四庫提要著録叢書

《四庫提要著録叢書》編纂委員會編纂

國家古籍整理出版重點項目

北京出版社

四庫提要著録叢書

《四庫提要著録叢書》編纂委員會編纂

國家古籍整理出版重點項目

北京出版社

子部第一三九冊目次

證治準繩六種四十四卷（一）（明）王肯堂撰　明萬曆三十年至三十六年刻本　〇〇一

證治準繩六種四十四卷（一）

（明）王肯堂撰

明萬曆三十年至三十六年刻本

證治準繩一百二十卷（通行本）

明王肯堂撰。肯堂有尚書要旨，已著錄。是編據肯堂自序，稱先撰證治準繩八冊，專論雜證，分十三門，附以類方八冊，皆成於丁酉戊戌間。其書採摭繁富，而參驗脈證，辨別異同，條理分明，具有端委。故博而不雜，詳而有要。於寒溫攻補無所偏主。視繆希雍之餘派，虛實不問，但談石膏之功；張介賓之末流，診候未施，先定人參之見者，亦爲能得其平。其諸傷門內附載傳尸勞諸蟲之形，雖似涉乎語怪，然觀北齊徐之才以死人枕療鬼疰，則專門授受，當有所傳，未可概疑以荒誕也。其傷寒準繩八冊，瘍醫準繩六冊，則成於甲辰。幼科準繩九冊，女科準繩五冊，則成於丁未。皆以補前書所未備。故仍以證治準繩爲總名。惟其方皆附各證之下，與雜證體例稍殊耳。史稱肯堂好讀書，尤精於醫。所著證治準繩，該博精詳，世競傳之。其所著鬱岡齋筆麈，論方藥者十之三四。蓋於茲一藝，用力至深，宜其爲醫家圭臬矣。

證治準繩自敘

余髮始燥則聞長老道說范文正公未達時禱于神以不得為良相願為良醫因歎古君子之存心濟物如此其切也當是時顓蒙無所知顧讀岐黃家言輒心開意解若有夙契者嘉靖丙寅毋病阽危常潤名醫延致殆徧言人人殊罕得要領心甚陋之於是銳志學醫既起亡妹于垂死漸為人知延診求方戶屨恒滿先君以為妨廢舉業常嚴戒之遂不復窮究無何舉于鄉

又十年成進士選讀中祕書備員史館凡四年請急歸旋被口語終已不振因伏自念受
聖主作養厚恩見謂儲相材雖萬萬不敢望文正公然其志不敢不立而其具不敢不勉以庶幾無負父師之教而今已矣定省之餘頗多暇日乃復取岐黃家言而肆力焉二親篤老善病即醫非素習固將學之而況乎輕車熟路也於是聞見日益廣而藝日益精鄉曲有抱沉痾醫技告窮者叩閽求方亡弗立應未嘗致謝厭心

所全活者稍稍衆矣而又念所濟僅止一方孰若著為書傳之天下萬世耶偶嘉善高生隱從余游因遂採取古今方論參以鄙見而命高生次第錄之遂先成雜病論與方各八巨袟高生請名余命之曰證治準繩高生曰何謂也余曰醫有五科七事曰脈曰因曰病曰證曰治為五科因復分為三曰內曰外曰亦內亦外并四科為七事如陰陽俱緊而浮脈也傷寒因也太陽病也頭痛發熱身痛惡寒無汗證也麻黃湯治也派析支分毫不容濫而時師皆失之不殀者

幸而免耳自陳無擇始發明之而其為三因極一方復語焉不詳李仲南為永類鈐方枝分派析詳矣而入理不精比附未確此書之所以作也曰五科皆備焉而獨名證治何也曰以言證治獨詳故也是書出而不知醫不能脈者因證檢書而得治法故也雖然大匠之所取平與直者準繩也而其能用準繩者心目明也倘守死句而求活人以準繩為心目則是書之刻且誤

天下萬世而余之罪大矣家貧無貲假貸爲之
不能就其半會侍御周鶴陽公以按鹺行縣至
金壇聞而助成之遂行于世時
萬曆三十年歲次壬寅夏五月朔旦念西居士
王肯堂宇泰識

證治準繩第一冊目錄

諸中門
卒中暴厥 中風
中寒 中暑
中濕 中氣
中食 中惡
五絕 自縊 摧壓 溺水 魘
諸傷門 傷寒傷風別爲一書
傷暑 傷濕
傷燥 傷飲食
傷勞倦 虛勞 瘵骨蒸熱
傳尸勞
寒熱門
發熱 潮熱
惡寒 振寒 氣分寒 三焦寒 寒痺 血分寒 五藏寒
往來寒熱 外熱內寒外寒內熱
上熱下寒上寒下熱 瘧
厥 寒厥手足冷 熱厥手足熱 尸厥

證治準繩第一冊

中國科學院圖書館藏

金壇王肯堂輯

卒中暴厥

經云暴病卒死皆屬於火註云火性速疾故也然初治之藥不寒而温不降而升甚者從治也俗有中風中氣中食中寒中暑中濕中惡之別但見卒然仆倒昏不知人或痰涎壅塞咽喉作聲或口眼喎斜手足癱瘓或半身不遂或六脉沉伏或指下浮盛者並可用麻油薑汁竹瀝調

蘇合香丸如口噤抉開灌之或用三生飲一兩加人參一兩煎成入竹瀝二三杯薑汁少許如抉不開不可進藥急以生半夏為末吹入鼻中或用細辛皂角菖蒲為末吹入得嚏則甦此可以驗其受病深淺則知其可治不可治詳見中風門口噤條　若口開手撒遺尿者虛極而陽暴脫也速用大料參芪接補之及臍下大艾灸之　痰涎壅盛者宜吐之急救稀涎散豬牙皂角肥實不蛀者四挺去黑皮晉礬光明者一兩各為細末研勻輕者五分重者三字温水調灌下又碧霞散揀上色精好石綠研篩水飛再研取二三錢同氷片三四豆許研勻以生薄荷汁合温酒調服之二藥不大嘔吐但微微令涎自口角流出自甦　舊說口開心絕手撒脾絕眼合肝絕遺尿腎絕聲如鼾肺絕皆為不治之症然五症不全見者速服參芪膏灸臍下亦有得生者　卒中眼上戴不能視者灸第二椎骨第五椎上各七壯一齊下火炷如半棗核大　若中人髮直吐

清沫搖頭上擡面赤如粧汗綴如珠或頭面赤黑眼閉口開氣喘遺尿皆不可治　諸中或未甦或已甦或初病或久病忽吐出紫紅色者死

傳心方云治男子婦人涎潮於心卒然中倒當即時扶入暖室中扶策正坐當面作好醋炭熏之令醋氣衝入口鼻內良久其涎潮聚於心者自收歸舊輕者即時甦醒重者亦省人事唯不可喫一滴湯水入喉也如喫湯水則其涎永繫於心絡不能去必成廢人

風邪中人六脉多沉伏亦有脉隨氣奔指下洪盛者浮遲吉堅大急疾凶　浮遲爲寒　虛大爲暑不當暑則爲虛　浮澀爲濕　浮大爲風浮數無熱亦爲風　微而數浮而緊沉而遲皆氣中　風應人迎　氣應氣口　洪大爲火滑爲痰　或浮而滑沉而滑微而虛者皆虛與痰　更當察時月氣候及其人之起居參以顯症而定病之主名以施治療

中風

中後當如東垣法分中血脉中府中藏施治靈樞經云虛邪偏客於身半其入深內居榮衛榮衛稍衰則眞氣去邪氣獨留發爲偏枯故其邪氣淺者脉偏痛又云偏枯身偏不用而痛言不變志不亂病在分腠之間巨針取之益其不足損其有餘乃可復也痱之爲病也身無痛者四肢不收志亂不甚其言微知可治甚則不能言不可治也此內經論中風之淺深也其偏枯身偏痛而言不變志不亂者邪在分腠之間即

仲景東垣所謂邪中府是也痱病無痛手足不收而言瘖志亂者邪入於裏即仲景東垣所謂邪中藏是也

中血脉外有六經之形症則以小續命湯加減及疎風湯治之　太陽經中風無汗惡寒於續命湯中加麻黃防風杏仁一倍針太陽經至陰出血崑崙舉蹻有汗惡風於續命湯中加桂枝芍藥杏仁一倍針風府　陽明經中風無汗身

熱不惡寒於續命湯中加石膏二兩知母二兩甘草一兩有汗身熱不惡風於續命湯中加葛根二兩桂枝黃芩各一倍針陷谷刺厲兌　太陰經中風無汗身涼於續命湯中加附子一倍乾薑加二兩甘草加三兩針隱白　少陰經中風有汗無熱於續命湯中加桂枝附子甘草各一倍針太谿　凡中風無此四證六經混淆繫於少陽厥陰或肢節攣痛或麻木不仁每續命八兩加羌活四兩連翹六兩刺厥陰之井大敦以通其經灸少陽之經絕骨以引其熱

中府內有便溺之阻隔宜三化湯或局方中麻仁丸通利之

外無六經之形症內無便溺之阻隔知為血弱不能養筋故手足不能運動舌強不能語言也宜大秦艽湯養血而筋自榮　若內外症俱有之先解表而後攻裏若內邪已除外邪已去當服愈風湯以行中道久服大風盡去縱有微邪只從愈風湯加減治之然治病之法不可失於通塞或一氣之微汗或一旬之通利如此乃常治之法也久之清濁自分榮衛自和矣

中藏痰涎昏冒宜至寶丹活命金丹之類若中血脈中府之病初不宜用龍腦麝香牛黃為麝香入脾治肉牛黃入肝治筋龍腦入腎治骨恐引風深入骨髓如油入麪莫之能出

中府者多兼中藏　如左關脈浮弦面目青左脇偏痛筋脉拘急目瞤頭目眩手足不收坐踞不得此中膽兼中肝也犀角散之類　如左寸脈浮洪面赤汗多惡風心神顛倒言語謇澀舌

強口乾忪悸恍惚此中小腸兼中心也加味牛黃散之類　如右關脈浮緩或浮大面唇黃汗多惡風口喎語澀身重怠惰嗜臥肌膚不仁皮肉瞤動腹脹不食此中胃兼中脾也防風散之類　如右寸脈浮濇而短鼻流清涕多喘胸中冒悶短氣自汗聲嘶四肢痿弱此中大腸兼中肺也五味子湯之類　如左尺脈浮滑面目黧黑腰脊痛引小腹不能俛仰兩耳虛鳴骨節疼痛足痿善恐此中膀胱兼中腎也獨活散之類

治風之法解表攻裏行中道三法盡矣然不
可執也如小續命湯亦麻黃桂枝之變麻黃桂
枝若不施於冬月卽病之傷寒而施於溫熱之
症未有不殺人者其可執乎　戴復菴云治風
之法初得之卽當順氣及其久也卽當活血久
患風疾因物湯吞活絡丹愈者正是此義若先
不順氣遽用烏附又不活血徒用防風天麻羌
活輩吾未見其能治也然順氣之藥則可破氣
瀉氣之藥則不可　卒仆偏枯之症雖有多因

未有不因眞氣不周而病者故黃芪爲必用之
君藥防風爲必用之臣藥黃芪助眞氣者也防
風載黃芪助眞氣以周於身者也亦有治風之
功焉許徹宗治王太后中風口噤煎二藥熏之
而愈況服之乎　多怒加羚羊角　渴加葛根
汁秦艽　口噤口喎亦加秦艽　恍惚錯語加
茯神遠志　不得睡加炒酸棗仁　不能言加
竹瀝荆瀝梨汁陳醬汁生葛汁人乳汁　內熱
加梨汁人乳生地黃汁　痰多加竹瀝荆瀝少

佐以薑汁　予每治此症用諸汁以收奇功爲
其行經絡滲分肉捷於湯散故也　[illegible]
三因白散子加木通燈心莖根煎湯　或[illegible]附子
潔古云中風如小便不利不可以藥利之既
已自汗則津液外亡小便自少若利之使榮衛
枯竭無以制火煩熱愈甚當俟熱退汗止小便
自行也　[illegible]濃煎參芪湯少加益智子頻啜
之　中風[illegible]風木盛也盛則尅脾脾受敵求
助於食經曰實則夢與虛則夢取當瀉肝木治

風安脾脾安則食少是其效也　此其大畧也
仍分症詳著於後
[illegible]橘紅一斤逆流水五碗煮數滾去
橘紅再煮至一碗頓服白湯導之吐痰之聖藥
也　竹瀝荆瀝少佐薑汁加入二陳湯星香散
中乃必用之藥　戴云肥人多中以氣盛於外
而歉於內也肺爲氣出入之道人肥者必氣急
氣急必肺邪盛肺金尅肝木膽爲肝之府故痰
涎壅盛所以治之必先理氣爲急中後氣未盡

順痰未盡降調理之劑唯當以藿香正氣散和星香散煎服此藥非特可以治中風之症中氣中惡霍亂尤宜　中後體虛有痰宜四君子湯和星香散或六君子湯和之　脉沉伏無熱者用三生飲加全蝎一箇　養正丹可以墜下痰涎鎮安元氣氣實者以星香湯吞之氣虛者以六君子湯吞之

口噤　以蘇合香丸或天南星氷片末或白梅末擦牙　以鬱金藜蘆末搐鼻　以黃芪防風

湯熏　鍼人中頰車各四分　白礬半兩鹽花一分細研揩點牙根下更以半錢七綿裹安牙盡頭　用甘草比中指節截作五截於生油內浸過炭火上炙候油入甘草以物斡開牙關令咬定甘草可人行十里許時又換甘草一截後灌藥極効

口眼喎斜　經曰木不及曰委和委和之紀其動緛戾拘緩又云厥陰所至爲緛蓋緛縮短也木不及則金化縮短乘之以勝木之條[illegible]

[illegible]口目喎斜也拘者筋脉拘强也木爲金之縮短乘引而喎斜拘强也緩者筋脉縱也木爲金乘則土寡於畏故土乘化緩縱於其空[illegible]而拘緩者自緩也故口目喎斜者多屬胃土然有筋脉之分焉經云足之陽明手之太陽筋急則口目爲僻眥急不能卒視此胃土之[illegible]喎斜也又云胃足陽明之脉挾口環脣[illegible]所生病者口喎脣斜此胃土之脉爲喎斜也口目常動故風生焉耳鼻常靜故風息焉治宜清陽湯秦艽升麻

湯或二[illegible]黃芪二錢人參當歸白芍[illegible]各一錢甘草桂枝各五分升麻葛根秦艽各一錢白芷防風蘇木紅花酒黃蘗各五分水酒各半煎稍熱服[illegible]有外感者加蔥白三莖同煎取[illegible]服不用　外以酒煎桂枝取汁一[illegible]筋[illegible]灸[illegible]灸之[illegible]以透

去外邪次燒乳香熏之以順其血脉
[illegible] 經云胃脉沉鼓濇胃外鼓大心脉
小堅急皆爲偏枯男子發左女子發右不瘖舌
轉可治三十日起其從者瘖三歲起年不滿二
十者三歲死蓋胃與脾爲表裏陰陽異位更實
更虛更逆更從或從內或從外是故胃陽虛則
內從於脾內從於脾則脾之陰盛故胃脉沉鼓
濇也濇爲多血少氣胃之陽盛則脾之陰虛虛
則不得與陽主內反從其胃越出於部分之外

故胃脉鼓大於臂外也大爲多氣少血心者元
陽君主宅之生血主脉因元陽不足陰寒乘之
故心脉小堅急小者陽不足也堅急者陰寒之
邪也夫如是心胃之三等脉凡有其一即爲偏
枯者何也蓋心是天真神機開發之本胃是穀
氣充大真氣之標標本相得則胸膈間之膻中
氣海所留宗氣盈溢分布四藏三焦上下中外
無不周徧若標本相失則不能致其氣於氣海
而宗氣散故分布不周於經脉則偏枯不榮

於五藏則瘖即此言之是一條可爲後之繩言
偏枯者綱領也未有不因真氣不周而病者也
故治療之方不用黃芪爲君人參當歸白芍藥
爲臣防風桂枝鈎藤竹瀝荆瀝薑汁韭汁葛汁
梨汁乳汁之屬爲佐使而雜乎烏附羌獨
之屬以潤燥行血衛如此死者皆發之也　丹
溪云大率多痰在左挾死血與無血在右挾氣
虛與痰亦是無本標之談不必拘之　古方
順風勻氣散虎骨散虎脛骨酒黃芪酒皆可用

外用蠶沙兩石分作三袋每袋可七升蒸熱
一袋着患處如冷再換一袋依前法數數換易
百不[illegible]也須羊肚釀粳米葱白薑椒豉等煮
爛熟空心食一具十日止
[illegible] 經云太陰所謂入中爲瘖者陽
盛已衰故爲瘖也內奪而厥則爲瘖俳此腎虛
也少陰不至者厥也夫瘖者[illegible]精上下焦通道
[illegible]脉與[illegible]陰腎之大
[illegible]起於腎下其循脉因[illegible]十

二經脈之海遂名海爲衝脈之上行者滲諸陽灌諸精下行者滲三陰灌諸絡而溫肌肉別絡結於跗因腎虛而腎絡與胞絡內絕不通於上則瘖腎脈不上循喉嚨挾舌本則不能言二絡不通於下則痱厥矣如是者以地黃飲子主之

竹瀝 荊瀝 大梨汁各一 生葛汁 人乳汁各二 陳醬汁半 和勻隔湯頓溫服 有痰者滌痰湯 內熱者涼膈散加石菖蒲遠志爲末煉蜜丸彈子大朱砂爲衣每服一丸薄荷湯化下名轉舌膏 寶鑑訶子湯正舌散茯神散

[illegible] 有虛有實實者脾土太過濕令濕退之中而愈虛者脾土不足十全散加減去邪[illegible]

[illegible] 鐵彈丸十味剉散[illegible]

[illegible] 活命金丹 至寶丹 至聖保命金丹

[illegible]中氣滿[illegible]丸

中風要[illegible]陰陽 陰中顏青臉白痰厥喘塞昏亂眩暈喎斜不遂或手足厥冷不知人多汗陽中臉赤如醉怒牙關緊急上視強直掉眩

[illegible]問云諸風掉眩支痛強直筋縮爲厥陰風木之氣自大寒至小滿風木君火二氣之位風主動善行數變木旺生火[illegible]多爲兼化且陽明燥金主於緊斂[illegible]風木爲病反見燥金之化由亢則害承乃制謂已過極則反似勝已之化故木極似金況風能勝濕而爲燥風病勢甚而成筋縮燥之甚也

有熱盛生風而爲卒仆偏枯者以麻桂烏附投之則殆[illegible]法治之綱珠經云以火爲本以風爲標心火暴甚腎水必衰肺金既摧肝木自旺[illegible]以瀉心火爲主或清心湯或瀉心[illegible]脈之[illegible]火降則肝木自平矣[illegible]以[illegible]或大便[illegible]三化湯下之內[illegible]以羌活愈風湯常服之[illegible]自已矣或舌謇不語者轉舌膏或活命金丹以治之此聖人心法也

有中風便牙關緊急漿粥不入急以三一承氣湯灌於鼻中待藥下則口自開矣然後按法治之

有元氣素弱或過於勞役或傷於嗜欲而卒然厥仆狀類中風者手必散口必開非大劑參芪用至斤許豈能回元氣於無何有之鄉哉亦有不仆而但舌強語澀痰壅口眼喎斜肢體不遂者作中風治必給以六君子湯加諸汁治之

寶鑑云凡人初覺大指次指麻木不仁或不用

者三年內有中風之疾也宜先服愈風湯天麻丸各一料此治未病之法也薛己云預防之理當養氣血節飲食戒七情遠幃幙可也若服前方以預防適所以招風取中也

中寒

中寒之症身體強直口噤不語或四肢戰掉或[illegible]惡寒或[illegible]發熱或卒然眩暈身無汗者此[illegible]所中也其[illegible]傷寒何也曰傷寒發熱而中寒不[illegible]傷寒詳之而中寒不[illegible]之又何也曰陽動陰靜動則[illegible]生靜則不[illegible]寒雖陰邪深[illegible]而成熱遂從乎陽[illegible]傳變不一靡有定方故須推其所之之病不得不詳也其不成熱者則是邪中於陰形之中一定

而不移不[illegible]不變不變則止在所中寒處而生病是[illegible]不必詳也治之先用酒調蘇合香丸[illegible]香附一錢麝香少許重則用[illegible]人[illegible]身體回暖漸能言語須更[illegible]脈遲緊挾氣帶洪攻刺作痛[illegible]木香半[illegible]挾風帶汗眩暈不仁加防風一錢挾濕帶[illegible]疼痛加白朮一錢[illegible]木瓜一錢肢節疼痛加桂一錢亦[illegible]大抵中在皮膚則為子

中在肉則爲苛爲重爲聚液分裂而痛或痛在四肢或痛在胸脇或痛在脛背或痛在小腹引睾或經脉引注藏府之膜原爲心腹痛或注連於藏府則痛死不知人中於筋骨爲筋攣骨痛屈伸不利中入六府五藏則仲景述在金匱要畧中所以肺中寒者吐濁涕肝中寒者兩臂不能舉舌本燥喜太息胸中痛而不得轉側則吐而汗出也心中寒者其人苦心中如噉蒜狀劇者心痛徹背背痛徹心譬如蠱注其脉浮者自

吐乃愈不言脾腎二藏中寒者缺文也然所謂中藏者乃中五藏所居畔界之郭內間隔其經藏氣不得出入故病若眞中藏則死矣　永類鈐方云肝中寒其脉人迎并左關緊而弦其證惡寒發熱面赤如有汗胸中煩脇下攣急足不得伸　心中寒者其脉人迎并左寸緊而洪其證如斂其證則心痛徹背惡寒四肢厥自吐昏塞不省　脾中寒其脉人迎并右關緊而沉其[illegible]心腹脹[illegible]吐[illegible]不通或氣不傳或

秘或泄　肺中寒其脉人迎并右寸緊而滑其證善吐濁氣短不能報息洒洒而寒吸吸而咳腎中寒其脉人迎并左尺緊而滑其證色黑氣弱吸吸少氣耳聾腰痛膝下拘疼昏不知人治當審微甚甚則以薑附湯爲主微則不換金正氣散加附子附子五積散臍腹痛四肢厥附子理中湯薑附湯入肝加木瓜入肺加桑白皮入脾加术入心加茯苓

中暑 [illegible]傷暑門

中暑之症面垢悶倒昏不知人冷汗自出手足微冷或吐或瀉或喘或滿以來復丹末同蘇合香丸用湯調灌或以來復丹研末湯調灌之却暑散水調灌下亦得候其人稍甦則用香薷飲香薷湯煎熟去滓入麝香少許服或刺蒜肉入鼻中或研蒜水解灌之蓋中傷暑毒陽外陰內諸暑藥多有煖劑如大順散之用薑桂枇杷葉散之用丁香香薷飲之用香薷香薷味辛性煖蒜

亦辛煖又[illegible]能通諸竅大[illegible]香之物皆[illegible] [illegible]死人切勿便與冷水及卧冷地止如凍死人須先與冷水若近火即死一法行路暍死人惟得置日中[illegible]令近火以熱湯灌之即活 初覺中暑即以日曬瓦或[illegible]易換其心腹臍下急以[illegible]氣丹末[illegible]下 一方用[illegible]多少削去[illegible]合[illegible] [illegible]服一[illegible]

新汲水調下氣虛人溫[illegible]調下皆迷不省者不過兩服蓋中暑人痰塞關竅[illegible]能[illegible]去痰故也 又有暑[illegible]證似中而輕欲[illegible]語[illegible]人香薷飲[illegible] 氣虛人星香飲加香薷[illegible]後冷汗[illegible]足尚逆煩悶多渴者宜香薷飲[illegible]吐利不止外[illegible]內[illegible]煩燥多渴[illegible]或如[illegible]陰絡陽宜用溫藥香薷飲加附子浸冷服渴者縮脾飲加附子亦[illegible]冷服

東垣云[illegible]謂之中暑中暑者陰證當發散也[illegible]大[illegible]中暑[illegible]寒身形[illegible] [illegible]

子139 011

熱外傷肺氣宜蒼术白虎湯主之　薛氏云若人元氣不足用前藥不應宜補中益氣湯主之大抵夏月陽氣浮於外陰氣伏於內若人飲食勞倦內傷中氣或酷暑勞役外傷陽氣者多患之法當調補元氣爲主而佐以解暑若中暍者乃陰寒之症法當補陽氣爲主少佐以解暑故先哲多用薑桂附子之類此推內經捨時從證之良法也今患暑症殁而手足指甲或肢體青黯此皆不究其因不溫補其內而泛用香薷飲之類所誤也夫香薷飲乃散陽氣導真陰之劑也須審有是證而服亦何患哉若人元氣素虛或犯房過度而飲之適所以招暑也

中濕　叅看傷濕門

風寒暑濕皆能中人惟濕氣積久留滯關節故能中非如風寒暑之有暴中也中濕之證關節重痛浮腫喘滿腹脹煩悶昏不知人其脉必沉而緩或沉而微細宜除濕湯白术酒　有破傷處因澡浴濕氣從瘡口中入其人昏迷沉重狀類中濕名曰破傷濕宜白术酒

中氣

中氣因七情內傷氣逆爲病痰潮昏塞牙關緊急七情皆能爲中因怒而中者尤多大畧與中風相似風與氣亦自難辨風中身溫氣中身冷風中多痰涎氣中無痰涎風中脉浮應人迎氣中脉沉應氣口以氣藥治風則可以風藥治氣則不可纔覺中氣急以蘇合香丸灌之候醒繼以八味順氣散加香附三五錢或木香調氣散若有餘痰未盡平復宜多進四七湯及星香散

或 醫方經 三十三

若其人本虛痰氣上逆關隔不通上下升降或大便虛秘宜用三和丹

中食

中食之證忽然厥逆昏迷口不能言肢不能舉狀似中風皆因飲食過傷醉飽之後或感風寒或着氣惱以致填塞胸中胃氣有所不行陰陽痞隔升降不通此內傷之至重者人多不識若作中風中氣而以祛風行氣之藥重傷胃氣其死可立而待不若先煎薑鹽湯探吐其食仍服其風寒尚在者以藿香正氣散解之氣滯不行者以八味順氣散調之吐後別無他證只用平胃散加白术茯苓半夏麴蘗之類調理如遇此卒暴之病必須審問明白或方食醉飽或飲食過傷但覺胸膈痞悶痰涎壅塞氣口脉緊盛者且作食滯治之

口食 醫方經 三十四

戴云人之飲食下咽而入肝由肝而入脾由脾而入胃因食所傷肝氣不理故痰逆[illegible]若中風然亦有手足不遂者肝主[illegible]也治以[illegible]按[illegible]進飲食[illegible]而[illegible]入脾[illegible]理[illegible]其必行[illegible]矣[illegible]

[illegible]

中惡

中惡之證因冒犯不正之氣忽然手足逆冷肌膚粟起頭面青黑精神不守或錯言妄語牙緊口噤或頭旋暈倒昏不知人即此是卒厥客忤飛尸鬼擊弔死問喪入廟登塚多有此病蘇合香丸灌之候稍蘇以調氣散和平胃散服名調氣平胃散

五絕

治五絕一自縊二牆壓三溺水四魘魅五產乳用半夏一兩末之爲丸豆大內鼻中愈心溫者

[illegible]治

仲景云自旦至暮雖已冷必可治暮至旦小難恐此當言陰氣盛故也然夏時夜短於晝又熱猶應可治又云心下若微溫者一日以上猶可治之當徐徐抱解不得截繩上下安被臥之一人以腳踏其兩肩手挽其髮常令弦急勿使縱緩一人以手按據胸上數摩動之一人摩捋臂脛屈伸之若已殭但漸漸強屈之并按其腹如此一炊頃氣從口出呼吸眼開仍引按莫置亦勿勞之須臾可少與桂湯及粥清含與之令濡喉漸漸能嚥乃止更令兩人以管吹其兩耳此法最善無不活者　自縊者切不可割斷繩子以膝頂住穀道用手厚裹衣物緊[illegible]放下揉其項癰捻圓鼻孔吹其兩耳待氣回方可放手若便泄氣則不可救

矣。肘後方自縊死安定心神徐徐解之愼勿
割縄斷須抱取心下猶溫者刺雞冠血滴口中
卽活男雌女雄　又方雞屎白如棗大酒半盞
和灌及鼻中尤妙　千金方以藍汁灌之餘法
同上　自縊死但身溫未久者徐徐放下將喉
氣管捻圓揪髮向上揉擦用口對口接氣糞門
用火筒吹之以半夏皁角搐鼻以薑汁調蘇合
香丸灌之或煎木香細辛湯調灌亦得徘甦可
治縊小痕深過時者不治

【跌壓】卒暴擊壓倒打死心頭溫者皆可救將
本人如僧打坐令一人將其頭髮控放低用半
夏末吹入鼻內如活却以生薑汁香油打勻灌
之　餘詳折傷門

【溺水】撈起以尸橫伏牛背上無牛以凳控
于貴水冬月以綿被圍之却用皂角以生薑自
然汁灌之上下以灰擦之得甦可治若五孔
有血者不治　金匱救溺死方取竈中灰兩石
埋之從頭至足水出七孔卽活　溺水者放大

発上腰者將脚後跟脚站起二磚却雞[illegible]
中待其水自流出切人可倒提出水此數等但
心頭微熱者皆可救治　又方溺水死一宿者
尚活搗皂角綿裹納下部須臾出水卽活

【魘】神虛氣濁風痰客於心肺所以得夢不覺
濁氣閉塞而死[illegible]不可用燈照者不治急以
[illegible]搐鼻取引出腸[illegible]次以蘇合香丸導動滯氣
亂則甦若身體冷者不治　魘死不得近前
喚但痛咬其[illegible]以唾其面[illegible]不醒者移動些少

則徐徐喚[illegible]有燈則存無燈切不可點燈
肘後[illegible]不知多以水噀之[illegible]殺人[illegible]嚙
大趾[illegible]其[illegible]取韭搗汁吹鼻孔冬
月用[illegible]以[illegible]中　皂角細末如大豆大
[illegible]氣通　雄黃搗末篩以
[illegible]

傷暑傷暑與熱病相似但熱病脈盛中暑脈虛以此別之又有濕溫與中暑同但身涼不渴為異耳

此事難知傷暑有二　動而傷暑心火大盛肺氣全虧故身脈洪大動而火勝者熱傷氣也辛苦人多得之白虎加人參湯　靜而傷暑火勝金位肺氣出表故惡寒脈沉疾靜而濕勝者身體重也安樂之人多受之白虎加蒼术湯　傷暑必自汗背寒面垢或口熱煩悶或頭疼發熱神思倦怠殊甚暑傷氣而不傷形故也但身體

不痛與勝濕實異宜香薷飲香薷湯六和湯　嘔而渴者浸冷香薷湯或五苓散兼吞消暑丸　嘔不止白枇杷葉散去茅根吞來復丹嘔而痰却吞[illegible]散吞消暑丸或小半夏茯苓湯或消暑飲　瀉而渴生料平胃散和生料五苓散各半貼名胃苓散或理中湯加黃連名連理湯瀉定仍渴春澤湯或縮脾飲　瀉而腹痛有積者生料五苓散藿香正氣散各半貼若瀉雖無積其腹痛甚生料五苓散加木香作七分或六和湯加木香半錢或不加木香止與二藥煎熟去滓調下蘇合香丸　又有不瀉而腹乾痛者六和湯煎熟調蘇合香丸　瀉而發熱者胃苓散瀉而發渴者胃苓散兼進縮脾飲瀉渴兼作未透者湯化蘇合香丸吞來復丹或研來復丹作末白湯調下已上並宜香薷飲感冒外發熱者六和湯香薷湯香薷飲或熱煩者五苓散或香薷湯加黃連一錢熱而汗多畏風甚者生料五苓散熱而渴者五苓散兼進縮脾飲　暑氣攻裏熱不

解心煩口渴辰砂五苓散或香薷飲加黃連一錢若大渴不止辰砂五苓散吞酒煮黃連丸　暑氣攻裏腹內刺痛小便不通生料五苓散加木香七錢或止用益元散　冒暑飲酒引暑入腸內酒熱與暑氣相併發熱大渴小便不利其色如血生料五苓散去桂加黃連一錢或五苓散去桂吞酒煮黃連丸　暑氣入腸胃而大便艱澀不通者加味香薷飲仍佐以三黃丸　暑氣入心身熱而驚者辰砂五苓散或香薷飲

加黃連一錢　傷暑而傷食者其人頭疼背寒自汗發熱畏食惡心噫酸臭氣胸膈痞滿六和湯倍砂仁　若因暑渴飲食冷物致內傷生冷外傷暑氣亦宜此藥　暑先入心者心爲南方離火各從其類小腸爲心之府利心經暑毒使由小腸中出五苓散利小便爲治暑上劑也　有傷於暑因而露卧又爲冷氣所入其人自汗怯風身疼頭痛去衣則凜著衣則煩或已發熱或未發熱宜六和湯內加扁豆砂仁一方用

藿香一方用紫蘇正治已感於暑而復外感於風寒或內傷生冷以藿香紫蘇兼能解表砂仁扁豆兼能溫中然感暑又感冷亦有無汗者只宜前藥若加以感風則斷然多汗審是此症宜生料五苓散內用桂枝爲佳市井中多有此病往往日間冒熱經營夜間開窗眠卧欲取清涼失蓋不覺用藥所當詳審有此症而發潮熱似瘧猶未成瘧者六和湯香薷湯各半貼相和煎　有[illegible]而鼻流清涕或鼻孔熱氣時出者六和湯加川芎半錢羌活黃芩各七分　有因傷暑遂極飲以冷水致暑毒留結心胸精神昏憒語音不出者煎香薷湯化蘇合香丸　若先飲冷後傷暑者五苓散主之此必心下痞懷生薑湯調服佳或四君子湯調中亦可中和後或小便不利或莖中痛宜蒲黃三錢滑石五錢甘草一錢　有因傷暑用水沃面或入水洗浴暑濕相搏自汗發熱身重小便不利宜五苓散　傷暑而大汗不止甚則真元耗散宜急收其汗生料

五苓散倍[illegible]加黃芪如术之數　傷暑自汗手足厥冷者[illegible]六和湯調蘇合香丸　傷暑自汗手足時[illegible]搐搦者謂之暑風緣已傷於暑毛孔開[illegible]風乘之宜香薷飲或香薷湯並加羌[illegible]六和湯半貼和[illegible]香散半貼暑[illegible]風木子六[illegible]加以吐瀉交作[illegible]各半貼加[illegible][illegible]出不

能過關或上氣喘急六和湯浸冷調入麝香少許　伏暑煩渴而多熱痰者於消暑丸中每兩入黄連末二錢名黄連消暑丸或二陳湯或小半夏茯苓湯並可加黄連一錢　暑氣久而不解遂成伏暑內外俱熱煩躁自汗大渴喜冷宜香薷飲加黄連一錢繼進白虎湯若服藥不愈暑毒深入結熱在裏譫語煩渴不欲近衣大便秘結小便赤澀當用調胃承氣湯或三黄石膏湯

清暑益氣湯　時當長夏濕熱大勝蒸蒸而熾人感之

四肢困倦精神短少懶於動作胸滿氣促肢節沉疼或氣高而喘身熱而煩心下膨痞小便黄而數大便溏而頻或利出黄如糜或如泔色或渴或不渴不思飲食自汗體重或汗少者血先病而氣不病也其脈中得洪緩若濕氣相搏必加之以遲遲病雖互換少差其天暑濕令則一也宜以清燥之劑治之內經曰陽氣者衛外而為固也炅則氣泄今暑邪干衛故身熱自汗以黄芪甘溫補之為君人參陳皮當歸甘草甘微溫補中益氣為臣蒼朮白朮澤瀉滲利而除濕升麻葛根苦甘平善解肌熱又以風勝濕也濕勝則食不消而作痞滿故以炒麴甘辛青皮辛溫消食快氣腎惡燥急食辛以潤之故以黄柏苦辛寒借甘味瀉熱補水虛者滋其化源以人參五味子麥門冬酸甘微寒救天暑之傷於肺也　名曰清暑益氣湯此病皆由飲食勞倦損其脾胃乘天暑而病作也但藥中犯澤瀉猪苓茯苓燈心通草木通淡味滲利小便之類

皆從時令之旺氣以泄脾胃之客邪而補金水之不及也此正方已是從權而立之若於其時病濕熱脾旺之証或小便已數腎肝不受邪者誤用之必大瀉真陰竭絕腎水先損其兩目也復立變証加減法於後　如心火乘脾乃血受火邪而不能升發陽氣伏於地中地者人之脾也必用當歸和血少用黄柏以益真陰　如脾胃不足之証須少用升麻乃足陽明太陰引經之藥也使行陽道自脾胃中右遷少陽行春

令生萬物之根蒂也更少加柴胡使諸經右遷
生發陰陽之氣以滋春之和氣也　如脾虛緣
心火亢盛而乘其土也其次肺氣受邪為熱所
傷必須用黃芪最多甘草次之人參又次之三
者皆甘溫之陽藥也脾始虛肺氣先絕故用黃
芪之甘溫以益皮毛之氣而閉腠理不令自汗
而損其元氣也上喘氣短懶言語須用人參以補
之心火乘脾須用炙甘草以瀉火熱而補脾胃
中元氣甘草最少恐滋滿也若脾胃之急痛并

脾胃大虛腹中急縮腹皮急縮者却宜多用經
曰急者緩之若從權必加升麻以引之恐左遷
之邪堅盛卒不肯退反致項上及臀尻肉消而
行陰道故引之以行陽道使清氣出地右遷而
上行以和陰陽之氣也若中滿者去甘草咳甚
者去人參口乾嗌乾者加乾葛　如脾胃既虛
不能升浮為陰火傷其生發之氣榮血大虧榮
氣伏於地中陰火熾盛日漸煎熬血氣虧少且
心包與心主血血減則心無所養致使心亂而

煩病名曰悗悗者心惑而煩悶不安也是由清
氣不升濁氣不降清濁相干亂於胸中使周身
血氣逆行而亂經云從下上者引而去之故當
加辛溫甘溫之劑生陽陽生而陰長也或曰甘
溫何能生血又非血藥也曰仲景之法血虛以
人參補之陽旺則能生陰血也更加當歸和血
又宜少加黃柏以救腎水蓋甘寒瀉熱火火減
則心氣得平而安也如煩亂猶不能止少加黃
連以去之蓋將補腎水使腎水旺而心火自降

扶持就中陽氣也　如氣浮心亂則以朱砂安
神丸鎮固之得煩減勿再服以防瀉陽氣之反
陷也如心下痞亦少加黃連氣亂於胸為清濁
相干故以陳皮理之能助陽氣之升而散滯氣
又為諸甘辛為用故長夏濕土客邪火旺可從
權加蒼朮白朮澤瀉上下分消其濕熱之氣濕
氣大勝主食不消化故食減不知穀味加炒麯
以消之復加五味子麥門冬人參瀉火益肺氣
助秋損也　在三伏中長夏正旺之時藥也

夫脾胃虛弱必上焦之氣不足遇夏天氣熱甚損傷元氣怠惰嗜臥四肢不收精神不足兩脚痿軟遇早晚寒厥日高之後陽氣將旺復熱如火乃陰陽氣血俱不足故或熱厥而陰虛或寒厥而氣虛口不知味目中溜火而視物䀮䀮無所見小便頻數大便難而秘結胃脘當心而痛兩脇痛或急縮臍下周圍如繩束之急甚則如刀刺腹難舒伸胸中閉塞時顯嘔噦或有痰嗽口沃白沫舌強腰背胛皆痛頭痛時作食不下

或食入即飽全不思食自汗尤甚若陰氣覆在皮毛之上皆天氣之熱助本病也乃庚大腸辛肺金為熱所乘而作當先助元氣治庚辛之不足黃芪人參湯主之

夫脾胃虛弱至六七月間河漲霖雨諸物皆潤人汗沾衣身重短氣甚則四肢痿軟行步不正脚欹眼黑欲倒者此腎水與膀胱俱竭之狀也當急救之滋肺氣以補水之上源又使庚大腸不受邪熱不令汗大泄也汗泄甚則亡津液亡津液則七神無所依經云津液相成神乃自生津者庚大腸所主三伏之義為庚金受囚也若亡津液汗大泄濕令亢甚則清肅之氣亡燥金受囚風木無制故風濕相搏骨節煩疼一身盡痛亢則害承乃制也孫思邈云五月常服五味子是泄丙火補庚金大腸益五臟之元氣壬膀胱之寒已絕於巳癸腎水已絕於午今更逢濕旺助熱為邪西方北方之寒清絕矣聖人立法夏月宜補者補天元之真氣非補熱火也令人

夏食寒是也為熱傷元氣以人參麥門冬五味子生脈脈者元氣也人參之甘補元氣瀉熱火也麥門冬之苦寒補水之源而清肅燥金也五味子之酸以瀉火補庚大腸與肺金也當此之時無病之人亦或有二病況素損脾胃有宿疾之人遇此天暑將理失所違時伐化必困乏無力懶語氣短氣弱氣促似喘非喘骨乏無力其形如夢寐朦朦如煙霧中不知身所有也必大汗泄若風犯汗眼皮膚必搐項筋皮枯毛焦身

體皆重肢節時有煩疼或一身盡疼或渴或不渴或小便黃澀此風濕相搏也頭痛或頭重上熱壅盛口鼻氣短氣促身心煩亂有不樂生之意情思慘悽此陰勝陽之極也病甚則傳腎肝爲痿厥厥者四肢如在火中者爲熱厥四肢寒冷者爲寒厥寒厥則腹中有寒熱厥則腹中有熱爲脾主四肢故也若肌肉濡漬痺而不仁傳爲肉痿証証中皆有肺疾用藥之人當以此調之氣上衝胸皆厥証也痿者四肢痿軟而無力

也其心煩冤不止厥者氣逆也甚則大逆故曰厥逆其厥痿多相類也於前已立人參黃芪五味子麥門冬湯中每加白茯苓二分澤瀉四分猪苓白朮各一分如小便快利不黃澀者只加澤瀉二分與二朮上下分消其濕　如行步不正脚膝痿弱兩足欹側已中痿邪者加酒洗黃柏知母三分或五分令二足涌出氣力　如汗大泄者津脫也急止之加五味子六粒炒黃柏五分炒知母三分不令妨其食當以意斟酌若妨食則止候食進再服取三里氣衝以三稜鍼出血若汗不減不止者於三里穴下三寸上廉穴出血禁酒濕麪

六七月之間濕令大行子能令母實而熱旺濕熱相合而刑庚大腸故用寒涼以救之燥金受濕熱之邪絕寒水生化之源源絕則腎亡痿厥之病大作腰以下痿軟癱瘓不能動行不正兩足欹側以清燥湯主之

子139 021

傷濕

濕有天之濕霧露雨是也天本乎氣故先中表之榮衛有地之濕水泥是也地本乎形故先傷皮肉筋骨血脉有飲食之濕酒水乳酪之類是也胃爲水穀之海故傷於脾胃有汗液之濕汗液亦氣也止感於外有人氣之濕太陰濕土之所化也乃動於中治天之濕當同司天法濕上甚而熱者平以苦溫佐以甘辛以汗爲効而止如金匱要畧諸條之謂風濕相搏身上疼痛者是也治地之濕當同在泉法濕淫於內治以苦熱佐以酸淡以苦燥之以淡泄之治飲食之濕在中奪之在上吐之在下引而竭之汗液之濕同司天者治雖人氣屬太陰脾土所化之濕者在氣交之分也與前四治有同有異何者土兼四氣寒熱溫涼升降浮沉備在其中脾胃者陰陽異位更實更虛更逆更從是故陽盛則木勝合爲風濕至陽盛則火勝合爲濕熱陰盛則金勝合爲燥濕至陰盛則水勝合爲陰濕爲兼四

氣故淫泆上下中外無處不到大率在上則病嘔吐頭重胸滿在外則身重腫在下則足脛胕腫在中腹脹中滿痞塞當分上下中外而治隨其所兼寒熱溫涼以爲佐使至若先因乘尅以致脾土虛而成濕者則先治勝克之邪或脾胃本虛而生濕者則用補虛爲主或鬱熱而成濕者則以發熱爲要或脾胃之濕淫泆流於四肢與皮肉血脉之間者大槩濕主乎否塞以致所受之邪溢滿不得通疏本臟之病因而發痛其筋骨皮肉血脉受之則發爲痿痺緩弱痛重不任爲用所治之藥各有所入能入於此者不能入於彼且濕淫爲病內經所論豈出於各病不同治濕亦不一而見凡切於治功者便是要藥今丹溪書乃止歸重蒼朮一味豈理也哉

傷濕爲病發熱惡寒身重自汗骨節疼痛小便秘澁大便多泄腰脚痺冷皆因坐臥卑濕或冒雨露或著濕衣所致並除濕湯　具前諸症而腰痛不能轉側如繫五六貫重者濕氣

入腎腎主水水流濕從其類也腎著湯滲濕湯
小便秘大便溏雨淫腹疾故也五苓散吞戊
已丸戊已屬土土尅水因以得名五苓乃濕家
要藥所謂治濕不利小便非其治也　傷濕而
兼感風者但有前項證而又惡風不欲去衣被
或額上微汗或身體微腫汗漬衣濕當風坐臥
多有此證宜除濕湯桂枝湯各半貼和服令微
發汗若大發其汗則風去濕在已得汗而發熱
不去者敗毒散加蒼术一錢防已半錢　傷濕

又兼感寒有前諸證但無汗慘慘煩痛宜五積
散和除濕湯半貼和五苓散半貼　傷濕而兼
感風寒者汗出身重惡風喘滿骨節煩疼狀如
歷節風臍下連脚冷痺不能屈伸所謂風寒濕
[illegible]而成痺宜防已黃芪湯或五痺湯　若因浴
出未解[illegible]身上未乾[illegible]熱[illegible]攻及腎經外
[illegible]腰[illegible]只以五苓散一貼入真[illegible]少
[illegible]如此三服藏府[illegible]消腰[illegible]
[illegible]者治熱滲濕湯其證[illegible]

背沉重疼痛上熱胸膈不利及徧身疼痛者拈
痛湯　酒麪乳酪停滯不能運化而濕自內盛
者除濕散及蒼白二陳湯加消息之[illegible]之

傷燥

内經曰諸燥枯涸乾勁皴揭皆屬於燥乃陽明燥金肺與大腸之氣也燥之爲病皆屬燥金之化然能令金燥者火也故曰燥萬物者莫熯乎火夫金爲陰之主爲水之源而受燥氣寒水生化之源竭絶於上而不能灌溉周身營養百骸色乾而無潤澤皮膚滋生毫毛者有自來矣或大病而剋伐太過或吐利而亡津液或預防養生悞餌金石之藥或房勞致虚補虚燥劑食味

過厚辛熱太多醉酒炙肉皆能偏助狂火而損害眞陰陰中伏火日漸煎熬血液衰耗使燥熱轉甚爲諸病在外則皮膚皴揭在上則咽鼻焦乾在中則水液衰少而煩渴在下則腸胃枯涸津不潤而便難在手足則痿弱無力在脉則細濇而微此皆陰血爲火熱所傷也治法當以甘寒[illegible]之劑[illegible]生血實能勝熱陰得滋而火[illegible]陰源泉下降精血上榮如是則氣[illegible]入而外色澤矣滋燥養榮湯大補地黄丸淸凉飲子導滯通幽湯潤腸丸八正散皆燥病中隨症酌用之方法也

傷飲食

東垣曰陰陽應象論云水穀之寒熱感則害人六府痺論云陰氣者靜則神藏躁則消亡飲食自倍腸胃乃傷此乃混言之也分之為二飲也食也飲者水也無形之氣也因而大飲則氣逆形寒飲冷則傷肺肺病則為喘咳為腫為水瀉輕則當發汗利小便使上下分消其濕解酲湯五苓散生薑半夏枳實白朮之類是也如重而蓄積為滿者芫花大戟甘遂牽牛之屬利下之

此其大法也食者物也有形之血也如生氣通天論云因而飽食筋脈橫解腸澼為痔又云食傷太陰厥陰寸口大於人迎兩倍三倍者或嘔吐或痞滿或下利腸澼當分寒熱輕重治之輕則內消重則除下如傷寒物者半夏神麯乾薑三稜廣茂巴豆之類主之如傷熱物者枳實白朮青皮陳皮麥糵黃連大黃之類主之亦有宜吐者陰陽應象論云在上者因而越之瓜蒂散之屬主之然而不可過劑過則反傷脾胃蓋先

因飲食自傷又加之以藥過故腸胃復傷而氣不能化食愈難消矣漸至羸困故五常政大論云大毒治病十去其六小毒治病十去其七常毒治病十去其八無[illegible]治病十去其九不可過之此聖人之深戒也[illegible]之[illegible]胸[illegible]痞塞吐[illegible]發熱惡寒病似傷寒但氣口大於人迎[illegible]倍[illegible]不痛耳內傷熱與傷冷物者治中湯加砂仁一錢下紅丸子小七香丸內有熱與傷熱物者上二黃丸枳朮導滯

丸通用保和丸枳朮丸麯糵枳朮丸木香枳朮丸檳榔丸木香檳榔丸　傷肉食濕麵辛辣厚味之物[illegible]不快[illegible]枳朮丸　傷熱[illegible]　傷濕[illegible]黃丸[illegible]枳朮導[illegible]湯[illegible]不消心下[illegible]脹[illegible]根汁飲之　食自[illegible]度生[illegible]

在胸膈不化必成癥瘕擣馬鞭草汁及生薑汁飲之　傷冷食半夏枳朮丸小便淋加澤瀉與熱不調每服加上二黃丸十丸或用木香乾薑枳朮丸丁香爛飯丸　張仲景治宿食在上脘以瓜蒂散吐之不可下之凡脉浮而大按之反濇尺中亦微而濇或數而滑或緊如轉索無常及下利不欲食者皆宿食也皆用大承氣湯下之其人熱甚傷物亦熱者宜之其人寒其傷物亦寒者不宜也戴云傷食腹痛脹滿大便不通

傷飲食　四十九

者遂虛食積小七香丸一貼用水一盞薑二片煎八分去滓吞感應丸此下傷冷之方也　大抵氣口脉緊盛者宜下尺脉絕者宜吐經曰氣口脉盛傷於食心胃滿而口無味口與氣口同口曰坤口乃脾之候故胃傷而氣口緊盛夫傷有多少有輕重如氣口一盛得脉六至則傷於厥陰乃傷之輕也枳朮丸之類主之氣口二盛脉七至則傷於少陰乃傷之重也雄黃聖餅子木香檳榔丸枳殼丸之類主之氣口三盛

脉得八至九至則傷太陰填塞悶亂則心胃大痛備急丸神保丸消積丸之類主之凡欲吐不已俗呼食迷風是也經曰上部有脉下部無脉其人當吐不吐者死瓜蒂散主之如不能吐是無治也經曰其高者因而越之此之謂也或曰盛食填塞胸中兩寸脉當用事今反兩尺脉不見其理安在曰胸中有食是木鬱宜達故探吐之食者物也物者坤土也是足太陰之號也胸中者肺也為物所塞肺者手太陰金也

傷飲食　五十

金主殺伐與坤土俱在乎上而旺於天金能克木故肝木發生之氣伏於地下非木鬱而何吐去上焦陰土之物木得舒暢則鬱結去矣食塞於上脉絕於下若不明天地之道無由達此至理水火者陰陽之徵兆天地之別名也故獨陽不生獨陰不長天之用在於地下則萬物生長地之用在於天上則萬物收藏此乃天地交而萬物通也此天地相根之道也故陽火之根本於地下陰水之源本於天上故曰水出高源故

人五藏主有形之物物者陰也陰者水也右三部脉主之偏見於寸口食塞於上是絕五藏之源源絕則水不下流兩尺脉之絕此其理也何疑之有然必視所傷之物冷熱隨證加減如傷冷物一分熱物二分則用寒藥二停熱藥一停隨時消息經云必先歲氣無伐天和此之謂也既有三陰可下之法亦必有三陰可補之法故曰內傷三陰可用溫劑若飲冷內傷雖云損胃未知色脉各在何經若面色青黑脉浮沉不

傷飲食 進經

一弦而弱者傷在厥陰若面色紅赤脉浮沉不

一細而微者傷在少陰若面色黃[illegible]脉浮沉不

一緩而遲者傷在太陰也傷在厥陰肝之經當歸四逆湯加吳茱萸生薑湯[illegible]之傷在少陰腎之經通脉四逆湯[illegible]之傷在太陰脾之經理中丸湯[illegible]人便[illegible]者[illegible]湯[illegible]者宜丸　凡[illegible]微[illegible]　微弦傷冷[illegible]　微[illegible]傷[illegible]物經云[illegible]　微[illegible]用[illegible]物[illegible]脉[illegible]　弦[illegible]

傷[illegible]硬物經云辛勝酸　洪[illegible]云酸脉甘　微遲傷冷痰積[illegible]　浮洪並伏主物不消化[illegible]藥二錢廣茂之類　傷[illegible]其作瀉不止而數皆中酒蓊餅陳皮茯苓[illegible]於應服藥中加肉[illegible]以收固之　傷食兼感風寒[illegible]與前同但添[illegible]疼氣口人迎俱盛[illegible]謂夾食傷寒宜生料五積散或養胃湯香蘇飲和解[illegible]

傷酒惡心[illegible]頭痛如破

傷食[illegible]

宜沖和[illegible]理中湯加乾葛七分或用[illegible]代酒瀉縮脾湯或煎乾[illegible]久[illegible]於酒遂成酒積腹痛泄瀉[illegible]然並宜酒蒸黃連丸[illegible]中有塊隨氣上下沖和湯[illegible]半夏湯加[illegible]半夏一錢茯苓[illegible]之妙一名枳損一[illegible]人名曰[illegible]瓜[illegible]

之白石樹杭州貨賣名蜜屈立詩所謂南山有枸是也樹形似白楊其子着枝端如小指長數寸屈曲相連春生秋熟經霜後取食如餳美以此木作屋柱令一室之酒味皆淡薄趙以德治酒人發熱用枝矩子而愈即此也　東垣云酒者大熱有毒氣味俱陽乃無形之物也若傷之止當發散汗出則愈矣其次莫如利小便乃上下分消其濕今之病酒者往往服酒癥丸大熱之藥下之又有用牽牛大黃下之者是無形元氣受病反下有形陰血乖誤甚矣酒性大熱已傷元氣而復重瀉之亦損腎水真陰及有形陰血俱為不足如此則陰血愈虛真水愈弱陽毒之熱大旺反增其陰火是以元氣消鑠折人長命不然則虛損之病成矣酒疸下之久則為黑疸慎不可犯此以葛花解酲湯主之　海藏云治酒病宜發汗若利小便炎焰不肯下行故曰火鬱則發之以辛溫散之是從其體性也是知利小便則濕去熱不去若動大便尤為疏遠

大飲者有形質之物酒者無形之水從汗發之是為近理濕熱俱去故治以苦溫發其火也佐以苦寒除其濕也　按酒之為物氣熱而質濕飲之而昏醉狂易者熱也宜以汗去之既醒則熱去而濕留止宜利小便而已二者宜酌而用之大抵葛花解酲湯備矣

傷勞倦

東垣曰調經篇云陰虛生內熱岐伯曰有所勞倦形氣衰少穀氣不盛上焦不行下脘不通而胃氣熱熱氣熏胸中故內熱舉痛論云勞則氣耗勞則喘且汗出內外皆越故氣耗矣夫喜怒不節起居不時有所勞傷皆損其氣氣衰則火旺火旺則乘其脾土脾主四肢故困熱無氣以動懶於語言動作喘乏表熱自汗心煩不安當病之時宜安心靜坐以養其氣以甘寒瀉其熱

火以酸味收其散氣以甘溫補其中氣經言勞者溫之損者溫之是也金匱要略云平人脈大為勞脈極虛亦為勞矣夫勞之為病其脈浮大手足煩熱春夏劇秋冬瘥脈大者熱邪也極虛者氣損也春夏劇者時助邪也秋冬瘥者時勝邪也以黃芪建中湯治之此亦溫之之意也　蓋人受水穀之氣以生所謂清氣營氣運氣衛氣春升之氣皆胃氣之別名也夫胃為水穀之海飲食入胃游溢精氣上輸於脾脾氣散精上歸於肺通調水道下輸膀胱水精

四布五經並行合於四時五藏陰陽揆度以為常也若陰陽失節寒溫不適脾胃乃傷喜怒憂恐損耗元氣脾胃氣衰元氣不足而心火獨盛心火者陰火也起於下焦其系繫於心心不主令相火代之相火包絡之火元氣之賊也火與元氣不兩立一勝則一負脾胃氣虛則下流肝腎陰火得以乘其土位故脾證始得則氣高而喘身熱而煩其脈洪大而頭痛或渴不止甚者肩不任風寒而生寒熱蓋陰火上衝則氣高喘

而煩熱為頭痛為渴而脈洪脾胃之氣下流使穀氣不得升浮是春生之令不行則無陽以護其營衛則不任風寒乃生寒熱此皆脾胃之氣不足所致也然與外感風寒之證頗同而實異內傷脾胃乃傷其氣外感風寒乃傷其形傷其外為有餘有餘者瀉之傷其內為不足不足者補之汗之下之吐之克之之類皆瀉也溫之和之調之養之之類皆補也內傷不足之病苟誤認作外感有餘之證而反瀉之則虛其虛實其

實虛虛如此死者醫殺之耳然則奈何惟當以辛甘溫劑補其中而升其陽甘寒以瀉其火則愈矣經曰勞者溫之損者溫之又曰溫能除大熱大忌苦寒之藥損其脾胃今立補中益氣湯主之夫脾胃虛者因飲食勞倦心火亢甚而乘其土位其次肺氣受邪須用黃耆最多人參甘草次之脾胃一虛肺氣先絕故用黃耆以益皮毛而閉腠理不令自汗損其元氣上喘氣短人參以補之心火乘脾須炙甘草之甘以瀉火熱

而補脾胃中元氣若脾胃急痛并大虛腹中急縮者宜多用之經曰急者緩之白朮苦甘溫除胃中熱利腰臍間血胃中清氣在下必加升麻柴胡以引之引黃耆甘草甘溫之氣味上升能補衛氣之散解而實其表也又緩帶脈之縮急二味苦平味之薄者陰中之陽引清氣上升也氣亂於胸中為清濁相干用去白陳皮以理之又能助陽氣上升以散滯氣助諸甘辛為用脾胃氣虛不能升浮為陰火傷其生發之氣榮血

大虧榮氣不營陰火熾盛是血中伏火日漸熬煎血氣日減心包與心主血血減則心無所養致使心亂而煩病名曰悗悗者心惑而煩悶不安也故加辛甘微溫之劑生陽氣陽生則陰長故血虛以人參補之更以當歸和之少加黃蘗以救腎水能瀉陰中之伏火如煩猶不止少加生地黃補腎水水旺而心火自降如氣浮心亂以朱砂安神丸鎮固之則愈　以手捫之而肌表熱者表證也只服補中益氣湯一二服得微

汗則已非正發汗乃陰陽氣和自然汗出也

若更煩亂如腹中或周身有刺痛皆血澀不足加當歸身五分或一錢　如精神短少加人參五分五味子十二箇　頭痛加蔓荊子三分痛甚者加川芎五分頂痛腦痛加藁本五分細辛三分諸頭痛並用此四味足矣若頭上有熱則此不能治別以清空膏主之如苦頭痛有痰沉重懶倦者乃太陰痰厥頭痛加半夏五分生薑三分耳鳴目黃頰頷腫頸肩臑肘臂外後廉痛面

赤脈洪大者以羌活二錢防風藁本各七分甘
草五分通其經血加黃芩黃連各三分消其腫
人參五分黃芪七分益元氣而瀉火邪另作一
服與之　嗌痛頷腫脈洪大面赤者加黃芩甘
草各三分桔梗七分　口乾嗌乾加葛根五分
升引胃氣上行以潤之　久病痰嗽肺中伏火
去人參初病勿去之冬月或春寒或秋涼時各
宜加不去根節麻黃半錢如春令大溫只加佛
耳草款冬花各五分　夏月病嗽加五味子三

五枚去心麥門冬五分如舌上白滑胎者是胸
中有寒勿用之夏月不嗽亦加人參二分或三
分并五味子麥門冬各等分救肺受火邪也
食不下乃胸中胃上有寒或氣澀滯加青皮木
香各三分陳皮五分此三味為定法如冬月加
益智仁草豆蔻仁各五分如夏月加黃芩黃連
各五分如秋月加檳榔草豆蔻白豆蔻縮砂各
五分如春初猶寒少加辛熱之劑以補春氣之
不足為風藥之佐益智草豆蔻可也　心下痞

夯悶加芍藥黃連各一錢　如痞腹脹加枳實
木香縮砂仁各三分厚朴七分如天寒少加乾
薑或肉桂　心下痞覺中寒加附子黃連各一
錢不能食而心下痞加生薑陳皮各一錢能食
而心下痞加黃連五分枳實三分脈緩有痰而
痞加半夏黃連各一錢脈弦四肢滿便難而心
下痞加柴胡七分黃連五分甘草三分　胸中
氣壅滯加青皮二分如氣促少氣去之　腹中
痛者加白芍藥五分炙甘草三分如惡寒冷痛

者加桂心三分如惡熱喜寒而腹痛者於已加
白芍藥甘草二味中更加生黃芩二三分如夏
月腹痛而不惡熱者亦然治時熱也如天涼時
惡熱而痛於已加白芍藥甘草黃芩中更少加
桂如天寒時腹痛去芍藥味酸而寒故也加益
智仁三分或加半夏五分生薑三片　如腹中
痛惡寒而脈弦者是木來剋土也小建中湯主
之蓋芍藥味酸於土中瀉木為君如脈沉細腹
中痛以理中湯主之乾薑辛熱於土中瀉水以

爲主也如脉緩體重節痛腹脹自利米穀不化
是濕勝也平胃散主之　脇下痛或脇下絞急
俱加柴胡三分甚則五分甘草三分　臍下痛
加眞熟地黄五分其痛立止如不已者乃大寒
也更加肉桂二三分內經所說少腹痛皆寒證
從復法相報中來也經云大勝必大復從熱病
中變而作也非傷寒厥陰之證乃下焦血結膀
胱也仲景以抵當湯并丸主之　身有疼痛者
濕若身重者亦濕加去桂五苓一錢如風濕相

搏一身盡痛加羌活七分防風藁本根各半錢
升麻蒼朮各一錢勿用五苓所以然者爲風藥
已能勝濕故別作一服與之如病去勿再服以
諸風藥損人元氣而益其病故也　小便遺失
肺金虚也宜安卧養氣以黄芪人參之類補之
不愈則是有熱也加黄蘗生地黄各五分切禁
勞役如卧而多驚小便淋者邪在少陽厥陰宜
太陽經所加之藥更添柴胡五分如淋加澤瀉
五分　下焦風寒合病也經云腎肝之病同一

治爲俱在下焦非風藥行經則不可乃受客邪
之濕熱也宜升舉發散以除之　大便秘澀
當歸梢一錢大黄酒洗煨五分或一錢閉澀不
行者煎成正藥先用一口調玄明粉五分
或一錢得行則止此病不宜下下之恐變凶證
也　脚膝痿軟行步乏力或疼痛乃腎肝伏熱加
黄蘗五分空心服不已更加漢防己五分脉緩
顯沉困怠惰無力者加蒼朮澤瀉人參白朮茯
苓五味子各五分　右一方加減是飲食勞倦

喜怒不節始病熱中則可用之若末傳寒中則
不可用也蓋甘酸適足益其氣耳如黄芪人參
甘草芍藥五味之類是也

[illegible]頭痛大作四
[illegible]喘身熱而煩上氣鼻息不調四
肢困倦不收無氣以動無氣以言或煩躁悶亂
心煩不安或[illegible]久者邪氣在血脉中有
渴或不渴[illegible]是心火炎上尅肺金故渴或
表[illegible]不欲[illegible]惡食口不知味右手

氣口脉大於左手人迎三倍其氣口脉急大而數特一代而澀澀是肺之本脉代是無氣不相接乃脾胃不足之脉大是洪大洪大而數乃心脉刑肺急是弦急乃肝木挾心火尅肺金也其右關脾脉比五脉獨大而數數中時顯一代此不甚勞役是飲食不時寒溫失所則無右關胃脉損弱隱而不見惟內顯脾脉如此也治用補中益氣湯

[illegible] 腹脹胃脘當心痛四肢兩脇隔噎不通或涎唾或清涕或多溺足下痛不能任身履地骨乏無力喜唾兩凡多唸陰陧作痛或妄見鬼狀夢亡人腰背胛眼脊膂皆痛不渴不瀉脉盛大以濇名曰寒中治用沖聖復氣湯白朮附子湯草豆蔻丸

傷勞倦　入世疆　六三

[illegible] 有天氣大熱時勞役得病或路途勞役或田野中勞役或身體怯弱食少勞役或長齋久素胃氣久虛勞役其病肌體壯熱頭痛惡熱口渴飲水此與陽明傷寒熱白虎湯證相似身口中氣短促上喘[illegible]胃久虛元氣不足之證身亦爽痛至日晡[illegible]熱渴悶不止脉洪大空虛或微弱白虎湯[illegible]其脉洪大有力與此內傷中熱不同治用清暑益氣湯

傷因勞役之後肌熱躁熱困渴引飲目赤面紅[illegible]不息其脉大而虛宜接金無經曰脉虛[illegible]血虛則發熱證象白虎惟脉不長實為辨也誤服白虎湯必危宜黃芪當歸補血湯

[illegible] 有因勞役坐卧陰凉處後[illegible]表虛不任風寒少氣短促嬾言語困弱無力此因勞役辛苦腎中陰火沸騰後因脫衣或沐浴歇息於陰凉處其陰火不行還歸皮膚腠理[illegible]無陽被風與陰凉所遏以此表虛不任風寒與外感惡風相似不可同外感治宜用補中益氣湯

傷勞倦　入世疆　六十四

[illegible] 飲食失節勞役所傷脾胃[illegible]發[illegible]治用小建中湯或[illegible]

湯或大建中湯選而用之

[illegible] 理中丸 心肺在膈上為陽腎肝在膈下為陰此上下藏也脾胃應土處在中州在五藏曰孤藏在三焦曰中焦自三焦獨治在中一有不調此丸專治故名曰理中丸人參味甘溫內經曰脾欲緩急食甘以緩之緩中益脾必以甘為主是以人參為君白朮味甘溫內經曰脾惡濕甘勝濕溫中勝濕必以甘為助是以白朮為臣甘草味甘平內經曰五味所入

甘先入脾脾不足者以甘補之補中助脾必須甘劑是以甘草為佐乾薑味辛熱喜溫而惡寒者胃也胃寒則中焦不治內經曰寒淫所勝平以辛熱散寒溫胃必先辛劑是以乾薑為使脾胃居中病則邪氣上下左右無所不之故有諸加減焉若臍下築者腎氣動也去白朮加桂氣壅而不泄則築然動也白朮味甘補氣去白朮則氣易散桂辛熱腎氣動者欲作奔豚也必服辛味以散之故加桂以散腎氣泄奔豚氣 吐

多者去白朮加生薑氣上逆則吐多朮甘而壅非氣逆者之所宜千金曰嘔家多服生薑以其辛散故吐多者加之 下多者還用白朮氣泄而不收則下多朮甘壅補使正氣收而不下泄也或曰濕勝則濡泄朮專除濕故下多者加之 悸者加茯苓飲聚則悸茯苓味甘滲泄伏水是所宜也 渴欲得水者倍加朮津液不足則渴朮甘以補津液故加之 腹中痛者加人參虛則痛本草曰補可以去弱人參羊肉之屬是也

寒多者加乾薑以辛熱能散寒也 腹滿者去白朮加附子內經曰甘者令人中滿朮甘壅補於腹滿家則去之附子味辛熱氣壅鬱腹為之滿以熱勝寒以辛散滿故加附子內經曰熱者寒之寒者熱之此之謂也 建中湯內經曰肝生於左肺生於右心位在上腎處在下左右上下四藏居之脾者土也應中央處四藏之中為中州治中焦生育榮衛通行津液一有不調則榮衛失所育津液失所行必以此湯溫中益脾是

以建中名之焉膠飴味甘溫甘草味甘平脾欲緩急食甘以緩之建脾者必以甘爲主故以膠飴爲君而甘草爲臣桂辛熱散也潤也榮衛不足潤而散之芍藥味酸微寒收也泄也津液不通收而行之是以桂芍藥爲佐生薑味辛溫大棗味甘溫胃者衛之源脾者榮之本靈樞經云榮出中焦衛出上焦是也衛爲陽不足者益之必以辛榮爲陰不足者補之必以甘甘辛相合脾胃建而榮衛通是以薑棗爲使也嘔家不用

此湯以味甜故也　寶鑑育氣湯參朮調中湯養胃進食丸寬中進食丸和中丸安胃丸補中丸加減平胃散嘉禾散白朮散緩中丸沉香鱉甲散十華散沉香溫脾湯厚朴溫中湯雙和湯小沉香丸木香分氣丸木香餅子

[illegible]　金匱要略云夫男子平人脉大者爲勞極虛亦爲勞男面色薄者主渴及亡血卒喘悸脉浮者裏虛也男子脉虛沉弦無寒熱短氣裏急小便不利面色白時目瞑兼衄少腹滿此爲勞使之然勞之爲病其脉浮大手足煩春夏劇秋冬瘥陰寒精自出酸削不能行男子脉微弱而濇爲無子精清冷夫失精家少腹弦急陰頭寒目瞑髮落脉極虛芤遲爲清穀亡血失精也　調中益氣湯治因饑飽勞役損傷脾胃元氣不足其脉弦或洪緩按之無力中之下時一濇其證身體沉重四肢困倦百節煩疼胸滿短氣膈咽不通心煩不安耳聾耳鳴目有瘀肉熱壅如火視物昏花口中沃沫飲

食失味忽肥忽瘦怠惰嗜臥溺色變赤或濇利而頻或上飲下便或時飧泄腹中虛痛不思飲食內經云勞則氣耗熱則傷氣以黃芪甘草之甘瀉熱爲主以白芍藥五味子之酸能收耗散之氣又曰勞者溫之損者溫之以人參甘溫補氣不足當歸辛溫補血不足故以爲臣白朮橘皮甘苦溫除胃中客熱以養胃氣爲佐升麻柴胡苦平味之薄者陰中之陽爲脾胃之氣下溜上氣不足故從陰引陽以補之又以行陽明之

經爲使也　如時顯熱燥是下元陰火蒸蒸然發也加真生地黄二分黄蘗三分　如大便虚坐不得或大便了而不了腹中常逼迫血虚血澀也加當歸身五分　如身體沉重雖小便數多亦如茯苓五分蒼术一錢澤瀉五分黄蘗三分此暫從權而祛濕也不可常用兼足太陰已病其脉亦絡於心中故顯濕熱相合而煩亂　如胃氣不和加湯洗半夏半錢生薑三片有嗽者加生地黄三分以製半夏之毒痰厥頭痛非半夏不能除此足太陰經邪所作也如無以上

證只服黄芪一錢人參三錢甘草五分橘皮酒洗三分柴胡二分升麻二分蒼术五分黄蘗酒洗二分右件剉如麻豆大依前煎服　如秋冬之月胃脉四道爲衝脉所逆并脇下少陽脉二道而反上行病名曰厥逆内經曰逆氣上行滿脉去形明七神昏絶離去其形而死矣其證氣上衝咽不得息而喘息有音不得卧加吳茱萸半錢或一錢半湯洗去苦觀厥氣多少而用之　如夏月有此證爲大熱也蓋此病隨四時爲

寒熱温凉也宜以酒黄連酒黄蘗酒知母各等分爲細末熟湯爲丸如梧桐子大每服二百丸白湯送下空心服仍多服熱湯服畢少時便以美飲食壓之不令胃中停留直至下元以瀉衝脉之邪也大抵治飲食勞倦所得之病乃虚勞七損證也當用温平甘多辛少之藥治之是其本法也如時上見寒熱病四時也又或將理不如法或酒食過多或辛熱之食作病或寒冷之食作病或居大熱大寒之處益其病當臨時制

宜暫用大寒大熱治法而取効此從權也不可以得効之故而久用之必致夭横矣靈樞經曰從下上者引而去之上氣不足推而揚之蓋上氣者心肺上焦之氣陽病在陰從陰引陽宜以入腎肝下焦之藥引甘多辛少之藥使升發脾胃之氣又從而去其邪氣於腠理皮毛也又云視前痛者常先取之是先以繆刺瀉其經絡之壅者爲血凝而不流故先去之而後治他病

實瀉補其[illegible]中升陽[illegible]湯黄芪建中湯人參黄

芪散續斷湯柴胡散秦艽鼈甲散人參地骨皮散地仙散當歸補血湯犀角紫河車丸人參柴胡散清神甘露丸雙和散四君子湯猪肚丸酸棗仁丸定志丸麥煎散獨聖散

飲食不節勞役所傷腹脇滿悶短氣遇春則口淡無味遇夏雖熱猶有惡寒饑則常如飽不喜食冷物升陽順氣湯主之脾胃不足之證須用升麻柴胡苦平味之薄者陰中之陽引脾胃中清氣行於陽道及諸經生發陰陽之氣以滋春

氣之和也又引黃芪人參甘草甘溫之氣味上行充實腠理使陽氣得衛外而爲固也凡治脾胃之藥多以升陽補氣名之者此也　饑飽勞役胃氣不足脾氣下溜氣短無力不能寒熱早飯後轉增昏悶須要眠睡怠惰四肢不收懶倦動作五心煩熱升陽補氣湯主之如腹脹及窄狹加厚朴如腹中似痞加枳實加砂仁　脾胃虛弱氣促氣弱精神短少衄血吐血門冬清肺飲大阿膠丸　痰嗽人參清鎮丸　勞風心脾壅滯痰涎盛多唾中不利涕唾稠黏嗌塞吐逆不思飲食或時昏憒且角化痰丸　病久厭厭不能食而臟腑或結或溏此胃氣虛弱也白朮和胃丸

明醫雜著云東垣論飲食勞倦爲內傷不足之證治用補中益氣湯溯洄集中又論不足之中又當分別飲食傷爲有餘勞倦傷爲不足予謂傷飲食而留積不化以致宿食鬱熱熱發於外此爲有餘之證法當消導東垣自有枳朮丸等治法具於飲食門矣其補中益氣方論却謂

人因傷饑失飽致損脾胃非有積滯者也故只宜用補藥蓋脾胃全賴飲食之養今因饑飽不時失其所養則脾胃虛矣又脾主四肢若勞力辛苦傷其四肢則根本竭矣或專因飲食不調或專因勞力過度或飲食不調之後加之勞力或勞力過度之後繼以不調故曰内傷之内傷元氣不足之證而宜用補藥也但須於此四者之間審察明白略加增減則無不效矣

虛勞 瘵骨蒸熱

素問云脉虛氣虛尺虛是謂重虛所謂氣虛者言無常也尺虛者行步恇然脉虛者不象陰也又云脉細皮寒氣少泄利前後飲食不入是謂五虛五虛死漿粥入胃泄注止則虛可活治用黃芪建中湯理中湯之類　此素問但言虛而無勞瘵之名然其因則固嘗言之矣凡外感六淫內傷七情其邪展轉乘於五藏遂至大骨枯槁大肉陷下各見所合衰憊之證眞藏脉見則有死期又如二陽之病則傳爲風消息賁三陽之病傳爲索澤癉成爲消中大腸移熱於胃胃移熱於膽則皆善食而瘦嘗貴後賤病從內生名曰脫營嘗富後貧名曰失精暴樂暴苦始樂後苦皆傷精氣精氣竭絕形體毀沮離絕菀結喜怒悲恐五藏空虛血氣離守饑飽曰怵惕思慮則傷神神傷則恐懼自失破䐃脫肉毛悴色夭死於冬又嘗熱病在膚肉脉筋骨之間者各客於所合一不藏不得客於所不勝及其腎和

視晉平公之疾曰是近女室晦女陽也而晦時淫則生內熱惑蠱之疾非鬼非食疾不可爲也至漢張仲景金匱要略明立虛勞門於是巢元方病源論遂有虛勞有蒸病有注病皆由此而致之也虛勞者五勞六極七傷是也五勞者志勞思勞心勞憂勞瘦勞六極者氣極血極筋極骨極肌極精極七傷者曰陰寒曰陰痿曰裏急曰精速曰精少陰下濕曰精滑曰小便苦數臨事不舉又曰大飽傷脾大怒氣逆傷肝強力舉重久坐濕地傷腎形寒飲冷傷肺憂愁思慮傷心風雨寒暑傷形大恐懼不節傷志蒸有五曰骨蒸脉蒸皮蒸肉蒸內蒸又有二十三蒸曰胞玉房髓骨血脉肝心脾肺腎膀胱膽胃三焦小腸大腸肉膚皮氣各有一蒸其狀病身發熱多因熱病愈後食牛肉或飲酒過度而成注者注之爲言住也邪氣居人身內生既連滯停住死又注易傍人也與所謂傳尸已別立門外今以虛勞骨蒸合爲一門而列古今所治法於後

金匱云五勞虛極羸瘦腹滿不能飲食食傷
憂傷飲傷房室傷饑傷勞傷經絡營衛氣傷內
有乾血肌膚甲錯兩目黯黑緩中補虛大黃䗪
蟲丸主之按虛勞發熱未有不由瘀血者而瘀
血未有不由內傷者人之飲食起居一失其節
皆能成傷此亦可以睹矣故以潤劑治乾以蠕
動啖血之物行死血死血既去病根已剗而後
可從事乎滋補之劑仲景為萬古醫方之祖有
以哉又有陳大夫傳仲景百勞丸可與䗪蟲丸

互用　活法機要云虛損之疾寒熱因虛而感
也感寒則損陽陽虛則陰盛故損則自上而下
治之宜以辛甘淡過於胃則不可治也感熱則
損陰陰虛則陽盛故損則自下而上治之宜以
苦酸鹹過於脾則不可治也自上而損者一損
損於肺故皮聚而毛落二損損於心故血脉虛
弱不能榮於藏府婦人則月水不通三損損於
胃故飲食不為肌膚也自下而損者一損損於
腎故骨痿不起於牀二損損於肝故筋緩不能
自收持三損損於脾故飲食不能消剋也故心
肺損則色敝肝腎損則形痿脾胃損則穀不化
也　治肺損而皮聚而毛落宜益氣四君子湯
治心肺損而皮聚而毛落血脉虛耗婦人月水愆
期宜益氣和血八物湯　治心肺損及胃損飲
食不為肌膚宜益氣和血調飲食十全散　治
腎損骨痿不能起於牀宜益精補腎金剛丸
治腎肝損骨痿不能起於牀宜益精筋緩不能
自收持宜緩中牛膝丸　治肝腎損及脾食穀

不化宜益精緩中消穀煨腎丸　如陽盛陰虛
肝腎不足房室虛損形瘦無力面多青黃而無
常色宜榮血養腎地黃丸　如陽盛陰虛心肺
不足及男子婦人面無血色食少嗜卧肢體困
倦宜八味丸　如形體瘦弱無力多困未知陰
陽先損夏月宜地黃丸春秋宜腎氣丸冬月宜
八味丸　病久虛弱厭厭不能食和中丸　肝
腎[illegible]則口苦骨疼筋攣煩悶
宜[illegible]關格牢澀不通眼目

赤澀煩悶熱纏毛悴色夭[illegible]
斷遲神機而成虛寒則驚悸恍惚神志[illegible]
遠志飲子酸棗仁湯實熱則口舌生瘡大小便
秘澀宜黃芩湯　脾勞意外致思而成虛寒則
氣脹咽滿食不下噫氣宜白术湯生嘉禾散大
[illegible]脾散實熱則四肢不和脹滿氣急不安宜小
甘露飲　肺勞損事而發所成虛寒則心腹冷
氣胸滿背痛吐逆宜溫肺湯實熱則氣喘面目
苦腫宜二母湯　腎勞矜持志節所成虛寒則

遺精白濁腰脊如折宜羊腎丸實熱則小便黃
赤澀痛陰生瘡宜地黃丸　肝傷筋極虛則手
足拘攣腹痛指甲痛轉筋宜木瓜散當歸枸杞
續斷實則咳而脇下痛腳心痛不可忍手足甲
青黑宜五加皮散　心傷脈極虛則咳而心痛
咽腫喉中介介如梗宜茯神湯遠志酸棗仁朱
砂龍齒實則血焦髮落唇赤語澀肌瘦宜麥
門冬湯　脾傷肉極虛則四肢倦怠關節痛不食
[illegible]宜半夏湯[illegible]

實則肌肉痹陰理開汗大泄四肢緩弱急[illegible]
薏苡仁散　肺傷氣極虛則皮毛焦津液枯乏力
[illegible]喘息宜紫菀湯人參黃芪白石英實則
喘息衝胸心[illegible]口燥咽乾宜前胡
湯　腎傷骨極虛[illegible]腰脊痛氣衰毛髮
枯槁宜鹿角丸[illegible]五味鹿茸實則耳焦耳鳴
小便不通手足痛宜玄參湯　臟府氣虛視聽
已耶精極虛則遺精白濁體弱小腹急膝弱[illegible]
小宜磁石丸鹿茸茯苓破故紙龍骨人參附子

鍾乳實則[illegible]焦煩熱煩悶泄精宜石斛湯
古今錄驗五蒸湯甘草炙一兩茯苓三兩人
參二兩[illegible]三兩竹葉二把葛根三兩知母
一兩[illegible]一兩粳米一合石膏五兩碎右十味
㕮咀以水九升煮小麥一升令六升去麥入藥
煮取二升半分三服　實熱黃連黃芩黃蘗大
[illegible]烏梅[illegible]龍膽蛤蚧
牡丹皮小麥[illegible]肝[illegible]紫菀天門冬麥
門冬　皮[illegible]桑白皮　膽[illegible]牡丹皮

氣(偏身氣熱而促鼻乾)人參黃芩梔子　大腸(鼻右且乾痛)
芒硝大黃　脉[illegible]當歸生地黃(　)
心[illegible]黃連生地黃　血[illegible]地黃當歸桂心童子
小便　小腸[illegible]木通赤茯苓生地黃(　)脾[illegible]
芍藥木瓜苦參　肉[illegible]芍藥　胃[illegible]
石膏粳米大黃芒硝葛根(　)肝[illegible]前胡川芎
當歸　筋[illegible]川芎當歸　膽[illegible]柴胡栝蔞
三焦[illegible]石膏竹葉(　)腎[illegible]石膏知母生地
黃寒水石　膀胱[illegible]羌活地黃防風　髓[illegible]

虛勞　四　土經　七十九

熱[illegible]當歸地黃天門冬　骨[illegible]鱉甲
當歸地骨皮牡丹皮生地黃　肉[illegible]石
當歸[illegible]　胞[illegible]生地黃澤瀉茯苓沉香滑石
膀胱[illegible]澤瀉茯苓滑石(　)凡此諸蒸皆因
熱病後食肉油膩行房飲酒犯之而成久蒸不
除變成瘵病即死矣　珍珠囊云地為陰骨為
裏皮為表地骨皮瀉腎火牡丹皮瀉包絡火總
治[illegible]骨蒸[illegible]瀉腎火治熱在內
[illegible]四物湯加二皮治婦人骨蒸　[illegible]

珠云五行六氣水特五之一耳一水既[illegible]
勝五火熾虛勞等證蜂起矣其體虛者[illegible]感
於邪氣當先和解微利微下之從其緩而治之
次則調之[illegible]者不知邪氣[illegible]便行
補劑邪氣得補遂入經絡至死不悟如此悞者
何[illegible]大涼劑[illegible]火熱劑
[illegible]火與易明也勞為[illegible]遂可補
[illegible]熱無積之人脉舉按無力而弱者
方可補之又必察其胃中及右腎二火虧而用

虛勞　四　土經　八十

之心虛則動悸恍惚憂煩少色舌強宜養榮湯
琥珀定神丸之類以益其心血脾虛肉削羸瘦
吐利清冷腹脹腸鳴四肢無力飲食不進宜快
胃[illegible]食丸之類以調其飲食肝虛目昏筋脉
拘[illegible]婦人[illegible]宜牛膝[illegible]中湯
虛[illegible]類以[illegible]脉[illegible]虛呼吸少氣喘
[illegible]人參黃芪阿膠蘇子
以[illegible]膝[illegible]逆[illegible]痛[illegible]耳鳴
小[illegible]八味丸加五味鹿茸去附子

用山藥等丸以生其精　陳藏器諸虛用藥凡例　虛勞頭痛復熱加枸杞萎蕤　虛而欲吐加人參　虛而不安亦加人參　虛而多夢紛紜加龍骨　虛而多熱加地黃牡蠣地膚子甘草　虛而冷加當歸川芎乾薑　虛而損加鍾乳棘刺蓯蓉巴戟天　虛而大熱加黃芩天門冬　虛而多忘加茯苓遠志　虛而口乾加麥門冬知母　虛而吸吸加胡麻覆盆子柏子仁　虛而多氣兼微咳加五味子大棗　虛而驚

悸不安加龍齒沙參紫石英小草若冷則用紫石英小草若客熱即用沙參龍齒不冷不熱皆用之　虛而身強腰中不利加磁石杜仲　虛而多冷加桂心吳茱萸附子烏頭　虛而勞小便赤加黃芩　虛而客熱加地骨皮白水黃耆　虛而冷加隴西黃耆　虛而痰復有氣加生薑半夏枳實　虛而小腸利加桑螵蛸龍骨雞胜胵　虛而小腸不利加茯苓澤瀉　虛而損溺白加厚朴　髓竭不足加地黃當歸　肺氣

不足加天門冬麥門冬五味子　心氣不足加上黨人參茯苓菖蒲　肝氣不足加天麻川芎　脾氣不足加白术白芍藥益智　腎氣不足加熟地黃遠志牡丹皮　膽氣不足加細辛酸棗仁地榆　神昏不足加朱砂預知子茯神

諸虛百損五勞皆因不量才力勉强云爲憂思過度嗜慾無節或病失調將積久成勞其證頭旋眼暈身疼腳弱心怯氣短自汗盜汗或發寒熱或五心常熱或往來潮熱或骨蒸作熱夜

多惡夢晝少精神耳內蟬鳴口中無味飲食減少此皆勞傷之證也五藏雖皆有勞心腎爲多心主血腎主精精竭血燥則勞生焉治勞之法當以調心補腎爲先不當用峻烈之劑惟當溫養滋補以久取効天雄附子之類投之適足以發其虛陽緣內無精血不足當此猛劑然不可因有熱純用甜冷之藥以傷其胃氣獨用熱藥者猶釜中無水而進火也過用冷藥者猶釜下無火而添水也非徒無益而又害之宜十全大

補湯或雙和散或養榮湯七珍散樂令建中湯皆可選用間進雙補丸　如前發有雜病如咳嗽吐血不得眠盜汗寒熱潮熱等已見各門審知因虛勞得之並宜用前藥不効用十四味建中湯（無熱者不熱乃可用）或大建中湯治而不勝熱藥者七珍散加木香五味子各七分熱多黃芪鱉甲散或人參散獨五心發熱將欲成勞者茯苓補心湯　飲食減少畏食而嘔者難獨用前滯甜藥須斟酌用前快脾之劑縮砂陳皮却不可少仍

下鹿茸橘皮煎丸如不嘔不畏食用前十全大補湯雙和散等藥亦當少加快脾之劑以為之防　有患精血不足明知當補腎方欲一取之歸芪等藥其人素減食又恐不利於脾方欲理脾則不免用疎刷之藥又恐愈耗腎水全一舉而兩得之功莫若鹿茸橘皮煎丸為第一故曰精不足者補之以味又曰補腎不如補脾以脾上交於心下交於腎故也道家交搆心腎以脾為黃婆者即此意若腎元大段虛損病勢困篤

則腎又不容少緩不必拘於此說要在於滋腎之中佐以砂仁澄茄之類於壯脾之中參以北五味黃芪之屬此又臨時審病用藥之活法

難經曰腎有兩者非皆腎也其左為腎右為命門命門者諸精神之所舍原氣之所繫也男子以藏精女子以繫胞故知腎有二也男子藏精者氣海也女子繫胞者血海也所主者二受病者一也是故左腎為陰合主地道生育之化故曰元氣之舍也若夫腎之藏精者是受五藏六

府之精輸納入精房血海而藏之然精有陰有陽陰陽平則兩腎和而不偏不平則偏陰陽俱不足則兩腎俱虛故東垣治兩虛者以仲景八味丸[illegible]之偏於左腎之陰精不足者以地黃丸[illegible]以[illegible]封髓丹主之右腎之陽火不足則以八味丸[illegible]之[illegible]用力之凡例也[illegible]為陽[illegible]為陽[illegible]

陰陰虚則氣不降氣不降則痰涎上逆而連綿吐出不絕也脉浮爲陽沉爲陰陰虚則浮之洪大沉之空虚也此皆陰虚之證用四物湯加黄柏知母主之然世醫遵用治療乃百無一効者何哉蓋陰既虚矣火必上炎而川芎當歸皆味辛氣大温非滋虚降火之藥又川芎上竄尤非虚炎短乏者所宜地黄泥膈非胃弱食少痰多者所宜黄柏知母苦辛大寒雖曰滋陰其實燥而損血雖曰降火其實苦先入心久而增氣反

能助火至其敗胃所不待言用藥如此烏能奏功也予每用薏苡仁百合天門冬麥門冬桑根白皮地骨皮牡丹皮枇杷葉五味子酸棗仁之屬佐以生地汁藕汁乳汁童子小便等如咳嗽則多用桑皮枇杷葉有痰則增貝母有血則多用薏苡仁百合增阿膠熱盛則多用地骨皮食少則用薏苡仁至七八錢而麥門冬常爲之主以保肺金而滋生化之源無不應手而効蓋諸藥皆甘淡降收之氣氣之降者爲陽中之陰氣

薄則發泄辛甘淡平寒凉是也以[illegible]動之症[illegible]當溽暑伊鬱之時而商飈颯然倏動則炎歊如失矣與治暑者熱用白虎湯同意然彼是外感外傷爲有餘故用寒沉藏之藥而後能輔其[illegible]此内傷内傷爲不足但用燥降收之劑而[illegible]其平矣此用藥之權衡也　虚勞之疾百脉空虚非粘膩之物填之不能實也精血枯涸非滋濕之物濡之不能潤也宜用人參黄芪地黄天麥門冬枸杞子五味子之屬各煎膏

另用青蒿以童便熬膏及生地汁白蓮藕汁人乳汁薄荷汁隔湯煉過酌定多少并鹿角膠霞天膏合和成劑每用數匙湯化服之如欲行瘀血加入醋製大黄末子玄明粉桃仁泥韭汁之屬欲止血加入京墨之屬欲行痰加入竹瀝之屬欲降火加入童便之屬　凡虚勞之症大抵心下引脇俱疼蓋滯血不消新血無以養之也尤宜用補[illegible]加韭汁桃仁泥　呼吸少氣懶言語[illegible]動作[illegible]無精光面色㿠白皆兼氣虚用

麥門冬人參各三錢橘紅桔梗炙甘草各半兩五味子二十一粒爲極細末水浸油餅爲丸如雞頭子大每服一丸細嚼津唾嚥下名補氣丸

氣虛則生脉散不言白朮血虛則三才丸不言四物　大略前言薏苡仁之屬治肺虛後言參芪地黃膏子之類治腎虛蓋肝心屬陽肺腎屬陰陰虛則肺腎虛矣故補肺腎即是補陰非四物黃蘗知母之謂也　勞瘵兼痰積其證腹脇常熱頭面手足則於寅卯時分乍有凉時者

是也宜以霞天膏入竹瀝加少薑汁調玄明粉行之若頑痰在膈上膠固難治者必以吐法吐之或沉香滾痰丸透膈丹之類下之甚則用倒倉法若肝有積痰汚血結熱而勞瘵者其太衝脉必與衝陽脉不相應宜以補陰藥吞當歸龍薈丸　古方柴胡飲子防風當歸飲子麥煎散皆用大黃蓋能折炎上之勢而引之下行莫速乎此然惟大便實者乃可若溏泄則雖地黃之屬亦不宜況大黃乎　透肌解熱柴胡乾葛爲

要劑故治骨蒸方中多用之如秦艽鱉甲散人參地骨皮散人參柴胡散皆退熱之劑然非常用多服之藥也衍義云柴胡本經並無一字治勞今治勞方中鮮有不用者凡此誤世甚多嘗原病勞有一種真臟虛損復受邪熱者如經驗方治勞熱青蒿煎丸用柴胡正合宜耳服之無不効熱去即須急已若無邪熱不死何待又大忌芩連梔蘗用純苦寒藥反瀉其陽但當用瓊玉膏之類大助陽氣使其復還寅卯之位微加

瀉陰火之藥是也　有重陰覆其陽火不得伸或洒洒惡寒或志意不樂或脉弦數四肢五心煩熱者火鬱湯柴胡升麻湯病去即已不可過劑　服寒凉藥證雖大減脉反加數者陽鬱也宜升宜補大忌寒凉犯之必死　男子肌瘦氣弱咳嗽漸成勞瘵用猪肚丸服之即肥　有面色如故肌體自充外有如無病內實虛損俗呼爲桃花疰當看有何證候於前項諸藥審而用之　右所列五勞六極二十三蒸諸治法亦略

備矣然當以脾腎二藏為要何以言之[illegible]
元氣者也 脾乃養形體者也經曰形不足者溫之
以氣者也謂真氣有少火之溫以生育形體然
此火不可使之熱熱則壯壯則反耗真氣也候
其火之壯少皆在兩腎間經又曰精不足補之
以味五味入胃各從所喜之藏而歸之以生津
液輸納於腎者若五味一有過節反成其藏有
餘勝克之禍起矣候其五味之寒熱初在脾胃
次在其所歸之藏即當補其不足瀉其有餘謹

守精氣調其陰陽使神內藏夫如是則天癸開
發而胃和脈生故榮衛以周於內外無不被滋
養而病愈矣 勞疾久而嗽血咽疼無聲此為
自下傳上若不嗽不疼久而溺濁脫精此為自
上傳下皆死證也 骨蒸之極聲嗄咽痛面黧
脈躁汗出如珠喘乏氣促出而無入毛焦唇反
皆死證也 又骨肉相失聲散嘔血陽事不禁
晝涼夜熱者死

附水丘先生紫庭治瘵秘方 人有傳尸[illegible]

伏連五勞七傷二十六蒸其候各異其源不同
世醫不明根本妄投藥石可勝歎哉予休心雲
水遠絕人事遂以所傳[illegible]精微以示世醫使
之明曉夫傳尸勞者男子自腎傳心心而肺肺
而肝肝而脾女子自心傳肺肺而肝肝而脾脾
而腎五藏復傳六腑而死矣或連及親族至於
滅門其源皆由房室飲食過度冷熱不時憂思
悲傷有欲不遂驚悸喜懼或大病後行房[illegible]
尸哭泣尸氣所感邪氣一生流傳五藏蠹食傷

心雖有諸候其實不離乎心陽[illegible]陰也若明陰
陽用藥[illegible]以[illegible]命起死回生人知勞之名
未知其理人生以血為榮氣為衛二者運轉而
無[illegible]滯勞何由生故勞者倦也血氣倦則不運
[illegible]滯[illegible]邪氣相乘心受之為盜汗虛汗憂悲
恐懼恍惚不安腎受之為骨蒸為鬼交虛好
色肝受之為瘰癧脇[illegible]風
氣脾受之為[illegible]多思[illegible]
[illegible]

焦枯至於六府亦各有證今人多用涼藥則損
胃氣雖盧扁亦難矣予之所論但在開關把胃
何則勞病者血氣不運遂致乾枯此關脉閉也
故先用開關藥通其血脉既開關則須起胃蓋
五藏皆有胃氣邪氣附之則五藏衰弱若不把
胃則他藥何由而行故開關把胃乃治勞妙法
也然必須明陰陽且如起胃陽病藥不可過暖
陰病藥不可過涼今人言丁香厚朴肉桂蓯蓉
可補五藏不知用之則喘息悶嗽如火益熱或

以治鬼爲先務要當法藥相濟道力資扶然後
鬼尸可逐也此論上合黃帝岐扁下明藏府陰
陽非患人有福亦不遭逢實之　總論病證
如夜夢鬼交遺精自泄夢魂不安常見先亡恐
怖思禪思量飲食食全不進目睛失白骨節疼
痛汗心煩熱頭髮作滯向臉時紅如傅臙脂唇
紅或常恍惚不消言語氣短大便秘澀或時溏
利小便黃赤或時白濁項生瘰癧腹中氣塊鼻
口生瘡口舌乾燥咽喉不利仰臥不得或時

喘滿唾稠粘上氣煩滿痰吐惡心腹脇妨悶陰
中冷痛陰痒生瘡多濕轉筋拘急或恐怒悲啼
舌直苦痛目睛時疼盗汗[illegible]肩喘息陽道虛[illegible]
如手足心煩疼口乾舌瘡小便黃赤大便難及
熱多咽喉痛涎唾黃粘及兼前項一二證即是
陽病當用陽病開關散爲瀉陽而補陰如大便
溏利小便白濁飲食不化胃逆口惡雖有熱痰
[illegible][illegible]色及小便多仍兼前項數症即是陰病當
用陰病開關藥凡勞病虛極亦多令人煩躁大

小便不利宜兼諸脉證審之陰陽二症皆用起
胃散又歌訣云　水丘道人年一百煉得龍精
并虎髓流傳此法在人間聊向三天助陰德扶
危起死莫蹉跎此藥於人有功多不問陰陽與
冷熱先將脾胃與安和脾經虛冷易生寒最是
難將熱藥攻閉却大便并上氣爲多厚朴與蓯
蓉此法精關兩道分病入入口便知良但須仔
細看形候更向陰中錯用陽滯唾稠粘小便赤
乾枯閉滯[illegible][illegible]多爲龍[illegible]于二十圓便似焦枯

得甘滴遺精夢泄腹膨高咳嗽陰疼為患勞此病是陰須識認便當急下玉龍骨嗽裹痰涎卯酉難陰陽交併候多端却須兼服訶黎散治取根源病自安

七寶圓瀉骨蒸傳尸邪氣陽病可服黃連四兩為細末用猪肚一箇洗淨入藥末線縫之用童便五升文火煮令爛乾為度以肚細切同藥爛研置風中吹乾丸如桐子大朱砂麝香作衣空心麥門冬水下或用陽病開關散咽下無朱砂亦可

陽病開關散北柴胡去蘆桔梗炒秦艽麥門冬去心各半兩芍藥木香澤瀉各一兩木通半兩甘草一錢炙當歸桑白皮蜜炙地骨皮各一兩㕮咀每服三錢水一盞薑三片煎六分空心服小便多即病去也

陰病開關散當歸赤芍藥肉桂白芷甘草炙各半兩木香二錢製枳殼三錢天南星一錢去皮薑汁浸一宿焙㕮咀每服三錢薑三片煎七分入無灰酒三分盞童便三分盞又煎七入□□麥服此起胃散一二日後不問退否兼玉龍骨服之

起胃散陰陽二候皆用黃芪炙二兩白朮炒一兩白芷半兩人參半兩山藥一兩㕮咀每服三錢加木瓜煎　或加沉香茯苓甘草各半兩

□骨烏梅大核柴胡紫菀生乾地黃木香各一兩秦艽貫好茯貝母麪炒去心防風各三錢杏仁五兩麪炒為末皂角六十片二十片去黑皮酥炙為末二十片燒灰存性二十片湯浸去黑皮用猪肉剝爛如泥同皂角一處入水五升細揉汁入童便三升無灰酒一升併熬如膏和前藥末為丸如梧桐子大每服二十丸空心麥門冬湯下甚者二十日効

玉龍骨散藤子柴胡白檳榔各二兩製鼈甲白朮赤茯苓木香牡蠣各半兩地骨皮半兩人參一兩生乾地黃一兩當歸二錢朱砂一錢豆豉心二合虎頭骨研開酒炙黃赤色一兩肉蓯蓉

酒浸一宿炙一兩鼈甲湯煮去皮醋酒浸炙黃赤皆爲末又加烏梅肉捍薮右前件末成却以杏仁五升壯者以童便浸春夏七日秋冬十日和瓶日中晒每日一換新者日數足以清水淘去皮尖焙乾別以童便一升於銀石器內以文火煎至隨手爛傾入砂盆用柳木槌研爛爲膏細布濾過入酥一兩薄荷自然汁二合攪勻和藥用槌搗五百下丸如梧桐子大空心湯下十五丸加至三十丸如覺熱減丸數服熱少還添

加減經月日諸證皆退進食安卧面有血色乃藥行也當勤服無忌忌莧菜白粥冷水生血雀鴿等物

訶黎散治勞嗽上氣赤茯苓二兩訶黎勒皮二兩木香半兩檳榔一兩當歸一兩炒大黃一兩炒吳茱萸湯泡七次半兩㕮咀每服三錢生薑三片水一盞煎六分溫服

傳尸勞

本事方云葛稚川言鬼疰者是五尸之一疰又挾諸鬼邪爲害其變動乃有三十六種至九十九種大約使人淋瀝沉沉默默的不知其所苦而無處不惡累年積月漸就頓滯以至於死傳於傍人乃至滅門覺知是候者急治獺肝一具陰乾取末水服方寸匕日三服効未知再服此方神良　紫庭方云傳尸伏尸皆有蟲須用乳香熏病人之手乃仰手掌以帛覆其上熏良久

手背上出毛長寸許白而黃者可治紅者稍難青黑者即死若熏之良久無毛者即非此症屬尋常虗勞症也又法燒安息香令煙出病人吸之嗽不止乃傳尸也不嗽非傳尸也　直指方云瘵蟲食人骨髓血枯精竭不救者多人能平時愛護元氣保養精血瘵不可得而傳惟夫縱欲多淫精血內耗邪氣外乘是不特男子有傷婦人亦不免矣然而氣虛腹餒最不可入勞瘵之門吊喪問疾衣服器用中皆能乘虛而染觸

昔有婦人入其房覩其人病者思之勞氣入人
染患日久莫不化而爲蟲治療之法大抵以保
養精血爲上去蟲次之安息蘇合阿魏麝犀丹
砂雄黃固皆驅伐惡氣之藥亦須以天靈蓋行
乎其間蓋尸疰者鬼氣也伏而未起故令人沉
滯得枯髏枕骨治之鬼氣飛越不復附人於是乎
瘥外此則虎牙骨鯉魚頭皆食人之類也其亦
枕骨之亞乎要之發用以前當以川芎當歸先
立乎根本之地　先用芎歸血餘散次北斗符

次用鱉甲生犀散取蟲　蘇遊論曰傳尸之候
先從腎起初受之兩脛痠疼腰背拘急行立腳
弱飲食減少兩耳颼颼真似風聲夜臥遺泄陰
汗痿弱腎既受病次傳於心心初受氣夜臥心
驚或多恐悸心懸懸氣吸吸欲盡夢見先亡有
時盜汗飲食無味口內生瘡心氣煩熱惟欲眠
臥朝輕夕重兩頰口脣悉皆紋赤如傅臙脂有
時手足五心煩熱心受已次傳於肺肺初受氣
咳嗽上氣喘臥益甚鼻口乾燥不聞香臭如或

忽聞惟覺朽腐氣有時惡心欲吐肌膚枯燥時
或疼痛或似蟲行乾皮細起狀如麩片肺既受
已次傳於肝肝初受氣兩目䀮䀮面無血色常
欲顰眉視不能遠目常乾澀又時赤痛或復睛
黃常欲合眼及時睡臥不着肝既受已次傳於
脾脾初受氣兩脇虛脹食不消化又時瀉利水
穀生蟲有時肚痛腹脹雷鳴脣口焦乾或生瘡
腫毛髮乾聳無有光潤或時上氣撐肩喘息利
赤黑汁見此證者乃不治也

夫骨蒸　殗殜　伏連　屍疰　勞疰　蟲疰
毒疰　熱疰　冷疰　食疰　鬼疰善皆曰
傳疰以疰者注也病自上注也其變有二十二
種或三十六種或九十九種大畧令人寒熱盜
汗夢與鬼交遺精白濁髮乾而聳或腹內有塊
或腦後兩邊有小結核連數箇或聚或散沉沉
默默咳嗽痰涎或咯膿血如肺痿肺癰狀或腹
下利羸瘦困乏不自勝持積月累年以至於死
死復傳注親屬乃至滅門者是也更有蜚尸遁

尸寒尸喪尸與尸疰謂之五尸及大小附著等
證乃挾諸鬼邪而害人其證多端傳變推遷難
以推測故自古及今愈此病者十不一得所謂
狸骨獺肝天靈蓋銅鑑鼻徒有其說未嘗取効
惟膏肓俞四花穴若及早灸之可否幾半稍亦
不濟矣

上清紫庭追勞方云三尸九蟲之爲害治者不
可不知其詳九蟲之內三蟲不傳無關寸白也
其六蟲者或臟種毒而生或親屬相染而傳疾

之初覺精神恍惚氣候不調切在戒忌酒色調
節飲食如或不然五心煩熱寢汗忪悸如此十
日頓成羸瘦面黃光潤此其證也大抵六蟲一
旬之中徧行四穴周而復始病經遇木氣而生
立春一日後方食起三日一食五日一退方其
作苦自節皆痛蟲之食也退即還穴醉睡一醉
五日其病乍靜候其退醉之時乃可投符用藥
不然蟲熟於符藥之後不能治也一蟲在身中
占十二穴六蟲共占七十二穴一月之中上十
日蟲頭向上從心至頭遊四穴中十日蟲頭向
內從心至臍遊四穴下十日蟲頭向下從臍至
足遊四穴陽日長雄陰日長雌其食先臟府脂
膏故其色白五臟六府一經食損即皮聚毛脫
婦人即月信不行血脉皆損不能榮五臟六府
也七十日後食人血肉盡故其蟲黃赤損於肌
肉故變瘦劣飲食不爲肌膚筋緩不能收持一
百二十日外血肉食盡故其蟲紫即食精髓傳
於腎中食精故其蟲色黑食髓即骨痿不能起

於牀諸蟲久即生毛毛色雜花鍾孕五臟五行
之氣傳之三人即自能飛其狀如禽亦多品類
傳入腎經不可救治利藥下蟲後其蟲色白可
三十日服藥補其蟲黃赤可六十日服藥補其
蟲紫黑此病已極可百二十日服藥補又云蟲
頭赤者食患人肉可治頭口白者食患人髓其
病難治只宜斷後故經曰六十日者十得七八
八十日內治者十得三四過此以往未知生全
但[illegible]除害耳

第一代爲初勞病謂初受其疾不測病源酒食加餐漸覺羸瘦治療蹉跎乃成重病醫人不詳其故悞藥多死



此蟲形如鬼狀變動在人藏府中



此蟲形如蝦蟆變動在人藏府中

已上諸蟲在人身中萦著之後或大或小令人夢寐顛倒魂魄飛揚精神離散飲食不减形容漸羸四肢痠疼百節勞倦增寒壯熱背膊拘急頭腦疼痛口苦舌乾面無顏色鼻流清涕虛汗常多行步艱辛眼睛多痛其蟲遇丙丁日食起醉歸心俞穴中四穴輪轉周而復始候蟲大醉方可醫灸取出蟲後用藥補心

傳尸勞 [illegible] 食經 百一

第二代爲覺勞病謂傳受此病已經年者患人乃自知夜夢不祥與亡人爲伴侶醒後全無情思昏沉似醉神識不安所食味輒成患害或氣痰發動風毒所加四體不和心胸滿悶日漸羸瘦骨節乾枯或噁心或是醋心唇焦口苦鼻塞胸[illegible]虛汗常出腰膝刺痛如此疾狀早須醫治過時難療致傷性命



此蟲形如亂絲長三寸許在人藏府中

此蟲形如蜈蚣或似守宮在人藏府中



此蟲形如[illegible]在人藏府中

已上諸蟲在人身中令人氣喘唇口多乾咳嗽增寒心煩壅滿毛髮焦落氣脹吞酸津液漸衰次多虛汗[illegible]水四肢將虛臉赤面黃皮膚枯瘦腰膝無力背脊疼痛吐血唾膿語言不利鼻塞頭痛[illegible]痰重者心悶吐血僵仆在地不能自知其蟲遇庚辛日食起醉歸肺俞穴中四穴[illegible]周而復始候蟲大醉方可治醫取出其蟲補肺則差

傳尸勞 [illegible] 經 百一

第三代爲傳尸勞病謂傳受病人自不得知之日漸消瘦頓改容顏日日惆悵夜夜憂死不過良醫就[illegible]伊通

此蟲形如[illegible]在人藏府中

已上諸蟲在人身中令人三焦多昏日常思睡嘔[illegible]水或甜或苦粘涎常壅腹脹

虛鳴臥後多驚口鼻生瘡唇黑面青目漸消瘦
精神恍惚魂魄飛揚飲食不消氣咽聲乾目多
昏淚其蟲過庚寅日食起醉歸厥陰穴中四穴
輪轉周而復始俟蟲大醉方可治取蟲出之後
補氣即差

第四代


此蟲形如亂絲在人腹藏之中

此蟲形如猪肺在人腹內之中

此蟲形如蛇虺在人五藏之中

已上諸蟲在人身中令人藏府虛鳴嘔逆傷中

羸瘦氣塊增寒壯熱肚大筋生腰背疼痛或虛
或瘦瀉利無睛行履困重四肢憔悴上氣喘急
口苦舌乾飲食及水過多要喫酸鹹之物其蟲
過戊巳日食起醉歸脾俞穴中四穴輪轉周而
復始俟蟲大醉方可治取蟲出之後補脾爲瘥
甚停

第五代


此蟲形如鼠似小瓶渾無頭[illegible]


此蟲形如有頭無足有足無頭

此蟲形如血片在於腎宮

已上諸蟲入肝經而歸腎得血而變更也令人
多怒氣逆筋骨拳攣四肢解散唇黑面青憎寒
壯熱腰背疼痛起坐無力頭如斧斫眼睛時痛
翳膜多淚背膊刺痛力乏虛羸手足乾枯臥着
牀枕不能起止有似風中肢體頑麻腹內多痛
眼見黑花忽然倒地不省人事夢寐不祥覺來
遍身虛汗或有面色紅潤如平將者或有通靈
知未來事者其蟲過癸未日食起醉歸肝俞
穴中四穴輪轉周而復始俟蟲大醉方可醫救

取蟲出後補肝乃瘥 舍明

第六代 此代蟲有翅足全者千里傳疰所謂飛尸不以常法治也


此蟲形如[illegible]有兩[illegible]雌


此蟲形如龜鱉在人五藏中


此蟲形如爛麵或長或短或如箍棬

已上諸蟲在人身中居於腎藏透連脊骨令人
思食百味要喫身體尫羸腰膝無力髓寒骨熱
四體乾枯眼見火生或多黑暗耳內虛鳴陰汗
燥痒冷汗如油夢多見鬼交小便黃赤醒後昏沉
臍下結硬或奔心[illegible]心腹悶亂骨節

疼痛食物進退有時喘嗽其蟲過子亥日含
醉歸腎俞穴中四穴輪轉周而復始候蟲大醉
可脅治取蟲後補腎填精瘥 月嬰服

發熱

凡病鮮有不發熱者而內傷外感其大關鍵也已各立門詳其治法此又立發熱門者重在內傷示人治熱之常例也 明醫雜著云世間發熱症類傷寒者數種治各不同張仲景論傷寒傷風此外感也因感寒之邪感於外自表入裏故宜發表以解散之此麻黄桂枝之義也以其感於冬春之時寒冷之月即時發病故謂之傷寒而藥用辛熱以勝寒若時非寒冷則藥當有變矣如春溫之月則當變以辛凉之藥如夏暑之月則當變以甘苦寒之藥故云傷寒不即病至春變溫至夏變熱而其治法必因時而有異也又有一種冬溫之病謂之非其時而有其氣蓋冬寒時也而反病溫焉此天時不正陽氣反泄用藥不可溫熱又有一種時行寒疫却在溫暖之時時行溫暖而寒反為病此亦天時不正陰氣反逆用藥不可寒凉又有一種天行溫疫熱病發於冬春之間城門閭境相同者此天

地之病氣當隨令參氣運而施治宜[illegible]四[illegible]上
辛涼甘苦寒之藥以清熱解毒已上皆治外
感天地之邪者若夫飲食勞倦為內傷元氣此
則真陽下陷內生虛熱故東垣發補中益氣之
論用人參黃芪等甘溫之藥大補其氣而提其
下陷此用氣藥以補氣之不足也又若勞心好
色內傷真陰陰血既傷則陽氣偏勝而變為火
矣是謂陰虛火旺勞瘵之症故丹溪發陽有餘
陰不足之論用四物加黃栢知母補其陰而火

自降此用血藥以補血之不足者也益氣補陰
皆內傷症也一則因陽氣之下陷而補其氣以
升提之一則因陽火之上升而滋其陰以降下
之一升一降迥然不同矣又有夏月傷暑之病
雖屬外感卻類內傷與傷寒大異蓋寒傷形寒
邪客表有餘之症故宜汗之暑傷氣元氣為熱
所傷而耗散不足之症故宜補之東垣所謂清
暑益氣湯是也又有因時暑熱而過食冷物以
傷其內或過取涼風以傷其外此則非暑[illegible]入

乃因暑而自致之之病治宜辛熱解表或辛溫
理中之藥卻與傷寒治法相類者也凡此數症
外形相似而實有不同治法多端不可或謬故
必審其果為傷寒傷風及寒疫也則用仲景法
果為溫病及瘟疫也則用河間法果為氣虛也
則用東垣法果為陰虛也則用丹溪法如是則
庶無差誤以害人矣今人但見發熱之症一皆
認作傷寒外感率用汗藥以發其表汗後不解
又用寒藥以涼其肌設是虛證豈不死哉間有

頗知發熱屬虛而用補藥則又不知氣血之分
或氣病而補血或血病而補氣誤人多矣故外
感之與內傷寒病之與熱病氣虛之與血虛如
冰炭相反治之若差則輕病必重重病必死矣
可不謹哉　內外傷辨人迎脈大於氣口為外
感氣口脈大於人迎為內傷外感則寒熱齊作
而無間內傷則寒熱間作而不齊外感惡寒雖
近烈火不除內傷惡寒得就溫暖而必解外
感惡風乃不禁一切風寒內傷惡風唯惡夫些

子139 078

少賊風外感證顯在鼻故鼻氣不利而壅盛有力內傷證顯在口故口不知味而腹中不和外感則邪氣有餘故發言壯厲先輕而後重內傷則元氣不足故出言懶怯先重而後輕外感頭痛常常而痛內傷頭痛時止時作外感手背熱手心不熱內傷手心熱手背不熱此其辨法大要如此有內傷而無外感有外感而無內傷以此辨之則判然矣若夫內傷外感兼病而相合者則其脉證並見而難辨尤宜細心求之若顯

內證多者則是內傷重而外感輕宜以補養為先若是外證多者則是外感重而內傷輕宜以發散為急此又東垣未言之意也　東垣云五臟有邪各有身熱其狀各異以手捫摸有三法以輕手捫之則熱重按之則不熱是熱在皮毛血脉也重按至筋骨之分則熱蒸手極甚輕摸之則不熱是熱在筋骨間也輕手捫之則不熱重力以按之亦不熱不輕不重按之而熱是在筋骨之上皮毛血脉之下乃熱在肌肉也

此謂三法以三黃丸通治之細分之則五臟各異矣　肺熱者輕手乃得微按全無瞥瞥然見於皮毛上為肺主皮毛故也日西尤甚乃皮毛之熱也其證必見喘欬洒淅寒熱輕者瀉白散重者涼膈散白虎湯之類治之及地黃地骨皮散每服□□如火燎以手重取之不甚熱肺熱以□□□皮膚亦□躁引飲晝盛黃芩一物湯□□□丸黃芩末粥丸亦名與點丸食後服肺火此乃瀉肺中血分之火瀉白散瀉肺中氣分之火　心熱者心主血脉微按至皮膚之下肌肉之上輕手乃得微按至皮毛之下則熱少加

力按之則全不熱是熱在血脉也日中大甚乃心之熱也其證煩心心痛掌中熱而噦以黃連瀉心湯導赤散硃砂丸安神丸清涼散之類治之[illegible]　脾熱者輕手捫之不熱重按至筋骨又不熱不輕不重在輕手重手之間此熱在肌肉遇夜尤甚其證必怠惰嗜臥四肢不收無氣以動以瀉黃散□□□治實熱用之人參黃芪散□□中有熱者用之　肝熱者

按之肌肉之下至骨之上乃肝之熱[illegible]
其脈弦其證四肢滿悶便難轉筋多怒多驚
四肢困熱筋痿不能起於牀瀉青丸柴胡飲之
類治之兩手脉弦者或寅申發者皆肝熱也俱
宜用之[illegible]　腎熱者輕按之不
熱重按之至骨其熱蒸手如火如灸其人骨酥
酥然如蟲蝕其骨困熱不任亦不能起於牀滋
腎丸六味地黃丸主之　以脉言之則輕按之
如三菽之重與皮毛相得洪大而數者肺熱也

如六菽之重與血脉相得洪大而數者心熱也
如九菽之重與肌肉相得洪大而數者脾熱也如
十二菽之重與筋相得洪大而數者肝熱也按
之至骨舉指來疾洪大而數者腎熱也　有表
[illegible]熱[illegible]之表熱無表而熱者[illegible]也裏熱故苦
者[illegible]藏[illegible]藏[illegible]而居於內辛者以治六
有[illegible]於外故曰內者下之外者發
[illegible]為陰虛熱自除　以脉言之[illegible]
[illegible]內熱浮大有力為外熱[illegible]

力為內熱　晝則發熱夜則安靜是陽氣自旺
於陽分也　晝則安靜夜則發熱煩躁是陽氣
下陷入陰中也名曰熱入血室　晝則發熱煩
躁夜亦發熱煩躁是重陽無陰當亟瀉其陽峻
補其陰　晝熱則行陽　十五度柴胡飲子
夜熱則行陰　十五度四順飲子　平旦發熱
熱在行陽之分肺氣主之故用白虎湯以瀉氣
中之火　日晡潮熱熱在行陰之分腎氣主之
故用地骨皮散以瀉血中之火　白虎湯治脉

洪故抑之使秋氣得以下降也　地骨皮散治
脉弦故舉之使春氣得以上升也　氣分熱柴
胡飲子白虎湯　血分熱清涼飲子桃仁承氣
湯[illegible]熱不能除血中[illegible]又能
[illegible]而熱反勝之是
為實熱　骨痿肉燥筋緩血枯皮聚毛落陰不
足而有熱疾是為虛熱　能食而熱口舌乾燥
大便難者[illegible]之劑下之瀉熱
[illegible]下之而愈脈洪盛有力者

是巳　不能食而熱自汗氣短者虛熱也以甘
寒之劑瀉熱補氣經云治熱以寒溫而行之脉
虛弱無力者是巳　金匱云熱在上焦者因欬
爲肺痿熱在中焦者爲堅熱在下焦者爲尿血
亦令淋閉不通　[illegible]又用前熱者腰以上熱手
前獨熱者腰以下熱用前獨熱者膺前熱肘後
獨熱者肩背熱掌中獨熱者腰腹熱肘後以下
三四寸熱者腸中有蟲掌中熱者腹中亦熱又
云胃足陽明之脉盛則身以前皆熱又云胃中

熱則消穀令人懸心善饑臍巳上皮熱腸中熱
則出黃如糜臍巳下皮熱胃居臍上故胃熱
則臍巳上熱腸居臍下故腸熱則臍巳下熱如
肝膽居脇肝膽熱則當脇亦熱肺居胸背肺熱
則當胸背亦熱腎居腰腎熱則當腰亦熱可類
推也　上焦熱身熱脉洪無汗多渴者宜桔梗
湯　即涼膈散減大黃芒硝加桔梗同爲
舟楫之劑浮而上之治胸膈中與六經熱以手
足少陽之經　不但下膈絡胸中三焦之氣同相火

遊於身之表膈與六經乃至高之分此藥浮載
亦至高之劑故施於無形之中隨高而走去胸
膈中及六經之熱也　三焦熱用藥大例　上
焦熱梔子黃芩　中焦熱小便不利黃連芍藥
下焦熱黃檗大黃　上焦熱清神散連翹防
風湯涼膈散龍腦飲子龍腦雞蘇丸犀角地黃
湯　中焦熱小承氣湯調胃承氣湯洗心散四
順清涼飲桃仁承氣湯瀉脾散貫衆散　下焦
熱大承氣湯五苓散立效散八正散石韋散四

物湯二十四味丹溪滋腎丸　通治三焦甚熱之
氣三黃丸黃連解毒湯　暴熱者病在心肺積
熱者病在肝腎用暴熱者宜局方雄黃解毒丸積
熱者宜局方妙香丸暴者上喘也病在心肺謂
之[illegible]木香金鈴子散上焦熱而煩者宜牛
黃散[illegible]病久必怫發[illegible]石藏齊損此
[illegible]煩喘腸澼下血皆
[illegible]陰熱自能退此謂不治
而治也[illegible]　黃連解毒湯治大

熱甚煩躁錯語不得眠加防風連翹為合花丸
治虛熱加柴胡治小兒潮熱與四物相合各半
治婦人潮熱　陰虛發熱陽火不得伸宜汗經曰
體若燔炭汗出而散是也　脈弦而數此陰氣
不足虛熱升陽以發火鬱則脈數少退矣　凡
治此病脈數者當用黃檗少加黃連柴胡蒼朮
黃芪甘草更加升麻得汗則脈必下乃火鬱則
發之意也　男婦四肢發熱肌肉熱筋痺熱骨
髓中熱如火燎火燒捫之令人亦熱四肢主屬

脾脾者土也熱伏地中此病多因血虛而得又
因胃虛過食冷物冰水無度鬱遏陽氣於脾土
中經曰火鬱則發之柴胡升陽湯　五心煩熱
是火鬱於地中四肢土也心火下陷在脾土之
中故宜升發火鬱以火鬱湯主之　手足心熱
用梔子香附蒼朮白芷半夏川芎末之神麯糊
丸　病手人熱為骨蒸如在火中可灸湧泉穴
三壯立愈　東垣云曰人有四肢熱逢風寒如
炙如火者何也岐伯曰是人者陰氣虛陽氣盛

四肢者陽也兩陽相得而陰氣虛少少水不能
滅盛火而陽獨治獨治者不能生長也獨勝而
止耳逢風如炙如火者是人當肉爍也　仲景
有三物黃芩湯治婦人四肢煩熱　小兒痘後
餘熱不退痂不收斂大便不行是謂血燥則當
以陰藥治之因而補之用清涼飲子通大便而
瀉其熱　潔古云涼風至而草木實夫清涼飲子
乃秋風徹熱之劑也傷寒表邪入於裏日晡潮
熱大渴引飲譫語狂躁不大便是胃實乃可攻

之夫胃氣為熱所傷以承氣湯瀉其上實元氣
乃得周流承氣之名於此具矣今世人以苦泄
火故備陳之除熱瀉火非甘寒不可以苦寒瀉
火非徒無益而反害之故有大熱脈洪大服苦
寒劑而熱不退者加石膏如症退而脈數不退
洪大而病有加者宜減苦寒加石膏如大便軟
或泄者加桔梗食後服此藥要用則其害非細
用者旋旋加之如食少者不可用石膏石膏善
能去脈數如病退而脈數不退者不治　肌熱

燥熱目赤面紅煩渴引飲日夜不息脈浮大而虛重按全無為血虛發熱症似白虎唯脈不長實為辨也誤服白虎必危宜當歸二錢黃芪一兩水煎服　有腎虛火不歸經游行於外而發熱者煩渴引飲面目俱赤遍舌生刺兩唇黑裂喉間如煙火上衝兩足心如烙痰涎壅盛喘急脈洪大而數無倫按之微弱者是也宜十全大補湯吞八味丸或問燥熱如此復投桂附不為以火濟火乎曰心包絡相火附於右尺命門

男子以藏精女子以繫胞因嗜欲竭之而火無所附故厥而上炎桂附與火同氣也而其味辛能開腠理致津液通氣道據其窟宅而招之同氣相求火必下降矣且火從腎出者是水中之火也火可以水折而水中之火不可以水折故巴蜀有火井焉得水則熾得火則熄則桂附者固治相火之正藥歟　楊仁齋云凡壯熱煩躁用柴胡黃芩大黃解利之其熱乍輕而不退盖用黃芩川芎甘草烏梅作劑或用黃連生地黃赤茯苓同煎臨熟入燈心一捻主之其效亦速蓋川芎生地黃皆能調血心血一調其熱自退

其人脈澀必有漱水之證必有嘔惡痰涎之證必有煩悶厥冷之證亦必有小腹結急之證或唾紅或鼻衄此皆瘀血作熱之明驗也用藥不止於柴胡黃芩當以川芎白芷桃仁五靈脂甘草佐之大便秘結者於中更加大黃濃蜜使滯血一通黑物流利則熱不復作　東垣云發熱晝少而夜多太陽經中尤甚晝病則在氣夜

病則在血是足太陽膀胱血中浮熱微有氣也既病人大小便如常知邪氣不在藏府是無裏證也外無惡寒知邪氣不在表也有時而發有時而止知邪氣不在表不在裏在經絡也夜發多而晝發少是邪氣下陷之深也此雜證當從熱入血室論治而湯主之　丹溪治陰虛發熱者於血藥四物湯亦分陰陽血之動者為陽芎歸主之血之靜者為陰生地黃芍藥主之若血之陽不足雖薑桂辛溫亦在所不用若血之

陽不足○雖畏桂辛熱而亦用之○與瀉火之藥並有
正治有從治皆在臨機應變　飲酒發熱治法
酒性大熱有毒遍身之陽氣本盛得酒則熱愈
熾酣而又剛陰氣破散陽氣亦亡故難治也然
耗之未至於亡者則猶可治一富家子二十餘
歲因月間病發熱脈之浮沉皆無力而虛熱有
往來潮作無時間得洪數之脈隨熱進退因知
非外感之熱必是飲酒留毒在內今因房勞氣
血虛乏而病作問之果得其情遂用補氣血藥

加葛根以解酒毒服一貼微汗反懈怠熱如故
因思是病氣血皆虛不禁葛根之散而然也必
得雞矩子方可解其毒偶得乾者少許加於藥
中其熱即愈　治酒肉發熱青黛瓜蔞仁薑汁
又有服金石辛熱者甘草烏豆湯下火邪者艾
湯下冷飲食者乾薑湯下炙煿者茶清甘草湯
下　亡消諸失血後勞久痢諸虛復發熱者
皆非其證　有當直攻其發者有不當專治其
熱者因他病而發為熱當隨證用藥不可

一槩求之　其他諸證作熱當自治其本病即
於本證藥中加入退熱藥　元戎謂參蘇飲治
一切發熱皆能作効不必拘其所因謂中有風
藥解表有氣藥和中則外感風寒及內積痰飲
並可用也而合四物湯名茯苓補心湯尤能治
虛熱與此方乃虛實表裏兼治之劑然不可過
如素有痰飲者俟熱退即以六君子湯調之素
陰虛者俟熱退即用三才丸之屬調之
治各有五一治曰和假令小熱之病當以凉藥

和之和之不已次用取二治曰取為熱勢稍大
當以寒藥取之取之不已次用從三治曰從為
勢既甚當以溫藥從之為藥氣溫也味隨所為
或以寒因熱用味通所用或寒以溫用或以汗
發之不已又用折四治曰折為病勢極甚當以
逆制之逆制之不已當以下奪之下奪之不已
又用屬五治曰屬為求其屬以衰之緣熱深陷
在骨髓間無法可出鍼藥所不能及故求其屬
以衰之求屬之法是同聲相應同氣相求經曰

陷下者灸之夫衰熱之法同前所云火衰火[illegible]
金衰於辰之類是也如或又不已當廣其法治
治之譬如孫子之用兵若在山谷則塞淵泉在
水陸則把渡口在平川廣野當清野千里塞淵
泉者刺俞穴把渡口者督病發時前清野千里
者如肌膚羸瘦皆服大藥以養正　治熱以
寒溫而行之行之皆因大熱在身止用黃芪人
參甘草此三味者皆甘溫雖表裏皆熱燥發於
內謂之肌熱於外能和之汗自出而解矣此溫
能除大熱之旨理一也熱極生風乃左遷入地
補母以虛其子使天道右遷順行諸病得天令
行而必愈二也況大熱在上其大寒必伏於內
溫[illegible]其寒以助地氣地氣者在人乃胃之生氣

[illegible]大[illegible]也
脉[illegible]大而無力為虛　沉細而有力為實
[illegible]　病[illegible]有火者生心脉洪是
[illegible]是也　浮而滑濇而身有熱
者[illegible]脉[illegible]者難治　脉盛汗出不解者
死　脉虛熱不止者死　脉弱四肢厥不欲見
人食不入利下不止者死

潮熱

潮熱有作有止若潮水之來不失其時一日一發若日三五發即是發熱非潮熱也有虚有實惟傷寒日晡發熱乃胃實別無虚證其餘有潮熱者當審其虚實若大便堅澀喜冷畏熱心下愊然睡卧不著此皆氣盛所謂實而潮熱者也輕宜參蘇飲重則小柴胡湯　若氣消乏精神憔悴飲食減少日漸尫羸雖病暫去而五心常有餘熱此屬虚證宜茯苓補心湯十全大補湯

養榮湯之類病後欠調理者八珍散主之　有潮熱似虐胸膈痞塞背心疼痛服補藥不効者此乃飲證留氣而潮故熱隨飲而亦潮宜於痰飲門求之　又有每遇夜身發微熱病人不覺早起動作無事飲食如常既無別證可疑只是血虚陰不濟陽宜潤補之茯苓補心湯候熱稍減繼以養榮湯十全大補湯　脉滑腸有宿食常發潮熱明日復止者於傷飲食門求之　濕痰夜熱以二陳湯加黃連白芍藥為末粥丸

潮熱者黃芩生甘草　辰戌時發加羌活　午間發黃連　未時發石膏　申時發柴胡　酉時發升麻　夜間發當歸稍　有寒者加黃芪參术　分晝夜例見前發熱門

惡寒 表寒 寒痺 氣分寒 血分寒 三焦寒 五臟寒

經曰惡寒戰慄皆屬於熱又曰戰慄如喪神守皆屬於火惡寒者雖當炎月若遇風霜重綿在身如覺凜凜戰慄如喪神守惡寒之甚也原病式曰病熱證而反覺自冷此爲病熱實非寒也或曰往往見有服熱藥而愈者何也曰病熱之人其氣炎上鬱爲痰飲抑遏清道陰氣不升病熱尤甚積痰得熱亦爲暫退熱勢助邪其病益深或曰寒勢如此誰敢以寒涼藥與之非殺而

惡寒 [illegible]

何曰古人遇戰慄之證有以大承氣湯下燥糞而愈者惡寒戰慄明是熱證但有虛實之分耳

虛則惡寒是陰氣上溢於陽分也夜則惡寒是陰血自旺於陰分也。有衛氣虛衰不能實表溫分肉而惡寒者丹溪用參芪之類甚者加附子少許以行參芪之氣是也有上焦之邪隔絕榮衛不能升發出表而惡寒者丹溪治一女子[illegible]爲木瓣水吐後用川芎蒼朮[illegible]

[illegible]有酒熱內[illegible]

泄而惡寒者丹溪治一人形瘦色[illegible]近半月且有別館一日大惡寒戰且自言渴[illegible]不能飲其脈大而弱唯右關稍實略類弦[illegible]以[illegible]一物與[illegible]同煎與之甚者[illegible]二兩乾薑一兩脈出[illegible]且安　六月大熱之[illegible]又[illegible]大寒之病[illegible]雖命[illegible]身涼脈遲何以治之[illegible]病有標本[illegible]大寒爲標用涼則違[illegible]而失本用熱則[illegible]本而失時故不從標本而從乎中治中治者何用溫是也然既曰溫則

惡寒 [illegible]

不能治大寒之病治大寒者非薑附不可若用薑附又似非溫治之例然終其大[illegible]乃[illegible]脈得四分餘[illegible]無令治之足矣雖用薑附亦中治也[illegible]例經曰用熱遠熱[illegible]不當禁[illegible]可犯亦其理也丹溪治色目婦人年近六十六月內常覺惡寒戰慄喜炎火御綿多汗如雨其形肥肌厚[illegible]十餘貼渾身痒甚兩[illegible]脈[illegible]取[illegible]大知其熱甚而血虛也以四物[illegible]加[illegible]黃芩炒黃蘗生甘草

人參每服一兩重方與一貼腹大泄目無視口無言知其病勢深而藥無反佐之過也仍用前藥熱炒與之蓋借火力爲向導一貼利止四貼精神回十貼全安又治蔣氏年三十餘形瘦面黑六月喜熱惡寒兩手脉沉而濇重取似數以三黃丸下之以薑湯每服三十粒二十貼微汗而安　婦人先病惡寒手足冷全不發熱脉八至兩脇微痛治者使作少陽治之陽在內伏於骨髓陰在外致使發寒治當不從內外從乎中

治也宜以小柴胡調之倍加薑棗　脾胃之虚怠惰嗜卧四肢不收時值秋燥令行濕熱少退體重節痛口舌乾食無味大便不調小便頻數不嗜食食不消兼見肺病灑淅惡寒氣慘慘不樂面色惡而不和乃陽氣不伸故也升陽益胃湯主之　背惡寒是痰飲仲景云心下有留飲其人背惡寒冷如水治以茯苓丸之類是也身前寒屬胃經云胃足陽明之脉氣虚則身以前皆寒慄治法宜鍼補三里穴是也　手足寒

者厥也　掌中寒者腹中寒魚上白肉有青血脉者胃中有寒理中之類治之　黃芪補胃湯治表虚惡賊風　上焦不通則陽氣抑遏而皮膚分肉無以溫之故寒慄東垣升陽益胃湯用升發之劑開發上焦以伸陽明出外溫之也丹溪吐出濕痰亦開發上焦使陽氣隨吐升發出外溫之也故寒慄皆愈

振寒　謂寒而顫振也經云陽明所謂灑灑振寒者陽明者午也五月盛陽之陰也陽盛而陰

氣加之故灑灑振寒也此當瀉陽者也又云寒氣客於皮膚陰氣盛陽氣虚故爲振寒寒慄此當補陽者也又云厥陰在泉風淫所勝病灑灑振寒治以辛涼又云陽明司天之政清熱之氣持於氣交民病振寒四之氣寒雨降病振慄治視其熱輕重多少其制　六脉中之下得弦細而濇按之無力腹中時痛心胃相控隱隱而痛或大便溏而不閉食負清濁涕不止日中[illegible]沐腰沉沉苦痛項背肩

脇時作痛目中流火口鼻惡寒時時頭痛目眩
苦振寒不止或嗽或吐或嘔或噦則發躁蒸蒸
而熱如坐甑中必得去衣居寒處或飲寒水則
便如故其振寒復至或氣短促胸中滿悶而痛
如有膈咽不通欲絕之狀甚則口開目瞪聲聞
於外而淚涕痰涎大作其發躁方過而振寒復
至或面白而不澤者脫血也悲愁不樂情慘意
悲健忘或善嚏此風熱大損寒水燥金之復也
如六脈細弦而澀按之空虛此大寒證也亦傷
[illegible] 骨痺 [illegible]
精氣以存中滿熱潤之劑大瀉西北二方則愈
論 帝曰人身非衣寒也中非有寒氣也寒
從中生者何岐伯曰是人多痺氣也陽氣少陰
氣多故身寒如從水中出 帝曰人有身寒湯
火不能熱厚衣不能溫然不凍慄是為何病岐
伯曰是人者素腎氣勝以水為事太陽氣衰腎
脂枯不長一水不能勝兩火腎者水也而生於
骨腎不生則髓不能滿故寒甚至骨也所以不
能凍慄者肝一陽也心二陽也腎孤藏也一水

不能勝二火故不能凍慄名曰骨痺是人當攣
節也治法當求之痺門
氣分寒[illegible]桂枝加附子湯桂枝加芍藥人參新加
湯 血分寒巴戟天丸[illegible]丸 上焦寒陳皮厚
朴藿香胡椒[illegible]四逆湯桂附丸 中焦寒
白朮散[illegible]大建中湯二氣丹附子理中丸
下焦寒[illegible]附子沉香入味丸還少丹天真
丹 海藏云下焦寒[illegible]四逆倒花蘿葡苗能止而
不行附子味辛能行而不守泄小便不通二藥
[illegible]小便苦黃附朮二味內加茯苓
以分利之[illegible]用不炮則無火力熱則
行何不[illegible]以水多熱少則熱直入下焦
[illegible]和湯 心寒定志丸菖蒲
[illegible] 肺寒小[illegible] 腎寒入
[illegible]大[illegible]丸沉香桂附
[illegible]
[illegible]以和之大寒之氣熱以
[illegible]之奪之不已則逆而之

折之不盡則求其屬以衰之　東垣云治寒以熱涼而行之有三北方之人爲大寒所傷其足脛脹乃寒勝則浮理之然也若火灸湯浴必脫毛見骨須先以新汲水浴之則時見完復矣更有大寒凍其面或耳若近火湯必脫皮成瘡須先於涼房處浴之少時以温手熨烙必能完復此涼而行之除其大寒之理一也大寒之氣必令母實乃地道左遷入肺逆行於天以涼藥投之使天道右遷而順天令諸病得天令行而必愈二也況大寒在外其大熱伏於地下者乃三焦包絡天眞之氣所居之根蒂也熱伏於中元氣必傷在人之身乃胃也以涼藥和之則元氣充盛而不傷三也

往來寒熱

凡病多往來寒熱但發作有期者瘧也無期者諸病也　[illegible]經云衆之生病也寒熱少氣血上下行[illegible]　[illegible]經云風氣盛於皮膚之間內不得通外不得洩風者善行而數變腠理開則洒然寒閉則熱而悶其寒也則衰飲食其熱也則消肌肉故使人怢慄而不能食名曰寒熱又云因於露風乃生寒熱又云風勝爲寒熱[illegible]　肺經云脈之至也喘而虛名曰肺痺寒熱得之醉而使內也又曰肺脈微急爲肺寒熱　脾經云脾脈小甚爲寒熱　[illegible]經云三陽爲病發寒熱　[illegible]經云一陽維爲病苦寒熱　[illegible]經云少陰司天熱氣下臨肺氣上從[illegible]寒熱又云少陽司天火氣下臨肺氣上從[illegible]寒熱[illegible]又云少陰司天熱淫所勝寒熱[illegible]痛又云[illegible]乃大行復則病寒熱[illegible]治以寒劑　[illegible]經云陽明司天之政大氣[illegible]發寒熱[illegible]

熱交合氏病寒熱又云陽明司天燥氣下臨肝
氣上從民病寒熱如瘧又云少陰司天之政四
之氣寒熱[illegible]民病寒熱治視寒熱多少其制
皮寒熱者不可附席毛髮焦鼻槁腊不得汗
取三陽[illegible]以補手太陰　肌寒熱者肌痛毛
髮焦[illegible]槁腊不得汗取三陽於下以去其血
者補[illegible]太陰以出其汗　骨寒熱者病無所安
汗注[illegible]未槁取其少陰於陰股之絡齒已
槁死不治骨厥亦然[illegible]
[illegible]
灸寒熱之法先灸項大椎以年為
壯數[illegible]次灸橛骨以年為壯數[illegible]
[illegible]視背俞陷者灸之[illegible]
[illegible]舉臂肩上陷者灸之[illegible]兩季脇之
間灸之[illegible]外踝上絕骨之端灸之[illegible]足小
指次指間灸之[illegible]腨下陷脈灸之[illegible]外踝
後灸之[illegible]缺盆骨上切之堅動如筋者灸之
[illegible]膺中陷骨間灸之[illegible]掌束骨
下灸之[illegible]臍下關元三寸灸之毛際動

脈灸之[illegible]膝下三寸分間灸之[illegible]足陽明
跗上動脈灸之[illegible]巔上一灸之[illegible]凡當灸
二十九處灸之不已者[illegible]其經之過於陽者
數刺其俞而藥之
邪在肺則病皮膚痛寒熱上氣喘汗出欬動
肩背取之膺中外俞[illegible]五藏之傍以手疾
按之快然乃刺之[illegible]缺盆中以越之　小腹
滿大身時寒[illegible]小便不利取足厥陰　絡病者
善太息口苦[illegible]寒熱取陽陵泉　病風且寒
[illegible]
且熱汗出一日數過先刺諸分理絡脈汗出且
寒且熱三日一刺百日而已　凡刺寒熱皆多
血絡[illegible]取之[illegible]虛實
[illegible]背
內俞[illegible]谿
關[illegible]陽谷少海
然[illegible]寒
熱[illegible]門主之　心如懸陰厥
[illegible]腹血足跗上痛

舌卷不能言善笑心下痞四肢倦溺青赤白黄黑青取井赤取滎黄取輸白取經黑取合　血痔泄後重腹痛如癃狀狂仆必有所扶持及失氣涎出鼻孔中痛腹中常鳴骨寒熱無所安汗出不休復溜主之　骨寒熱溲難腎俞主之　[illegible]熱呼吸不得臥上氣嘔沫喘氣相追逐胸滿脅膺急息難振慄脈鼓氣[illegible]胸中有熱支滿不嗜食汗不出腰脊痛[illegible]主之　咳而嘔[illegible]寒食不下寒熱皮肉膚痛少氣不得臥胸滿支[illegible]鬲上兢兢脅痛腹䐜胃脘暴痛上氣肩背[illegible]汗不出喉痹腹中痛積聚默默然嗜臥怠[illegible]不欲動身常濕濕[illegible]心痛無可搖者鬲俞主之　欬而脅滿急不得息不得反側腋脅下[illegible]筋急而痛反折目上視眩目中循然[illegible]目䀮䀮生[illegible]欬引胸[illegible]主之　寒熱食[illegible]心下[illegible]痛心如懸下引臍[illegible]目䀮䀮久喘咳少氣[illegible]

溺赤腎俞主之　寒熱咳嘔沫掌中熱虛則肩背寒慄少氣不足以息寒厥交兩手而瞀口沫出實則肩背熱痛汗出四肢暴腫身濕搖時寒熱饑則煩飽則[illegible]口噤不開惡風泣出列缺主之　[illegible]咳上氣喘掌中熱數欠伸汗出[illegible]善忘四肢[illegible]逆善笑溺白列缺主之　胸[illegible]交兩手而瞀暴痹喘逆刺經渠[illegible]天府此謂之大腧　肺系急胸中痛惡寒胸滿悒悒然善嘔膽汁胸中熱喘逆氣[illegible]相追逐多濁唾不得息肩背風汗出面腹腫[illegible]不下喉痹肩息肺脹皮膚骨痛寒熱[illegible]中府主之　寒熱[illegible]善咳喘逆通谷[illegible]心咳寒[illegible]主之　寒[illegible]閉主之[illegible]時有微熱[illegible]腋下[illegible]膝外廉痛[illegible]大[illegible]主之　寒熱頭痛

喘喝目不能視神庭主之其目泣出頭不痛者聽會取之 寒熱頭痛如破目痛如脫喘逆煩滿嘔吐流汗難言頭維主之 寒熱胸滿頭痛四肢不舉腋下腫上氣胸中有聲喉中鳴天池主之 寒熱頭痛水溝主之 寒熱善噦頭重足寒不欲食腳弱京骨主之 下部寒熱病汗不出體重逆氣頭眩痛飛陽主之 肩背痛寒熱瘰癧遶頸有大氣暴聾氣蒙瞀耳目不明頭頷痛淚出目鼻衄不得息不知香臭風眩喉痺天牖

主之 寒熱瘻痛四肢不舉腋下腫馬刀挾癭髀膝脛骨搖酸痺不仁陽輔主之 寒熱頸瘰癧欬呼吸灸手三里左取右右取左 寒熱頸瘰癧大迎主之 寒熱瘰癧胸中滿有大氣缺盆中滿痛者死外潰不死肩引項不舉缺盆中痛汗不出喉痺欬嗽血缺盆主之 寒熱頸瘰癧肩痛不可舉臂臑俞主之 寒熱頸瘰癧耳鳴無聞引缺盆肩中熱痛手臂不舉肩貞主之 寒熱目不明欬上氣唾血肩中[illegible]

主之 寒熱頸腋下腫申脈主之 寒熱頸頷腫後谿主之 胸中滿耳前痛齒熱痛目赤痛頸腫寒熱渴飲輒汗出不飲則皮乾熱煩曲池主之 振寒小指不用寒熱汗不出頭痛喉痺舌急卷小指之間熱口中熱煩心心痛臂內廉痛聾欬瘛瘲口乾頸痛不可顧少澤主之 振寒寒熱肩臑肘臂頭痛不可顧煩滿身熱惡寒目赤痛眥爛生翳臂腋暴痛鼽衄耳聾臂重痛肘攣痂疥胸滿引臑泣出而驚頸項強身寒頭不

可顧後谿主之 振寒寒熱頸項腫實則肘攣頭眩痛狂易虛則生疣小者痂疥支正主之 寒熱[illegible]水漿主之 肩痛引項寒熱缺盆主之 身熱汗不出胸中熱滿天窌主之 寒熱肩腫引胛中有臂痠痛臑俞主之 臂厥肩膺胸滿痛目中白翳眼青轉筋掌中熱乍寒乍熱缺盆中相引痛數欬喘不得息臂內廉痛[illegible]主之 寒熱腹脹央央然[illegible]熱汗不出[illegible]

中熱痛衝陽主之胃脘痛時寒熱皆主之　寒
熱篡反出承山主之　寒熱篡後出瘈瘲腳腨
痠重戰慄不能久立腳[illegible]痛跗筋足攣少腹
痛引喉嗌大便難[illegible]主之　寒熱脛腫丘墟
主之　寒熱痺脛不收陽交主之　跟厥膝急
腰脊痛引腹篡陰股熱陰暴痛寒熱膝痠重合
陽主之　寒熱[illegible]　[illegible]脛痠四肢重痛
少氣難言至[illegible]　寒熱腰痛如折束骨主
之　寒熱[illegible]痛委中主之　黃帝曰人之善病

寒熱[illegible]經　[illegible]

寒熱何以候之少俞答曰小骨弱肉者善病寒
熱黃帝曰何以候骨之大小肉之堅脆色之不
一也少俞答曰顴骨者骨之本也顴大則骨大
顴小則骨小皮膚薄而其肉無䐃其臂懦懦然
其地色殆然不與天同色汙然獨異此其候也
然後臂薄者其髓不滿故善病寒熱也　問曰病
者有灑淅惡寒而復發熱者何也曰陰脈不足
陽往從之陽脈不足陰往乘之何謂陽不足假
令寸口脈微名曰陽不足陰氣上入陽中則灑

淅惡寒也何謂陰不足假令尺脈弱名曰陰不
足陽氣下陷入陰中則發熱也[illegible]
[illegible]
[illegible]者謂甲乙[illegible]之又備錄之者以
多[illegible]列寒熱門[illegible]有之又近錄[illegible]用
[illegible]方然知鍼[illegible]之經絡則知[illegible]之[illegible]
[illegible]不能一一以藥代之[illegible]定
令人眼目　[illegible]婦人中風七八日[illegible]寒
熱發作有時經水適斷此為熱入血室其血必

寒熱[illegible]經　[illegible]

結故使如瘧狀發作有時小柴胡湯主之　小
柴胡加減法　如寒熱往來經水不調去半夏
加秦艽芍藥當歸知母地骨皮牡丹皮川芎白
朮茯苓　如小柴胡湯與四物湯各半名調經
湯　無孕嘔者加半夏　無汗者加柴胡　惡
寒者加桂　有汗者加地骨皮　嗽者加紫菀
通經加京三稜[illegible]　勞者加鱉甲　[illegible]
小將[illegible]病[illegible]後有[illegible]五[illegible]中微
血滯[illegible]四肢[illegible]之殊無大[illegible]

內傷寒也問之向者飲食所傷風又渴飲水藥水此外感者輕內傷者重外從內病俱爲陰也故先斑後血顯內陰證寒熱間作脾亦有之非徒少陽之寒熱也與調中湯數服而愈　脉經云大腸有宿食寒慄發熱有時如瘧輕則消導重則下之當求之傷食門　血中風氣體虛發渴寒熱地骨皮散　寒熱體瘦肢節疼痛口乾心煩柴胡散　產後往來寒熱柴胡四物湯黃芪丸　師尼寡婦獨陰無陽慾心萌而不遂陰

陽交爭寒熱互作金匱溫瘧久則成勞其肝脉弦長而上魚際宜抑陰地黃丸　結熱在裏往來寒熱者大柴胡湯　武陽仇天祥之子病發寒熱諸醫作骨蒸勞治之半年病甚戴人往視之診其手脉尺寸皆潮於關關脉獨大戴人曰肺癰也問其乳媼曾有所苑乳媼曰無戴人令兒去衣舉其兩手觀其兩脇下右脇稍高戴人以手側按之兒移身避之按其左脇則不避戴人曰[illegible]脇部有[illegible]已吐膿矣

【診】寸口脉沉而喘曰寒熱　脉沉數細散者寒熱也（[illegible]）　脉澀洪大寒熱在中　尺膚炎熱先熱後寒者寒熱也（[illegible]）　尺膚先寒久之而熱者亦寒熱也（[illegible]）　寒熱[illegible]形[illegible]（[illegible]）　尺[illegible]（[illegible]）　診寒熱赤脉上下貫瞳子見一脉一歲死見一脉半一歲半死見二脉二歲死見二脉半二歲半死見三脉三歲死（[illegible]）　寒熱病者[illegible]死（[illegible]）

外熱內寒外寒內熱

仲景云病人身大熱反欲得近衣者熱在皮膚寒在骨髓也活人云先與桂枝湯治寒次與小柴胡湯治熱也　又云病人身大寒反不欲近衣者寒在皮膚熱在骨髓也活人云先與白虎加人參湯治熱次與桂枝麻黃各半湯以解其外

上熱下寒上寒下熱

脉經云熱病所謂陽附陰者腰以下至足熱腰以上寒陰氣下爭還心腹滿者死所謂陰附陽者腰以上至頭熱腰以下寒陰氣上爭還得汗者生

灸刺經云上寒下熱先刺其項太陽久留之已刺則熨項與肩胛令熱下合乃止此所謂推而上之者也　上熱下寒視其虛脉而陷之於經絡者取之氣下乃止此所謂引而下之者也

東垣云昔有上熱下寒經曰陰病在陽當從陽引陰必須先去絡脉經隧之血若陰中火旺上騰於天致六陽反不衰而上充者先去五藏之血絡引而下行天氣降下則下寒之病自去矣慎勿獨瀉其六陽此病陽亢乃陰火之邪滋之只去陰火只損血絡經隧之邪勿悞也

聖人以上熱下寒是有春夏無秋冬也當從天外引陽下降入地中此乃上天群陰火熾而反助六陽不能衰退先於六陽中決血絡出血使氣下降陰邪勿敢能逆六陽下行以陰

血自降故也亦可謂老陽變陰之象也故經云上熱下寒視其虛脉下陷於經絡者取之此所謂引而下之也但言絡脉皆是也病大者三稜鍼決血去陽中之熱熱者手太陽小腸中留火熱之邪致此老陽不肯退化爲陰而下故先決去手太陽之熱血使三陰得時之用而下降以行秋令奉收道下入地中而舉藏也乃瀉老陽在天不肯退化行陰道者也至元戊辰春中書參政楊公正卿年踰七十病面顏鬱赤若飲酒

狀痰稠粘時眩運如在風霧中一日會都堂此症忽來復加目曈不明遂歸命予診候兩寸脉洪大尺脉弦細無力此上熱下寒明矣欲藥之爲高年氣弱不任記先師所論凡上熱譬猶鳥巢高巔射而取之卽以三稜針於巔前髮際疾刺二十餘出紫黑血約二合許卽時頭目清利諸苦皆去自後不復作　中書左丞姚公茂六旬有七宿有瘖風至元戊申末因酒病發頭面赤腫而痛耳前後腫尤甚胸中煩悶咽嗌不利

身半已下皆寒足脛尤甚由是以牀相接作炕身半已上常臥於牀飲食減少精神困倦而體弱命予治之診得脉浮數按之弦細上熱下寒明矣內經云熱勝則腫又曰春氣者病在頭難經云畜則腫熱砭射之也蓋取其易散故遂於腫上約五十餘刺出血紫黑約一杯數頃時疼痛消散又於氣海中大艾灸百壯乃助下焦陽虛退其陰寒次於三里二穴各灸三七壯治足胻下寒引導陽氣下行故也遂製一方名曰既

濟解毒湯以熱者寒之然病有高下治有遠近無越於此以黃芩黃連苦寒酒製爲引用瀉其上熱桔梗甘草辛甘溫升佐諸苦藥治其熱柴胡升麻苦平味薄者也陽中之陽散發上熱連翹苦辛平散結消腫當歸辛溫和血止痛酒煨大黃苦寒引苦性上行止煩熱投劑之後腫散痛減大便利再服減大黃愼言語節飲食不旬日良愈

瘧

內經論病諸篇唯瘧論最詳語邪則風寒暑濕
四氣皆得留著而病瘧論邪入客處所則有腸
胃之外榮氣之舍脊骨之間五藏募原與入客
於藏府淺深不同語其病狀則分寒熱先後遇
寒熱之多少則因反時而病以應令氣生長化
收藏之異此皆外邪所致者也及乎語溫瘧在
藏者止以風寒中於腎語癉瘧者止以肺素有
熱然冬令之寒既得以中於腎則其餘四藏令

氣之邪又寧無入客於所屬之藏者乎既肺本
氣之熱為瘧則四藏之氣鬱而為熱者又寧不
似肺之為瘧乎此殆舉一隅可以三隅反也故
陳無擇謂內傷七情饑飽房勞皆得鬱而蘊積
痰涎其病氣與衛氣并則作瘧者豈非用此例
以推之歟夫如是內外所傷之邪皆因其客在
榮氣之舍故瘧有止發之定期榮氣有舍猶行
人之有傳舍也故瘧榮衛之氣日行一周歷五
藏六府十二經絡之界分每有一界分必有其

舍舍有隨經絡沉內薄之瘧邪故與日行之衛
氣相集則病作離則病休其作也不惟脈外之
衛虛并入於陰靈樞所謂足陽明與榮俱行者
亦虛以從之陽明之氣虛則天真因水穀而充
大者亦暫衰所以瘧作之際禁勿治刺恐傷胃
氣與天真也必待陰陽并極而退其榮衛天真
胃氣繼而復集過此邪留所客之地然後治之
或當其病未作之先迎而奪之丹溪謂瘧邪得
於四氣之初弱者即病胃氣強者伏而不得動

至於再感胃氣重傷其病乃作此謂外邪必用
汗解虛者先以參朮實胃加藥取汗唯足厥陰
最難得汗其汗至足方佳大率取汗非用麻黃
輩但開鬱通經其邪熱即散為汗矣又云瘧發
於子後午之前是陽分受病其病易愈發
於午後子之前陰分受病其病難愈必分受
病在氣血藥以佐之觀形察色以別之蓋嘗
從是法而治之凡色澤者病在氣分則通經開
鬱以取汗色枯夭者則補虛取汗挾痰者先實

其胃一二日方服㓮劑形羸色枯者則不用取汗亦不可㓮但補養以通經調之其形壯而色紫黑者病在血分則開其阻滯色枯者補血調氣夫如是者猶爲尋常之用至於取汗不得汗理血而汗不足者非更求藥之切中病情宜遣邪所着處何能愈之乎　經云夏傷於暑秋必痎瘧暑者季夏也季夏者濕土也君火持權不與之子暑濕之令不行也濕令不行則土虧矣所勝妄行木氣太過少陽旺也所生者受病則瘧

肺金不足所不勝者侮之故水得以乘之土分土者坤也坤土申之分申爲相火水入於土則水火相干陰陽交爭故爲寒熱兼木氣終見三焦是二少陽相合也少陽在濕土之分故爲寒熱肺金不足灑淅寒熱此皆往來未定之氣也故爲痎瘧久而不愈瘧不發於夏而發於秋者以濕熱在西之分方得其權故發於大暑以後也　在氣則發早在血則發晏淺則日作深則間日或在頭項或在背中或在腰脊雖上下遠近之不同在太陽一也或在四肢者風淫之所及隨所傷而作不必盡當風府也先寒而後熱者謂之寒瘧先熱而後寒者謂之溫瘧二者不當治水火當從乎中治中治者少陽也渴者燥勝也不渴者濕勝也瘧雖傷暑遇秋而發其不應也秋病寒甚太陽多也冬寒不甚陽不爭也春病則惡風夏病則多汗汗者皆少陽虛也其病隨四時而作異形如此又有得之於冬而發之於暑邪客於腎足少陰也有藏之於心內熱瘧

薰於肺手太陰也至於少氣煩寃手足熱而嘔但熱而不寒謂之癉瘧足陽明也治之奈何方其盛也勿敢必毁因其衰也治法易老瘧論備矣

易老云夏傷於暑濕熱閉藏而不能發洩於外邪氣內行至秋而發爲瘧也初不知何經受病隨其受而取之有中三陽者有中三陰者經中邪氣其證各殊同傷寒論之也五藏皆有瘧其治各異　肺瘧令人心寒寒甚熱熱間善驚如有所見者桂枝加芍藥湯　心瘧令人煩

心甚欲得清水反寒多不甚熱桂枝黄芩湯　肝瘧令人色蒼蒼然太息其狀若死者四逆湯通脉四逆湯　脾瘧令人寒腹中痛熱則腸中鳴鳴已汗出小建中湯芍藥甘草湯　腎瘧令人灑灑然腰脊痛宛轉大便難目眴眴然手足寒桂枝加當歸芍藥湯　足太陽之瘧令人腰痛頭重寒從背起先寒後熱熇熇暍暍然熱止汗出難已羌活加生地黄湯小柴胡加桂湯　足少陽之瘧令人身體解㑊寒不甚熱不甚惡

見人見人心惕惕然熱多汗出甚小柴胡湯　足陽明之瘧令人先寒灑淅灑淅寒甚久乃熱熱去汗出喜見日月光火氣乃快然桂枝二白虎一黄芩芍藥加桂湯　足太陰之瘧令人不樂好太息不嗜食多寒熱汗出病至則善嘔嘔已乃衰小建中湯異功散　足少陰之瘧令人嘔吐甚多寒熱熱多寒少欲閉戶牖而處其病難已小柴胡加半夏湯　足厥陰之瘧令人腰痛少腹滿小便不利如癃狀非癃也數便噫恐

懼氣不足腹中悒悒四物柴胡苦楝附子湯　在太陽經者謂之風瘧治多汗之　在陽明經者謂之熱瘧治多下之　在少陽經者謂之風熱瘧治多和之　此三陽受病皆謂暴瘧也發在夏至後處暑前者此乃傷之淺者近而暴也在陰經者則不分三經皆謂之溫瘧宜以太陰經論之其發處暑後冬至前者此乃傷之重者遠而深也痎瘧者老瘧也故謂之久瘧　瘧疾處暑前發頭痛項強脉浮惡風有汗桂枝羌活

湯　瘧疾頭痛項強脉浮惡寒無汗麻黄羌活湯　發瘧如前證而夜發者麻黄黄芩湯（桃仁散血緩甲乙乃陰經有邪此湯[illegible]在血也）　瘧疾身熱目痛熱多寒少脉長睡臥不安先以大柴胡湯下之微利爲度如下過微邪未盡者宜白芷湯以盡其邪　瘧無他證隔日發先寒後熱寒少熱多宜桂枝石膏湯　瘧寒熱大作不論先後此太陽陽明合病也謂之大爭寒作則必戰動經曰熱勝則動也發熱則汗出經曰汗出不愈知爲熱

也陽盛陰虛之證當實内治外不治恐又有傳入陰經也桂枝芍藥湯主之　如前藥服之寒熱轉大者知太陽陽明少陽三陽合病也宜桂枝黃芩湯和之　服藥已如外邪已罷内邪未已再詮下藥　從卯至午時發者宜大柴胡湯下之　從午至酉發者知邪在内也宜大承氣湯下之　從酉至子發者或至寅時發者知邪在血也宜桃仁承氣湯下之　前項下藥微利爲度更以小柴胡湯徹其微邪之氣　大法先

熱後寒者小柴胡湯先寒後熱者小柴胡加桂枝湯多熱但熱者白虎加桂枝湯多寒但寒者柴胡桂薑湯　此以瘧之寒熱多少定治法也若多寒而但有寒者其脉或洪實或滑當作實熱治之若便用桂枝誤也如或多熱而但有熱者其脉或空虛或微弱當作虛寒治之若便用白虎亦誤也所以欲學者必先問其寒熱多少又診脉以參之百無一失矣　仲景云瘧脉自弦弦數者多熱弦遲者多寒弦小緊者可下之

弦遲者可溫之弦緊者可發汗及鍼灸也浮大者可吐之弦數者風疾發也以飲食消息止之

陰氣孤絶陽氣獨發則熱而少氣煩寃手足熱而欲嘔名曰癉瘧若但熱不寒者邪氣内藏於心肺外舍於分肉之間令人消爍脫肉又云溫瘧者其脉如平身無寒但熱骨節疼煩時時嘔逆以白虎加桂枝湯主之　瘧多寒者名曰牝瘧蜀漆散主之外臺牡蠣湯亦主之　予甥延之館校時校師蔣先生之内患牝瘧身痛逾

月不瘥因甚時予初知醫延予診治告以醫欲用薑附溫之予曰瘧暑未衰明係熱邪安得寒而溫之答云陽并於陰則陰實而陽虛陽明虛則寒慄鼓頷也巨陽虛則腰背頭項痛三陽俱虛則陰氣勝陰氣勝則骨寒而痛寒生於内故中外皆寒此所云寒乃陰陽交爭互作之寒非眞寒也豈得用桂附溫之乃處一方以柴胡升麻葛根羌活防風補三陽之虛[illegible]以桃仁紅花引入陰分而

取陽以出還於陽分以猪苓分隔之使不復下陷一劑而病良已　瘧病發渴小柴胡去半夏加栝蔞根湯亦治勞瘧　張子和法　白虎加人參湯　小柴胡湯　五苓散　神祐丸　服前二服未動次與之承氣湯　甘露飲調之　人參柴胡飲子補之　在上者常山飲吐之，劉立之法　先當化痰下氣調理榮衛　草果平胃散　理中湯加半夏　藿香正氣散　不換金正氣散　對金飲子　皆要藥也俟榮衛

正方進瘧藥　湯仁齋法　風瘧自感風而得惡風自汗煩燥頭疼轉而爲瘧風陽氣也故先熱後寒可與解散風邪如川芎白芷青皮紫蘇之類或細辛檳榔佐之溫瘧一證亦先熱後寒此爲傷寒壞病與風瘧大略則同熱多寒少小柴胡湯熱少寒多小柴胡湯內加官桂　寒瘧自感寒而得無汗惡寒攣痛而慘轉而爲瘧寒陰氣也故先寒後熱可與發散寒邪生料五積散增桂養胃湯或良薑乾薑官桂草果之類甚則薑附湯附子理中湯　暑瘧者暑勝熱多得之一名癉瘧陰氣獨微陽氣獨發但熱不寒裏實不泄煩渴且嘔肌肉消鑠用小柴胡湯香薷散嘔者縮脾飲加生薑溫服下消暑圓熱多燥甚者少與竹葉湯常山柴胡於暑證最便　濕瘧者冒襲雨濕汗出澡浴得之身體痛重肢節煩疼嘔逆脹滿用五苓散除濕湯加蒼朮茯苓輩寒多者朮附湯最良　牝瘧者久受陰濕陰盛陽虛陽不能制陰所以寒多不熱氣虛而泄

悽慘柴胡桂薑湯減半黃芩加半夏　食瘧一名胃瘧飲食無節饑飽有傷致然也凡食啖生冷鹹酸魚鹽肥膩中脘生痰皆爲食瘧其狀苦饑而不能食食則中滿嘔逆腹痛青皮陳皮半夏草果縮砂白豆蔻作劑或四獸湯下紅圓子　瘴瘧挾嵐瘴溪源蒸毒之氣致然也自嶺以南地毒苦炎燠濕不常人多瘴瘧其狀血乘上焦病欲來時令人迷困甚則發躁狂妄亦有啞不能言者皆由敗血瘀於心毒涎聚於脾

坡仙指爲脾胃實熱所致又有甚於傷暑之瘧耳治之須用涼膈疎通大腸小柴胡加大黃治瘴木香圓觀音圓皆爲要藥　戴復菴法不問寒熱多少且用清脾飲　草果飲　二陳湯加草果　半夏平胃散加草果前胡　初發之際風寒在表雖寒熱過後而身體常自疼常自畏風宜草果飲或養胃湯每服加川芎草果各半錢熱少者進取微汗寒多者宜快脾湯或養胃湯每服更加草果半錢服藥後寒仍多者養胃

湯每服加熱附官桂各半錢獨寒者尤宜不効則七氣湯熱多者宜驅瘧飲或參蘇飲每服加草果半錢大熱不除宜小柴胡湯渴甚則佐以五苓散入辰砂少許獨熱無寒宜小柴胡湯熱雖劇不甚渴者於本方加桂四分熱多而脾氣怯者小柴胡湯寒熱俱等者常服宜如上項二陳湯平胃散加料之法發日進柴胡桂薑湯候可截則截之若瘧熱用清脾飲効者內煩增參作一錢　食瘧乃是飲食傷脾得之或瘧已成而猶不忌口或寒熱正作時喫食其人噫氣吞酸胸膈不利宜生料平胃散每服加草果砂仁各半錢仍佐以紅丸子七香丸　暑瘧其人面垢口渴雖熱已過後無事之時亦常有汗宜養胃湯一貼香薷飲一貼和勻作二服渴甚汗出多者加味香薷飲間進辰砂五苓散不問已發未發其人嘔吐痰食俱出宜多服二陳湯加草果半錢又恐伏暑鬱結爲痰宜消暑丸　按戴院使處元末國初大亂之後草昧之初故其用藥

多主溫熱醫者當更斟酌於天時方土物情之間而得其宜以爲取捨可也　仲景易老治瘧法雖寒熱用之外因暑邪病在盛熱之時爲宜若深秋凄清之候與七情痰食諸傷未可泥也故又備諸治法然暑月之瘧必脉浮有表證始可用麻桂羌活等表藥脉洪數長實有熱證始可用白虎等藥脉沉實有裏證始可用大柴胡承氣等藥若弦細芤遲四肢倦怠飲食少進口乾小便赤澀得之傷暑當以清暑益氣湯十味

香薷飲投之雖人參白虎非其治也至於內外
俱熱煩渴引飲自汗出而不惡雖熱退後脉長
實自如仍處以後進白虎何害是又不可泥矣
濟生云用藥多一冷一熱半熱半生分利陰
陽按局方交解飲子即半熟半生之例也東垣
云秋暮暑氣衰病熱寒知其寒也局方用雙解
飲子是已治瘧尤妙邑令劉蓉川先生深秋
患瘧而洞泄不止問予以先去其一為快予以
此方投之一服而二病俱愈　外祖母虞太孺
瘧　生氣　百三九
人年八十餘夏患瘧諸舅以年高不堪懼其再
發議欲截之予曰欲一劑而已亦甚易何必截
乎乃用柴胡升麻葛根羌活防風之甘辛氣清
以升陽氣使離於陰而寒自已以知母石膏黃
芩之苦甘寒引陰氣下降使離於陽而熱自已
以猪苓之淡滲分利陰陽使不得交併以穿山
甲引之以甘草和之果一劑而止故趙以德云
嘗究本草知母草果常山甘草烏梅檳榔穿山
甲皆言治瘧集以成方者為知母性寒入足陽

明藥將用治陽明獨盛之火熱使其退就太陰
也草果性溫燥治足太陰獨盛之寒使其退就
陽明也二經合和則無陰陽交錯之變是為君
藥也常山主寒熱瘧吐胸中痰結是為臣藥也
甘草和諸藥烏梅去痰檳榔除痰癖破滯氣是
佐藥也穿山甲[illegible]以其穴山而居遇水而入則
是出陰入陽穿其經絡於榮分以破暑結之邪
為之使藥也然此方乃脾胃有鬱痰伏涎者
用之收效若無痰止於暑結榮分獨應是太陰
瘧　直經　百卆
血證而熱者當發唇瘡而愈於此方則無功矣
[illegible]　東南瀕海海風無常所
食魚鹽人多停飲故風瘧食瘧所由以盛烏頭
草果陳皮半夏施得其宜西北高曠隆冬則水
冰地裂盛暑則爍石流金人多中寒伏暑故多
暑瘧寒瘧柴胡恒山故爲合用東南西北往來
其間病亦不分此際可用藿香正氣散草果飲
是猶養胃湯也　治瘧方瘧以馬鞭草葉煎
一盞飲之　瘧甚脈實多加薑汁　戴云近世因

寒熱發作見其指甲青黑遂名曰沙或戞或挑或濇以油茶且禁其服藥此病即是南方瘴氣生料平胃散加草果檳榔正其所宜豈有病而無藥者哉　按南人不以患瘴爲意北人則畏之北人而在南方發者尤畏之以此見治者當知方土之宜也上三條姑引其端耳　潔古家珍治久瘧不能食胸中鬱鬱欲吐而不能吐者以雄黃散吐之按此必上部脉浮滑有力確知兩寸[illegible]而後可用不然能無虛虛之禍楊仁

齋云有中年人藏府久虛大便常滑忽得瘧疾嘔吐異常唯專用人參爲能止嘔其他瘧劑並不可施遂以茯苓二陳湯加人參縮砂而倍用白荳蔻進一二服病人自覺氣脉頓平於是寒熱不作蓋白荳蔻能消能磨流行三焦榮衛一轉寒熱自平繼今遇有嘔吐發瘧之症或其人素嘔而發瘧謹勿用常山惟以生薑厚朴各[illegible]烏梅二枚同煎吞[illegible]服其利下惡血痰水即以

人參川芎茯苓半夏砂仁甘草調之萬一嘔吐止熱不退却用真料小柴胡湯多加生薑主治其或嘔吐大作而又發熱且先與治瘧生熟飲嘔定以小柴胡湯繼之仁齋論治雖悉而用藥不甚中肯[illegible]不若以逆流水煎[illegible]之若吐不出便可定之抑之使下於[illegible]之屬大抵[illegible]從其本而[illegible]之難以[illegible]也　仁齋又云[illegible]黃水常山

爲能吐之[illegible]或瘧或痎熱內實[illegible]以常山[illegible]下似泄不泄須用[illegible]數下然後獲愈又云凡瘧[illegible]積水[illegible]水不行所以寒熱不歇此[illegible]也治法[illegible]熱以香[illegible]服[illegible]同煎[illegible]其病[illegible]水即水飲也血

即瘀血也唯水飲所以作寒熱唯瘀血所以增寒熱常山逐水利飲固也苟無行血藥品佐助其間何以收十全之効耶繼自今瘧家或衄血或大便血絲或月信過來適去皆是血證當於方藥中加五靈脂桃仁爲佐入生薑蜜同煎以治之又云瘧之經久而不歇其故何耶有根在也根者何曰飲曰水曰敗血是耳惟瘧爲癖之母惟敗血爲暑熱之毒惟飲與水皆生寒熱故暑之脉虛水飲之脉沉癖之脉結挾水飲者爲

之逐水消飲結癖者腸必痛爲之攻癖敗血暑毒隨證而因利之寒熱不除吾未之信按仁齋之論[illegible]其於治末也大黃但能去有形之積不[illegible]其本其敗瘀血亦必酷製乃以桃仁之[illegible]後行不然不行也常山治瘧是其本[illegible]人[illegible]行以而不吐者瘧更易[illegible]亦非吐水之劑但能敗[illegible]飲[illegible]當用常山[illegible]之術兀兀

欲寐也甲午以多飲茶過醉且感時事[illegible]中伏大熱瘦中常號輒有發夏秋之交[illegible]大發始[illegible]已而病不[illegible]見其[illegible]惡用瓜蒂散[illegible]吐之不得吐因念積飲非十棗[illegible]用二錢以黑豆煮製曬乾研爲末棗肉[illegible]如芥子大而以棗湯下之初服五分後[illegible]加至[illegible]分無何腹痛甚以棗湯飲之[illegible]皆瀉無水時益腑[illegible]夜半乃大[illegible]瀉水數十而疾平然當其下時眩

眩特甚[illegible]欲令絕而復甦舉家號泣咸咎予之孟浪[illegible]藥可輕試哉王海藏云水者肺腎脾三經所主有五藏六府十二經之部分上而頭中而四肢下而腰腳外而皮毛中而肌肉內而筋骨脉[illegible]之[illegible]不可輕瀉當而[illegible]可用之若[illegible]按之則當深[illegible]其[illegible]無過不[illegible]積水瘀血其實者可[illegible]行血其虛者不若且以

淡滲之劑加竹瀝薑汁以治痰而於[illegible]滲藥中加桃仁韭汁之屬以活血疾亦當以漸而平慎無急旦夕之功而貽後悔也　瘧發已多徧諸藥未效度[illegible]虎人進瘧者以人參生薑各一兩[illegible]二時或發日五更連進二服無不[illegible]亦易康復不煩調將近因人參價高難[illegible]以白朮代之夜發則用當歸亦莫不應[illegible]而愈　金匱問曰瘧以月一日發當十五日愈設不差當月盡日解也如其不差

瘧母　[illegible]

當云何師曰此結為癥瘕名曰瘧母急宜治之可用鱉甲煎丸　瘧母丸鱉甲醋炙二兩三稜莪朮各醋煮一兩香附醋製二兩阿魏醋化二錢醋糊為丸服之積消及半即止　諸久瘧及處暑後冬至前後瘧及非時之間日瘧並當用瘧母法治之以鱉甲為君　瘧之間日而作者其氣之舍深內薄於陰陽氣獨發陰邪內着陰與陽爭不得出故間日而作也其有間二日或至數日發者亦氣與衛氣客於六府而有時相失不能相得故休數日乃作也丹溪曰三日一作者邪入於三陰經也作於子午卯酉日者少陰瘧也作於寅申巳亥日者厥陰瘧也作於辰戌丑未日者太陰瘧也當更參之證與脉而後決其經以立治法

[illegible]　肝病面青脉弦皮急多青則痛形盛胸脇痛耳聾口苦身熱往來寒熱而嘔以上是形盛當和之以小柴胡湯也如形衰骨搖而不能安於地此乃膝筋治之以羌活湯本草云

瘧門　[illegible]

羌活為[illegible]散以[illegible]陽如久者發為癰癤宜以鍼刺經穴復以小柴胡湯治之　心病面赤脉洪[illegible]熱赤多則熱甚狂[illegible]熱惡寒麻黃加[illegible]黃芩湯主之此證如不發汗久不[illegible]身熱脉洪緊而消[illegible]人[illegible]失精　脾病面黃脉緩[illegible]依傷寒說是為濕濕[illegible]治在太陰濕溫自汗[illegible]久不愈為濕瘧[illegible]曰

虎加桂枝主之淹疾肉消食少無力故曰熱中宜
肌肉宜以養血涼藥內經曰血生肉　肺病面
白皮膚脈亦濇多白則寒甚病濇痒氣虛麻貴
加桂枝令少汗出也傷寒論云夏傷於暑汗不
得出爲痒若久不瘥爲風瘧形衰面白脉濇皮
膚亦濇形羸氣弱形淹衛氣不足　腎病面黑
身涼脉沉而滑多黑則痺暴病形冷惡寒三焦
傷也治之以薑附湯或四逆湯久不愈爲痿暴
氣衝上吐食夜發俗呼謂之夜瘧太陽經桂枝

證形衰淹疾黑瘅羸瘦風痺痿厥不能行也
外有傷寒往來寒熱如瘧勞病往來寒熱亦如
瘧謂之如瘧非眞瘧也然傷寒寒熱如瘧初必
惡風寒發熱頭痛體疼自太陽經而來勞病寒
熱如瘧初必五心煩熱倦怠咳嗽久乃成寒熱
與正瘧自不同諸病皆有寒熱如失血痰飲癥
瘕積聚小腸疝癩風寒暑濕食傷發勞勞瘵脚
氣瘡毒已各見本門其餘不能盡舉應有發寒
熱者須問其凡有何病而生寒熱則隨病施治

凡寒熱發作有期者瘧也無期者諸病也

厥

婁全善曰王太僕云厥者氣逆上也世謬傳爲腳氣讀此始知其病上古稱之爲腳氣也經曰寒厥者手足寒也曰熱厥者手足熱也曰痿厥者痿病與厥雜合而足弱痿無力也曰痺厥者痺病與厥病雜合而腳氣頑麻腫痛也曰厥逆者即前寒厥熱厥痿厥痺厥風厥等氣逆上而或嘔吐或迷悶或脹或氣急或小腹不仁或暴不知人世所謂腳氣衝心者是也　今人又以

忽然昏運不省人事爲厥　或問世以手足冷者名爲厥何如曰非也在張仲景論傷寒則以手足熱者爲熱厥手足冷者爲寒厥冷者曰逆謂凡厥者陰陽不相順接便爲厥厥者手足逆冷也是故於陽虛而不接者則溫之於陽陷而伏深不與陰相順者則下之於邪熱入而未深者則散其傳陰之熱隨其淺深輕重以爲治此乃寒邪客之所自表入裏至太陰手足厥者獨[illegible]自傷寒六經傳邪者論故厥陰

是謂陰交盡之經熱傳至此乃陰盡之時故曰厥陰及內經厥論[illegible]則不然皆以足之三陰起於足五指[illegible]陰起於足五指之裏故陽[illegible]則足下[illegible]陽則從五指至膝上寒論得寒厥之[illegible]者宗筋之所聚太陰陽明之所合也[illegible]質壯秋冬陰氣盛陽氣衰之時也[illegible]用下氣上爭不能復精氣溢下邪氣因從之而上[illegible]陽氣衰不能滲營其經絡陽氣日損陰氣獨在故手足爲之寒也論得熱厥

之由則謂[illegible]必數醉若飽以入房氣聚於脾中腎氣有衰[illegible]故手足爲之熱也觀其徵[illegible]精元氣從此而充二藏相因[illegible]陰陽於內外各有所司陽主[illegible]之脈循環相接於四肢[illegible]此所謂傷於酒色致陰陽二厥之大者爲何[illegible]十二經之厥逆[illegible]手足之厥亦不及[illegible]

於此便可推而及之故不復言也雖然更以諸篇有關於厥者詳陳以明之如太陰陽明論曰陽明者五藏六府皆稟氣於胃今脾病不能與胃行其津液於三陰胃亦不能行津液於三陽四肢不得稟水穀氣日以益衰陰道不利筋骨肌肉皆無氣以生即此而言脾胃有更實更虛互相盛衰衰者不行津液盛者獨行獨行必寒此脾胃之致厥一也又十二經皆稟氣於胃受胃之寒則經氣亦寒受胃之熱則經氣亦熱因

厥

之經脈不和比流行相接之際必有所遺寒熱於四末此脾胃之致厥二也更有脾胃是腎之勝藏脾胃有邪必乘於腎腎乃治下主厥者也腎受邪則厥此脾胃之致厥三也鍼經曰衝脈者與少陰大絡同出於腎為五藏六府之海故五藏六府皆稟焉其上者滲諸陽灌諸精其下者並少陰之經滲三陰灌諸絡而溫肌肉其別絡結則跗上不動不動則厥厥則寒矣夫衝脈者足少陰腎藏之[illegible]者陽即火也故陽動之

以正則為生物溫養之少火動之以妄則為炎燒害物之壯火火壯則元真之陽亦衰李東垣謂火與元氣不兩立一勝則一負是也如前厥論謂下氣上爭氣因從之而上者非別有其邪即此火所以腎陽之淫氣起而上逆者也故經以逆氣屬衝脈之病病機亦言諸逆衝上皆屬於火諸厥皆屬於下然而在腎之陰陽和則下治不和則下不治不治則寒熱之厥生矣此腎主厥之道也至於衝脈與胃皆以海名故十

厥

二經稟氣而致厥病悉同又若繆刺論厥有謂因陽氣煩勞則張精絕辟積於夏使人煎厥者有二陽一陰發病為風厥者有志不足則厥者有薄厥者有暴不知人之厥者有五絡俱竭而尸厥者凡此諸因上逆之邪皆相火與君火相扇而逆逆則從亂其經氣所以屬風寒燥濕熱之在人相從而至其氣多有兼化風燥可熱化濕同火化寒熱則手足經從其所化之寒熱以為厥矣所逆之氣自下而上者非得於火逆之

勢而能之乎如三焦足少陽衝任督皆自司相
火在下者然而統屬乎腎何則足少陰子與手
少陰午對化者皆於其間如是則腎之元氣安
於治下若[illegible]火妄動須當先救其腎分正治從
治折其衝任督五氣所從之盛衰者補瀉之雖
然亦有不因氣逆而遽冷者如原病式謂陰水
主清淨故為寒則四肢冷是也乃為陽虛而陰
獨在故寒即仲景所謂先厥後熱因寒邪外中
陽氣未能勝之故先厥也雖邪有內外之分然

在漏之則一耳

[illegible]　素問黃帝曰厥之寒熱者何也岐
伯曰陽氣衰於下則為寒厥陰氣衰於下則
為熱厥帝曰熱厥之為熱也必起於足下者何
也岐伯曰陽氣起於足五指之表陰脈者集於
足下而聚於足心故陽氣勝則足下熱也帝曰
寒厥之為寒也必從五指而上於膝者何也岐
伯曰陰氣起於五指之裏集於膝下而聚於膝
上故陰氣勝則從五指至膝上寒其寒也不從

外皆從內也　帝曰寒厥何為而然也岐伯曰
前陰者宗筋之所聚太陰陽明之所合也春夏
則陽氣多而陰氣少秋冬則陰氣盛而陽氣衰
此人者質壯以秋冬奪於所用下氣上爭不能
復精氣溢下邪氣因從之而上也氣因於中陽
氣衰不能滲營其經絡陽氣日損陰氣獨在故
手足為之寒也　帝曰熱厥何如而然也岐伯
曰酒入於胃則絡脈滿而經脈虛脾主為胃行
其津液者也陰氣虛則陽氣入陽氣入則胃不

和胃不和則精氣竭精氣竭則不營其四肢也
此人必數醉若飽以入房氣聚於脾中不得散
酒氣與穀氣相薄熱盛於中故熱遍於身內熱
而溺赤也夫酒氣盛而慓悍腎氣日衰陽氣獨
勝故手足為之熱也　[illegible]狂篇厥逆為病
也足暴清胸將若裂腸若將以刀切之煩而不
能食脈大小皆濇暖取足少陰清取足陽明清
則補之溫則瀉之　儒門事親云[illegible]
病寒厥其及為熱厥前後十餘年其[illegible]

散十餘劑終無効一日命予診之二人脉皆浮
大而無力攻之曰吾手足之寒時時漬以熱湯
漬而不能止吾婦手足之熱終日沃以冷水沃
而不能巳者何也予曰寒熱之厥也此皆得之
貪飲食縱嗜欲遂出內經厥論證之攻之喜曰
十年之疑今而釋然縱不服藥愈過半矣僕曰
熱厥者寒在上也寒厥者熱在上也寒在上者
以溫劑補肺金熱在上者以涼劑清心火分取
二藥令服之不輟不旬日攻之詣門謝曰寒熱

厥者皆愈矣　原病式謂厥者有陰陽之辨陰
厥者原病脉候皆爲陰證身涼不渴脉遲細而
微也陽厥者原病脉候皆爲陽證煩渴譫妄身
熱而脉數也若陽厥極深或失下而至於身冷
反見陰證脉微欲絕而死者正爲熱極而然也
王安道曰熱極而成厥逆者陽極似陰也寒極
而成厥逆者獨陰無陽也陽極似陰用寒藥獨
陰無陽用熱藥不可不辨也　葉氏曰內經所
謂寒熱二厥者乃陰陽之氣逆而爲虛損之證

也寒厥補陽熱厥補陰正王太僕所謂壯水之
主以鎮陽光益火之原以消陰翳此補其[illegible]水
火之不足耳仲景河間安道所論厥證乃傷寒
手足之厥冷也語雖不同治法亦異　寒厥表
熱裏寒下利清穀食入即吐脉沉伏手足冷四
逆湯主之　熱厥腹滿身重難以轉側面垢譫
語遺溺厥冷自汗脉沉滑白虎湯主之　熱厥
手足熱而游赤宜升陽泄火湯　若大便結實
大柴胡湯主之　寒厥手足冷以附子理中湯

指尖冷謂之清厥理中湯主之
脉沉數實爲熱厥東垣治中書黏合公[illegible]尻
腰背冷脉沉數有力用黃蘗滋腎丸痱服而愈
又治中書左丞姚公茂上熱下寒用既濟解毒
湯良愈又治呂宗信腹有積塊足冷至膝用
大承氣湯下之愈此皆寒厥有熱也　脉沉
細微爲寒厥謙甫治征南副元帥大忒木兒年
六十秋七月征南至仲冬病自利完穀不化臍
腹冷疼足胻寒以手搔之不知痛癢常燒石

濕之亦不得暖診之脉沉細而微此手高氣弱深入臟其實務煩冤朝夕形寒飲食失節冷飲乳酪冷於臍腹陽不外固由是清濕之邪得以起於下故脚寒有逆厥冷云惑於寒而受濕故則爲咳爲泄爲痛或嘔此乃寒濕相合而爲病也法當先溫寒濕之邪使衛其陽外灸不能病已宜以大艾炷於氣海灸百壯補下焦陽虛次灸三里各三七壯治脚寒而逆且接引陽氣下行又灸三陰交以散足受寒濕之邪遂處方云寒淫

所勝治以辛熱濕淫於外平以苦熱以苦發之以附子大辛熱助陽退陰溫經散寒爲君乾薑官桂大熱辛甘亦除寒濕白朮半夏苦辛溫而燥脾濕故以爲臣人參草荳蔻甘草大溫中益氣生薑大辛溫能散清濕之邪葱白辛溫能通上焦陽氣故以爲佐又云補下治下制以急急則氣味厚故大作劑服之不數服寫止痛減足胻寒溫和飲食亦日平復明年秋涼陽值寒雨則行餘前不復作再依前灸添陽輔穴各二

七壯再以前藥投之數服愈　内經寒厥皆屬腎虛云腎藏志志不足則厥又云腎虛則清厥意不樂又云下虛則厥又云諸厥固泄皆屬於下是也　靈樞逆順肥瘦篇黄帝曰少陰之脉獨下行何也岐伯曰不然夫衝脉者五藏六府之海也五藏六府皆禀焉其上者出於頏顙滲諸陽灌諸精其下者注少陰之大絡出於氣街循陰股内廉入膕中伏行骭骨内下至内踝之後屬而別其下者並於少陰之經滲三陰其前

者伏行出跗屬下循跗入大指間滲諸絡而溫肌肉故別絡結則跗上不動不動則厥厥則寒矣經絡堅緊火所治之灸以溫之或湯酒漬之也　運氣寒厥有二　一曰寒經云水平氣曰靜順靜順之紀其病厥又云歲水太過寒氣流行邪害心火火燥悸陰厥又云歲金不及炎火乃行復則病陰厥且格是也　二曰寒濕經云太陰司天之政天氣下降地氣上騰民病寒厥是也　千金方治丈夫腰脚冷不隨不能行方上醇酒三斗水三

斗合若甕中溫漬至膝三日止冷則遷下肯湯
灰火勿令冷　東垣云經云厥在於足寒氣不
下豚中之血凝而留止非火而弗能取之　潔
古云身熱如火足冷如氷可灸陽輔穴又云鍼
寒冷絕骨取之　熱厥治驗　丹溪曰司丞
叔平生脚自踝以下常覺熱冬不可加綿於上
常自言曰我資禀壯不怕冷予曰此足三陰虛
宜斷慾事以補養陰血庶乎可免笑而不答年
方十七患瘵半年而死　千金方手足煩者小
便三升盆中溫漬手足　素問熱厥取足太陰
少陽皆留之

暴不知人之厥已前見卒中暴厥門但有輕而
未至於卒仆者難以諸中目之故復附見於此
厥有涎潮如拽鋸聲在咽中爲痰厥先用瓜蒂
散或稀涎散或人參蘆煎湯探吐隨用導痰湯
多加竹瀝　加薑汁　暴怒氣逆而昏運者爲氣
厥宜八味順氣散或調氣散或四七湯手足搐
搦爲風厥宜小續命湯　因酒而得爲酒厥宜二
陳湯加乾葛青皮或葛花解酲湯　又有骨枯
爪痛爲骨厥　身立如椽爲骭厥　喘而強爲
陽明厥　此皆由氣逆也　厥亦有腹滿不知
人者一二日稍知人者皆卒然悶亂者皆因邪
氣亂陽氣逆是少陰腎脉不至也腎氣衰少精
血奔逸使氣促迫上入胸膈宗氣反結心下陽
氣退下熱歸股腹與陰相助令身不仁又五絡
皆會於耳五絡俱絶則令人身脉皆動而形體
皆無知其狀如尸故曰尸厥正由臟氣相刑或

與外邪相忤則氣鬱不行閉於經絡諸脉伏匿
昏不知人唯當隨其臟氣而通之寒則熱之熱
則寒之閉則通之　仲景云尸厥脉動而無氣
氣閉不通故靜而死也　菖蒲屑內鼻孔中吹
之令人以桂屑著舌下　又剔取左角髮方寸
燒末酒和灌之立起　以竹管吹其兩耳
還魂湯　救卒死而四肢逆冷不醒人事腹中
氣急[illegible]　此尸厥也以焰硝五錢硫黃二錢
研細分作三服每服好陳酒一大盞煎覺硝焰起

[illegible]若溫服如人行五里又進一服不
[illegible]灸百會四十九壯氣海丹田三百
壯[illegible]灸[illegible]如無[illegible]用黑附子一隻炮製入
參一兩分作二服[illegible]煎服或生薑汁酒合
煎亦妙灸百會[illegible]大[illegible]則傷人
沉微不數[illegible]沉伏而數為[illegible]
細為氣虛 大[illegible]為血虛 浮數為痰
弦數為熱 浮[illegible]脉至如喘為氣厥
寸沉大而滑沉為實滑為氣實[illegible]氣入
[illegible]脣口青身冷死 如身和汗自出為入府也
為尸厥

證治準繩第二冊目錄

諸氣門

諸氣 鬱
痞 脹痛 水脹總論
水腫 脹滿 不服
積聚 痰飲
咳嗽 肺痿 肺癰 喘
短氣 少氣

子139 095

證治準繩第二冊

金壇王肯堂輯

諸氣

經云諸痛皆因於氣百病皆生於氣怒則氣上喜則氣緩悲則氣消恐則氣下寒則氣收熱則氣泄驚則氣亂勞則氣耗思則氣結九氣不同也　按子和云天地之氣常則安變則病而況人稟天地之氣五運迭侵於外七情交戰於中是以聖人嗇氣如持至寶庸人役物而反傷太

和此岐伯所以論諸痛皆因於氣百病皆生於氣遂有九氣不同之說氣本一也因所觸而為九怒喜悲恐寒熱驚思勞也蓋怒氣逆甚則嘔血及飧泄故氣逆上矣怒則陽氣逆上而肝木乘脾故甚嘔血及飧泄也喜則氣和志達榮衛通利故氣緩矣悲則心系急肺布葉舉而上焦不通榮衛不散熱氣在中故氣消矣恐則精却却則上焦閉閉則氣逆逆則下焦脹故氣不行矣寒則腠理閉氣不行故氣收矣熱則腠理開榮衛通汗大泄故氣泄矣驚則心無所倚神無所歸慮無所定故氣亂矣勞則喘息汗出內外皆越故氣耗矣思則心有所存神有所歸正氣留而不行故氣結矣嘗考其為病之詳變化多端如怒氣所至為嘔血為飧泄為煎厥為薄厥為陽厥為胸滿脅痛食則氣逆而不下為喘渴煩心為消癉為肥氣為目暴盲耳暴閉筋緩發於外為疽癰喜氣所至為笑不休為毛革焦為內病為陽氣不收甚則為狂悲氣所至為陰縮

為筋攣為肌痺為脈痿男為數溲血女為血崩為酸鼻辛頞為目昏為少氣不能息為泣則臂麻恐氣所至為破䐃脫肉為骨痠痿厥為暴下綠水為面熱膚急為陰痿為懼而脫頤驚氣所至為潮涎為目睘為口呿為痴癇為不省人為僵仆久則為痿痺勞氣所至為嗌噎病為喘促為嗽血為腰痛骨痿為肺鳴為高骨壞為陰痿為唾血為冥目視為耳閉男為少精女為不月衰甚則潰潰乎若壞都汨汨乎不可止思氣

所至為不眠為嗜卧為昏瞀為中痞三焦閉塞為咽嗌不利為膺痺嘔苦為筋痿為白淫為得後與氣快然如衰為不嗜食寒氣所至為上下所出水液澄徹清冷下利清白云云熱氣所至為喘嘔吐酸暴注下迫云云竊又稽之内經治法但以五行相勝之理互相為治如怒傷肝肝屬木怒則氣并於肝而脾土受邪木太過則肝亦自病喜傷心心屬火喜則氣并於心而肺金受邪火太過則心亦自病悲傷肺肺屬金悲則

氣并於肺而肝木受邪金太過則肺亦自病恐傷腎腎屬水恐則氣并於腎而心火受邪水太過則腎亦自病思傷脾脾屬土思則氣并於脾而腎水受邪土太過則脾亦自病寒傷形形屬陰寒勝熱則陽受病寒太過則陰亦自病熱傷氣氣屬陽熱勝寒則陰受病熱太過則陽亦自病凡此數者更相為治故悲可以治怒以愴惻苦楚之言感之喜可以治悲以謔浪褻狎之言娛之恐可以治喜以迫遽死亡之言怖之怒可

以治思以汚辱欺罔之言觸之思可以治恐以慮彼志此之言奪之凡此五者必詭詐譎怪無所不至然後可以動人耳目易人視聽若胸中無材器之人亦不能用此法也熱可以治寒寒可以治熱逸可以治勞習可以治驚經曰驚者平之夫惟以其忽然而遇之也使習見習聞則不驚矣如丹溪先生治一女子年婚後夫經商二年不歸因不食困卧如癡他無所病但向裏牀坐此思想氣結也藥難獨治得喜可解不然

令其怒[illegible]因激之大怒而哭至三時許令解之與藥一貼即求食矣然其病雖愈必得喜方已乃紿以夫回既而果然病不舉又如子和治一婦人久思而不眠令觸其怒婦果怒是夕困睡捷於影響惟勞而氣耗恐而氣奪者為難治喜者少病百脉舒和故也又聞莊先生治喜勞之極而病者莊切其脉為之失聲佯曰吾取藥去數日更不來病者因悲泣後即愈矣素問曰懼勝喜可謂得玄

闕者也凡此之類內經自有治法庸工廢而不
行亦已久矣幸河間子和丹溪數先生出而其
理始明後之學者宜知所從事　丹溪云冷氣
滯氣逆氣皆是肺受火邪氣得炎上之化有升
無降熏蒸清道甚而轉成劇病局方類用辛香
燥熱之劑以火濟火咎將誰執　氣無補法世
俗之言也以其為病痞悶壅塞似難於補不思
正氣虛者不能運行邪滯著而不出所以為病
經曰壯者氣行則愈怯者著而成病苟或氣怯

不用補法氣何由行　氣屬陽無寒之理上升
之氣覺惡寒者亢則害承乃制也　氣有餘便
是火冷生氣者高陽生之謬言也自覺冷氣自
下而上者非真冷也蓋上升之氣自肝而出中
挾相火自下而上其熱為甚火極似水陽亢陰
微也按[illegible]
氣鬱用香附蒼朮撫芎　調氣用木香然

味辛氣能上升如氣鬱而不達固宜用之若陰
火衝上而用之則反助火邪矣故必用黃柏知
母而少用木香佐之　氣從左邊起者肝火也
氣刺痛皆屬火當降火藥中加枳殼　破滯
氣用枳殼枳殼能損至高之氣二三服即止恐
傷真氣氣實者可服　實熱在內相火上衝有
如氣滯用知母黃柏芩連　陰虛氣滯用四物
以補血　因事氣鬱不舒伸而痛者木香調達
之　憂而痰氣香附五錢瓜蔞一兩貝母山查

各三錢[illegible]一兩　禀受素壯而氣刺痛用枳
殼烏藥　因死血而痛者桃仁紅花歸頭　解
左藏結氣宜少陰經血用梔子炒黑為末入湯
同煎飲之甚効　河間云婦人性執故氣疾為
多宜正氣天香湯先導之　戴復庵云七氣致
病雖本一氣而所以為氣者隨症而變三因方
論喜怒憂思悲恐驚謂之七氣有痰在咽
喉間如綿絮相似咯不出咽不下並宜四七湯
未効進丁沉透膈湯[illegible]審知是思慮過度

宜四七湯去茯苓加半夏人參前清審知是盛
怒成痰面色青黃或兩脇脹滿宜調氣散或四
七湯加枳殼木香各半錢因驚恐得疾心下怔
忡者見驚悸門　脉滑者多血少氣澀者少血
多氣大者血氣俱多小者血氣俱少下手脉沉
便知是氣其或沉滑氣兼痰飲　脉弦軟或虛
大虛滑微弱飲食不節勞傷過度精神倦怠四
肢困乏法當補益補中益氣湯調中益氣湯十
全大補湯夏月清暑益氣湯四君四物之類加

減　脉結澀或沉弦急疼收斂四肢腹脇腰膝
間牽引疼痛不能轉側皆由七情鬱滯賊閃傷
損蓄瘀病原隨證疏導三因七氣湯流氣飲子
大七氣湯蘇子降氣湯化氣散四磨湯大玄胡
索散可用　脉沉滑氣兼痰飲者二陳湯桔梗半
夏湯四七湯枳殼烏藥紫蘇大腹皮桑白皮之
類隨證加減

鬱

六元正紀大論曰木鬱達之火鬱發之土鬱奪
之金鬱泄之水鬱折之然調其氣過者折之以
其畏也所謂瀉之　王安道曰木鬱達之五句
治鬱之法也調其氣一句治鬱之餘法也過者
折之三句調氣之餘法也夫五法者經雖為病
由五運之所致而立然擴而充之則未嘗不
可也且凡病之起也多由乎鬱鬱者滯而不通
之義或因所乘而為鬱或不因所乘而本氣自

鬱皆鬱也豈惟五運之變能使然哉鬱既非五
運之變可拘則達之發之奪之泄之折之之法
固可擴而充之矣木鬱達之達者通暢之也
如肝性急怒氣逆胠脇或脹火時上炎治以苦
寒辛散而不愈者則用升發之藥加以厥陰報
使而從治之又如久風入中為飱泄及不因外
風之入而清氣在下為飱泄則以輕揚之劑舉
而散之凡此之類皆達之之法也王氏謂吐之
令其條達為木鬱達之東垣謂食塞胸中食為

坤土脾爲金位金主殺伐與坤土俱在於上而旺於天金能克木故肝木生發之氣伏於地下非木鬱而何吐去上焦陰土之物木得舒暢則鬱結去矣此木鬱達之也竊意王氏以吐訓達此不能使人無疑者以爲肺金盛而抑制肝木歟則瀉肺氣舉肝氣可矣不必吐也以爲脾胃濁氣下流而少陽清氣不升歟則益胃升陽可也不必吐也雖然木鬱固有吐之之理今以吐字總該達字則是凡木鬱皆當用吐矣其可乎

哉至於東垣所謂食塞肺分爲金與土旺於上而克木又不能使人無疑者夫金之克木五行之常道固不待夫物傷而後能也且爲物所傷豈有反旺之理若曰吐去其物以伸木氣乃是反爲木鬱而施治非爲食傷而施治矣夫食塞胸中而用吐正內經所謂其高者因而越之之義耳恐不勞引木鬱之說以汨之也火鬱發之發者汗之也升舉之也如腠理外閉邪熱怫鬱則解表取汗以散之又如龍火鬱甚於內非苦

寒降沈之劑可治則用升浮之藥佐以甘溫順其性而從治之使勢窮則止如東垣升陽散火湯是也凡此之類皆發之之法也土鬱奪之奪者攻下也刼而衰之也如邪熱入胃用鹹寒之劑以攻去之又如中滿腹脹濕熱內甚其人壯氣實者則攻下之其或勢盛而不能頓除者則刼奪其勢而使之衰又如濕熱爲痢有非力輕之劑可治者則或攻或刼以致其平凡此之類皆奪之之法也金鬱泄之泄者滲泄而利小便

也疏通其氣也如肺金爲腎水上原金受火爍其令不行原鬱而滲道閉矣宜肅清金化滋以利之又如肺氣膹滿胸憑仰息非利肺氣之劑不足以疏通之凡此之類皆泄之之法也王氏謂滲泄解表利小便爲金鬱泄之夫滲泄利小便固爲泄金鬱矣其解表二字莫曉其意得非以人之皮毛屬肺其受邪爲金鬱而解表爲泄之乎竊謂如此則凡筋病便是木鬱肉病便是土鬱耶此二字未當於理今刪去且解表間於

滲泄利小便之中是滲泄利小便爲二治矣若以滲泄爲滋肺生水以利小便爲直治膀胱則直治膀胱既責不在肺何爲金鬱乎是亦不通故予易之曰滲泄而利小便也水鬱折之折者制禦也伐而挫之也漸殺其勢也如腫脹之病水氣淫溢而滲道以塞夫水之所不勝者土也今土氣衰弱不能制之故反受其侮治當實其脾土資其運化俾可以制水而不敢犯則滲道達而後愈或病勢既旺非上法所能遽制則用

泄水之藥以伐而挫之或去菀陳莝開鬼門潔淨府三治備舉迭用以漸平之王氏所謂抑之制其衝逆正欲折挫其氾濫之勢也夫實土者守也泄水者攻也兼三治者廣略而決勝也守也攻也廣略也雖俱爲治水之法然不審病者之虛實久近淺深雜焉而妄施治之其不傾踣者寡矣且夫五鬱之病固有法以治之矣然邪氣久客正氣必損今邪氣雖去正氣豈能遽平哉苟不平調正氣使各安其位復其常於治鬱

之餘則猶未足以盡治法之妙故又曰然調其氣苟調之而其氣猶或過而未服則當益其所不勝以制之如木過者當益金金能制木則木斯服矣所不勝者所畏者也故曰過者折之以其畏也夫制物者物之所欲也制於物者物之所不欲也順其欲則喜逆其欲則惡今逆之以所惡故曰所謂瀉之王氏以鹹瀉腎酸瀉肝之類為說未盡厥旨雖然自調其氣以下蓋經之本旨故予推其義如此以盡應變之用則

不必拘泥也[illegible]有六氣血濕[illegible]食

也[illegible]香附[illegible]

[illegible]脈

[illegible]茯苓[illegible]小便

[illegible]痰

[illegible]脈沉[illegible]香[illegible]南星瓜蔞

仁[illegible]能食便紅其脈[illegible]桃仁

紅花[illegible]食[illegible]噯酸腹滿不能食

右[illegible]香附[illegible]山查神麯砂　右

諸鬱藥春加防風夏加苦參秋冬加吳茱萸

蒼朮撫芎總解諸鬱　凡鬱皆在中焦以蒼朮撫芎開提其氣以升之假令食在氣上提其氣則食自降矣餘皆倣此　或問方論分六鬱欲治其證有□□之名今止出六鬱之藥何也曰夫人氣之變一如天地六淫而分之故鬱者燥淫爲病之別稱也燥乃陽明秋金之位化經曰金木者生成之終始又曰木氣之下金氣乘之蓋物之化從於生物之成從於殺造化之道於生殺之氣未始相離猶權衡之不可輕重也生之重殺之輕則氣殫散而不收殺之重生之輕則氣斂濇而不通是謂鬱矣鬱有外邪內傷外邪者內經所有六氣五運勝克之鬱內應乎人氣而生病者是也用五鬱而治木鬱者達之火鬱者發之水鬱者折之土鬱者奪之金鬱者泄之內傷者人之天氣與殺氣併分布五藏名五陽者金木水火土之五氣也各司一藏而合本則統爲生殺之氣紀以上□□　周迴復五五二十五陽

於是一藏一五氣各有生長化收藏之用遲者自爲之用然必歸於肺肺屬金主氣分布其化燥其變斂濇斂濇則倂其分布之政亦生其氣不得升而收氣亦不得降故經曰逆秋氣則太陰不收肺氣焦滿又曰諸氣膹鬱皆屬於肺此之謂也今觀此方所云鬱病多在中焦及六鬱凡例之藥誠得其要矣中焦者脾胃也水穀之海法天地生萬物體乾坤之化其用靜之德五性備而沖和之氣五藏六府皆稟之以爲主榮衛由是而生之精悍所化天真亦由穀氣而充大氣由是而盛人身之清氣榮氣運氣衛氣春升之氣皆由胃氣之別稱然而諸氣豈盡是胃氣者乃因胃氣以資其生故也脾胃居中心肺在上腎肝在下凡有六淫七情勞役妄動上下所屬之藏氣致有虛實勝克之變遇於中者而中氣則常先是故四藏一有不平則中氣不得其和而先鬱矣更有因飲食失節停積痰飲寒溫不適所鬱皆自受所以中焦致鬱之多也今以其

藥兼升降而用之者蓋欲升之必先降之而後得以升也欲降之必先升之而後得以降也老氏所謂將欲取之必先與之其蒼朮足陽明藥也氣味雄壯辛烈強胃強脾開發水穀氣其功最大香附陰血中快氣藥也下氣最速一升一降以散其鬱撫芎者足厥陰直達三焦俾生發之氣上至頭目下抵血海通疏陰陽氣血之使者也然用此不專開中焦而已其胃主行氣於三陽脾主行氣於三陰脾胃既布水穀之氣行縱是三陰三陽各藏府自受其燥金之鬱者亦必因胃氣可得而通矣天真等氣之不達亦必可得而伸矣況蒼朮尤能徑入諸經疏泄陽明之濕通行斂澀者也觀此六鬱藥之凡例其升降消導皆因內經變而致殆將於受病未深者設也若或氣耗血衰津液枯竭病已入深寧復令人守此不從病機大要治法以有者求之無者求之盛者責之虛者責之必先五勝者哉不然如前條中風傷寒外邪者尚分虛實論治何

鬱 [illegible] 十九

乃鬱病傳內傷多者反不分之乎先生[illegible]不止是篇書者不能備其辭也曰予[illegible]淫之別稱劉河間則又以佛鬱為熱者何也曰燥之為氣有涼有熱而燥者秋風氣至大涼革候肅殺堅勁生氣不揚草木斂容人物之象一也在人身則腠理閉密中外澀滯氣液皆不滑澤是以原病式敘諸澀枯涸乾勁皺揭者在燥淫條下從化何如內經有之少陰少陽熱火下臨肺氣上從白起金用草木青河間又謂六氣不必一氣[illegible]病氣有相兼或[illegible]勝濕成燥澀者或[illegible]火熱致金衰耗津而燥者或火熱亢極[illegible]不化反閉塞而燥者或因寒邪外閉[illegible]而成燥其病在外其亦入內或[illegible]陽氣內鬱而成燥熱者其病在內裡[illegible]成[illegible]不能平木而[illegible]者[illegible]燥乎火燥[illegible]之為病外在

鬱 [illegible] 十八

六經九竅四肢內在五臟六府大而中風暴病暴死癲狂勞瘵消渴等疾小而百病莫不由是氣液不能宣通之所致治鬱之法有中外四氣之異在表者汗之在內者下之兼風者散之熱微者寒以和之熱甚者瀉陽救水養液潤燥補其已衰之陰兼濕者審其濕之太過不及猶土之旱澇也寒濕之勝則以苦燥之以辛溫之不及而燥熱者則以辛潤之以寒調之大抵須得仲景之法治之要各守其經氣而勿違然方論

止敘風寒濕熱四氣之病無燥火二淫之故殆是從四時令氣之傷人者於秋不言傷其燥而乃曰傷其濕者為相火代君火行令於暑故止言熱而不言火夫如是之天氣合四時者尚不能測況能推究人以一氣之變亦如天氣六淫之分者乎且人之燥火二淫常通貫於風寒濕熱病中尤多於四氣之相移也何以言之在[illegible]之[illegible]道奔迫四屬之火氣液不得通即屬之[illegible]之遊行於五者之間今不以為言尚不可也向夫燥者正屬五行金氣所化而亦於多之[illegible]何理焉及觀其所云氣門多是二淫之病可見其不識人氣有六化之六淫之道宜乎其治人病之法無端緒矣

【三】鬱脈多沉伏鬱在上則見寸脈鬱在中則見于關鬱在下則見于尺　鬱脈或促或結或[illegible]

[illegible]

痞 [illegible] 脹有形 痞無形 [illegible]

或問痞屬何臟邪屬何氣曰嘗考之內經有陽明之復心痛痞滿者注以清甚於內熱鬱於外太陽之復心胃生寒心痛痞悶者注以心氣內燔備化之紀病痞卑監之紀留滿痞塞太陰所至為積飲否膈注皆以陰勝陽也由是觀之則是受病之藏者心與脾也因而怫鬱壅塞不通為痞者火與濕也其論致病所由之邪則不可一言而盡大氣之六淫外感人氣之五邪相乘

陰陽之偏負飲食七情之過節皆足以亂其火土之氣蓋心陽火也主血脾陰土也主濕凡傷其陽則火怫鬱而血凝傷其陰則[illegible]而濕聚[illegible]不離方寸間[illegible]入[illegible]便不可同也何則[illegible]籍謂心下堅大如盤邊如旋杯水飲所作者二條同是語也但一條之上有氣分二字用桂枝去芍藥加麻黃附子細辛湯治為水寒之邪閉結氣分[illegible]不行一條用枳朮湯為中焦水停土壅故也又胸痹篇云胸痹心下痞[illegible]氣結在胸胸滿脇下逆搶心枳實薤白桂枝湯主之人參湯亦主之一證列二方原其意蓋是留氣結在胸為重者便須治中又心中痞諸逆心懸痛桂枝生薑枳實湯主之傷寒論中有謂病人手足厥冷脈[illegible]結在胸中者當吐之脈浮大心下反硬有熱屬藏者下之茲二者為不汗下而痞屬從其邪有高下故吐下之不同若經汗下而心下痞則以諸瀉心湯大抵痞與

結胸同是滿鞕但結胸則涌治豈非仲景治痞亦在心脾二藏從火土之陰陽者歟各適其宜而治高者越之下者竭之上氣不足推而揚之下氣不足溫而行之高者抑之下者舉之[illegible]者開之結者解之寒者熱之熱者寒之虛則補實則瀉[illegible]以為治 東垣云太痞者心下滿而不痛是也[illegible]也土壅塞乃土來心下為痞滿也[illegible]下太甲亦為痞乃為寒傷其榮[illegible]心主血邪入於本故為心下痞悶

仲景立瀉心湯數方皆用黃連以瀉心下之土
邪其效如響應桴故活人書云審知是痞先用
桔梗枳殼湯非以此專治痞也蓋因先錯下必
成痞證是邪氣將陷而欲過胸中故先用截散
其邪氣使不至於痞先之一字早用之義也若
已成痞而用之則失之晚矣不惟不能消痞而
反損胸中之正氣則當以仲景痞藥治之經云
察其邪氣所在而調治之正謂此也非止傷寒
如此至於酒積雜病下之太過亦作痞傷蓋下

多亡陰亡陰者謂脾胃水穀之陰亡也故胸中
之氣因虛下陷於心之分野則致心下痞宜升
胃氣以血藥兼之若全用氣藥導之則其痞益
甚甚而復下之氣愈下降必變為中滿膨脹皆
非其治也又有虛實之殊如實痞大便閉者厚
朴枳實湯主之虛痞大便利者芍藥陳皮湯主
之如飲食所傷痞悶者當消導之去其胸中窒
塞上逆兀兀欲吐者則吐之所謂在上者因而
越之是也　海藏云治痞獨益中州脾土以血藥

治之其法無以加矣　傷寒痞者從血中來雜
病痞者亦從血中來雖俱為血證然傷寒之證
從外至內從有形至無形故無形氣證以苦泄
之有形血證以辛甘散之中滿者勿食甘不滿
者當食也中滿者腹脹也如自覺滿而外無
腹脹之形即非中滿乃不滿也不滿者病也當
以甘治之可也　東垣方黃芪補中湯加柴胡升
麻緣天地不交為痞人以豬苓澤瀉從九天之
上而降柴胡升麻從九地之下而升則可以轉

否而為泰矣　無形氣證以苦泄之枳實黃連
之類大消痞丸黃連消痞丸失笑丸　有形血
證以辛甘散之枳實理中丸人參湯半夏瀉心
湯　傷寒五六日不論已下未下心下痞滿瀉
心湯小柴胡湯加枳桔主之　少陰面赤不利
心下痞瀉心湯[illegible]減例[illegible]單用瀉心湯用錢
氏方[illegible]　煩者加山梔　躁加香豉
[illegible]　[illegible]加枳實厚朴　腹痛加芍藥
[illegible]　[illegible]傷寒加乾薑　大便閉加

大黃　如用薑附先煎令熟使熱不僭後加黃
連同用　痞而頭目不清者以上清散主之胸
中不利者悉利於表　飲食傷脾痞悶輕者大
消痞丸枳朮丸同企丸之類甚者微下之吐之
下之者檳榔丸或黃連丸吐之者二陳湯及瓜蒂
散探吐之　若因積滯病下之太過亦作痞滿
宜升提胃氣以血藥兼之　濕者四肢困重小
便短宜平胃和[illegible]以滲之　帶者越鞠丸
熱則煩渴溺赤以苦寒泄之大消痞丸熱湯用黃連及

葛根升麻之便結節利之　寒則中清以辛甘散之
枳實理中丸麯脾湯加丁香或丁沉透膈湯
截復養以諸痞塞及噎膈乃是痰為氣所激而
上氣又為痰所隔而滯痰與氣搏不能流通並
宜用二陳湯加枳實砂仁木香或木香流氣飲
入竹瀝薑汁服　因七氣所傷結滯成痰痞塞
滿悶宜四七湯或導痰湯加木香半錢或下來
復丹　脾胃弱而轉運不調為痞宜四君子湯
傷於勞倦者補中益氣湯大病後元氣未復而

痞者亦宜之　脈之右關多弦弦而遲者必心
下堅此肝木剋脾土鬱結涎閉於臟腑氣不舒
則痞木香順氣湯　挾死血者多用牡丹皮江
西紅麴麥芽香附桔梗川通草穿山甲
番降香紅花肉蘇木各錢許酒童便各一
鍾煎甚者加大黃臨服入韭汁桃仁泥此方一
應大怒之後作痞者皆可服

胸痺　心下滿而不痛為痞心下滿而痛為胸
痺　金匱方胸痺胸中氣塞短氣茯苓杏仁甘

草湯主之橘枳薑湯主之　胸痺緩急者薏苡
仁附子散主之　支飲胸滿者枳朴大
黃湯主之　胸痺之病喘息咳唾胸背痛
短氣寸口脈沉而遲關上小緊數者以括蔞薤
白白酒湯主之　胸痺不得臥心痛徹背括蔞
薤白半夏湯主之　胸痺心中痞留氣結在胸
胸滿脇下逆搶心枳實薤白桂枝湯主之人參
湯亦主之　一味瓜蔞取子熟炒連皮或煎或
丸最能滌胸中垢膩

水脹總論

許學士云臍腹四肢悉腫者為水但腹脹四肢不甚腫為蠱蠱即脹也然脹亦有頭面手足盡腫者大抵先頭足腫後腹大者水也先腹大後四肢腫者脹也　靈樞經五癃津液篇黃帝問曰水穀入於口輸於腸胃其液別為五天寒衣薄則為溺與氣天熱衣厚則為汗悲哀氣并則為泣中熱胃緩則為唾邪氣內逆則氣為之閉塞而不行不行則為水脹予知其然也不知其何由生願聞其道岐伯曰水穀皆入於口其味有五各注其海津液各走其道故三焦出氣以溫肌肉充皮膚為其津其流而不行者為液天暑衣厚則腠理開故汗出寒留於分肉之間聚沫則為痛天寒則腠理閉氣濕不行水下留於膀胱則為溺與氣五臟六府心為之主耳為之聽目為之候肺為之相肝為之將脾為之衛腎為之主外故五臟六府之津液盡上滲於目心悲氣并則心系急心系急則肺舉肺舉則液上

溢夫心系與肺不能常舉乍上乍下故欬而泣出矣中熱則胃中消穀消穀則蟲上下作腸胃充郭故胃緩胃緩則氣逆故唾出五穀之津液和合而為膏者內滲入於骨空補益腦髓而下流於陰股陰陽不和則使液溢而下流於陰髓液皆減而下下過度則虛虛故腰背痛而脛痠陰陽氣道不通四海閉塞三焦不瀉津液不化水穀并于腸胃之中別於迴腸留於下焦不得滲膀胱則下焦脹水溢則為水脹　水脹篇黃帝問於岐伯曰水與膚脹鼓脹腸覃石瘕石水何以別之岐伯答曰水始起也目窠上微腫如新臥起之狀其頸脈動時欬陰股間寒足脛腫腹乃大其水已成矣以手按其腹隨手而起如裹水之狀此其候也黃帝曰膚脹何以候之岐伯曰膚脹者寒氣客於皮膚之間鼕鼕然不堅腹大身盡腫皮厚按其腹窅而不起腹色不變此其候也鼓脹何如岐伯曰腹脹身皆大大與膚脹等也色蒼黃腹筋起此其候也腸覃何如

岐伯曰寒氣客於腸外與衛氣相搏氣不得營因有所繫癖而內著惡氣乃起瘜肉乃生其始生也大如雞卵稍以益大至其成如懷子之狀久者離歲按之則堅推之則移月事以時下此其候也石瘕何如岐伯曰石瘕生於胞中寒氣客於子門子門閉塞氣不得通惡血當瀉不瀉衃以留止日以益大狀如懷子月事不以時下皆生於女子可導而下黃帝曰膚脹鼓脹可刺耶岐伯曰先瀉其脹之血絡後調其經刺去其血絡也[illegible]

水腫

素問湯液醪醴論帝曰其有不從毫毛而生五藏陽以竭也津液充郭其魄獨居孤精於內氣耗於外形不可與衣相保此四極急而動中是氣拒於內而形施於外治之奈何岐伯曰平治於權衡去宛陳莝微動四極溫衣繆刺其處以復其形開鬼門潔淨府精以時服五陽已布疏滌五藏故精自生形自盛骨肉相保巨氣乃平

釋云不從毫毛生者明其邪不自腠理入是水從內而溢出於外者也五藏陽以竭者為由脾胃虛弱夫脾胃者土也法天地生萬物故水穀入胃清陽化氣濁陰成味五藏稟其氣曰陽稟其味曰精即經之謂五陽者胃脘之陽是也氣和精生今不得稟水穀氣則無氣以生不得稟五味則無精以化肺主氣而魄藏焉無氣則魄獨居腎為陽故動之經脈行則脾胃之水穀得以化四藏亦得以稟之然後可以施治其水在表在上者汗之在下在裏者分利之夫如是此

條所治正與評熱論陰虛者對待而言也彼為腎之陰虛不能敵夫所湊之陽此為胃之陽虛不能制夫溢水之陰也　仲景法諸有水者腰以下腫當利小便腰已上腫當發汗乃愈　防已黃芪湯　防已茯苓湯・蒲灰散（已上利小便）越婢湯　越婢加朮湯　甘草麻黃湯　麻黃附子湯・杏子湯（已上發汗）・觀此可見仲景之法一出於內經後世治水腫方有五皮散香蘇散中用薑橘紫蘇大腹皮辛以散之茯苓防已木通桑皮淡以滲之是開鬼門潔淨府同用也

水腫　門　二十九

丹溪云因脾虛不能制水水漬妄行當以參朮補脾氣得實則自能健運自能升降運動其樞機則水自行非五苓之行水也又云內經曰諸氣膹鬱皆屬於肺諸濕腫滿皆屬於脾諸腹脹大皆屬於熱是三者相因而為病蓋濕者土之氣土者火之子故濕每生於熱熱氣亦能自濕胃脾氣虛上濕之變也濕氣盛肺氣不行而積鬱久則水不得清者肺失運化之職清濁混淆內鬱而為水脾土既病肺為之子而肺亦虛營衛不布氣停水積凝聚濁液滲透經絡泝流谿谷室礙津液久久灌入隊道血亦化水矣凡治腫皆宜以治濕為主所挾不同故治法亦異更宜清心經之火清養脾土火退則肺氣下降而水道通脾土旺則運化行清濁分其清者復回而為氣為血為津液其敗濁之甚者在上為汗在下為溺以漸而分消矣盧祇鏡治水腫類例以肺金盛而生水水溢妄行氣息閉樞機壅而為

水腫　門　準繩二　三十

腫必欲導腎以決去之豈理也哉夫肺者腎之母其氣清肅若果由肺盛生水則將奉行降令通調水道下輸膀胱水精四布五經並行而何病腫之有　或問丹溪所論水病之源在於脾而盧氏論水宗於水熱穴篇陰盛不溢其源在腎所起不同故治必異今如丹溪之論則內經非歟曰不然試用水熱穴篇一章之義繹之則晰然矣曰帝問少陰何以主腎腎何以主水曰腎者至陰也至陰者盛水也肺者太陰也少陰者冬

脉也故其本在腎其末在肺皆積水也此以少陰經脉在上主腎行冬令至陰盛水氣化之常者而言也非是為病之因也當時若遇邪傷則二藏之氣停而皆積水矣今盧氏不求其為因所感之邪而致氣停水積乃輙以至陰盛水謂是藏氣有餘而生病者誤矣不然何乃次章復問腎何以能聚水而生病曰腎者胃之關也關門不利故聚水而從其類也上下溢於皮膚故為胕腫胕腫者聚水而生病也此承上章積水

之病故注文以腎主下焦膀胱為府主其分注關竅二陰故腎氣化則二陰通二陰閉則胃填滿故云腎者胃之關也關閉則水積然而氣停水溢之義尚有可言者焉當是下焦之氣也何則靈樞本輸篇曰少陽者屬腎上連肺故將兩藏三焦者決瀆之府也水道出焉屬膀胱是孤府也是明在氣為下焦溢為水注文以分注之所[illegible][illegible]不瀉則溢而為水也又曰三焦病者腹氣滿小腹尤堅不得小便窘急溢則水留即為

脹以此觀之其下焦少陽之經氣當相火之化六氣中惟相火有其經無其府藏遊行於五者之間故曰少陽為遊部其經脉之在上者布膻中散絡心包在下者出於委陽上絡膀胱豈非上佐天真之施化下為決瀆之生發與手厥陰為表裏以行諸經之使者乎是故腎經受邪則下焦之火氣鬱矣火鬱則水精不得四布而水聚矣火鬱之久必發發則與衝脉之屬火者同逆而上蓋衝脉者十二經之海其上者出於

頏顙滲諸陽灌諸精其下者並少陽下足滲三陰灌諸絡由是水從火溢上積於肺而為喘呼不得卧散聚於陰絡而為胕腫隨五藏之虛者入而聚之為五藏之脹夫如是之病皆相火泛濫其水而生病者也非相火則水不溢而止為積水之病如內經所謂陰陽結斜多陰少陽曰石水少腹腫三陰結謂之水腎肝并沉為石水[illegible]又當推其腎氣不化之由多是四氣[illegible]腎之勝癥或濕熱盛而傷之

或胃氣不足下陷而害之或心火太過下乘而侮之或燥金斂澀之或風木搖撼之與夫勞役色慾七情外感皆足以致胃氣之不足也夫胃之關不惟因腎氣不化而後閉其胃之病者而關亦自閉矣其水不行胃水而生所飲之水亦旬聚矣蓋胃主中焦爲水穀之海胃氣和則升降出納之氣行水穀各從其道而輸泄也胃氣不和則出納之關皆不利故水穀之津液皆積聚而變水也仰考經脉篇曰胃所生病大腹

水腫膝臏腫痛津液篇曰五穀之津液曰陰陽不和則氣道不通四海閉塞三焦不瀉津液不化水穀并于腸胃之中留於下焦不得滲膀胱則下焦脹水溢則爲水脹王叔和脉經曰脾常懷抱其子子肺金也子畏火傷下避水中木畏金乘下爲荊棘脾復畏木居一隅水遂上溢而爲腫也即此諸論觀之所謂關門不利云云者蓋以二藏相因而然耳第三章問諸水皆生於腎乎曰腎者牝藏也地氣上者屬於腎而生水

液也故曰至陰勇而勞甚則腎汗出腎汗出逢於風內不得入於藏府外不得越於皮膚客於玄府行於皮裏傳爲胕腫本之於腎名曰風水觀是章所謂地氣上者指人形體皆具地之陰以生者而言也腎居五藏之下是至陰主水以生津液是故津液在百體猶水在地中行五氣所化之五液悉屬於腎今因勞火逼於腎氣之液發出爲汗因遇風而玄府閉其汗與風相搏遂結於皮膚於是五氣所化新舊之液則皆類

聚而成水矣由是比例推之則腎氣之勞不止房事一端而已如夜行勞甚渡水跌仆持重遠行擔負驚恐之類皆無越出腎液於表亦得以遂爲風者乎此聖人之言簡而意博舉一而可十者也又按評熱篇曰有病腎風者面胕痝然壅害於言虛不當刺不當刺而刺後五日其氣必至至必少氣時熱時熱從胸背上至頭汗出手熱口乾苦渴小便黃目下腫腹中鳴身重難以行月事不來煩而不能食不能正偃

發病名曰風水此腎虛不可妄治治之則陰益虛而陽必湊之轉及五藏有是證[illegible]病狀也用此此方前後所敘諸水溢之病未有不因腎虛得之故不須指鞭攻其水是重虛其陰也虛則諸邪而入而轉生病矣內經又謂肝腎脉并浮為風者此尤其是陰虛之甚者也何則夫腎肝二藏同居下焦腎為陰主靜其脉沉肝為陽主動其脉浮而陰道易虛[illegible]能為二藏俱有[illegible]火故也若相火所動不得其正動於腎者猶龍

大腫 [illegible] 三十三

火之於海[illegible]動於肝者猶雷火之出於地[illegible]暴發故水如波涌令水從風是以肝腎[illegible]以為風薄於下似若水風之[illegible]知肝木內發之風也　靈樞水脹篇[illegible]膚脹鼓脹腸覃石瘕石水之病治膚脹[illegible]其脹之血絡後調其經刺去其血絡[illegible]脹與膚脹[illegible]榮氣衛脉衛氣逆[illegible]脉循分肉為膚脹三里而瀉[illegible]下無問虛實工在疾瀉[illegible]

皮脹亦與腹中論中之鼓脹同其病共役則治之以[illegible]刺知二[illegible]已若飲食不節其病雖已當[illegible]復發於腹也何與此篇治是二證皆先瀉其脹之血絡刺去其血而復調其經如是之不同何哉蓋彼以氣聚之病此以氣停與血相搏故血凝於絡氣凝於經而生水液為脹故治不同也　仲景云風水其脉自浮外證骨節疼痛惡風[illegible]

大腫 [illegible] 三十六

[illegible]風水脉浮身重汗出惡風者防己黃芪湯主之　風水惡風一身悉腫脉浮不渴[illegible]汗出無大熱越婢湯主之惡風者加[illegible]　皮水其脉亦浮外證胕腫按之沒指不惡風其腹如鼓不渴當發其汗又云[illegible]皮水為病四肢腫水氣在皮膚中四肢聶聶動者防己茯苓湯主之　厥而皮水者

散主之續去皮木身體面目悉浮腫木香丸主之 正水其脉沉遲
外證自喘 石水其脉自沉外證腹滿不喘大奇
爲腎并[illegible]爲石水[illegible]所爲風水又續去石水 四肢細瘦腹獨[illegible]丸主之 石水病腹 便當[illegible]急如鼓大[illegible] [illegible]溢横[illegible]聚土之 黄汗其脉沉遲身發熱胸
滿四肢頭面腫久不愈必致癰膿又云身腫而冷汗如周痺
[illegible]不能食[illegible]暮躁不得[illegible]此爲黄汗[illegible]黄疸門 裏水者一身
面目黄腫其脉沉小便不利故令病水假如小
便自利此亡津液故令渴越婢加木湯主之甘
草麻黄湯亦主之 水之爲病其脉沉小屬少

陰浮者爲風無水虚脹者爲氣水其汗即已脉
沉者宜麻黄附子湯浮者宜杏子湯 心水者
其身重而少氣不得卧煩而躁其陰大腫 肝
水者其腹大不能自轉側脇下腹中痛時時津
液微生小便續通 肺水者身腫小便難時時
鴨溏 脾水者其腹大四肢苦重津液不生但
苦少氣小便難 腎水者其腹大臍腫腰痛不
得溺陰下濕如牛鼻上汗其足逆冷面黄瘦大
便反堅 [illegible]小便渴而不利小便數者皆不

可發汗 問曰病者若水面目四肢身體皆腫
小便不利脉之不言水反言胸中痛氣上衝咽
狀如炙肉當微咳喘審如師言其脉何類師曰
寸口脉沉而緊沉爲水緊爲寒沉緊相搏結在
關元始時當微年盛不覺陽衰之後榮衛相干
陽損陰盛結寒微動腎氣上衝喉咽塞噎脇下
急痛醫以爲留飲而大下之氣擊不去其病不
除後重吐之胃家虚煩咽燥欲飲水小便不利
水穀不化面目手足浮腫又與葶藶丸下水當

時如小差食飲過度腫復如前胸脇苦痛象若
奔豚其水揚溢則浮欬喘逆當先攻擊衝氣令
止乃治欬欬止其喘自差先治新病病當在後
右仲景治水皆方皆用脉病爲本然後量輕
重而施治皆守聖經之法耳柰何今世俗
之醫見病者急求一時之効以破氣去水爲功
不知[illegible]一日則病復至而不可救矣嗚呼予
[illegible]人患水腫多死不救者有二一以病
人[illegible]一以醫惧投下藥之過竭其陰陽

絕其胃氣故多死於是詳猶未見金匱之言而猶發明之有志者當不厭其繁也

腫病不一或徧身腫或四肢腫面腫脚腫皆謂之水氣然有陽水有陰水並可先用五皮飲或除濕湯加木瓜腹皮各半錢如未効繼以四磨飲兼吞桂黃丸仍用赤小豆粥佐之　徧身腫煩渴小便赤澀大便多閉此屬陽水輕宜四磨飲添磨生枳殼兼進保和丸重則疏鑿飲子利之以通為度　亦有雖煩渴而大便已利者此不可更利宜用五苓散加木通大腹皮半錢以通小便　徧身腫不煩渴大便自調或溏泄小便雖少而不赤澀此屬陰水宜實脾飲小便多少如常有時赤有時不赤至晚則微赤却無澀滯者亦屬陰也不可遽補木香流氣飲繼進復元丹若大便不溏氣息脹滿宜四磨飲下黑錫丹　四肢腫謂之肢腫宜五皮飲加薑黃木瓜各一錢或四磨飲或用白朮三兩㕮咀每服半兩水一盞半大棗三枚拍破同煎至九分去查

溫服日三無時名大棗湯　兩[illegible]重蘇子降氣湯兼氣急者尤宜或煎蒸去滓後更煎沉香一呷　有一身之間唯面與脚浮腫早則面甚晚則脚甚經云面腫為風脚腫為水乃風濕所致須問其大小腑通閉別其陰陽二症前後用藥[illegible]除濕湯加木瓜腹皮白芷各半錢可通用或以蘇子降氣湯除濕湯各半貼煎之　蘿蔔[illegible]有導滯通經湯治面目手足浮腫　感濕而[illegible]者其身雖腫而自腰下至脚尤重腿脹滿尤[illegible]於身氣或急或不急大便或溏或不溏宜[illegible]利小便為佳以五苓散吞木瓜丸[illegible]間進除濕湯加木瓜腹皮各半錢炒萊菔子七分[illegible]　因氣而腫者其脈沉伏或腹脹或喘急宜分氣香蘇飲　飲食所傷而腫或胸滿或噯氣宜消導寬中湯　不服水土而腫者胃苓湯加味五皮湯　有患生瘡用乾瘡藥太早致徧[illegible]宜消風敗毒散若大便不通升麻和氣飲[illegible]婦人[illegible]常或自利當導其氣自小便[illegible]

皮飲和生料五苓散腹若腫只在下宜除濕湯和生料五苓散加木瓜如澤瀉之數　已上數條爲有餘之證　大病後浮腫此係脾虛宜加味六君子湯白术三錢人參黃芪各一錢半白茯苓二錢陳皮半夏麯芍藥木瓜各一錢炙甘草大腹皮木瓜各五分薑棗煎服小便不利間入五苓散　有脾肺虛弱不能通調水道者宜用補中益氣湯補脾肺六味丸補腎　有心火尅肺金不能生腎水以致小便不利而成水證

者用人參平肺散以治肺滋陰丸以滋小便若腎經陰虧虛火爍肺金而小便不生者用六味地黃丸以補腎水用補中益氣湯以培脾土肺脾腎之氣交通則水穀自然尅化二經既虛漸成水脹又誤用行氣分利之藥以致小便不利喘急痰盛已成蠱證宜加減金匱腎氣丸主之　已上數條爲不足之證　不足者正氣不足有餘者邪氣有餘凡邪之所湊必正氣虛也故以治不足之法治有餘則可以治有餘之法治不足則不可　潔古法如水腫因氣爲腫者加橘皮　因濕爲腫者煎防已黃芪湯調五苓散　因熱爲腫者八正散　如以熱燥於肺爲腫者乃絕水之源也當淸肺除燥水自生矣於梔子豉湯中加黃芩　如熱在下焦陰消使氣不得化者當益陰而陽氣自化黃蘗內加黃連是也　如水脹之病當開鬼門潔淨府也白茯苓湯主之　白茯苓湯能變水白茯苓澤瀉各二兩郁李仁五錢水一碗煎至一半生薑自然

汁入藥常服無時從少至多服五七日後覺腹下再腫治以白术散白术澤瀉各半兩爲末煎服三錢或丸亦可煎茯苓湯下三十丸以黃芪芍藥建中湯之類調養之平復後忌房室猪魚鹽麪等物　香薷熬膏丸如桐子大每服五丸日三漸增以小便利爲度　冬瓜不限多少任喫　鯉魚一頭重一斤已上者煮熟取汁和冬瓜葱白作羹食之　靑頭鴨或白鴨治如食法細切和米幷五味煮熟作粥食之宜空腹時進

一何䎸齋學士云造化之機水火而已宜平不宜偏宜交不宜分水爲濕爲寒火爲燥爲熱火性炎上水性潤下故火宜在下水宜在上則易交也交則爲既濟不交則爲未濟不交之極則分離而死矣消渴證不交而火偏盛也水氣證不交而水偏盛也制其偏而使之交則治之之法也小火不能化大水故必先瀉其水後補其火開鬼門瀉在表在上之水也潔淨府瀉在裏在下之水也水勢既減然後用暖藥以補元氣使水火交則用藥之次第也又云盧氏以水腫隸肝腎胃而不及脾丹溪非之似矣然實則皆非也蓋造化生物天地水火而已矣主之者天也成之者地也故曰乾知太始坤作成物至於天地交合變化之用則水火二氣也天運水火之氣於地之中則物生矣然水火不可偏盛太旱物不生火偏盛也太澇物亦不生水偏盛也水火和平則物生矣此自然之理也人之藏府以脾胃爲主蓋飲食皆入於胃而運以脾猶地

之土也然脾胃能化物與否實由於水火二氣非脾胃所能也火盛則脾胃燥水盛則脾胃濕皆不能化物乃生諸病水腫之證蓋水盛而火不能化也火衰則不能化水故水之入於脾胃者皆滲入血脈骨肉血亦化水肉發腫脹皆自然之理也導去其水使水氣少減復補其火使二氣和平則病去矣丹溪謂脾失運化由肝木侮脾乃欲清心經之火使肺金得令以制肝木則脾土全運化之職水自順道乃不爲腫其詞迂而不切故何氏辨之　按何公雖於醫學未精其論水火則醫書所未發是可存也故附著於此

【蠱】目窠微腫如臥蠶之狀曰水　足脛腫曰水　頸脈動喘疾欬曰水　腹下利後渴飲水小便不利腹滿陰腫此欲爲水也若小便自利及汗出者自愈　趺陽脈當伏今反數本自有熱消穀小便數今反不利此欲作水　寸口脈浮而遲浮脈則熱遲脈則潛熱潛相搏名曰

沉趺陽脉浮而數浮脉則熱數脉則止熱止相搏名曰伏沉伏相搏名曰水沉則絡脉虚伏則小便難虚難相搏水走皮膚則爲水矣 脉得諸沉當責有水身體腫重水病脉出者死三因云太陽無浮脉帶數知其居矣潛止於其間久必沉伏沉伏則陰虚陰實爲水必矣 面痝然浮腫疼痛其色炲黒多汗惡風者屬腎風 陽水兼陽證脉必沉數 陰水兼陰證脉必沉遲 沉而滑爲風水一 浮而遲弦而緊皆爲腫一云 水病脉洪大者可治微細者不可治又云浮大輕者生沉細虚小者死又云實者生虚者死 唇黒則傷肝 缺盆平則傷心 臍出則傷脾 足心平則傷腎 背平則傷肺 凡此五傷必不可治

水腫 壽親卷二 四五

脹滿

仲景云脹滿按之不痛爲虚痛者爲實可下之 腹滿不減減不足言須當下之宜大承氣湯 腹脹時減復如故此爲寒當與温藥 心下堅大如盤邊如旋杯水飲所作枳术湯主之 腹滿口舌乾燥此腸間有水氣防己椒藶丸主之 病腹滿發熱十日脉浮而數飲食如故厚朴七物湯主之 脾虚滿者黄芪湯芍藥停濕一脾實滿不運平胃散茯苓澤瀉 東垣云腹脹滿氣不轉者加厚朴以破滯氣腹中夯悶此非腹脹滿乃散而不收可加芍藥收之是知氣結而脹宜厚朴散之氣散而脹宜芍藥收之 六元政紀論云太陰所至爲中滿太陰所至爲畜滿諸濕腫滿皆屬脾土論云脾乃陰中之太陰同濕土之化脾濕有餘腹滿食不化天爲陽爲熱主運化也地爲陰爲濕主長養也無陽則陰不能生化故云藏寒生滿病調經篇云因飲食勞倦損傷脾胃始受熱中末傳寒中皆由脾胃之氣虚

脹滿 壽親卷二 四六

弱不能運化精微而制水穀聚而不散而成脹滿經云腹滿䐜脹支膈胠脇下厥上冒過在太陰陽明乃寒濕鬱遏也脉經所謂胃中寒則脹滿者是也腹滿大便不利上走胸膺喘息喝喝然取足少陰又云脹取三陽三陽者足太陽寒水為脹與通評虛實論說腹暴滿按之不下取太陽經絡胃之募也正同取者瀉也經云中滿者瀉之於內者是也宜以辛熱散之以苦瀉之淡滲利之使上下分消其濕正如開鬼門潔淨

府溫衣繆刺其處是先瀉其血絡後調其真經氣血平陽布神清此治之正也或問諸脹腹大皆屬於熱者何也此乃病機總辭假令外傷風寒有餘之邪自表傳裏寒變為熱而作胃實腹滿仲景以大承氣湯治之亦有膏粱之人濕熱鬱於內而成脹滿者此熱脹之謂也大抵寒脹多而熱脹少治之者宜詳辨之　諸腹脹大皆屬於熱此乃八益之邪有餘之證自天外而入是感風寒之邪自表傳裏寒變為熱作胃實腹

病日晡潮熱大渴引飲譫語是太陽陽明并大實大滿者大承氣湯下之少陽陽明微滿實者小承氣湯下之經云泄之則脹已此之謂也假令瘦瘠為脹滿亦有寒脹熱脹是天之邪氣傷暑而得之不即時發至秋暑氣衰絕而瘧病作矣知其寒也可方用交解飲子者是也內虛不足寒濕令人中滿及五藏六府俱有脹滿更以脉家寒熱多少較之胃中寒則脹滿濁氣在上則生䐜脹取三陽三陽者足太陽膀胱寒水為

脹腹暴滿按之不下取太陽經絡者胃之募也正同腹滿䐜脹支膈胠脇下厥上冒過在太陰陽明此胃之寒濕鬱遏也太陰䐜脹後不利不欲食食則嘔不得臥按內經所說寒脹之多如此中滿治法當開鬼門潔淨府開鬼門者謂發汗也潔淨府者利小便也中滿者瀉之於內謂脾胃有病當令上下分消其氣下焦如瀆氣血自然分化不待泄滓穢如或大實大滿大小便不利從權以寒熱藥下之或傷酒濕麪及味厚

之物膏粱之人或食已便卧使濕熱之氣不得
施化致令腹脹滿此脹亦是熱脹治熱脹分消
丸主之　如或多食寒涼及脾胃久虛之人胃
中寒則脹滿或藏寒生滿病以治寒脹中滿分
消湯主之　中滿熱脹及脹氣脹皆分消丸主
之　中滿寒脹寒疝大小便不通陰躁足不收
四肢厥逆食入反出下虛中滿腹中寒心下痞
下焦躁寒沉厥奔豚不收皆分消湯主之　中
滿腹脹内有積聚堅硬如石其形如盤令人不

能坐卧大小便澀滯上喘氣促面色痿黃通身
虛腫廣茂潰堅湯主之二服後中滿減半止有
積不消再服半夏厚朴湯　陰陽應象論云清
氣在下則生飧泄濁氣在上則生䐜脹此陰陽
反作病之逆從也夫䐜脹者以寒熱溫涼論之
此何脈也因此飲食失節爲脹乃受病之始
也濕熱亦能爲脹右關脉洪緩而沉弦脉浮於
上是風濕熱三脉相合而爲病也是脾胃之令
不行陰火亢甚乘於脾胃盛則左遷而陽道不

行是六府之氣已絶於外大盛能令母實風氣
外絶風氣外絶者是穀氣入胃清氣營氣不行
便是風氣也異呼同類即胃氣者是也經云虛
則兼其所勝土不勝者肝之邪也是脾胃之土
不足水火大勝者也經云濁陰出下竅濁陰走
五藏濁陰歸六府濁陰歸地此平康不病之常
道反此則爲脹也陰陽論云飲食不節起居不
時者陰受之陰受之則入五藏入五藏則䐜脹
閉塞調經篇云下脘不通則胃氣熱熱氣熏胸

中故内熱下脘者幽門也人身之中上下有七
衝門皆下衝上也幽門上衝吸門吸門者會厭
也衝其吸入之氣不得下歸于腎肝爲陰火動
相拒故咽膈不通致濁陰之氣不得下降而大
便乾燥不行胃之濕與客陰之火俱在其中則
腹脹作矣治在幽門使幽門通利泄其陰火潤
其燥血生益新血幽門通利則大便不閉吸門
亦不受邪其膈咽得通膈滿腹脹俱去是濁陰
得歸地矣故經曰中滿者瀉之於内此法是

也　通幽湯　潤腸丸　脹而大便燥結脈沉之濡弱浮之弦者宜沉香交泰丸　范天騋夫人先因勞役飲食失節加之憂思氣結病心腹脹滿旦食則不能暮食兩脇刺痛診其脈弦而細至夜濁陰之氣當降而不降䐜脹尤甚大抵陽主運化飲食勞倦損傷脾胃陽氣不能運化精微聚而不散故為脹滿先灸中脘乃胃之募穴引胃中生發之氣上行陽道後以木香順氣湯助之則濁陰之氣自此而降矣經曰留者行之結者散之以柴胡升麻之苦平行少陽陽明二經發散清氣運行陽分為君以生薑半夏草豆蔻益智仁之甘辛大熱消散中寒為臣以厚朴木香蒼朮青皮之辛苦大溫通順滯氣以陳皮當歸人參之辛甘溫調和榮衛滋養中氣濁氣不降宜以苦泄之吳茱萸之苦熱泄之者也氣之薄者為陽中之陰茯苓甘平澤瀉鹹平氣薄引導濁陰之氣自上而下故以為佐氣味相合散之泄之上之下之使清濁之氣各安其位

靈樞經云腹滿大便不利上走胸嗌喘息喝喝然取足少陰[illegible]者寒也宜以辛熱散之良薑肉桂益智仁草豆蔻仁厚朴升麻甘草獨活　黃柏　又方桂枝桔梗人參陳皮青皮　良薑白朮澤瀉吳茱萸　太陰所至為中滿　辨云脾為陰中之太陰又云脾為陰中之至陰乃為坤元亘古不易之土天為陽火也地為陰水也在人則[illegible]同陰水之化脾有餘則腹脹滿食不化故無陽則不能化五穀脾盛乃大寒為脹滿故脈經云胃中寒則脹滿大抵此病皆水氣寒濕為之[illegible]治宜大辛熱之劑必愈然亦有輕重

木香塌氣丸　丹溪云脾具坤靜之德而有乾健之運故能使心肺之陽降腎肝之陰升而成天地交之泰是為平人今也七情內傷六淫外侵飲食失節房勞致虛脾土之陰受傷轉輸之官失職胃雖受穀不能運化故陽升陰降而成天地不交之否清濁相混隧道壅塞而為熱熱留為濕濕熱相生遂成脹滿經云鼓脹是

也以其外雖堅滿中空無物有似於鼓以其膠
固難治又名曰蠱若蟲之侵蝕有蠱之義爲
宜補其脾又須養肺金以制木使脾無賊邪之
患滋腎水以制火使肺得清化之令却鹹味斷
妄想遠音樂無有不安醫者不察急於取效病
者苦於脹急喜行利藥以求通快不知寬得一
日半日其脹愈甚而病邪甚矣眞氣傷矣　或
問方論或以胃冷中寒或以其食則不能暮食
由至陰居中五陽不布然也今丹溪乃云濕熱

相生則濕無寒者歟曰初病因寒飲食與外受
寒氣亦或有之若丹溪之所言者則非一日之
病何雖因寒陽氣被鬱久亦成熱矣經曰諸腹
脹大諸病有聲鼓之如鼓皆屬於熱是也今使
心肺之陽降腎肝之陰升仰是五陽布之也何
必藉用之然乎然先以救其脾胃虛弱者爲本
從而調其標之有餘者治之此亦聖人之旨也
靈樞脹論曰五藏六府皆有脹其脹皆在藏府
之外排藏府而郭胸脅脹皮膚胸腹者藏府之
郭也各有畔界各有形狀營氣循脈衛氣逆爲
脈脹衛氣並脈循分肉爲膚脹矣諸脹皆因
厥氣在下營衛留止寒氣逆上眞邪相攻兩氣
相搏乃合爲脹也凡此諸脹其道在一　明知逆
順針數不失瀉虛補實神去其室致邪失正眞
不可定麤之所敗謂之夭命補虛瀉實神歸其
室久塞其空謂之良工以此而觀則聖人未嘗
不以補虛爲要曰靈樞脹論多言由厥氣在下
寒氣逆上而爲脹也更有他邪之可言乎曰考

之內經脈要精微篇曰胃脈實氣有餘則脹腹
中論曰病心腹滿旦食不能暮食名爲鼓脹有
病熱者　陽盛入於陰故病在頭與腹乃䐜脹
而頭痛有病膺腫頸痛胸滿腹脹名曰厥逆風
論曰胃風鬲塞不通腹善滿失衣則䐜脹調經
篇曰形有餘則腹脹涇溲不利志有餘則腹脹
飧泄至眞大要論曰諸濕腫滿皆屬於脾六元
正紀大論曰土鬱之發心腹脹腸鳴而數後水
運太過[illegible]中寒甚則腹大脛腫寢汗憎

寒至真大要論謂厥陰司天食則嘔[illegible]
在泉病腹脹善噫少陰司天腹[illegible]脹[illegible]
彭而喘欬陽明之復脹而泄嘔苦欬[illegible]太陰司
氣病中熱脹[illegible]太陰陽明論[illegible]起
居失節入五藏[illegible]閉塞下為飧泄經[illegible]論
謂有所[illegible]內腹中滿脹不得[illegible]後光
飲利[illegible]厥陰之脈下傷少陰之絡診要
謂手少陰終者[illegible]長而垢[illegible]脹閉上下不
通而終足太陰終者腹脹閉不得息善噫善嘔
脹滿 附[illegible]經 五五
嘔則逆逆則面赤不逆則上下不通面黑皮毛
焦而終[illegible]謂二陰一陽發病善脹心滿
善[illegible]同逆三焦不行氣稿於上陰陽應
象[illegible]在上則生䐜脹六元正紀論謂太陰
[illegible]稿滿又云太陰所至為中滿脈解篇謂
太陰子也十一月萬物氣皆藏於中故曰病脹
所謂上走心為噫者陰盛而上走於陽明陽明
絡屬心故上走心為噫所謂食則嘔者物盛滿
而上溢故嘔所謂得後與氣則快然如衰[illegible]

二月陰氣下衰而陽氣且出[illegible]水脹篇謂
脹者[illegible]大[illegible]色蒼黃腹筋起此
其候也經脈篇謂胃[illegible]足胃中寒則脹滿身
以前皆[illegible]胃脘痛腹脹得後與
氣則快然如衰[illegible]胃病者腹䐜脹胃脘
當心而痛上支兩脇膈咽不通飲食不下又胃
[illegible]脾氣實則腹脹涇
[illegible]之別公孫[illegible]則鼓脹
又[illegible]則脹而泄脹論篇謂營氣[illegible]
[illegible] 附[illegible] 五六
脈[illegible]分肉為膚脹
脹[illegible]不能勝[illegible]不安胃
脹者[illegible]焦[illegible]於食大便難肺
脹者[illegible]大腸脹者腸鳴而痛濯濯有
[illegible]脹者[illegible]膀胱脹者
[illegible]少腹[illegible]
[illegible]三焦脹者氣滿
[illegible]不
[illegible]脹引腰而痛二經皆除之

論各邪所生之脹各脹之病狀如此各有所當
引經當攻大要云下之則脹已者謂南北二方
地形高寒及異法方宜論云北方之人藏寒生
滿病所謂適寒涼者脹者秋冬之氣也二者盡
謂寒涼在外六陽在於地上之中坤土者人之
脾胃也五藏之病外寒必內熱然陰盛陽虛故
下之則愈又曰大抵寒脹多而熱脹少治者宜
詳辨之予因是而思豈獨寒熱而已凡治是病
必會通聖經諸條之旨然後能識藏府之部分

形證邪氣之所自來從是通腹脹滿之雖究竟
者亦必有脹甚之部與病先起處何可知爲何
藏府之氣受邪而不行者爲先而後及乎中焦
氣交之分於是轉運不前壅聚通腹脹滿也若
脾胃受邪使先是胃脘心下痞氣起漸而爲通
腹脹也腹屬脾胃者則飲食少屬他府
藏者則飲食如常此亦可驗又須分其表裏淺
深何也在皮膚經絡之間者飲食亦如常其在
腸胃之間者則飲食減少其氣有寒有熱

藏則氣從急不食而病危矣是故病在表者易
治入府者難治入藏者不治更要分虛寒實熱
其藏府之氣本不虛被邪填塞不行者爲實其氣
本不足因邪所害者爲虛實者瀉之虛者補之
寒者熱之熱者寒之結者散之留者行之邪從
外入內而盛於中者先治其外而後調其內陰
從下逆上而盛於中者先抑之而調其中陽從
上降下而盛於中者先舉之亦調其中使陰陽
各歸其部故內經治法謂平治權衡去菀陳莝

開鬼門潔淨府宣布五陽巨氣乃平此之謂也
每見俗工不明其道專守下之則脹已者一法
耳雖得少寬一二日然真氣未免因瀉而下脫
而邪氣既不降必復聚成脹遂致不救可勝歎
哉因書一二驗以驗之麻城范氏子年十八患
胸腹身面俱脹滿諸治半月不效診其脈六部
皆不出也於是用紫蘇桔梗之類煎服一盞
有微汗再服則身出汗其六部和平之脈皆出
一二日其脹悉消又一服身痊十餘

大發煩躁渴而赤不得臥而足冷予以其人素
飲酒必酒後入內奪於所用精氣溢下邪氣因
從之上逆逆則陰氣在上故爲䐜脹其上焦之
陽因下逆之邪所迫壅塞於上故發煩躁此因
邪從上下而盛於上者也於是用吳茱萸附子
人參薑以退陰逆水冷飲之以解上焦之浮熱
入咽覺胸中頓爽少時腹中氣喘如牛吼泄氣
五七次明日其疾愈矣　風寒暑濕脹藿香正
氣散　七情脹五膈寬中散木香流氣飲沉香

降氣湯　或飲食所傷脾胃虛弱以致水穀聚
而不化此實濕鬱遏而脹香砂調中湯　大怒
而脹分心氣飲　憂思過度而脹紫蘇子湯
濕熱內甚心腹脹滿小便不利大便滑泄及水
腫大橘皮湯　失饑傷飽痞悶停酸早食暮不
能食名穀脹大異香散　雞矢醴治心腹脹滿
旦食不能暮食由脾元虛弱不能克制於水水
氣上行浸漬於土土濕不能運化水穀氣不宣
流上下痞塞故令人中滿其陽氣方長穀氣易

消故能食暮陰氣方進穀不得化故不能食其
脈沉實滑病名穀脹用雞矢白半升以好酒一
斗漬七日每服一盞食後臨臥溫服　脾土受
濕不能制水水漬於腸胃溢於皮膚漉漉有聲
怔忪喘息名水脹大半夏湯　煩躁漱水迷忘
驚狂痛悶喘急虛汗厥逆小便多大便血名血
脹人參芎歸湯　有因積聚相攻或疼或脹者
初用七氣消聚散日久元氣虛脾胃弱而脹者
參朮健脾湯少佐消導藥　瘀蓄死血而脹腹

皮上見青紫筋小水反利脈芤濇婦人多有此
疾先以桃仁承氣湯勢重者抵當湯如虛人不
可下者且以當歸活血散調治　勞倦所傷脾
胃不能運化而脹者補中益氣湯加減法見勞
倦門　大病後飲食失調脾胃受傷運化且難
而生脹者先以枳實消痞中湯次以參苓白朮散
調利後服消導藥以致脾胃太弱而脹專
以補脾為主名治痞木香開胃風湯　喘渴
不得臥[illegible]人參[illegible]散[illegible]實者[illegible]湯

類　閉腸滿脹一身面目盡浮鼻塞欬逆清涕流出當用小青龍湯二三服分利其經却進消脹散　經久患泄瀉[illegible]止乃氣脫也宜用益智子煎濃湯服立愈　[illegible]腹脹小腹脹　有腎熱　三焦虛寒　石水　腸覃　女勞疸一

金匱云寸口脈遲而澀遲則為寒澀則為血不足趺陽脈微而遲微則為氣遲則為寒寒氣不足則手足逆冷手足逆冷則榮衛不利榮衛不利則腹脹腸鳴相逐氣轉膀胱榮衛俱勞陽氣

不通即身冷陰氣不通即骨疼陽前通則惡寒陰前通則痺不仁陰陽相得其氣乃行大氣一轉其氣乃散實則失氣虛則遺尿名曰氣分

寸口脈沉而遲沉則為水遲則為寒寒水相搏趺陽脈伏水穀不化脾氣衰則鶩溏胃氣衰則身腫少陽脈卑少陰脈細男子則小便不利婦人則經水不通經為血血不利則為水名曰血分　[illegible]寸口脈沉而數數則為出沉則為入出則為陽實入則為陰結[illegible]趺陽脈微而弦[illegible]則無胃氣弦則不得息少陰脈沉而滑沉則為在裏滑則為實沉滑相搏血結胞門其瘕不瀉經絡不通名曰血分　問曰病有血分水分何也師曰經水前斷後病水名曰血分此病為難治先病水後經水斷名曰水分此病易治何以故去水其經自下　氣分謂氣不通利而脹血分謂血不通利而脹[illegible]之外又有氣分血分之病也蓋氣血不通利則水亦不通利而尿少尿少則腹中水漸積而為脹但氣分心下堅

大而病發於上血分血結胞門而病發於下氣分先病水脹後經斷血分先經斷後病水脹也

劉立之云氣分之證當以下氣消脹為先如枳殼散木香流氣飲三和散之類是也　金匱方氣分心下堅大如盤邊如旋杯水飲所作桂枝去芍加麻辛附子湯主之　良方加味枳朮湯治氣分脹滿　婦人血分如奪命丹黑神散皆治血分[illegible]　婦人小產後多有之唯產[illegible]脈[illegible]病所致當於血上治

【腸覃】者寒氣客於腸外與衛氣相搏氣不得榮因有所繫癖而內著惡氣乃起瘜肉乃生其始生也大如雞卵稍以益大至其成如懷子之狀久者離歲按之則堅推之則移月事以時下此其候也　夫腸者大腸也覃者延也大腸以傳導為事乃肺之府也肺主衛衛為氣得熱則泄得冷則凝今寒客於大腸故衛氣不榮有所繫止而結瘕在內貼著其延久不已是名腸覃也氣散則清氣聚則濁結為瘕聚所以惡氣發起

瘜肉乃生小漸益大至期而鼓其腹如懷子之狀也此氣病而血未病故月事不斷應時而下本非胎脹可以此為辨矣晞露丸木香通氣散主之　【石瘕】者生於胞中寒氣客於子門子門閉塞氣不得通惡血當瀉不瀉衃以留止日以益大狀如懷子月事不以時下皆生於女子可導而下　夫胞為血海為津液之府氣化則能出焉今寒客於子門則胞氣聚而不通血凝而不流衃以留止結硬如石是名石瘕也此病先氣病而後血病故月事不來則可宜導而下出之[illegible]經云任之為病[illegible]其內苦結男子生七疝女子為瘕聚此之謂也[illegible]非大辛之劑不能已也可服見晛丸和血通經湯

【脹】[illegible]大堅以濇[illegible]皆脹也[illegible]則內脹[illegible]治沉細[illegible]則為[illegible]脹　腹脹身熱脈大是逆也如是者不過十五日死矣[illegible]

大腹四末清脫形泄甚是逆也如是者不及一時死矣　腹脹便血其脈大時絕是逆也　嘔咳腹脹且飧泄其脈絕是逆也　少陰終者面[illegible]腹脹閉上下不通而終矣　太陰終者[illegible]則逆逆則面[illegible]不通則面[illegible]皮毛焦而終矣

積聚

內經論積　有寒氣客於小腸募原之間絡血之中血泣不得注於大經血氣稽留成積謂之瘕者　有小腸移熱於大腸爲伏瘕爲沉者　有脾傳腎[illegible]疝瘕者　有任脈爲病女子瘕聚者　有[illegible]四天瀆泄瘕水閉者　有二陽三陰脈並[illegible]爲血瘕　有腎脈小急亦爲瘕　有伏梁二其一謂少腹盛上下左右皆有根裹大膿血居腸胃之外其二謂氣溢於大腸而著於肓肓之原在臍下故環臍而痛　靈樞經言積皆生於風雨寒暑清濕喜怒喜怒不節則傷藏藏傷則病起於陰陰既虛矣則風雨襲陰之虛病起於上而生積清濕襲陰之虛病起於下而成積　虛邪中人始於皮膚皮膚緩則腠理開開則邪從毛髮入入則抵深深則毛髮立毛髮立則淅然故皮膚痛留而不去傳舍於絡脉則[illegible]之時息大經乃代傳舍於經[illegible]傳舍於輸則六經不通四肢則肢節痛腰脊乃強傳舍於伏衝之脉則體重身痛傳舍於腸胃則賁響腹脹多寒則腸鳴飧泄食不化多熱則溏出糜傳舍於腸胃之外募原之間[illegible]能傳矣下文是也[illegible]於脉稽留而不去息而成積不一其處　或著孫絡之脉者往來移行腸胃之間水湊滲注灌濯濯有音有寒則䐜滿雷引故時切痛　或著於陽明之經者則挾臍而居飽食則益大饑則益小　或著於緩筋者似陽明之積飽食則痛饑則安　或著於腸胃之募原者痛而外連於緩筋飽食則安饑則痛　或著於伏衝之脉者揣之應手而動發手則熱氣下於兩股如湯沃之狀　或著於膂筋在腸後者饑則積見飽則積不見按之不得　或著於輸之脉者閉塞不通津液不上孔竅乾壅此邪氣[illegible]

[illegible]成積也[illegible]氣生足悗[illegible]

氣上入於腸胃入於腸胃則䐜脹䐜脹則腸外之汁沫迫聚不得散日以成積卒然多食飲則腸滿起居不節用力過度則絡脉傷陽絡傷則血外溢血外溢則衄血陰絡傷則血內溢血內溢則後血腸胃之絡傷則血溢於腸外腸外有寒汁沫與血相搏則并合凝聚不得散而積成矣卒然外中於寒若內傷於憂怒則氣上逆氣上逆則六輸不通溫氣不行凝血蘊裹而不散津液濇滲著而不去而積皆成矣[illegible]

[illegible]內經言積始末明且盡矣　難經五[illegible]其中有五藏相傳分部位以立其名[illegible]而不移者爲藏病名曰積以[illegible]不定者爲府病名曰聚然而二者原其[illegible]不過就其肓膜結聚之處以經脉[illegible]爲藏者爲陰陰主靜靜則牢堅而不[illegible]爲腑陽則推蕩而不定以故名之耳[illegible]飲食之氣滲注停積之名也[illegible]外從其癥瘕之名謂由寒溫不調飲食不化與臟氣相搏結所生其有不動者癥也雖有癖而可推移者瘕也瘕者假也虛假可動也　張子和[illegible]積者因受勝己之邪而傳於己之所勝適當旺時拒而不受復還於勝己者[illegible]因留結爲積故肝之積得於季夏[illegible]鬱不伸而受其邪也[illegible]鬱成故五積六聚治同鬱斷[illegible]火鬱則發之是也[illegible]　食積酸心腹滿大黃牽牛之

類甚者[illegible]　酒積目黃口乾葛根麥蘖之類甚者[illegible]　氣積噫氣痞塞木香檳榔之類[illegible]　涎積咽如拽鋸硃砂膩粉之類[illegible]　痰積涕唾稠粘半[illegible]　癖積兩脇刺痛[illegible]　水積足脛脹[illegible]　血積打撲[illegible]之類甚者䗪蟲水蛭[illegible]刺出血甚者

硇砂阿魏　每見子和辯世俗之訛必引內經
爲証若此者論病是從難經五積之名論治立
丸積丸是從病源攻其所食之物內經之義則
未有發明　然則用內經之義而治當何如曰
內經分六淫六邪喜怒飲食起居房勞各有定
治之法今既論積聚由內外邪所傷豈不以諸
邪之治法盡當行於其間乎邪自外入者先治
其外邪自內生者先治其內然而天人之氣一
陰陽也是故人氣中外之邪亦同天地之邪也

從手經自上而下者同司天法平之從足經自
下而上者同在泉法治之從五藏氣之相移者
同五運鬱法治之從腸胃食物所留者則奪之
消之去宛陳莝也若氣血因之滯者則隨其所
在以疏通之因身形之虛而邪得以入客積留
者必先補其虛而後瀉其邪大抵治是病必分
初中末三法初治其邪入客後積塊之未堅者
當如前所云治其始感之邪與留結之客者除
之散之行之虛者補之約方適其主所爲治及
乎積塊已堅氣鬱已久變而爲熱熱則生濕濕
熱相生塊日益大便從中治當祛濕熱之邪其
塊之堅者削之鹹以耎之比時因邪久湊正氣
尤虛必以補瀉迭相爲用若塊消及半便從末
治即住攻擊之劑因補益其氣兼導達經脉使
榮衛流通則塊自消矣凡攻病之藥皆是傷氣
損血故經曰大毒治病十去其五小毒治病十
去其七不行減也　潔古云壯人無積虛人則
有之皆由脾胃怯弱氣血兩衰四時有感皆能

成積若遽以磨堅破結之藥治之疾似去而人
已衰矣乾漆硇砂三稜牽牛大黃之類得藥則
暫快藥過則依然氣愈消疾愈大竟何益哉故
善治者當先補虛使血氣壯積自消如滿座皆
君子縱有一小人自無容地也不問何臟先調其中
使能飲食是其本也　東垣云許學士云大抵
治積或以所惡者攻之所喜者誘之則易愈如
硇砂阿魏治肉積神麴麥蘗治酒積水蛭蝱蟲
治血積木香檳榔治氣積牽牛甘遂治水積雄

黃[illegible]粉治痰積[illegible]石巴[illegible]治食積各從其類也
若用群隊之[illegible]分其勢則難取効須要認得分
明是何積[illegible]兼見何證[illegible]後增加佐使之藥不
爾反有所損要在[illegible]也治積當察其所
痛以如其病有餘[illegible]可補可瀉無逆天時詳
藏府之高下如[illegible]熱之結者散之客者除之
留者行之堅者[illegible]強者奪之鹹以耎之苦以
瀉之全真氣[illegible]其所積而行之節飲食
慎起居和其中[illegible]可使[illegible]已不然遽以大[illegible]之

劑攻之[illegible]反傷正氣終難復也可不[illegible]
歟 肝之積名曰肥氣在左脇下如覆杯有頭
足久不愈令人[illegible]逆或兩脇痛牽引小腹足寒
積為久則如[illegible]大七氣湯[illegible]待冷[illegible]以鐵
[illegible]紅以[illegible]之乘熱[illegible]肥氣丸 肺
之積名曰息賁在右脇下大如覆杯氣逆背痛
或[illegible]皮中時痛如蝨緣鍼刺
久[illegible]大七氣湯加桑白皮半夏[illegible]各
[illegible] 心之積名曰伏梁[illegible]上
大如臂上至心下久不愈令人病煩[illegible]腹熱咽
乾甚則吐血宜大七氣湯加石菖蒲[illegible]半夏各半
錢兼吞伏梁丸 脾之積名曰痞氣在胃脘大
如覆杯[illegible]不通[illegible]痛心[illegible]饑減飽見腹滿吐
泄久則[illegible]發黃疸飲食不為肌膚足腫
肉消[illegible]湯下紅丸子兼吞痞氣丸 腎
之積名曰賁豚發於少腹上至心若豚狀或下
或上無時[illegible]小腹[illegible]腰痛口乾目昏骨
冷久[illegible]令人喘逆骨痿少氣宜大七氣湯倍

桂加茴香[illegible]練子肉各半錢兼吞奔豚丸 雜
積通治[illegible]丸局方溫白丸厚朴丸 熱
積[illegible]取之[illegible]石丸醋煮三稜丸神功助化
散[illegible]子 寒積熱取之雞爪三稜丸硇砂煎
丸[illegible]丸子 [illegible]少食勿與攻下二賢散常服
[illegible]自消 驚風成塊者妙應丸加穿山甲炒
[illegible]各[illegible]錢[illegible]各四錢每服五十丸
加[illegible]為度 腸痛有塊龍薈丸加
薑黃[illegible]各[illegible]丸 龍[illegible]丸加白[illegible]大

能消食積或入保和丸　肉積阿魏丸　有正當積聚處內熱如火漸漸循及四肢一日數發如此二三日又愈此不當攻其熱　又有元得熱病熱留結不散遂成瘕癖此卻當用去熱之劑　有病癥瘕[illegible]用三稜莪朮以酒煨服下一物如黑魚狀[illegible]愈或加入香附子用水煎多服取効　又有病此者用[illegible]蘇湯吞六味丸六味者乃小七香丸紅丸子小安腎丸連翹丸三稜煎[illegible]丸六件等也　有飲癖結成塊在脇腹之間病類積聚用破塊藥多不効此當行其飲宜[illegible]散湯五飲湯何以知為飲其人先曾病瘥口吐涎沫清水或素來多痰者是也　又多飲人結成酒癖肚腹積塊脹急疼痛或全身[illegible]黃少食宜十味大七氣湯用紅酒煎服

腹中似若瘕癖隨氣上下未有定處宜散聚湯[illegible]遠志心腹間攻刺上下隱若雷鳴[illegible]降氣散[illegible]

[illegible]積之藥必用補氣血藥相兼

服之積消及半即止若純用之致死乃醫殺之也　貼塊三聖膏　號珀膏　大黃朴硝各等分為末大蒜搗膏和勻貼　熨痞方吳茱萸碎之以酒和[illegible]熨上冷更炒更番用之

[illegible]遂[illegible]之[illegible]乃止

[illegible]加減[illegible]湯　當歸丸　牡丹散

[illegible]乃[illegible]下不在臟腑[illegible]間積久形成[illegible]不妨食[illegible]滿氣逆息[illegible]不已　化氣湯

[illegible]十斤[illegible]水[illegible]以布[illegible]入鍋中慢火熬至琥珀色則[illegible]人[illegible]不食曉飯[illegible]縮貯吐[illegible]日病者入室[illegible]鎖積數十鍾[illegible]月則[illegible]在上者欲其吐多[illegible]但有者[illegible]

俱多全在活法而為之緩急多寡也[illegible]
[illegible]視其所出之物必盡病根乃止吐
利後必渴不得與湯以所出之溺飲之名輪廻
酒非惟可以止渴抑且可以洗濯餘垢行後倦
睡覺饑先與稠米湯飲次與淡稀粥三日後方
與少菜羹[illegible]厚粥軟飯調養半月或一月覺
精神煥發形體輕健沉疴悉安矣其後忌牛肉
數五一作年夫牛坤土也黃土之色也以順為性
而效法乎乾以為功者牡之用也肉者胃之藥

也熟而為液無形之物也橫散入肉絡由腸胃
而滲透肌膚皮毛爪甲無不入也積聚久而形
質成依附腸胃回薄曲折處以為棲泊之窠臼
阻礙津液氣血熏蒸燔灼成病自非剖腸刮骨
之神妙可以銖兩丸散窺犯其藩牆戶牖乎肉
液之散溢腸胃受之其厚皆倍於前有似乎腫
其回薄曲折處[illegible]肉液充滿流行有如洪水泛漲
其浮槎陳朽皆推逐蕩漾順流而下不可停留表
者因吐而汗清道者自吐而湧濁道者自泄而

去凡屬滯礙一洗而空牛肉全重厚和順之性
盎然渙然潤澤枯槁補益虛損寧無精神煥發
之樂乎
[illegible] 即倒倉法有人指授韓懋天爵投煎
[illegible]黃牯牛一具選純黃肥
澤無病纔一二歲者右洗淨取四腿項脊去筋
膜將精肉切作塊子如栗大秤三十斤或四五
十斤於靜室以大側鍋或新鐵鍋加長流水煮
之不時撥動另以一新鍋煮沸湯旋加常使水

淹肉五六寸掠去浮沫直煮至肉爛如泥漉去
查却將肉汁以細布漉入小銅鍋用一色桑柴
文武火候不住手攪不加熟水只以汁漸如稀
餳照水不散色如琥珀其膏成矣[illegible]
[illegible]一斤可煉膏一斤磁器盛之
用[illegible]滯多滯熱自然溶化 用和丸
劑[illegible]分同煮為糊或同煉蜜
[illegible]徵用重湯煮過熱天冷水窨
[illegible]

【診】細而附骨爲積寸口見之積在胸中微出寸口積在喉中關上積在臍傍上關下積在心下微下關積在少腹尺中積在氣衝脉出在右積在右脉出在左積在左脉左右兩出積在中央　沉而有力爲積　脉浮而毛按之辟易脇下氣逆背相引痛爲肺積　沉而芤上下無常處胸滿悸腹中熱名心積　弦而細二脇下痛邪走心下足腫寒重名肝積　沉而急苦脊與腰相引痛饑見飽減名腎積　浮大而長饑減飽見腹滿泄瀉名脾積　寸口沉而横脇下及腹有横積痛右手脉横積在左左手脉横癥在右脉頭大者在上頭小者在下　脉弦腹中急痛爲瘕　脉細微者爲癥　脉沉重而中散者因寒食成癥脉左轉而沉重者氣癥在胃中右轉出不至寸口者内有肉癥也　脉細而沉時直者身有癰若腹中有伏梁　脉沉小而實者胃中有積聚不下食食即嘔吐　脉沉而緊者心下有寒時痛有積聚　關上脉大而尺

寸細者必心腹冷積　遲而滑中寒有癥結弦而伏者腹中有癥不可轉也必死不治　虚弱者死堅强急者生

痰飲

痰皆動於脾濕寒少而熱多　濕在肝經謂之風痰　濕在心經謂之熱痰　濕在脾經謂之濕痰　濕在肺經謂之氣痰　濕在腎經謂之寒痰　風痰脉弦面青四肢滿悶便溺秘澀心多躁怒水煮金花丸用芎防風丸　熱痰脉洪面赤煩熱心痛唇口乾燥多喜笑小黃丸小柴胡湯加半夏　濕痰脉緩面黃肢體沉重嗜卧不收腹脹而食不消白术丸局方防巳丸　氣

痰脉澀面白氣上喘促洒淅寒熱悲愁不樂玉粉丸局方桔梗湯　寒痰脉沉面色黧黑小便急痛足寒而逆心多恐怖姜桂丸局方胡椒理中丸金匱吳茱萸湯　心下痞悶加枳實五錢　身熱甚加黃連五錢　體重加茯苓白术各一兩　氣逆上加苦葶藶五錢　氣促加人參桔梗各五錢　浮肺加郁李仁杏仁各五錢　大便秘加大黃五錢[illegible]

痰分五色　色白肺之本色　色黃逆而之脾色紅甚而之丙金受火因為難治　青色受風之羈絆　黑如煙煤腎臟而之北方不治自愈

經曰飲入於胃游溢精氣上輸於脾脾氣散精上歸於肺通調水道下輸膀胱水精四布五經並行安有所謂痰者哉痰之生由於脾氣不足不能致精於肺而淤以成焉者也故治痰先補脾脾復健運之常而痰自化矣然停積既久如溝渠壅遏淹久則倒流逆上瘀濁臭穢無所不

有苟不疏決滌除而欲澄治已壅之水而使之清無是理也　金匱云其人素盛今瘦水走腸間轆轆有聲謂之痰飲當以溫藥和之又云心下有痰飲胸脇支滿目眩苓桂朮甘湯主之　飲後水流在脇下咳唾引痛謂之懸飲十棗湯主之[illegible]大[illegible]　飲水流行歸於四肢當汗出而不汗出身體疼重謂之溢飲當發其汗大青龍湯主之小青龍湯亦主之　咳逆倚息短氣不得臥其形如腫謂之支飲又云膈間支飲[illegible]

瀉心下有支飲故也小半夏湯主之又云心下
有支飲其人苦冒眩澤瀉湯主之　通用海藏
五飲湯茯方倍朮丸　丹溪曰痰之源不一有
因痰而生熱者有因熱而生痰者有因氣而生
者有因風而生者有因驚而生者有積飲而生
者有多食而成者有因暑而生者有傷冷物而
成者有脾虛而成者有嗜酒而成者其為病也
驚痰則成心包痛顛疾熱痰則成煩躁頭風爛
眼燥結怔忡懊憹驚眩風痰成癱瘓大風眩暈

暗風悶亂飲痰成腸痛四肢不舉每日嘔吐食
痰成癰瘍口出臭氣暑痰中暈眩冒黃疸頭疼
冷痰骨痺四肢不舉氣刺痛酒痰飲酒不消但
得酒次日又吐脾虛生痰食不美反胃嘔吐氣
痰攻注走刺不定婦人於驚痰最多蓋因產內
交接月事方行其驚因虛而入結成塊者為驚
痰必有一塊在腹發則如身孕轉動跳躍痛不
可忍按熱痰用[illegible]遠花[illegible]丸當下者用妙應丸
加益智等分每服　用丸亦可用滾痰丸驚痰

用妙應丸加朱砂二錢全蝎二[illegible]每用八九丸
常與之三五服去盡驚痰成塊妙應丸加穿山
甲炒鱉甲燒各二錢玄胡索蓬朮各四錢每服
五十丸加至七十丸[illegible]痰妙應丸加
[illegible]一二十丸風痰
暑[illegible]痰丸酒痰[illegible]丸加雄黃全蝎各二錢
每服十丸飲痰小胃丹食痰保和丸暑痰消暑
丹　羅安常有[illegible]人身無倒上之痰天下無逆
流之水故善治痰者不治痰而治氣氣順則一

身之津液亦隨氣而順矣並宜蘇子降氣湯導
痰湯[illegible]小半夏茯苓湯加枳實木
香各一[illegible]五苓丸或以五苓丸料依分兩作
[illegible]平居皆無他事只有痰數口
[illegible]湯小半夏茯苓湯痰多間進
[illegible]和來復丹名來復丸如和以入神
[illegible]特治痰飲尤其療喘
[illegible]入門服令人有背痠疼
[illegible]以為風[illegible]其治宜消痰湯加

木香 蒲黄各半錢

大凡病痰飲而變生諸證，不當爲諸證牽掣，妄言作名，且以治飲爲先，飲消則諸證自愈。故如頭風眉稜角疼，累以風藥不効，投以痰藥收功；如患眼赤羞明而痛，與之涼藥弗瘳，畀以痰劑獲愈。凡此之類，非一而足，散在各證門中，不復繁引。

有陰血不足，陰火上逆，肺受火侮，不得清肅下行，由是津液凝濁，生痰不生血者，此當以潤劑，如門冬、地黄、枸杞子之屬，滋其陰，使上逆之火得返其宅而息焉，而痰自清矣。投以二陳，立見其殆。

痰飲 [illegible]

腎虚不能納氣歸元，出而不納則積，積而不散則痰生焉，八味丸主之。

脉來細滑或緩，痰涎清薄，身體倦怠，手足痠軟，此脾虚挾濕，六君子湯或補中益氣加半夏茯苓。

脉來結澀，胸膈不利，或作[illegible]，宜七氣湯、越鞠丸。

有人坐處吐痰滿地，其痰不甚稠粘，只是沫多，此氣虚不能攝涎，不可用利藥，宜六君子湯[illegible]

有[illegible]不[illegible]少思利熱大[illegible]日[illegible]以[illegible]化痰[illegible]次[illegible]日[illegible]之遂不服[illegible]年餘[illegible]治則大肉已脫[illegible]見[illegible]有難色[illegible]分[illegible]可[illegible]大便[illegible]結不通[illegible]以[illegible]

咳嗽[附痰]　肺臟

咳謂無痰而有聲肺氣傷而不清也嗽謂無聲而有痰脾濕動而為痰也咳嗽是有痰而有聲蓋因傷於肺氣而欬動於脾濕因咳而為嗽也經言藏府皆有咳嗽咳嗽屬肺何為藏府皆有之蓋咳嗽為病有自外而入者有自內而發者風寒暑濕外也七情饑飽內也風寒暑濕先自皮毛而入皮毛者肺之合故雖外邪欲傳藏府亦必先從其合而為嗽此自外而入者也七情

饑飽內有所傷則邪氣上逆肺為氣出入之道故五藏之邪上蒸於肺而為嗽此自內而發者也然風寒暑濕有不為嗽者蓋所感者重徑傷藏府不留於皮毛七情亦有不為嗽者蓋病尚淺止在本藏未即上攻所以傷寒以有嗽為輕而七情饑飽之嗽久而後見治法當審脈證三因若外因邪氣止當發散又須原其虛實冷熱若內因七情只當隨其部經在與氣口脈相應當以順氣為先下痰次之有停飲而欬又須消化

之方不可用烏梅罌粟酸澀之藥[illegible]亦不可便用補藥尤忌憂思過度房勞傷逆成咳嗽宜[illegible]脾生肺也　仁齋直指[illegible]者[illegible]者復清快寒挾熱為焦煩受濕為[illegible]脇間停水則心下怔忪或實[illegible]實自唾之稀稠從可知也治嗽大法肺脈浮為風邪所客以發散取之肺脈實為氣壅內熱以清利行之脈濡散為肺虛以補肺安之其間久嗽之人曾經解利以致肺胃俱寒

飲食不進則用溫中助胃加和平治嗽之藥等若酒色過度虛勞少血津液內耗心火自炎遂使燥熱乘肺咯唾膿血上氣涎潮其嗽連續而不已由是肌肉不榮故邪在皮毛皆能入肺而自背得之尤速此則人參[illegible]不可無一種傳注病涉鬼邪[illegible]及異蟲之類[illegible]用驗者人[illegible]及用砂雄黃安息香蘇合香丸通[illegible]治於此可以關津索途[illegible]出氣也腎納氣也肺為氣

之主腎爲氣之本凡咳嗽暴重動引百骸自覺
氣從臍下逆奔而上者此腎虛不能收氣歸元
也當以破故紙安腎丸主之毋徒從事於寧肺
感風而嗽者惡風自汗或身體發熱或鼻流
清涕其脉浮宜桂枝湯加防風杏仁前胡細辛
感寒而嗽者惡寒發熱無汗鼻流清涕其脉
緊宜杏子湯去乾薑五味加紫蘇乾葛或二陳
加紫蘇葛根杏仁桔梗　若感風寒不惡寒發
熱止是咳嗽痰盛聲重者寧嗽化痰湯　薛新

咳嗽　附案續編　全生

甫云春月風寒所傷咳嗽聲重頭疼用金沸草
散咳嗽聲重身熱頭痛用局方消風散蓋肺主
皮毛肺氣虛則腠理不密風邪易入治法當解
表兼實肺氣肺有火則腠理不閉風邪外乘治
宜解表兼清肺火邪退即止若數行解散則重
亡津液邪蘊而爲肺疽肺痿矣故凡肺受邪不
能輸化而小便短少皮膚漸腫咳嗽日增者宜
用六君子湯以補脾肺六味丸以滋腎水　夏
月喘急而嗽面赤潮熱其脉洪大者黄連解毒

湯熱躁而咳梔子湯欬唾有血麥門冬湯俱加
六味丸壯水之主以制陽光而保肺金　秋月
咳而身熱自汗口乾便赤脉虛而洪者白虎湯
身熱而煩氣高而短心下痞滿四肢困倦精神
短少者香薷飲若[illegible]佐去宜用補中益氣湯
加乾山藥五味子以養元氣柴胡升麻各二分
以升生氣　冬月風寒外感形氣病氣俱實者
宜華蓋散加減麻黄湯所謂從表而入自表而
出若形氣病氣俱虛者宜補其元氣而佐以解

咳嗽　八　全八

表之藥若專於解表則肺氣益虛腠理益疎外
邪乘虛易入而其病愈難治矣　治法權變云
夏月嗽而發熱者謂之熱痰嗽小柴胡湯四兩
加石膏一兩知母半兩用之冬月嗽而發寒熱
謂之寒嗽小青龍湯加杏仁服之　感濕而嗽者
身體重痛或有汗或小便不利此多是熱入水
或[illegible]不解濕衣致有此患宜白术
酒[illegible]鼻出熱氣且其痰喉間難出
然[illegible]或[illegible]血腥臭或堅如爛肉

不若風寒之嗽痰清而白宜金沸草散去麻黃
半夏加薄荷枇杷葉五味杏仁桑根白皮貝母
茯苓桔梗入棗子一箇同煎仍以辰砂化痰丸
或導痰湯煎入風散各合化　有熱嗽諸藥不効竹
葉石膏湯去竹葉入粳米少加知母多服五味
杏仁枇杷葉此必審是伏熱在上焦心肺間可
用　冷熱嗽因增減衣裳寒熱俱感遇乍寒亦
嗽乍熱亦嗽飲熱亦嗽飲冷亦嗽宜金沸草散
消風散各一貼和煎或應夢人參散款冬花
咳嗽　[illegible]　今九
散以薄荷代麻黃或二母散仍以辰砂化痰丸
入風丹各化　七情饑飽嗽無非傷動臟府正
氣致邪上逆結成痰涎肺道不理宜順氣爲先
四七湯一貼加杏仁五味子桑白皮人參阿膠
麥門冬枇杷葉各一錢　有飲冷熱酒或飲冷
水傷肺致嗽俗謂之[illegible]宜紫菀飲　有嗽吐
痰與食俱出者此[illegible]飲食失節致肝氣不利而
[illegible]肺濁道清濁相干宜二陳
湯加木香杏仁細辛枳殼各半錢　[illegible]

發熱　[illegible]湯加瓜蔞貝母[illegible]
機要云痰而能食者大承氣湯下之痰而不能
食者厚朴湯主之　嗽而失聲潤肺散或清音
[illegible]有熱[illegible]多進冷劑而聲愈不
出者宜以生薑汁調消風散少少進之或只一
味薑汁亦得冷熱嗽後失聲者尤宜嗽而失聲
者非獨熱嗽有之[illegible]以橄欖丸
含化仍濃煎[illegible]　聲啞者寒
包其熱[illegible]半夏生薑[illegible]以散之亦有痰
咳嗽　[illegible]
熱[illegible]心清金[illegible]咽
[illegible]乃
[illegible]精
[illegible]與
[illegible]麥門冬
[illegible]花紫菀
[illegible]一錢
[illegible]乳粉亦宜[illegible]散或
[illegible]

凡久嗽不已服藥不瘥餘無他證却與勞嗽不同觀用三拗湯青金丸子謂其不妥獨宜保肺而已一味百部膏可也　衍義云有婦人患肺熱久嗽身如炙肌瘦將成肺勞以枇杷葉木通款冬花紫菀杏仁桑白皮各等分大黃減半各如常製治訖同爲末蜜丸如櫻桃大食後夜臥各含化一丸未終劑而愈　有風寒者可用熏法有熱者可用枳殼湯有實積者可用款氣丸利膈丸馬兜鈴丸脾胃如常飲食不妨者加味

人參清肺湯參粟湯　素問云咳嗽煩冤者是腎氣之逆也八味丸安腎丸主之　有暴嗽服諸藥不効或教之進生料鹿茸丸大菟絲子丸方愈有本有標却不可以其暴嗽而疑遽補之非所以易愈者亦覺之早故也　時行嗽發熱惡寒頭痛鼻塞氣急狀如傷冷熱連咳不已初得病即伏枕一兩日即輕俗呼爲蝦蟆瘟用參蘇飲加細辛半錢　潔古云咳而無痰者以辛甘潤其肺蜜煎生薑湯蜜煎橘皮湯燒生薑胡

桃皆治無痰而嗽者本草方補肺法生地黃二斤淨洗杏仁二兩生薑蜜各四兩搗如泥入瓷盆中置飯上蒸五七度每五更挑三匙嚥下　金匱方咳而上氣喉中水雞聲射干麻黃湯主之　咳嗽喉中作聲一味白前妙　千金有白前湯　一婦人五十餘歲病傷寒咳嗽喉中聲如鼾與獨參湯一服而鼾聲除至二三貼咳嗽亦漸退服二三斤病始全愈　丹溪云上半日嗽多者胃中有火午後嗽多屬陰虛黃昏嗽

多此火氣浮於肺不宜用涼藥宜斂而降之　有一咳即出痰者脾濕勝而痰滑也有連咳十數不能出痰者肺燥勝痰濕也滑者宜南星半夏皂角灰之屬燥其脾若利氣之劑所當忌也澀者宜枳殼紫蘇杏仁之屬利其肺若燥肺之劑所當忌也　形寒或有汗或脉緩體重嗜臥之人咳者脾濕勝宜白朮蒼朮茯苓之屬燥之脉或身有熱或脉澀之人咳者肺燥勝宜[illegible]潤之　凡咳嗽面赤胸腹

膈常熱唯於足乍有涼時其脉洪者熱痰在胸膈也宜小陷胸湯礞石丸之類清膈降痰甚而不已者宜吐下其痰熱迭面白悲嘘或脇急脹痛或脉沉弦細遲而欬者寒飲在胸腹也宜辛甘熱去之半夏溫肺湯　丹溪治飲酒傷肺痰嗽以竹瀝煎入韭汁就吞瓜蔞杏仁黃連丸按此恐太寒閉遏熱氣不得發舒不若先以辛散之而後以酸收之甚者吐之後與五苓甘露勝濕去痰之劑　吃醋搶喉咳嗽不止用甘

草二兩去赤皮作二寸段中半劈開用豬膽汁五枚浸三日取出火上炙乾為細末煉蜜丸每服四十丸茶清吞下臨臥服　鹹物所傷哮嗽不止用白麪二錢砂糖二錢通搜和用糖餅灰汁捻作餅子放在爐內煤熟劃出加輕粉四錢另炒罌粟將餅切作四亞摻輕粉在內令患人吃盡吐出病根即愈

肺欬之狀欬而喘息有音甚則唾血麻黃湯

心欬之狀欬則心痛喉中介介如梗狀甚則咽腫喉痺桔梗湯　肝欬之狀欬而兩脇下痛甚則不可以轉轉則兩胠下滿小柴胡湯　仲景云咳引脇痛為懸飲宜十棗湯丹溪云咳引脇痛宜疏肝氣用青皮枳殼香附子等實者白芥子之類　脾欬之狀欬則右脇下痛陰陰引肩背甚則不可以動動則欬劇升麻湯　腎欬之狀欬則腰背相引而痛甚則欬涎麻黃附子細辛湯　五臟之久欬乃移於六府脾欬不已則胃受之胃欬之狀欬而嘔嘔甚則長蟲出烏梅丸　肝欬不已則膽受之膽欬之狀欬嘔膽汁黃芩加半

夏生薑湯　肺欬不已則大腸受之大腸欬狀欬而遺矢赤石脂禹餘糧湯桃花湯不止用豬苓湯分水　心欬不已則小腸受之小腸欬狀欬而失氣氣與欬俱失芍藥甘草湯　腎欬不已則膀胱受之膀胱欬狀欬而遺溺茯苓甘草湯　久欬不已則三焦受之三焦欬狀欬而腹滿不欲食飲此皆聚於胃關於肺使人多涕唾而面浮腫氣逆[illegible]異功散

仲景云熱在上焦者因咳為肺痿肺痿

之府從何得之師曰或從汗出或從嘔吐或從消渴小便利數或從便難又被快藥下利重亡津液故得之　肺痿咳吐涎沫不止咽燥而渴生薑甘草湯主之生薑五兩人參三兩甘草四兩大棗十五枚水七升煮取三升分溫三服　炙甘草湯治肺痿涎唾多心中溫溫液液者用甘草一味水三升煮半升分溫三服　桂枝去芍藥加皂莢湯治肺痿吐涎沫桂枝生薑各三兩甘草二兩大棗十枚皂莢一枚去皮子炙焦

水七升微火煮取三升分三溫服　肺痿吐涎沫而不咳者其人不渴必遺尿小便數所以然者以上虛不能制下故也此爲肺中冷必眩多涎唾甘草乾薑湯以溫之甘草炙四兩乾薑炮二兩水三升煮取一升五合分溫再服若服湯已渴者屬消渴　肺痿欲咳咽燥欲飲水者自愈自張口者短氣也　欬而口中自有津液舌上胎滑此爲浮寒非肺痿也　肺痿或欬沫或欬血細數欬沫者死此欲欬血者入血證門

脈法　仲景云欬而上氣此爲肺脹脈浮大者越婢加半夏湯主之　又云肺脹欬而上氣煩躁而喘脈浮者心下有水小青龍湯加石膏主之　丹溪治七收欽用訶子爲主佐以海石香附瓜蔞仁青黛半夏麴杏仁薑汁蜜調噙之　肺脹而嗽或左或右不得眠此痰夾瘀血礙氣而病宜養血以流動乎氣降火疏肝以清痰四物湯加桃仁訶子青皮竹瀝薑汁之屬壅遏不得眠者難治

診　浮爲風　緊爲寒　數爲熱　細爲濕　浮緊則虛寒　沉數則實熱　弦澀則少血　洪滑則多痰　濇爲房勞　右關濡傷脾　左關弦短傷肝　浮短傷肺　脈出魚際爲逆氣喘息　弦爲飲欬有浮因十日已　咳而脈實者生沉者死　欬而脈虛必苦冒　脈沉不可發汗　肺脈搏堅爲欬　肺脈微急爲欬唾血　浮直者生　欬而上氣脈數有熱不得臥者死　上氣面浮腫肩息脈浮大者死

久嗽脉弱者可治實大數者死　上氣喘息低昂脉滑手足溫者生脉濇四肢寒者死　欬而脫形身熱脉小堅急以疾是逆也不過十五日死　咳嗽羸瘦脉形堅大者死　咳嗽脉沉緊者死浮直者生浮軟者生小沉伏匿者死　欬而嘔腹滿泄瀉脉弦急欲絶者死

喘

喘者促促氣急喝喝息數張口擡肩搖身擷肚短氣者呼吸雖數而不能接續似喘而不搖肩似呻吟而無痛呼吸雖急而無痰聲逆氣者但氣上而奔急肺壅而不下宜詳辨之　或問喘病之源何如曰嘗考古今方論自巢氏病源稱為肺主氣為陽氣之所行通榮藏府故氣有餘俱入於肺或為喘息上氣或為咳嗽因此至嚴氏謂人之五藏皆有上氣而肺為之總由其居於五藏之上而為華蓋喜清虛而不欲窒礙調攝失宜或為風寒暑濕邪氣所侵則肺氣脹滿發而為喘呼吸促迫坐臥不安或七情內傷鬱而生痰脾胃俱虛不能攝養一身之痰皆能令人發喘治之之法當究其源如感外邪則袪散之氣鬱則調順之脾胃虛者溫理之聖濟方又云呼隨陽出氣於是升吸隨陰入氣於是降一升一降陰陽和所謂上氣者蓋氣上而不下升而不降痞滿膈中氣道奔迫喘息有音者是

也本於脾濕之虛復感風邪肺葉脹舉痰涎壅盛又
上衝而氣道此所以有上氣之候也歷代醫者
用此調氣之說以為至當無復他論及觀劉河
間原病式則以喘病敘於熱淫條下謂火熱為
陽主乎急數故熱則息數氣麄而為喘也與巢
氏所云氣為陽有餘則喘較之則劉氏之言為
勝何則陰陽各因其對待而指之形與氣對則
以形為陰氣為陽寒與熱對則以寒為陰熱為
陽升與降對則以降為陰升為陽動與靜對則

以靜為陰動為陽巢氏不分一氣中而有陰陽
寒熱升降動靜備於其間一皆以陽為說[illegible]
人[illegible]以為氣者調其陽而已今劉氏五運所主
之[illegible]病是一氣變動而分者也其病機如何
曰[illegible]病之有機於化生者亦有之知生化之
機則可以知為病之機也蓋一氣運行升降浮
沈者由生氣根於身中而神居之中陰陽動靜
之機由其機動有消[illegible]者則生化治[illegible]而[illegible]
[illegible]

頁之變作故內經至真大要為立病機一十九
條而統領五運六氣之大綱如喘者謂諸喘皆
屬于上[illegible]以上乃上焦氣也炎熱薄爍心之
氣也承熱分化肺之氣也又謂諸逆衝上皆屬
于火是故河間以喘病在熱淫條下誠得其旨
矣[illegible]喘[illegible]火則聞命矣亦有節目
之可[illegible]嘗考之內經靈樞諸篇有言
喘[illegible]喘逆有[illegible]喘欬有言喘喝
有言[illegible]喘之形狀或因熱之微甚或

形之所自致其所以喘者內經逆調篇謂臥則
喘[illegible]脈篇謂夜行喘出于腎淫
氣[illegible]恐喘出于肝淫氣害脾有所驚
恐喘出于肺淫氣傷心渡水跌仆喘出于腎與
骨[illegible]者中氣喘爭
大[illegible]論[illegible]者[illegible]肢滿至真大要論
[illegible]則[illegible]呼吸氣喘太陰陽
明[illegible]喘呼不得臥脈解篇謂
[illegible]則惡人連臧則死連經

則生其言喘喝者喝謂大呵出聲生氣通天篇謂陽氣者因于暑煩則喘喝五常政篇堅成之紀喘喝胸滿仰息靈樞本神篇肺實者喘喝胸滿仰息經脉篇謂肺所生病則上氣喘喝煩心胸滿腎是動病者喝喝而喘坐而欲起其言喘息者玉機真藏篇謂大骨枯槁大肉陷下胸中氣滿喘息不便內痛引肩項身熱脫肉破䐃真藏見十月死註云是脾藏也皆以至其月真藏脉見乃予之期日又謂秋脉不及其氣來毛而

喘

微其病在中令人喘呼吸少氣而咳上氣見血下聞病音註云音是肺中喘息之聲也舉痛篇謂勞則喘息汗出內外皆越故氣耗矣逆調篇起居如故而息有音息而惡風口乾善渴不能勞事奇病篇謂有病癃一日數十溲身熱如炭頸膺如格人迎躁盛喘息氣逆此有餘也太陰脉微細如髮此不足也病在太陰其盛在胃頗在肺病名厥死不治繆刺篇謂邪客手陽明之絡令人氣滿胸中喘息而支胠胸中熱刺其井

痿論篇謂肺者藏之長為心之蓋也有所失亡所求不得則發肺鳴鳴則肺熱葉焦發為痿躄註云鳴者喘息之聲也陰陽別論篇謂陰爭于內陽擾于外魄汗未藏四逆而起起則熏肺使人喘鳴又二陽之病發心脾傳為息賁死不治註云息奔者喘息而上奔脾胃腸肺及心互相傳尅故死靈樞五邪篇謂邪在肺上氣喘汗出本藏篇謂肺高則上氣肩息肝高則上支賁切脇悗為息賁經筋篇謂太陰筋病甚成息賁脇

喘

急其言上氣而喘逆者經脉篇謂太陽獨至厥喘虛氣逆是陰不足陽有餘至真大要論謂陽明在泉主勝則腰重腹痛少腹生寒寒厥上衝胸中甚則喘不能久立痺論篇謂心痺者煩則心下鼓暴上氣而喘脉解篇謂所謂嘔欬上氣而喘者陰氣在下陽氣在上諸陽氣浮無所依從故也東垣解以此論秋冬之陰陽也經氣之燥寒在上遂也撥氣之寒水在下陰也所謂上喘而為水者陰氣下而復上上邪客藏府間故為水也

脉要精微篇謂肝脉搏堅而長當病墜若搏因血在脇下令人喘逆其言喘咳者藏氣法時論謂肺病者喘咳逆氣肩背痛又腎病者腹大脛腫喘咳身重寢汗憎風刺熱篇謂肺熱病者惡風寒舌上黄身熱熱爭則喘咳痛走胸膺背頭痛汗出而寒五常政大論謂從革之紀發喘咳氣交變大論謂歲火太過肺金受邪少氣喘咳血溢血泄嗌燥中熱又曰歲金太過甚則火氣復之喘咳逆氣肩背痛又曰咳逆甚而血溢歲水太過害在心火病在中上下寒甚則腹大脛腫喘咳寢汗出憎風六元正紀篇謂少陰司天三之氣大火行病氣厥心痛寒熱更作咳喘終之氣燥令行餘火內格腫於上咳喘甚則血溢內作寒中至眞大要論篇謂少陰司天胸中熱脹滿寒熱喘咳唾血少陰司天客勝少氣發熱甚則胕腫血溢咳喘靈樞經脉篇謂肺是動病肺脹滿膨膨而喘咳缺盆中痛又曰喘喝者痺論篇謂肺痺者煩滿喘而嘔下至眞大要篇謂少陰司天喘喝

寒熱其言喘咳上氣者調經篇謂氣有餘喘咳上氣玉機篇謂肺脉不及喘少氣而咳上氣見血下聞病音夫諸篇所言之多如此然猶是設爲凡例者耳何則舍其人之言舉一邪而諸邪具舉一臟而五臟具因是推之其陰陽之變百病之生各有所當其理之極致昭張仲景列其方治名其證而於喘症者皆因其邪動之機以致肺經之不失其氣宜若夫從後代集證類方諸書不過從巢氏嚴氏之說而已獨王海藏

辯華佗云肺氣盛爲喘活人云氣有餘則喘氣盛當認作衰有餘當認作不足肺氣果盛與有餘則清肅下行當復爲喘以其火入于肺炎燥與熱合與不足而爲喘焉所謂盛與有餘者非肺氣也肺中之火也此語高出前輩千古所以發明乎但患其喘未盡乎火所兼行之氣何則內外或六淫變而成火者則必與六淫相合而為之所在臟者亦必與邪相併遂有風[illegible]分諸逆衝上之火亦

然而有所從之氣在焉蓋相火出于肝腎厥陽之火氣起于五藏夫火生于動五藏主藏精宅神乃火也至若陰精先有所傷而虛不能閉藏其氣過有妄動其神至則火隨發而炎起起于腎者本藏寒水之氣從之起于肝者本藏風木之氣從之起于脾者濕氣從之起于心者熱氣從之起于肺者燥氣從之所從者得以附火之炎而遂迸諸逆之氣盛先入于所勝之藏甚而至于上焦或因火而徑衝于肺此亦火之合併

藏氣五邪者也此外復有心火因逆氣不得下降奔迫于上者有藏氣之俱不足其火浮溺于上有壯者有縱其當宜而務于取勝反自虛者更有人之稟素弱者有常貴後賤之脫營常富後貧之氣離守者夫如是之病雖有當攻之實亦不重瀉大抵必從病機大要治法曰謹守病機各司其屬有者求之無者求之盛者責之虛者責之必先五勝疏其血氣令其調達而致和平[illegible]之[illegible]有此數語矣于今得引

內經氣機諸篇綱目之詳如此條者蓋欲令人知是集之旨病盡有綱目之當察因書以為例

丹溪云喘因氣虛火入于肺有痰者有火炎者有陰虛自小腹下起而上逆者有氣虛而致氣短者有水氣乘肺者戴復菴云痰者凡喘便有痰聲火炎者乍進乍退得食則減食已則喘大概胃中有實火膈上有稠痰得食墜下稠痰喘即止稍久食已入胃反助其火痰再升上喘反大作俗不知此作胃虛治以燥熱之藥以火

濟火也一人患此諸醫作胃虛治之不愈後以導水丸利五六次而愈此水氣乘肺也若氣短喘急者呼吸急促而無痰聲有胃虛喘者抬肩擷肚喘而不休是也蓋肺主清陽上升之氣居五藏之上通榮衛合陰陽升降往來無過不及何病之有若內傷于七情外感于六氣則肺氣不清而喘作矣　外感風寒暑濕脈人迎大于氣口[illegible]氣急不得臥喉中有痰或聲不出審是風寒[illegible]三拗湯華蓋散[illegible]神秘湯審

是濕者滲濕湯審是暑者白虎湯通用秘傳麻
黃湯加減麻黃有汗不去節無汗去根節川升
麻北細辛桑白皮桔梗生甘草各等分熱加瓜
蔞根濕加蒼朮[illegible]服或加川芎乾葛
則斟酌矣若喘勿用　仲景云上氣喘而躁者
屬肺脹欲作風水發汗則愈又云咳而上氣此
為肺脹其人喘目如脫狀脈浮大者越婢加半
夏湯主之又云肺脹咳而上氣煩躁而喘脈浮
者心下有水小青龍加石膏主之　東垣麻黃
喘
定喘湯　麻黃蒼朮湯　[illegible]　七情鬱結上
氣喘急宜四磨湯四七湯　羅謙甫治石倅
吉夕元帥夫人年逾五十身體肥盛時寒雨不
止又飲酒及潼乳過度脹喘滿聲聞舍外不得
安卧大小便澀滯氣口脈大兩倍于人迎關脈
沉緩而有力此霖雨之濕飲食之熱濕熱大盛
上攻于肺神氣躁亂為喘滿邪氣盛則實實
者宜下之故制平氣散以下之一服減半再服
喘[illegible]乾[illegible]

加減瀉白散令愈[illegible]　仲景云膈間支飲其
人喘滿心下痞堅面色黧黑其脈沉緊得之數
十日醫吐下之不愈木防己湯主之虛者即愈實
者三日復發復與不愈者宜木防己湯去石膏加
茯苓芒硝湯主之　又[illegible]不得息葶藶大棗瀉
肺湯主之　[illegible]四七湯治痰涎咽喉中上
氣喘[illegible]　風痰作喘千緡湯半夏丸　經
驗方定喘化痰猪蹄甲四十九個淨洗控乾每
個指甲內入半夏白礬各一字裝罐子內封閉
勿令煙出火煅通赤去火毒細研入麝香一錢
[illegible]人[illegible]半夏丸化痰丸喘嗽[illegible]
云[illegible]用此方治久喘未發時服此丸已發
[illegible]丸微下累效　[illegible]利膈丸亦
[illegible]云凡下痰定喘諸方施之形
[illegible]脈浮大按之澀者不
[illegible]　初虞世云火
[illegible]神効　雙玉
[illegible]各等分

爲細末人參湯下三錢食後服[illegible]　經云
壯火太過炎暑流行肺金受邪民病少氣咳喘
又熱淫所勝病寒熱喘咳宜以人參麥門冬五
味子救肺童便炒黃蘗知母降火　平居則氣
平和行動則氣促而喘者此衝脈之火用滋腎
丸　仲景云火逆上氣咽喉不利止逆下氣麥
門冬湯主之　保命天門冬丸[illegible]　丹溪
云喘須分虛實久病是氣虛用阿膠人參五味
補之新病是氣實用桑白皮葶藶瀉之　金匱

云無寒熱短氣不足以息者實也或又曰實喘
者氣實肺盛呼吸不利肺竅壅滯右寸沉實宜
瀉肺虛喘者腎虛先覺呼吸氣短兩脇脹滿左
尺大而虛宜補腎邪喘者由肺受寒邪伏于肺
中關竅不通呼吸不利右寸沉而緊亦有六部
俱伏者宜發散則身熱退而喘定三因又云肺
實者肺必脹上氣喘逆咽中逆如欲嘔狀自汗
虛者必咽乾無津少氣不足以息也本類鈴
方云右寸口氣口以前陰脉應手有力而實

也必上氣喘逆咽塞欲嘔自汗皆肺實證若氣
口以前陰脉應手無力必咽乾無津少氣此肺
虛證[illegible]　東垣云肺脹
膨膨而喘咳[illegible]滿壅盛而上奔者於隨證用
藥方中[illegible]人參次之麥門冬又次之
黃連[illegible]　[illegible]則交兩手而瞀是真氣大虛
也若氣短加黃芪五味子人參氣盛去五味子
人參加黃芩荊芥穗冬月去荊芥穗加草荳蔻
仁　丹溪云氣虛者用人參蜜炙黃蘗麥冬地

骨皮之類　本草治咳嗽上氣喘急以人參一
味爲末雞子清投新水調下一錢昔有二人同
走一含人參一不含俱走三五里許其不含者
大喘含者氣息自如此乃人參之力也　夷堅
志[illegible]人[illegible]除[illegible]有痰嗽忽一日大喘
[illegible]如[illegible]汗如油[illegible]而[illegible]似命絕之狀速
[illegible]一錢人[illegible]　[illegible]錢[illegible]一錢[illegible]分煎
[illegible]後痰亦漸少再與前方
[illegible]　[illegible]五分白术[illegible]黃芩各

一錢服二十餘貼而安此實麥門冬五味子人參之功也如自汗兼腹滿脈沉實[illegible]喘者裏實也宜下之[illegible] 丹溪云喘有陰虛自小腹下火起而上者[illegible]四物湯加青黛竹瀝陳皮入童便煎服 [illegible]痰喘者四物湯加枳殼[illegible]降火[illegible]歸地泥膈生痰枳半燥泄傷於天[illegible]如用天門冬桑皮貝母馬兜鈴地骨皮麥門冬枳[illegible]之屬[illegible] 東垣曰病機云諸痿喘嘔皆屬於上辯云傷寒家論喘嘔以為

火熱者是門有餘之邪中於外寒變而為熱心火太[illegible]故為於上又云病潔之人本[illegible]太[illegible]小兒亦能積熱于上而為喘咳宜以[illegible]治之脈經又云肺盛有餘則咳嗽上[illegible]心[illegible]滿短氣皆衝脈[illegible]火行于胸中[illegible]下焦非爲[illegible]故[illegible]不足之邪[illegible]機[illegible]標本[illegible]傳多說飲食[illegible]寒熱感[illegible]人六府皆[illegible]食不下皆以

大甘辛熱之劑治之則立已今立熱喘寒喘二方于後 人參平肺散治心火刑肺傳為肺痿咳嗽喘[illegible]胸膈[illegible]咽嗌不利 參[illegible]則傷肺喘煩心胸滿短氣不[illegible] [illegible]湯加減法如秋冬月[illegible]脈[illegible]逆并脇下少陽脈二道而反上行[illegible]逆其氣上衝咽不得息而喘息有音[illegible]加萊菔子五分或一錢湯洗去苦[illegible]而用之如夏月有此證為大熱

也[illegible]四時為寒熱溫涼宜以酒黃連酒黃芩酒知母各等分為細末熟湯丸如桐子大每服[illegible]丸白湯送下空心服仍多飲熱湯服畢少時使以美膳壓之使不得胃中停留直至下元以瀉衝脈之邪也大抵治飲食勞倦所得之病乃虛[illegible]損病也當用溫平甘多辛少之藥治之[illegible]如時[illegible]寒熱病四時症[illegible]食過多或辛熱之食[illegible]大熱之處益

其病當臥臥則宜當用大寒大熱治法而取効
此從權也不可以得効之後而久用之必致夭
橫矣[illegible]針經曰從下上者引而去之上氣不
足者推而揚之益上氣者心肺上焦之氣陽病在
[illegible]宜以入[illegible]下焦之藥引甘多辛
少之藥使升發脾胃之氣又從而去邪氣於腠
理皮毛也又曰從[illegible]者當先取之是先以繆
刺瀉其經絡[illegible]為血凝而不流故先取
之而後治他病[illegible]以上分　胃絡不和喘出於陽
喘　[illegible]　一百三
明之氣逆[illegible]　眞元耗損喘生於腎氣之
上奔[illegible]　肺虛則少氣而喘
經云秋脈者肺也秋脈不及則喘呼吸少氣而
咳上氣見血下聞病音其治法則門冬五味人
參之屬是也　肺痺肺積則久喘而不已經云
淫氣喘息痺聚在肺又云肺痺者煩滿喘而嘔
[illegible]治法或表之或吐之使氣宜通而

愈也　難經又云肺之積名息賁在右脇下如
杯久不已令人喘咳發肺癰治法則息賁丸以
磨其積是也[illegible]　胃喘則身熱而煩經云
胃為氣逆又云犯賊風虛邪者陽受之陽受之
則入六府入六府則身熱不時臥上為喘呼又
云陽明厥則喘而惋惋則惡人或喘而死者或
喘而生者何也厥逆連藏則死連經則生是也
惋[illegible]熱內鬱而煩凡此胃喘治法宜加減
白虎湯之類是也右治胃喘例　腎喘則嘔咳經云
喘　[illegible]　一百四
少陰所謂嘔咳上氣喘者陰氣在下陽氣在上
諸陽氣浮無所依從故嘔咳上氣喘也東垣治
以瀉白散是也右治腎喘例　凡喘而不得臥其脈浮按之虛而
[illegible]虛大死不遠慎勿下之下之必死宜
[illegible]使竹瀝[illegible]門冬五味枳殼蘇葉服
之　[illegible]不得臥臥則喘者是水氣
之客也夫水者循津液而流也腎者水藏主津
液主臥與喘也[illegible]入不得眠眠則喘者

水氣逆行上乘於肺肺得水而浮使氣不流通其脉沉大宜神秘湯主之　仲景云咳逆倚息不得臥小青龍湯主之（支飲亦喘不得臥加短氣其脉平也）青龍湯下已多唾口燥寸脉沉尺脉微手足厥逆氣從小腹上衝胸咽手足痹其面翕然如醉狀因復下流陰股小便難時復冒者與茯苓桂枝五味子甘草湯治其氣衝　衝氣即低而反更咳胸滿者用桂枝茯苓五味甘草湯去桂加乾薑細辛各三兩以治其咳滿　咳滿即止而更復

渴衝氣復發者以細辛乾薑為熱藥也服之當遂渴而渴反止者為支飲也支飲者法當冒冒者必嘔嘔者復納半夏以去其水（於桂苓五味甘草湯中去桂加乾薑細辛半夏）　水去嘔止其人形腫者加杏仁半升主之其證應納麻黃以其人遂痹故不納之若逆而納之必厥所以然者以其人血虛麻黃發其陽故也用茯苓四兩甘草乾薑細辛各三兩五味子半夏杏仁去皮尖各半升右㕮去[illegible]服　若面熱如醉此胃為熱所衝[illegible]

其面加大黃三兩以利之　素問逆調論不得臥而息有音是陽道之逆也足三陽者下行今逆而上行故息有音也陽明者胃脉也胃者六府之海其氣亦下行陽明逆不得從其道故不得臥也下經曰胃不和則臥不安此之謂也治法已見前

哮　與喘相類但不似喘開口出氣之多如聖濟總錄名為呷嗽者是也以胸中多痰結於喉間與氣相系隨其呼吸呀呷於喉中作聲呷者

口開呼者口閉乃開口閉口盡有其聲蓋喉嚨者呼吸之氣出入之門也會厭者聲音之戶也懸雍者聲之一關也呼吸本無聲胸中之痰隨氣上升沾結於喉嚨及於會厭懸雍故氣出入不得快利與痰引逆相擊而作聲也是痰得之食味鹹酸太過因積成熱由來遠矣故膠如漆粘[illegible]出喉開之痰去則聲稍息若味不節[illegible]復與新味相結哮必更作[illegible]於痰宜吐法治哮必

用薄荷葉不可純作涼藥必帶表散　治哮方
用雞子略敲破殼不可損膜浸尿缸內三四日
夜煮吃効蓋雞子能去風痰　又方用貓屎燒
灰沙糖湯調下立効　哮喘遇冷則發者有二
證　其一屬中外皆寒治法乃東垣參蘇溫肺
湯調中益氣加茱萸湯及紫金丹劫寒痰者是
也　其二屬寒包熱治法乃仲景丹溪用越婢
加半夏湯等發表諸劑及預於八九月未寒之
時先用大承氣湯下其熱至冬寒時無熱可包

自天發者是也　遇厚味即發者清金丹主之
【產後喘】產後喉中氣急喘促者因所下過多
榮血暴竭衛氣無主獨聚肺中故令喘也此名
孤陽絕陰為難治陳無擇云宜大料芎歸湯或
用參蘇湯尤妙　若惡露不快敗血停凝上熏
於肺亦令喘急宜奪命丹參蘇飲血竭散　若
因風寒所傷宜旋覆花湯　若因憂怒鬱結用
小調經散以桑白皮杏仁煎湯調服　婁全善
治一婦人[illegible]孕時足腫七月初旬產後二日

洗浴即氣喘但坐不得臥者五個月惡風得暖
稍寬兩關脈動尺寸皆虛百藥不效用牡丹皮
桃仁桂枝茯苓乾薑枳實厚朴桑白皮紫蘇五
味子[illegible]服之即寬二三服得臥其痰
如[illegible]減寒治之也　若傷冷飲食
而喘者[illegible]丸
【肺】[illegible]主氣形寒飲冷則傷肺故其氣逆
而上行[illegible]喝喝而息數張口擡肩搖身滚肚
是為[illegible]　喘逆上氣脈數有熱不得臥者難

治　上氣面浮腫肩息脈浮大者危　上氣喘
息[illegible]脈滑手足溫者生脈澀四肢寒者死
右手[illegible]沉實而緊為肺感寒邪亦有六部俱伏者
宜發散則熱退而喘定　右寸沉實為肺實左
尺大為腎虛

短氣

短氣者氣短而不能相續似喘而非喘若有氣上衝而實非氣上衝也似喘而不搖肩似呻吟而無痛　金匱云平人無寒熱短氣不足以息者實也 [illegible]用[illegible]大 仲景論短氣皆屬飲金匱云夫短氣有微飲當從小便去之苓桂术甘湯主之腎氣丸亦主之又云咳逆倚息短氣不得臥其形如腫謂之支飲又云支飲亦喘而不得臥加短氣其脉平也又云膈上有留飲其人氣短而渴四肢歷節痛脉沉者有留飲又云肺飲不弦但苦喘短氣其治法危急者小青龍湯脹滿者厚朴大黄湯背脹者苓桂术甘湯及澤[illegible]大棗湯吐下不食者木防已[illegible]茯苓杏仁[illegible]枳實薤白桂枝湯亦主之　胸痺喘息咳唾[illegible]瓜蔞薤白半夏湯主之　[illegible]痰[illegible]氣短[illegible]又

數䨇搗末一兩金鈴子去核二錢半爲末入硼砂一錢揀過研細和勻每服二錢鹽湯或溫酒調下空心服　[illegible]東垣云胸滿少氣短氣者肺主諸氣五臟之氣皆不足而陽道不行也　氣短小便利者四君子湯去茯苓加黄芪以補之如腹中氣不轉者更加甘草一半　肺氣短促或不足者加人參白芍藥中焦用白芍藥則脾中陽升使肝膽之邪不敢犯之　如衣薄而短氣則添衣於無風處居止氣尚短則以沸湯一椀薰其口鼻即不短也　如厚衣於不通風處居止而氣短則宜減衣摩汗孔令合於漫風處居止　如久居高屋或天寒陰濕所遏令氣短者亦如前法薰之　如居周密小室或大熱處而[illegible]短則就風日　凡短氣皆宜食滋味湯飲令胃氣調和　戴復庵云短乏者下氣不接上呼吸不來語言無力宜補虛四柱飲木香減半加黄芪山藥各一錢若不勝熱藥及痰[illegible]人參[illegible]子作生脉在人活法餘皆倣

此藥雖病重可壯飲不足取效宜於本方[illegible]
香加炒川椒十五粒更不效則用椒附湯上焦
乾燥不勝熱藥者宜於椒附湯中加人參一錢
尋常病當用薑附而或上焦燥熱不可服者唯
此最良　氣短乏力之人於進藥之外選一盛
壯男子吸自己之氣噓入病人口中如此數次
亦可爲藥力一助此法不特可治虛乏尋常氣
逆致呃者用之良驗　[illegible]靈樞云短氣息
短不屬動作氣索補足少陰去血絡

一寸口脈沉胸中短氣　陽脈微而陰脈弦則
寒微則爲虛微緊相搏則爲短氣

少氣

少氣者氣少不足以言也　素問云三陽絕三
陰微是爲少氣又云怯然少氣者是水道不行
形氣消索也又云言而微終日乃復言者此奪
氣也其治法則生脈散獨參湯之屬是也　運
氣少氣有二　一曰火熱經云火鬱之發民病
少氣又云少陰之復少氣骨痿又云少陽之復
少氣脈痿化以爲寒是也　二曰風濕經云太
陽司天之政四之氣風濕交爭風化爲雨民病

大熱少氣是也　針灸少氣有三　一曰補肺
經云肺藏氣氣不足則息微少氣補其經隧無
出其氣又云肺虛則少氣不能報息耳聾嗌乾
取其經太陰足太陽之外厥陰內血者是也
二曰補腎經云少氣身漯漯也言吸吸也骨痠
體重懈惰不能動補足少陰是也　三曰補氣海
經云膻中者爲氣之海其輸上在於柱骨之上
下出於人迎氣海不足則氣少不足以言審
守其輸而調之所謂柱骨之上者蓋天容穴

也人迎者結喉兩旁之脉動處也乃取天容人迎二穴補之也

[醫] 魚際絡青而短者少氣也 脾脉搏堅而長其色黃當病少氣 一呼脉一動一吸脉一動曰少氣 尺堅大脉小甚少氣悗有加立死 尺[illegible]

[illegible]堅[illegible]脉反[illegible]少氣[illegible]

證治準繩第三冊目錄

諸嘔逆門

嘔吐膈氣總論

嘔吐 漏氣 走哺 吐食 乾嘔 惡心 吐蚘 吐酸 不酸 嘔清水 吐涎沫 嘔膿

反胃 噎膈 噎

吐利 霍亂 乾霍亂

關格 呃逆

噫氣 諸逆衝上

諸血門

諸見血證 九竅出血 毛孔出血

鼻衄 舌衄

齒衄 耳衄

吐血 欬嗽血

咯血 溲血

下血 中蠱 腸風 臟毒 蓄血

金壇王肯堂輯

嘔吐膈氣總論

潔古家珍吐證有三氣積寒也皆從三焦論之上焦在胃口上通於天氣主內而不出中焦在中脘上通天氣下通地氣主腐熟水穀下焦在臍下下通於地氣主出而不納是故上焦吐者皆從於氣氣者天之陽也其脉浮而洪其症食已暴吐渴欲飲水大便燥結氣上衝胸而發痛其治當降氣和中中焦吐者皆從於積有陰有陽食與氣相假為積而痛其脉浮而弦其證或先痛而後吐或先吐而後痛法當以小毒藥去其積檳榔木香和其氣下焦吐者皆從於寒地道也其脉沉而遲其證朝食暮吐暮食朝吐小便清利大便秘而不通治法宜以毒藥通其閉塞溫其寒氣大便漸通復以中焦藥和之不令大腑秘結而自愈也　此事難知問嘔吐噦胃所主各有經乎答曰胃者總司也內有太陽陽明

少陽三經之別以其氣血多少而為聲物有無之不同卽吐屬太陽有物無聲乃血病也有食入卽吐食已則吐食久則吐之別嘔屬陽明有物有聲氣血俱病也仲景云嘔多雖有陽明證不可下噦屬少陽無物有聲乃氣病也

醫家大法食刻則吐為之嘔生薑半夏湯

食入則吐為之暴吐生薑橘皮湯　食已則吐為之嘔吐橘皮半夏湯　食久則吐為之反胃水煮金花丸　食再則吐為之翻胃易老紫沉丸　日食不能暮食則吐食不下脉實而滑半夏生薑大黃湯下之　潔古論吐分三焦其說蓋本於黃帝所謂氣為上膈食飲入而還出為下膈食晬時乃反出之其上焦食已暴吐者今世謂之嘔吐也中下二焦食久而吐食再而吐者今世謂之膈氣反胃也分嘔吐膈氣為二門　趙以德云夫陰陽氣血隨處有定分獨胃得之則法天地人而三才之道備故胃有上中下三脘上脘法天為陽下脘法地為陰中脘

法氣交之分陽清而陰濁故陽所司者氣陰所司者血然陽中亦有陰陰中亦有陽於是上脘氣多血少則體乾道之變化動也下脘血多氣少則體坤道之資生靜也中脘氣血相半故運上下動靜升降之氣行由是物之入胃各從其類聚水飲者物之清穀食者物之濁然清中有濁濁中有清故飲之清者必先上輸於司氣之肺而後四布為津為液清中之濁者則下輸膀胱為便溺出焉食之清者亦必先注精於司血

之心肝以養筋骨經脈更化榮衛流注百骸濁中之濁者則自下脘變糟粕傳送下大腸出焉若邪在上脘之陽則氣停氣停則水積故飲之清濁混亂則為痰為飲為涎為唾變而成嘔邪在下脘之陰則血滯血滯則穀不消故食之清濁不分而為噎塞為痞滿為痛為脹變而成吐邪在中脘之氣交者盡有二脘之病兄故嘔從氣病法天之陽動而有聲與飲俱出猶雷震必雨注也吐從血病法地之陰靜而無聲與食俱

出象萬物之吐出於地也氣血俱病法陰陽之氣交則嘔吐並作飲食皆出然在上脘非不吐食也設陽中之陰亦病則食入即吐不得納於胃也非若中脘之食已而後吐下脘之食久而方出其下脘非不嘔也設陰中之陽亦病則吐與嘔齊作然嘔必少於吐不若上脘之嘔多於吐也

嘔吐

有氣　走哺　吐食　胃反　心　嘔苦　吐酸　不臥　嘔清水　吐涎沫　吐蚘

東垣曰夫嘔吐噦者俱屬于胃胃者總司也以其氣血多少爲異耳且如嘔者陽明也陽明多血多氣故有聲有物氣血俱病也仲景云嘔多雖有陽明症愼不可下孫眞人曰嘔家多服生薑乃嘔吐之聖藥也氣逆者必散之故以生薑爲主吐者太陽也太陽多血少氣故有物無聲乃血病也有食入則吐有食已則吐以陳皮去

白主之噦者少陽也少陽多氣少血故有聲無物乃氣病也以薑製半夏爲主故朱奉議治嘔吐噦以生薑半夏陳皮之類是也究三者之源皆因脾氣虛弱或因寒氣客胃加之飲食所傷而致也宜以丁香藿香半夏茯苓陳皮生薑之類主之若但有內傷而有此疾宜察其虛實使內消之痰飲者必下之當分其經對證用藥不可亂也　金匱方諸嘔吐穀不得下者小半夏湯主之又云嘔家本渴渴者爲欲解今反不渴心下有支飲故也小半夏湯主之用半夏一升生薑半斤水七升煮取一升半分溫再服又云卒嘔吐心下痞有水眩悸者小半夏加茯苓湯主之即前方加茯苓四兩也然則生薑半夏固通治嘔吐之正劑矣然東垣云辛藥生薑之類治嘔吐但治上焦氣壅表實之病若胃虛穀氣不行胸中閉塞而嘔者惟宜益胃推揚穀氣而已勿作表實用辛藥瀉之故服小半夏湯不愈者服大半夏湯立愈此仲景心法也　寒而嘔

吐則喜熱惡寒四肢淒清或先覺咽酸脈弱小而滑因胃虛傷寒飲食或傷寒汗下過多胃中虛冷所致當以剛壯溫之宜二陳湯加丁香十粒或理中湯加枳實半錢或丁香吳茱萸湯藿香安胃散鐵刷湯不效則溫中湯甚則附子理中湯或治中湯加丁香並須冷服蓋冷遇冷則相入庶不吐出[illegible]昔有患人用附子理中湯四逆湯加丁香到口即吐後去乾薑只參附加丁木二香煎熟更磨入沉香立吐

定蓋虛實痰氣凝結丁附既溫佐以沉木香則
通乾薑白朮則泥耳 熱嘔食少則出煩冷惡
熱煩躁引飲脉數而洪宜二陳湯加黃連炒梔
子枇杷葉竹茹乾葛生薑入蘆根汁服 金匱
方嘔而發熱者小柴胡湯主之潔古用小柴胡
湯加青黛以薑汁打糊丸名清鎮丸治嘔吐脉
弦頭痛蓋本諸此 胃熱而吐者聞穀氣即嘔
藥下亦嘔或傷寒未解胸中有熱關脉洪者是
也並用蘆根汁 金匱方嘔吐而病在膈上後

思水解急與之思水者豬苓散主之 嘔而胸
滿者吳茱萸湯主之 嘔而渴者枇杷葉汁飲
之 嘔而腸鳴心下痞者半夏瀉心湯主之
氣惱吐嘔滿悶脹關格不通不食常飽食則常
氣逆而吐此因盛怒中飲食而然宜二陳湯加
枳實木香各半錢或吳茱萸湯不効則丁沉透
膈湯及五膈寬中湯 食嘔吐多因七情而得
有外感邪氣併飲食不節而生大概治以理中
為先二陳湯加枳實一錢或加南星七分[illegible]

木香各四分亦妙 [illegible]湯或導痰湯
又有中脘伏痰遇冷即發俗謂之冷痰或服新
法半夏湯或過脾湯 有痰飲粥藥到咽即吐
人皆謂其番胃非也此乃痰氣結在咽膈之間
宜先以紫蘇湯下靈砂丹俟粥藥可進則以順氣
之藥調之 外有吐瀉及痢疾或腹冷痛進熱
藥太驟以致嘔逆宜二陳湯加砂仁白荳蔻各
半錢沉香少許 嘔吐諸藥不効當借鎮重之
藥以墜其逆氣宜紫蘇湯下靈砂丹百粒俟藥

得止却以養正丹半硫丸導之嘔吐津液既去
其口必渴不可因渴而遽以為熱 若陰虛邪
氣逆上窒塞嘔噦不足之病此地道不通也正
當用生地黃當歸桃仁紅花之類和血涼血潤
血兼用甘草以補其氣微加大黃芒硝以通其
閉大便利邪氣去則氣道通嘔噦自不見矣 復
有胸中虛熱穀氣久虛發而為嘔噦者但得五
穀之陰以和之則嘔噦自止
[illegible]皆熱[illegible]痛其氣不續[illegible]

問食入即先嘔而後下名曰漏氣此因上焦傷
風閉其腠理經氣失道邪氣内着麥門冬湯主
之
走哺 下焦實熱大小便不通氣逆不續嘔逆
不禁名曰走哺人參湯主之
上焦氣熱上衝食已暴吐脉浮而洪宜
先降氣和中以桔梗湯調木香散二錢隔夜空
腹服之三服後氣漸下吐漸去然後去木香散
加芍藥二兩黃芪一兩半同煎服之病愈則止

如大府燥結食不盡下以大承氣湯去芒硝微
下之少利為度再服前藥補之如大便復結又
依前微下之　保命集用荆黃湯調檳榔散
中焦吐食由食積與寒氣相格故吐而疼宜服
紫沉丸　金匱大黃甘草湯治食已即吐又治
吐水　吐食而脉弦者由肝勝於脾而吐乃由
脾胃之虛宜治風安胃金花丸青鎮丸主之
金匱茯苓澤瀉湯治胃反吐而渴欲飲水者
嘔噦 金匱乾嘔噦若手足厥者陳皮湯主

之　卒乾嘔不息取甘蔗汁溫服半升日三次
入生薑汁　搗葛根絞取汁服
惡心 惡心乾嘔欲吐不吐心下映漾人如畏
船宜大半夏湯或小半夏茯苓湯或理中湯治
中湯皆可用　金匱方病人胸中似喘不喘似
嘔不嘔似噦不噦徹心中憒憒然無奈者生薑
半夏湯主之　胃氣虛弱身重有痰惡心欲吐
是邪氣羈絆於脾胃之間當先實其脾胃茯苓
半夏湯主之　若有風證不敢見風眼濇眼黑

胸中有痰惡心兀兀欲吐但遇風覺皮肉寒手
足難舉動重如石若在暖室少出微汗其證隨
減再遇風病復如是柴胡半夏湯主之　仲景
云病人欲吐者不可下之又用大黃甘草治食
已即吐何也曰欲吐者其病在上因而越之可
也而逆之使下則必抑塞憒亂而益以甚故禁
之若既已吐矣吐而不已有升無降則當逆而
折之引令下行無速於大黃者也故不禁也兵
法曰避其銳擊其惰此之謂也丹溪泥之而曰

凡病嘔吐切不可下固矣夫

【針灸】經云善嘔嘔有苦長太息邪在膽逆在胃膽液泄則口苦胃氣逆則嘔苦故曰嘔膽取三里以下胃氣逆則刺少陽血絡以閉膽逆却調虛實以去其邪人云口苦嘔宿汁取陽陵泉　陽明為胃主嘔而膽汁苦故獨取膽與胃也　陽明在泉燥淫所勝病善嘔嘔有苦又云陽明之勝嘔苦治以苦溫辛溫是運氣嘔苦皆屬燥也

【吐酸】附吞酸　東垣曰病機云諸嘔吐酸皆屬於

熱辨云此上焦受外來客邪也胃氣不受外邪故嘔傷寒論云嘔家雖有陽明證不可攻之是未傳入裏三陰不受邪也亦可見此症在外也仲景以生薑半夏治之孫真人云嘔家多用生薑是嘔家聖藥以維病論之嘔吐酸水者甚則酸水浸其心不任其苦其次則吐出酸水令上下牙酸澀不能相對以大辛熱劑療之必減吐酸出酸味者收氣也西方肺金旺也寒水乃金之子能令母實故用大鹹熱之劑瀉其子以辛熱為之佐以瀉肺之實以病機之法作熱攻之者誤矣雜病嘈心濁氣不降欲為中消食藥豈能治之乎　丹溪曰或問吞酸素問明以為熱東垣又以為寒何也曰吐酸與吞酸不同吐酸似吐出酸水如醋平時津液隨上升之氣鬱而成積成積既久濕中生熱故從木化遂作酸味非熱而何其有鬱積之久不能自涌而出伏於肺胃之間咯不得上嚥不得下肌表得風寒則內熱愈鬱而酸味刺心肌表溫

暖腠理開發或得香熱湯丸津液得行亦可暫解非寒而何素問言熱者言其本也東垣言寒者言其末也但東垣不言外得風寒而作收氣立說欲瀉肺金之實又謂寒藥不可治酸而用安胃湯加減二陳湯俱犯丁香且無治熱濕鬱積之法為未合經意予嘗治吞酸用黄連茱萸各製炒隨時令迭為佐使蒼术茯苓為輔湯浸蒸餅為小丸吞之仍教以糲食蔬果自養則病易安　又有飲則嘈有宿食則酸故常噯宿

腐氣逆噫酸水，亦有每晨吐清酸水數口，日間無事者，亦有膈間常如酸折，皆飲食傷於中脘所致。生料平胃散加神麯、麥芽各一錢，或八味平胃散。有熱則咽醋丸。　膈間停飲積久必吐酸水，神术丸。　酒癖停飲吐酸水，乾薑丸。　風痰眩冒頭痛，惡心吐酸水，半夏、南星、白附生為末，滴水丸桐子大，以生麪為衣，陰乾，每服十丸至二十丸，薑湯送下。　參萸丸可治吞酸，亦可治自利。　酸心，用檳榔四兩，陳皮二兩，末之，空心生蜜湯下方寸匕。

吐清水　經云：太陰之復，嘔而密默，唾吐清液，治以甘熱。是嘔水屬濕。　一味蒼术丸主之。　金匱方：心胸中有停痰宿水，自吐出水後，心胸間虛氣滿，不能食，茯苓飲主之，能消痰氣，令能食。　又方：渴欲飲水，水入則吐者，名曰水逆，五苓散主之。　千金方：治痰飲水吐無時節者，其原因冷飲過度，遂令脾胃氣羸，不能消於飲食，飲食入胃則皆變成冷水，反吐不停，皆赤石脂散主之。赤石脂搗篩，服方寸匕，酒飲時稍加至三匕，服盡一斤，終身不吐痰水，又不下利。

乾嘔　金匱方：乾嘔吐逆，吐涎沫，半夏乾薑散主之。半夏、乾薑各等分，杵為散，取方寸匕，漿水一升半，煎取七合，頓服之。　乾嘔吐涎沫，頭痛者，吳茱萸湯主之。　婦人吐涎沫，醫反下之，心下即痞，當先治其吐涎沫，小青龍湯主之。涎沫止，乃治痞，瀉心湯主之。

嘔膿　仲景云：嘔家雖有癰膿，不可治嘔，膿盡自愈。　仁齋直指以地黃丸湯主之。

吐蚘　仲景以吐蚘為胃中冷之故，則成蚘厥，宜理中湯加炒川椒五粒、檳榔半錢，吞烏梅丸。　胃熱之蚘致而嘔吐，其則長蟲出，亦用烏梅丸，取胃三甲。　有嘔吐諸藥不止，別無他證，乃蚘在胸膈作嘔，見藥則動，動則不納藥，藥出而蚘不出，雖吐[illegible]，亦宜用吐蚘藥，或於治嘔藥中入炒川椒十粒，蓋蚘見椒則頭伏故也。

[illegible]　形狀如[illegible]　門[illegible]陰數，其人食已即

吐陽浮而數亦爲吐或浮大此出陽燥物不消配之也爲格主吐逆無陰和之　寸緊尺濇其人胸滿不能食而吐　寸口脈數其人則吐　寸口脈細而數數則爲熱細則爲寒數爲嘔吐金匱問數爲熱當消穀引食而反吐者何也曰以發其汗令陽微膈氣虛脈乃數數爲客熱不能消穀胃中虛冷故吐也

趺陽脈微而濇微則[illegible]濇則[illegible]或浮而濇浮則虛虛傷脾脾傷則不磨朝食暮吐名曰反胃　寸口脈微而數微則血虛虛則胃寒　脈緊而濇者難治　關上脈浮大風在胃中

嘔吐

心下澹澹食欲嘔　關上脈微浮積熱在胃中嘔吐蚘蟲　關上脈緊而滑者蚘動　脈緊而滑者吐逆　脈小弱而濇胃反　浮而洪爲氣浮而匿爲積　沉而遲爲寒　趺陽脈浮胃虛嘔而不食恐怖者難治寬緩生[illegible]　先嘔卻渴此爲欲解先渴卻嘔爲水停心下屬飲　脈弱而嘔小便復利身有微熱見厥者死　嘔吐大痛色如青菜葉者死

胃反門

金匱要略云發汗令陽微膈氣虛脈乃數數爲客熱不能消穀胃中虛冷其氣無餘朝食暮吐變爲胃反人又云趺陽脈浮[illegible]浮則爲虛虛濇則傷脾脾傷則不磨朝食暮吐宿食不化名曰胃反傷寒論太陽病吐後汗出不惡寒發熱關脈細數欲食冷食朝食暮吐謂以晨食入胃胃虛不能克化至暮胃氣行裏與邪相搏則食反出巢氏病源亦曰榮衛俱虛血氣不足停水積飲在胃脘即藏冷藏冷則脾不磨而宿食不化其氣逆而成反胃則朝食暮吐暮食朝吐則食已即吐王太僕註內經亦曰食不得入是有火也食入反出是無火也由是後世遂以胃虛爲寒而用辛香大熱之劑以復其陽雖有脈數爲邪熱不殺穀者亦用之殊不思壯火散氣其人大熱[illegible]反胃之[illegible]少[illegible]七

情飲食不節其證復作前藥再行務成其熱血液衰耗胃脘乾槁其槁在上近咽之下水飲可行食物難入入亦不多名之曰噎其槁在下與胃為近食雖可入難盡入胃良久復出名之曰膈亦曰反胃大便秘少若羊矢然必外避六淫內節七情飲食自養滋血生津以潤腸胃則金無畏火之炎腎有生水之漸氣清血和則脾氣健運而食消磨傳送行矣此論膈噎之久病者也然而亦有病未久而食入即反出之不已與

膈噎形狀同者何以言之內經謂厥陰之復嘔吐飲食不入入而復出甚則入脾食痺而吐王注食痺者食已心下痛陰陰然不可忍也吐出乃止此胃氣逆而不下行也又胃脉與散當病食痺又肺病傳之肝曰肝痺脇痛出食與夫金匱要畧復有肝中寒心中風厥陰之為病三者皆食入則吐則必又從其病由之邪而治也大抵反胃亦必如前條治吐分氣積寒三法可也余後世所用通利之劑製一方名十膈散治十

般膈氣令人守之為良方畧古聖賢而勿守者治病之道非中其邪而病豈能愈乎予試以昔嘗求邪而得驗者明之一男子壯年食後必吐出數口却不盡出膈上時作聲面色如平人知其病不在脾胃而在膈間問其得病之由乃因大怒未止輒吃麪即時有此證料之以怒甚則血菀於上積在膈間有礙氣之升降津液因聚為痰為飲與氣相搏而動故作聲也用二陳湯加香附韭汁萊菔子服二日以瓜蒂散酸漿吐

之再一日又吐痰中見血一盞次日復吐見血一鍾其病即愈一中年人中脘作痛食已則吐面紫霜色兩關脉濇知其血病也問之乃云跌仆後中脘即痛投以生新推陳血劑吐出停血碗許則痛不作而食亦不吐矣　咽喉閉塞胸膈[illegible]宜香砂寬中丸開導結散而[illegible]中氣不運而致者當補氣[illegible]　李絳療反胃嘔吐[illegible]即吐因俗無力垂死者以上黨

人參三大兩劈破水一大升煮取四合熱頓服

大便燥結如羊矢閉久不通似膈血熱止可清熱潤養小著湯丸累累加之關扃自透瘀血潤腸湯膈丸 韮汁大黃人參利玄明粉少加甘草 然服通利藥過多致血液耗竭而愈結者當補血潤血而使自行

有因火逆衝上食不得入其脉洪大有力而數者滋陰清膈散加枇杷葉二錢蘆根一兩

或痰飲阻滯而脉結澀者二陳湯入竹瀝薑汁

痰多食飲纔下便爲痰涎裹住不得下者以來復丹控其痰涎自製滌痰丸半夏麴枯礬皂角火炙刮去皮弦子玄明粉白茯苓枳殼各等分霞天膏和丸

有因脾胃陽火內衰其脉沉微而遲者以辛香之藥温其氣却宜丁沉透膈湯五膈寬中散嘉禾散之類仍以益陰之藥佐之

瘀血在膈閒阻礙氣道而成者居多以代抵當丸作芥子大取三錢去枕仰臥細細嚥之令其搜逐停積至天明利下惡物却好將息自愈

五靈脂淘淨爲細末黄犬膽汁和丸如龍眼大每服一丸好酒半盞温服不過三服効亦行瘀血之劑也

亦有蟲者以秦川剪紅丸取之此丸亦取瘀血

本事方芫花丸治積聚停飲痰水生蟲久則成反胃及變爲胃癰其說在靈樞及巢氏病源

有胃積而無內熱者古方厚朴丸萬病紫菀丸皆妙方服之能取下蟲物

治反胃用新汲水一大碗留半碗將半碗水內細細澆香油鋪滿水面上然後將益元散一貼輕輕鋪滿香油面上須臾自然沉水底此即

陰陽升降之道也用匙攪勻服却將所留水半碗湯盪藥碗漱口令淨吐既止却進末子涼膈散通其大小便未効再進一貼益元及涼膈即効也此方屢驗

童便降火竹瀝行痰韮汁行血人乳汁牛乳汁[illegible]蘆根汁[illegible]茅根汁[illegible]薑汁佐竹瀝甘蔗汁[illegible]仍入燒酒米醋蜜各少許和勻[illegible]服

自製通腸丸大黄[illegible]滑石飛研各[illegible]陳皮[illegible]厚朴[illegible]各一兩半人參當歸貫衆[illegible]各一兩木香檳榔各七錢半三

稜炮蓬朮炮川芎薄荷玄明粉雄黃桃仁泥甘
草各五錢俱各另取細末用竹瀝童便韭汁人
乳驢尿蘆根汁茅根汁甘蔗汁燒酒米醋蜜各
一杯薑汁一杯隔湯煮濃和丸如芥子大每服
三錢去枕仰臥唾津嚥下通利止後服服此丸
及前諸汁後得藥不反切不可便與粥飯及諸
飲食每日用人參五錢陳皮二錢作湯細啜以
扶胃氣覺稍安漸漸加人參旬日半月間方可
小試陳倉米飲及糜粥倉廩未固不宜便貯米

穀常見卽食粥飯者遂致不救　又有反胃因
呼呼極力破損氣喉氣喉破漏氣壅胃管胃受
氣亦致反胃法在不治或用牛喉管焙燥服之
張子和十膈五噎浪分支派疏　病派之分
自巢氏始病失其本亦自巢氏始何則老子曰
少則得多則惑且俗謂噎食一症在內經原無
多語惟曰三陽結謂之膈三陽者大腸小腸膀
胱也結謂結熱也小腸結熱則血脈燥大腸結
熱則後不圊膀胱結熱則津液涸三陽俱結則
前後閉濇下旣不通必反上行此所以噎食不
下縱下而復出也謂胃爲水穀之海日受其新
以易其陳一日一便乃常度也今病噎者三五
七日不便乖其度也豈非三陽俱結於下大腸
枯涸所食之物爲咽所拒縱入太倉還出喉嚨
此陽火不下推而上行也經曰少陽所至爲嘔
涌溢食不下又氣厥論云肝移寒於心爲狂膈
中註陽與寒相搏故膈食而中不通此膈熱與
寒爲之也非獨專於寒也六節藏象云人迎四

盛以上爲格陽王太僕云陽盛之極故膈拒而
食不入正理論云格則吐逆故膈亦當爲格後
世强分爲五噎後又別爲十膈五噎其派旣多
其惑滋甚人之溢食初未必遽然也初或傷酒
食或胃熱欲吐或胃風欲吐醫氏不察本原火
[illegible]桂丁香未已[illegible]繼之蓽撥木
[illegible]和胃胃本不寒雖曰補胃胃
[illegible]設如傷飲止可逐飲設如傷食止可逐
[illegible]將熱補熱之人三陽必結三

陽既結食必上潮醫者猶云胃寒不納燒針著艾三陽轉結分明一句到了難從不過抽薪退熱最爲緊要揚湯止沸愈急愈增歲月深深爲醫所悮人言可下退陽養陰張眼吐舌恐傷元氣上在沖和關塞不通腸宜通暢是以腸鳴腸既不通遂成噎病或曰憂恚氣結亦可下乎予曰憂恚盤礴便同火鬱太倉公見此皆下法廢以來千年不復今代劉河間治膈氣噎食用承氣三乙湯獨超近代今予不恤姑示後人用藥

之時更詳輕重假如閟久愼勿頓攻總得攻開必慮後患宜先潤養小著湯丸累累加之關扃自透其或咽噎上阻痰涎輕用苦酸微微涌出因而治下藥勢易行設或不行蜜鹽下導始終勾引兩藥相通結散陽消飲食自下莫將巴荳耗却天真液燥津枯留毒不去人言此病曾下奪之從下奪來轉虛轉痞此爲巴荳非大黃牽牛之過也箕城一酒官病嘔吐逾年不愈皆以胃寒治之丁香半夏青陳薑附種種燥熱燒錐燎艾莫知其數或少愈或復劇且十年大便澀燥小便赤黃予視之曰諸逆衝上皆屬於火王太僕云上謂上焦也火氣炎上之氣謂皆熱甚而爲嘔以四生丸下三十行燥糞腸垢何啻如斗其人昏困一二日頻以冰水呷之漸投涼乳酪芝蔴飲時時嚥之數日後大啜飲食精神氣血如昔繼生三子至五十歲

脉 寸口脉微而數微則無氣無氣則榮虛榮虛則血不足血不足則胸中冷　趺陽脉浮而

濇浮則爲虛虛則傷脾脾傷則不磨朝食暮吐暮食朝吐宿穀不化名曰胃反脉緊而濇其病難治　脉弦者虛也胃氣無餘朝食暮吐變爲胃反寒在於上醫反下之今脉反弦故名曰虛

[illegible]脉皆當病食痺[illegible]　腎脉[illegible]者食不化下嚥還出　沉緩而細小或大而弱爲氣虛　數而無力或濇小爲血虛　數而有力爲熱　寸關沉或伏或大而滑數爲痰　寸關脉沉而濇爲氣　反胃之脉

沉細散亂不成條道沉浮則有中按則無必死不治更參面色不欲黄白亦不欲純白皆惡候也　年高病久元氣敗壞手足寒冷糞如羊矢沫大出者皆不治

噎

噎謂飲食入咽而阻礙不通梗澀難下有下者有不得下者有吐者有不吐者故别立門　血槁者地黄麥門冬當歸煎膏入韭汁乳汁童便蘆根汁桃仁泥和勻細細呷之　大便秘澀加桃仁泥玄明粉或用人參散　有實積者可暫用厚朴丸亦可用昆布丸　食物下咽屈曲自膈而下梗澀作微痛多是瘀血用前膏子藥潤補之後以代抵當丸行之　有生薑汁煎方用生薑汁白蜜牛酥各五兩人參去蘆末百合末各二兩內銅鍋中慢火煎如膏不拘時候含一匙如半錢大津嚥或煎人參湯調下一茶匙亦得此虛而燥者宜之　干中有聚春杵頭糠時時拭齒杵令嗌刮春米杵頭細糠吞之或煎湯呷或煉蜜丸含嚥津亦得　杵頭糠人參末石蓮肉木香霜玄明粉等分紙吹　枇杷葉拭去毛炙橘皮去白各一兩生薑半兩水煎分溫三服　噎而喉中如有肉塊食不下用昆布二兩

洗去鹹水小麥二合水三大盞煎候小麥爛熟去滓每服不拘時喫一小盞仍以昆布不住含三兩片嚥津極効　噎病聲不出竹皮飲

東垣曰堵塞咽喉陽氣不得出者曰塞陰氣不得下降者曰噎夫噎塞迎逆於咽喉胸膈之間令諸經不行則口開目瞪氣欲絕當先用辛甘氣味俱陽之藥引胃氣以治其本加堵塞之藥以瀉其標也寒月陰氣大助陰邪於外於正藥內加吳茱萸大熱大辛苦之味以瀉陰寒之氣暑月陽盛則於正藥中加青皮陳皮益智黃栢散寒氣瀉陰火之上逆或以消痞丸合滋腎丸滋腎丸者黃栢知母微加肉桂三味是也或更加黃連別作丸二藥七八十丸空心約宿食消盡服之待少時以美食壓之不令胃中停留也

已上諸法悉於補中益氣湯加減之

膈咽不通并四時換氣用藥法　黃帝針經云胃病者腹䐜脹胃脘當心而痛上支兩脇膈咽不通飲食不下取三里夫咽者嚥物之門戶也膈者上焦心肺之分野不通者升降之氣上不得下交通又云清氣在下則生飧泄泄黃如糜米穀不化者是也濁氣在上則生䐜脹腹中䐜滿不得大便或大便難先結後溏皆是也濁氣在上當降而不降者乃腎肝吸入之陰氣不得下而反在上也胃氣逆上或為嘔或為吐或為噦者是陰火之邪上衝而吸入之氣不得入故食不下也此皆氣衝之火逆胃之脉反上而作者也清氣在下則生飧泄者胃氣未病之日當上行心肺而經營也因飲食失節勞役形體心火乘於土位胃氣弱而下陷入陰中故米穀入而不得升反降而為飧泄也膈咽之間交通之氣不得表裏者皆衝脉上行逆氣所作也蓋胃病者上支兩脇膈咽不通飲食不下取三里者是也針經云清濁相干亂於胸中是為大悗悗者惑也氣不交通最為急證不急去之諸變生矣聖人治此不惑從陽氣不足陰氣有餘先補其陽後瀉其陰是先令陽氣升發在陽分而後

瀉陰也春夏之月陽氣在經當益其經脉去其血絡秋冬陽氣降伏當先治其藏府若有噎有塞塞者五藏之所生陰也血也噎者六府之所生陽也氣也二者皆由陰中伏陽而作也今立四時用藥并治法於後　冬三月陰氣在外陽氣內藏當外助陽氣不得發汗內消陰火勿令泄瀉此閉藏周密之大要也盛冬乃水旺之時水旺則金旺子能令母實肺者腎之母皮毛之陽元本虛弱更以冬月助其令故病者善噎胷

流清涕寒甚則出濁涕嚏不止比常人尤大惡風寒小便數而欠或上飲下便色清而多大便不調夜臥無寐甚則爲痰欬爲嘔爲噦爲吐爲唾白沫以至口開目瞪氣不交通欲絕者吳茱萸丸主之　夏三月大暑陽氣在外陰氣在內以此病而值此時是天助正氣而剉其邪氣不治而自愈矣然亦有當愈不愈者蓋陰氣極盛正氣不能伸故耳且如膈咽不通咽中如梗甚者前證俱作治法當從時用利膈丸瀉肺火以

黃芪補中湯送下如兩足痿厥行步欹側欲倒臂膊如折及作痛而無力或氣短氣促而喘或不足以息以黃芪人參甘草白朮蒼朮澤瀉猪苓茯苓橘皮等作湯送下滋腎丸一百五十丸[illegible]閉澀熱之令大行氣短不能言者加五味子麥門冬如心下痞膨悶食不下以上件白朮蒼朮等湯送下消痞丸五七十丸更當審而用之

[illegible]胸[illegible]大[illegible]下之此爲大寒[illegible]無[illegible]而大[illegible]氣[illegible]而反[illegible]人即[illegible]寒[illegible]人[illegible]

吐利

成無已云若止嘔吐而利經謂之吐利是也上吐下利躁擾煩亂乃謂之霍亂其與但稱吐利者有異也蓋暴於旦夕者為霍亂可數日久者為吐利綱目以霍亂入傷寒吐利合為一門今仍分為二而以徐而日久者入此門　脉經云心乘肝必吐利　内經云厥陰所至為嘔泄又云木太過曰發生發生之紀上徵則氣逆其病吐利是風木之為吐利者也　又云水太過曰流衍流衍之紀其動漂泄沃涌是寒水之為吐利者也[illegible]　金匱云乾嘔而利者黄芩加半夏生薑湯主之黄芩湯亦主之　海藏云上吐下瀉不止當渴而反不渴脉微細而弱者理中湯主之　丹溪云泄瀉或嘔吐生薑汁湯調六一散服　潔古云有痰而泄利不止甚則嘔而欲吐利下而不能食由風痰羈絆脾胃之間水煮金花丸主之

霍亂

陳無擇曰霍亂者心腹卒痛嘔吐下利憎寒壯熱頭痛眩暈先心痛則先吐先腹痛則先利心腹俱痛吐利並作甚則轉筋入腹則斃蓋陰陽反戾清濁相干陽氣暴升陰氣頓墜陰陽痞隔上下奔迫宜詳別三因以調之外因傷風則惡風有汗傷寒則惡寒無汗冒濕則重著傷暑則煩熱内因九氣所致鬱聚痰涎痞隔不通遂致滿悶隨其勝復必作吐利或飽食膾炙恣餐乳酪冰脯寒漿旨酒胃既䐜脹脾藏停凝必因鬱發遂成吐利當從不内外因也　或問霍亂病亦復有他論者乎曰嘗考之内經有太陰所至為中滿霍亂吐下有土鬱之發民病嘔吐霍亂注下[illegible]有歲土不及風乃大行民病霍亂飧泄[illegible]有熱至則身熱霍亂吐下[illegible]　靈樞有足太陰之別名曰公孫去本節後一寸別走陽明其別者入絡腸胃厥氣上逆則霍亂實則腸

中切痛虐則蠱脹取之所別有清氣在陰濁氣在陽營氣順脉衛氣逆行清濁相干亂於腸胃則爲霍亂取之足太陰陽明不下取之三里巢氏因此一條乃云霍亂者由陰陽清濁二氣相干亂於腸胃間因遇飲食而變發則心腹絞痛挾風而實者身發熱頭痛體疼虛者但心腹痛而已亦有因飲酒食肉腥膾生冷過度居處不節或露卧濕地或當風取涼風冷之氣歸於三焦傳於脾胃水穀不化皆成霍亂自巢氏之說

行後世守之以爲法無復知內經諸條者矣至劉河間乃云吐下霍亂三焦爲水穀傳化之道路熱氣甚則傳化失常而吐瀉霍亂火性躁動故也世俗止謂是停食者誤也轉筋者亦是脾胃土衰肝木自甚熱氣燥爍於筋則筋攣而痛亦非寒也張戴人則以風濕暍三氣合而爲邪蓋脾濕土爲風木所克鬱則熱乃發發則心火炎上故嘔吐嘔吐者暍也脾濕下注故注泄注泄者濕也風急甚故轉筋轉筋者風也可謂善

推病情者乎王海藏亦謂風濕熱外至生冷物內加內外合病者此條殆似之矣凡治病當從內經隨宜施治安可執一端而已哉然則此病當以何爲要曰脾胃之濕爲本諸邪感動者爲病之由然其間脾胃有虛有實邪有陰陽相干之孰甚皆宜消息處治至若明理論謂傷寒吐利者由邪氣所傷霍亂吐利者由飲食所傷其有兼傷寒之邪內外不和者加之頭痛發熱而吐利者是霍亂傷寒也原仲景之意豈必在飲

食始爲是病彼於寒邪傳入中焦胃氣因之不和陰陽否隔者安得不有以致之乎不然何以用理中四逆等湯治之　此疾多生夏秋之交縱寒月有之亦多由伏暑而然病之將作必先腹中疞痛吐瀉之後甚則轉筋此兼風也手足厥冷氣少脣青此兼寒也身熱煩渴氣麤口燥此兼暑也四肢重着骨節煩疼此兼濕也傷風傷寒當於傷寒門中求之若風暑合病宜石膏理中湯暑濕相搏宜二香散　夏月中暑

霍亂上吐下利心腹撮痛大渴煩燥四肢逆冷
汗自出兩脚轉筋宜香薷飲井底沉極冷頓服
之桂苓白朮湯亦妙　羅謙甫治蔡參軍因食
酒肉飲潼乳得吐瀉霍亂證脉沉數按之無力
所傷之物已出矣即以新汲水半碗調桂苓白
朮散徐徐服之稍有安靜又於墻陰掘地約二
尺許入新汲水攪之澄清名曰地漿用清一杯
再調服之漸漸氣和吐瀉遂止翼日微煩渴却
以錢氏白朮散時時服之良愈或問用地漿者

何也曰坤爲地地屬陰土平曰靜順成至陰之
氣又於墻陰貯新汲水取重陰之氣也陰中之
陰能瀉陽中之陽霍亂症由暑熱內傷而得之
故經云陰氣者靜則神藏躁則消亡又加暑
熱亡神迷亂非至陰之氣何由息乎　又治提
舉侍其公七十九歲中暑霍亂吐瀉昏冒不知
人脉七八至洪大無力頭熱如火足寒如冰半
身不遂牙關緊急此年高氣弱不任暑氣陽不
維陰則瀉陰不維陽則吐陰陽不相維則既吐

且瀉矣前人見寒多以理中湯熱多以五苓散
作定法治之今暑氣極盛陽明得時之際況因
動而得之中暑明矣非甘辛大寒之劑不能泄
其暑熱除浮焰之火而安神明也遂以甘露散
甘辛大寒瀉熱補氣加茯苓以分陰陽冰水調
灌之漸省人事諸症悉去後愼言語節飲食三
日以參朮調中湯以意增減服之理其正氣逾
旬方平復　戴氏云人於夏月多食瓜果及飲
冷乘風以致食留不化因食成痞隔絕上下遂

成霍亂六和湯倍藿香煎熟調蘇合香丸　濕
霍亂除濕湯訶子散　七情鬱結五藏六府互
相刑剋陰陽不和吐利交作七氣湯　霍亂轉
筋吐瀉不止頭目昏眩須臾不救者吳茱萸湯
霍亂吐利轉筋四肢逆冷須臾不救急以茱
萸食鹽湯　霍亂吐瀉內令脉絶宜通脉四逆
湯　有吐有瀉則已有吐有瀉則以提其氣
用二陳湯探吐以…白礬湯
亦可吐…以…熱飲一升

劑口令吐得食從其證不吐更服吐乾仍灸三壯
乃止此法雖他法遠矣俗人鄙而不用坐視其
斃哀哉明後臨証調理亦有可下者　保命集
云夫傷寒霍亂者其本在於陽明胃經也胃者
水穀之海主稟四時皆以胃氣爲本與脾兼爲
表裏皆主中焦之氣腐熟水穀脾胃相通濕熱
相合中焦氣滯或因寒冷傷或因飲水或傷水毒
或感濕氣冷熱不調水火相干陰陽相搏上下
相離榮衛不能相維故轉筋絞痛經絡亂行暴

熱吐瀉中焦胃氣所主也有從標而得之者有
從本而得之者有從標本而得之者六經之變
治各不同察其色脉知犯何經隨經標本各施
其治此治霍亂之法也　如頭痛發熱邪自風
寒而來中焦爲熱相半之分邪稍高者居陽分
則爲熱熱多飲水者五苓散以散之如邪稍下
者居陰分則爲寒寒多不飲水者理中丸以溫
之[illegible]者[illegible]之汗出厥者溫之　如
[illegible]夏月大汗出內外熱者[illegible]

吐下後汗出厥逆不解脉欲絕者四逆等湯治
之　傷寒吐瀉轉筋身熱脉長陽明本病也宜
和中平胃散建中湯或四君子湯脉浮自汗者
四君子加桂五錢主之脉浮無汗者四君子加
麻黃五錢主之　傷寒吐瀉轉筋脇下痛脉弦
者木克土也故痛甚平胃散加木瓜五錢亦可
治宜建中加柴胡木瓜湯　傷寒吐瀉後大小
便不通胃中實痛者四君子加大黃一兩主之
傷寒吐瀉轉筋腹中痛體重脉沉而細者宜

四君子加芍藥高良薑湯　傷寒吐瀉四肢拘
急脉沉而遲此少陰霍亂也宜四君子加薑附
厚朴湯　厥陰霍亂必四肢逆冷脉微緩宜建
中加附子當歸湯　戴復菴云霍亂之病揮霍
變亂起於倉卒與中惡相似但有吐利爲異耳
其證胸痞腹痛氣不升降甚則手足厥逆冷汗
自出或吐而不瀉或瀉而不吐或吐瀉兼作或
吐[illegible]以[illegible]其痛寒熱[illegible]進藿香
[illegible]六和湯蘇合香丸調吞來復

丹若果瀉已甚則不可用來復丹瀉而不止者
腸痞滿先以陰陽湯或濃鹽湯頓服以導其吐
已吐未吐並藿香正氣散間進蘇合香丸吐而
不瀉心腹疞痛頻欲登圊苦於不通藿香正氣
散加枳殼一錢多下來復丹欲捷則用生枳殼
若更不能作効遲迴已甚其勢不容不用神保
丸但神保雖能通利亦入大腸而後有功若膈
於上而不能下轉服轉秘須用來復丹研末湯
調吞下養正丹百粒庶可引前藥到下吐瀉兼

作心腹纏擾未安者藿香正氣散加官桂木香
各半錢不愈則投四順湯 吐利不止元氣耗
散病勢危篤或水粒不入或口渴喜冷或惡寒
戰掉手足逆冷或發熱煩躁欲去衣被此盖內
虛陰盛却不可以其喜冷欲去衣被爲熱宜理
中湯甚則附子理中湯不効則四逆湯並宜放
十分冷服 霍亂已透而餘吐餘瀉未止腹有
餘痛宜一味報秋苔葉煎服乾者尤佳 霍亂
吐瀉後胸膈高起痞塞欲絕理中湯加枳

實半錢茯苓半錢名枳實理中湯吐瀉已愈而
力乏精神未復者十補散 轉筋陳氏云轉筋
者以陽明養宗筋屬胃與大腸今暴吐下津液
頓亡外感四氣內傷七情飲食甜膩攻閉諸脉
枯削於是宗筋失養必致攣縮甚則舌卷囊縮
者難治也劉宗厚云冷熱不調陰陽相搏故轉
筋攣痛甚者遍體轉筋此實陰陽之氣反戾風
寒乘之不過失血氣所榮而爲攣縮急痛也又河
間論轉筋皆屬火丹溪謂屬血熱二公之論謂

筋轉雖因於霍亂者也其不因霍亂而轉筋者誠
如二公之言亦有血虛筋失所養則轉而急痛
不能舒也若夫霍亂而轉筋則陳氏劉氏備矣
亦有營血中素有火熱卒然霍亂而風寒外束
營中之熱內鬱而其勢猖狂則筋亦爲之轉動
也大抵霍亂見此症甚者多不可救宜急治之
木瓜煮汁飲之 香薷煮汁飲之 燒梔子二
十枚研末熱水調下治熱者 理中湯去朮加生
附子一枚 或理中湯加凍膠剉炒一錢或以

造麪麥汁暖熱浸或用濃鹽湯浸仍令其[illegible]　腿脛若筋入腹及遍身轉筋者不可治（實者宜之）
直指木瓜湯　皂角末一小豆許入鼻中取嚏
蓼花一把去兩頭以水二升半煮一升半頓服之　灸承山二十七壯神效
〔論〕陳氏云陰陽反戾清濁相干水與穀併小便閉澀既走津液腎必枯燥引飲自救煩渴必矣止渴湯主之　霍亂煩渴以增損縮脾飲主之能解伏熱消暑毒止吐利霍亂之後服熱藥太多煩躁作渴尤宜服之　霍亂吐瀉後煩渴飲水宜茯苓澤瀉湯　霍亂已愈煩熱多渴小便不利宜小麥門冬湯　霍亂後惡心嬾食口乾多渴宜白朮散　霍亂後利不止冷汗出腹脇脹宜烏梅散　霍亂後下利無度腹中疞痛宜黃連丸　霍亂後下利見血宜止血湯赤石脂湯　潔古老人云霍亂轉筋吐瀉不止病在中焦陰陽交而不和發爲疼痛此病最急不可與分毫粥飲穀氣入胃則必死矣　保命集云凡霍亂慎勿與粟米粥湯入胃即死如吐瀉已多欲住之後宜以稀粥漸漸補養以遲爲妙

〔診〕霍亂徧身轉筋肚痛四肢厥冷欲絕者其脉洪大易治脉微囊縮舌卷不治　霍亂之後陽氣已脫或遺尿而不知或氣少而不語或膏汗如珠或大躁欲入水或四肢不收皆不可治也

〔乾霍亂〕忽然心腹脹滿攪痛欲吐不吐欲瀉不瀉燥亂憒憒無奈俗名攪腸沙者是也此由脾土鬱極而不得發以致火熱內擾陰陽不交或表氣發爲自汗或裏氣不通而作腹痛然脇上爲近陽也脇下爲近陰也若欲陰陽之氣行必先自近從上開之陽氣得通則先下之陽也若欲陰陽之氣行必死於其火也曰方論皆謂脾胃有宿食與冷氣相搏了何言爲火耶曰神志不[illegible]煩躁悶亂[illegible]躁狂越之爲屬火者乎不省[illegible]卒然暴死之屬火者乎但處治不[illegible]攻之過則脾愈虛亦不可過於熱

熱之過則內火愈熾不可過於寒寒之過則火
必與扞格須反佐以治然後藥可引食可出而
火可散矣古方有用鹽熬調以童便非獨用其
降陰之不逮陰既不通其血亦不行兼用行血
藥也此誠良法足可爲處方者比類矣　丹溪
云吐提其氣最是良法吐中兼有發散之義有
用解散者不用涼藥但二陳湯加川芎蒼朮防
風白芷　戴復菴法先以濃鹽湯頓服次調蘇
合香丸吞下來復丹仍進藿香正氣散加木香
枳殼各半錢　厚朴湯　活命散　冬葵子湯
　刺委中穴幷十指頭出血亦好

妊娠霍亂　若先吐或腹痛吐利是因於熱也
若頭痛體疼發熱是挾風邪也若風折皮膚則
氣不宜通而風熱上衝爲頭痛若風入腸胃則
泄利嘔吐甚則手足逆冷此陽氣暴竭謂之四
逆妊娠患多致損胎也　薛氏曰若因內傷飲
食外感風寒用藿香正氣散若因飲食停滯用
平胃散若脾胃損傷陽氣虛寒手足厥冷宜用
溫補之劑治當詳審毋使動胎也　人參散
人參白朮散　縮脾飲　木瓜煎　竹茹湯
四君子湯　理中丸　香薷飲

產後霍亂　陳氏云因臟腑虛損飲食不消觸
冒風冷所致若熱而飲水者五苓散寒而不飲
水者理中丸若冷者加附子來復丹尤妙　予
謂宜灸之於保命集治法

關格

關者不得小便格者吐逆上下俱病者也　格則吐逆　九竅　五藏　陰極自地而升是行陽道乃東方之氣金石之變上繼是也極則陽道不行反閉於上故令人吐逆是地之氣不能上行也逆而下降反行陰道故氣塡塞而不入則氣口之脈大四倍於人迎此淸氣反行濁道也故曰格　關則不便　下竅　六府　陽極自天而降是行陰道乃西方之氣膏粱之物下泄是也極則陰道不行反閉於下故不得小便是天之氣不得下通也逆而上行反行陽道故血脈凝滯而不通則人迎之脈大四倍於氣口此濁氣反行淸道也故曰關　或問關格之病因何如曰內經以藏府陰陽之病診見於外者則在人迎氣口謂人迎一盛病在少陽二盛病在太陽三盛病在陽明四盛已上爲格陽寸口一盛病在厥陰二盛病在少陰三盛病在太陰四盛已上爲關陰人迎與寸口俱盛四倍已上爲關格關格之脈羸不能極於天地之精氣則死矣註謂格者陽盛之極故格拒而食不得入也關者陰盛之極故關閉而溲不通也[illegible]亦曾[illegible]之[illegible]者[illegible]如內經之論人迎氣口之盛分經脈也但[illegible]者是經盛而躁者是手經至人迎四盛且大且數名曰溢陽溢陽爲外格手太陰脈口四盛且大且數名曰溢陰溢陰爲內關內關不通死不治人迎與太陰脈口俱盛四倍以上命曰關格關格者與之短期而人迎與脈口俱盛三倍以上命曰陰陽俱溢如是不開則血脈閉塞氣無所行流淫於中五藏內傷矣凡刺之道從所分人迎一盛二盛三盛五盛瀉其[illegible]補其所合之陰二瀉一補寸口亦然分瀉其[illegible]補其所合之陽二瀉一補皆以上氣和乃止[illegible]在府則陽脈不和陰脈不和則[illegible]留之氣留之則陽氣偏矣陽氣太盛則陰不利陰[illegible]利則[illegible]血留之則陰氣偏矣陰氣[illegible]不能榮也故曰關陽氣太盛則

陰氣不能榮也故曰格陰陽俱盛不得相榮也故曰關格關格者不得盡期而死也由此而觀前之論人迎寸口者爲人迎主外氣口主內故分三陰三陽氣之多寡定一盛二盛三盛而言也若此之不言人迎寸口者殆亦有謂指何則此因論脉度及之而以手足十二經周行上下者是大經隧然一陰一陽經相爲藏府之表裏者即有支横之路通其内外藏府之陰陽氣與之相榮故在兩手寸關尺六部以爲診法浮則

爲府沉則爲藏者於陰陽之盛豈盡從其部而見耶故不復言人迎氣口耳及張仲景之言關格者則可見矣如謂寸口脉浮而大浮爲虚大爲實在尺爲關在寸爲格關則不得小便格則吐逆又謂心脉洪大而長是心之本脉也上微頭小者則汗出下微本大者則爲關格不通不得尿頭無汗者可治有汗者死又云趺陽脉伏而濇伏則吐逆水穀不化濇則食不得入名曰關格蓋胃者水穀之海胃之居也濇者榮衛之

根源榮之根不動則衛氣不行衛氣不布則脉伏伏則發不化而吐逆榮氣不行則脉濇濇則食不入如是皆爲外格未見內關之病亦通言爲關格矣若乃又以濇脉爲脾病且脾者陰藏也脾病則陰盛陰盛則爲內關豈以外格其飲食不入耶蓋關格之名義格者拒扞其外入者不得內關者閉塞其內出者不得泄豈不明且盡乎後世妄以小便不通爲格大便不通爲關泛指在下陰陽二竅者爲言及乎陰陽之大法

者不復言已抑獨此也復有以陰陽格絕之說通爲[illegible]之見者是非錯亂有可歎邪夫關絕之說其於內經者有曰隔則閉絕上下不通者[illegible]之病也又云憂愁則[illegible]不行血脉隔絕[illegible]大小便不得通[illegible]久則傳化之行上下不[illegible]又有[illegible]經[illegible]之隔註云小腸[illegible]熱[illegible]小腸熱結則血脉燥膀胱熱[illegible]而不便又謂三陽積則九竅[illegible]而陽氣當隔隔者當

瀉不亟正治癃乃敗之原此數條其以明諸與
何如耶丹溪書云必用吐提其氣之提挈[illegible]必
在出痰也又云有痰二陳湯吐之吐中便有降
中氣不運者補氣藥中升降此蓋論其治小便
之法須於條下蹈世俗之弊而不落此悲夫　又
考之王氏脈經從八十一難謂有太過有不及
有陰陽相乘有覆有溢有關有格然關之前者
陽之動也脈當見九分而浮過者法曰太過減
者法曰不及遂上魚為溢為外關內格此陰乘

之脈也關以後者陰之動也脈當見一寸而沉
過者法曰太過減者法曰不及遂入尺為覆為
內關外格此陽乘之脈也故覆溢是其真藏之
脈人不病自死大抵亦人迎氣口之互見者也
雲岐子云陰陽易位病名關格胸膈上陽氣
常在則熱為主病身半已下陰氣常在則寒為
主病寒反在胸中舌上白胎而水漿不下故曰
格格則吐逆熱在丹田小便不通故曰關關則
不得小便胸中有寒以熱藥治之丹田有熱以

寒藥治之若胸中寒熱並有以主客之法治之
治主當緩治客當急　郁李仁湯　人參散
既濟丸　檳榔益氣湯　木通二陳湯　導氣
清利湯　加味麻仁丸　皂角散　孫尚藥治
奉職趙令儀女忽吐逆大小便不通煩亂四肢
漸冷無脈凡一日半與大承氣湯一劑至夜半
漸得大便通脈漸和翌日乃安

呃逆

呃逆即內經所謂噦也或曰成無巳許學士固以噦爲呃逆然東垣海藏又以噦爲乾嘔陳無擇又以噦名欬逆諸論不同今予獨取成許二家之說何也曰噦義具在內經顧諸家不察耳按靈樞雜病篇末云噦以草刺鼻嚏嚏而已無息而疾迎引之立已大驚之亦可已詳此經文三法正乃治呃逆之法按呃逆用紙撚刺鼻便嚏嚏則呃逆立止或閉口鼻氣使之無息亦立

已或作冤盜賊大驚駭之亦已此予所以取成許二家之論噦爲呃逆爲得經旨也若以噦爲乾嘔設使乾嘔之人或使之嚏或使之無息或使之大驚其乾嘔能立已乎噦非乾嘔也明矣若以噦名欬逆按內經生氣通天論曰秋傷於濕上逆而欬陰陽應象論曰秋傷於濕冬生欬嗽以此論之則欬逆爲欬嗽無疑以春夏冬三時比例自見孫眞人千金曰欬逆者嗽也本自明白後人不知何以將欬逆誤作呃逆失之遠矣　趙以德曰成無巳云噦者俗謂之欬逆呃呃然有聲俗所謂欬逆是噦非也內經以噦與欬逆爲兩證噦是胃病欬逆是肺病謂胃氣逆爲噦許學士云胃爲水穀之海腎與爲關關閉不利則氣逆而上胃以包容水穀性善受寒寒穀相搏故爲噦也又謂陽明之復欬噦太陽之復嘔出清水及爲噦噫少陰之復噦噫甚極亦謂穀入於胃胃氣上注於肺今有故寒氣與新穀氣俱還入於胃新故相亂眞邪相攻氣并相逆復出

於胃故爲噦補手太陰瀉足少陰張仲景言噦者皆在陽明證中謂濕家下之太早則噦而陽明病不能食攻其熱必噦皆因下後胃氣虛而噦者也至有風熱內壅氣不能通有潮熱時時噦者與小柴胡湯和解之噦而腹滿視前後知何部不利利之者此皆可治之證至若病極譫語與若欬噦又不尿腹滿加噦者皆不治丹溪先生亦以呃爲氣逆也氣自臍下直衝上出於口而作聲之名也內經謂諸逆衝上皆屬於

火東垣謂是陰火上衝而吸之氣不得入胃脈
反逆由陰中伏陽而作也從四時用藥法治古
方悉以胃弱言之而不及火且以丁香柹蔕竹
茹陳皮等劑治之未審孰爲降火孰爲補虛人
之陰氣依胃爲養胃土傷損則木氣侮之此土
敗木賊也陰爲火所乘不得內守木挾相火乘
之故直衝清道而上言胃弱者陰弱也虛之甚
也病人見此似爲危證然亦有實者不可不知
嗟乎聖人之言胃氣逆爲噦者非由一因而逆

緣王太僕用靈樞之意竟作胃寒逆上之病註
之由是後代方論或用熱劑治寒或用辛溫散
氣安知脾與胃一陰一陽也二者不和亦逆腎
肝在下相凌亦逆且腎之逆未可便謂之寒也
左腎主水性本潤下焉能自逆必右腎相火炎
上挾其衝逆須觀所挾多寡分正治反治以療
之肝木之風從少陽相火衝克者亦必治火皆
當如先生所言者以治若別有其故而噦者又
必[illegible]彼利而治之　劉宗厚曰呃

逆一證有虛有實有火有痰有水氣不可專作
寒論蓋傷寒發汗吐下之後與瀉痢日久及大
病後婦人產後有此者皆脾胃氣血大虛之故
也若平人食入太速而氣噎或飲水喜笑錯喉
而氣搶或因痰水停膈或暴怒氣逆痰
厥或傷寒熱病失下而有此者則皆屬實也夫
水性潤下火性炎上今其氣自下衝上非火而
何大抵治法虛則補之虛中須分寒熱如因汗
吐下後誤服寒涼過多當以溫補之如脾胃陰

虛火逆上衝當以平補之挾熱者涼而補之若
夫實者如傷寒失下地道不通因而呃逆當以
寒下之如痰飲停蓄或暴怒氣逆痰厥此等必
形氣俱實別無恙候皆隨其邪之所在涌之瀉
之清之利之也　胃傷陰虛木挾相火直衝清
道而上者宜參朮湯下大補陰丸　吐利後胃
虛寒者理中湯加附子丁香柹蔕　吐利後胃
虛熱者橘皮竹茹湯　三因方云凡吐利後多
作噦此由胃中虛膈上熱故噦或至八九聲相

逆於氣不回至於驚人者若似實久病得此甚
惡內經所謂壞病者是也　丹溪治超立道年
近五十質弱多怒暑月因饑後大怒得滯下病
口渴自以冷水調生蜜飲之甚漸緩五七日後
診脉稍大不數遂令止蜜水渴時且以參术湯
調益元散與之痢亦漸收七八日後覺倦甚發
呃知其因下久而陰虛也令守前藥然利尚未
止又以煉蜜與之衆皆尤藥之未當欲用薑附
曰補藥無速効附子非補陰者服之必死衆曰
冷水飲多得無寒乎曰炎暑如此飲涼非寒勿
多疑待以日數藥力到當自止又四日而呃止
滯下亦安　又治陳擇仁年近七十素厚味有
久嗽病新秋患滯下食大減至五七日後呃作
脉皆大豁衆以為難丹溪曰形瘦者尚可為以
參术湯下大補丸七日而安　婁全善治其兄
九月得滯下每夜五十餘行嘔逆食不下五六
日後加呃逆與丁香一粒噙之立止但少時又
至遂用黃連瀉心湯加竹茹飲之呃雖少止滯

下未安若此者十餘日遂空心用御米殼些少
澀其滑日間用參术陳皮之類補其虛自服御
米殼之後呃聲漸輕滯下亦收而安（以上□□□）
仲景云噦而腹滿視其前後知何部不利利
之即愈　大腸結燥脉沉數者調胃承氣湯。
大便不通噦數譫語小承氣湯　丹溪治超越
陳氏二十餘歲因飽後奔走數里患噦但食物
則連噦百餘聲半日不止飲酒與湯則不作至
晚發熱脉澀數以血入氣中治之用桃仁承氣
湯加紅花煎服下污血數次即減再用木香和
中丸加丁香服之十日而愈（□□□有質□□□之）又
治一女子年逾笄性躁味厚暑月因大怒而呃
作作則舉身跳動脉不可診神昏不知人問之
乃知暴病視其形氣俱實遂以人參蘆二兩煎
湯飲一碗大吐頑痰數碗大汗昏睡一日而安
人參入手太陰補陰中之陽者也蘆則反是大
瀉太陰之陽女子暴怒氣上肝主怒肺主氣經
曰怒則氣逆因怒逆肝木乘火侮肺故呃大作

而神昏參蘆善吐痰盡則氣降而火衰金氣復位胃氣得和而解（有宜例投 實者宜之） 三因云噦而心下堅痞眩悸者膈間有痰水所爲虛不禁吐者宜二陳湯導痰湯加薑汁竹瀝 亦有汙血而噦者丹溪治趙越陳氏用桃仁承氣湯是也虛不禁下者於畜血門求輕劑用之 仲景云噦逆者陳皮竹茹湯主之又云乾嘔噦若手足厥者陳皮湯主之本事方用枳殼五錢木香二錢半細末每服一錢白湯調下孫兆方用陳皮二

兩去白水煎通口服或加枳殼一兩此皆破氣之劑氣逆者宜之唯陳皮竹茹湯氣逆而虛者宜之 水寒相搏者小青龍湯寒甚加附子尖炒 潔古柿錢散寶鑑丁香柿蒂散羌活附子湯皆熱劑唯寒呃宜之 戴復菴以熱呃唯傷寒有之其他病發呃者皆屬寒用半夏一兩生薑一兩半水一碗煎半碗熱服或用丁香十粒柿蒂十個切碎白水一盞半煎或理中湯加枳殼茯苓各半錢半夏一錢不效更加丁香十粒

亦有無病偶然致呃此緣氣逆而生重者或經一二日宜小半夏茯苓湯加枳實半夏湯或煎湯泡蘿蔔子研取汁調木香調氣散乘熱服逆氣用之最佳 若胃中寒甚呃逆不已或復加以嘔吐輕劑不能取効宜丁香煮散及以附子粳米湯增炒川椒丁香每服各二三十粒 治呃逆於臍下關元灸七壯立愈累驗 又方男左女右乳下黑盡處一韭葉許灸三壯甚者二七壯

【診】心脈小甚爲噦 肺脈散者不治 噦聲頻密相連者爲實可治若半時噦一聲者爲虛難治多死在旦夕

[illegible] 此惡候也急灸期門三壯神効屈乳頭向下盡處是穴乳小者乳下一指爲率男左女右與乳正直下一指陷中動脈處是穴炷如小豆大灸罷病立止 丁香散 羌活散 [illegible]心[illegible]薑汁二合水煎服 參附湯[illegible] [illegible]以水一盞煎六分熱呷[illegible]

爾者
可用

噫氣

內經所謂噫即今所謂噯氣也宣明五氣論以心為噫痹論以心痹者脈不通煩則心下鼓暴上氣而喘嗌乾善噫至真大要論以太陽司天少陰之復[illegible]噦噫四時刺逆從論刺中心一日死其動為噫陰陽別論二陽一陰發病主驚駭背痛善噫善欠名曰風厥脈解太陰所謂上走心為噫者陰盛而上走於陽明陽明絡屬心故曰上走心為噫也此乃噫從心出者也厥陰

[illegible]脹而噫得後與氣則快然如衰玉版論要云[illegible]噫霍亂云足太陰是動病腹脹善噫又云寒氣客於胃厥逆從下上散復出於胃故為噫[illegible]仲景謂上焦受中焦氣未和不能消是故能噫[illegible]又云上焦不歸者噫而酢酸[illegible]由是觀之噫者是火土之氣鬱而不得發故噫而出下註解心為噫之[illegible]象火[illegible]如疾閉膈關中氣不得伸[illegible]內鬱也　仲景云痞而噫

旋復代赭湯主之　本事方心下蓄積痞悶或作痛多噫敗卵氣枳殼散主之　丹溪云胃中有實火膈上有稠痰故成噯氣用二陳湯加香附梔子仁黃連蘇子前胡青黛瓜蔞或丸或湯服之

【診】寸口脉弱而緩弱者陽氣不足緩者胃氣有餘噫而吞酸食卒不下氣塡於膈上　寸脉緊寒之實也寒在上焦胸中必滿而噫　趺陽脉微而濇微無胃氣濇卽傷脾寒在膈而反下

之寒積不消胃微脾傷穀氣不行食已自噫寒在胸膈上虛下實穀氣不通爲閉寒之病　趺陽脉微濇及寸脉緊而噫者皆屬寒　太陰終者腹脹閉噫氣嘔逆

諸逆衝上

逆氣五藏皆有　一曰心小腸經云諸逆衝上皆屬於火又云少腹控睪引腰脊上衝心邪在小腸取之肓原以散之刺太陽以予之取厥陰以下之取巨虛下廉以去之按其所過之經以調之是也　二曰胃經云胃爲氣逆是也胃逆有嘔有吐有噦故刺嘔吐取中脘三里也刺噦取乳下黑根盡處及臍下三寸皆大驗也治各見本門　三曰肺大腸經云肺苦氣上逆急食

苦以泄之又云腹中常鳴氣上衝胸喘不能久立邪在大腸刺肓之原巨虛下廉是也其肺逆曰咳喘取天突人迎泄之也治亦各有門　四曰肝經云肝氣逆則耳聾不聰頰腫取血是也　五曰腎卽奔豚氣逆脚氣衝心之類是也治亦各有門　六曰腎經云督脉別絡生病從少腹上衝心而痛不得前後爲衝疝是也

運氣厥逆有　一曰風火經云少陽司天火氣下臨風行於地厥逆膈不通是也　二曰寒

經云水鬱之發善厥逆是也　三曰濕經云太陰司天濕氣下臨厥逆是也
經云逆氣象陽凡氣逆必見象陽證面赤脈洪當以法降其逆乃愈若以氣象陽盛而用寒藥攻之則不救矣　氣上衝心咽不得息治法見傷寒厥陰病條　東垣云如秋冬之月胃脈四道為衝脈所逆并脇下少陽脈二道而反上行病名曰厥逆經曰逆氣上行滿脈去形七神昏絕離去其形而死矣其症氣上衝咽不得息喘息有聲不得臥於調中益氣加吳茱萸半錢或一錢觀厥氣多少用之如夏月有此症為大熱也治以[illegible]陰四時為寒熱溫涼宜以酒黃連酒黃柏酒知母各等分為細末熱湯為丸如梧桐子大每服二百丸空心白湯下仍多飲湯服畢少時便以美飲食壓之使不得胃中停留直至下焦以瀉衝脈之邪也　戴復菴云虛炎之證陰陽不升降下虛上盛氣促喘息宜蘇子降氣湯送下黑錫丹或養正丹氣急甚而不能臥

[illegible]者沉附湯或正元散或四柱散去木香用沉香並以[illegible]丹或靈砂丹[illegible]不效則以前藥[illegible]
[illegible]之

諸見血證　附九竅出血　毛孔出血

東垣云衄血出於肺以犀角升麻梔子黄芩芍藥生地紫參丹參阿膠之類主之　咯唾血者出於腎以天門冬麥門冬貝母知母桔梗百部黄蘗遠志熟地黄之類主之如有寒者乾薑肉桂之類主之　痰涎血者出於脾葛根黄芪黄連芍藥甘草當歸沉香之類主之　嘔血出於胃實者犀角地黄湯主之虚者小建中湯加黄連主之

海藏云胸中聚集之痰火腹裏積久之火陰上下隔絶脈絡部分陰陽不通用苦熱以定於中使辛熱以行於外升以甘温降以辛潤化嚴肅為春温變凛冽為和氣汗而愈也然餘毒土苴猶有存者周身陽和尚未泰然胸中微躁而思涼飲因食冷物服涼劑陽氣復消餘陰再作脈退而小弦細而遲澀而為衄血唾血者有之心肺受邪也下血為便血溺血者有之腎肝受邪也其血色紫不鮮此重沓寒濕水發道路浸漬而成若見血證不詳本源便用涼折變乃生矣　陽證溢出鮮血　陰證下如豚肝

上而血者黄芪桂枝湯　白芍當歸湯
中而血者當歸建中湯　增損胃風湯
下而血者芎歸朮附湯　桂附六合湯　若三血證在行陽二十五度見黄芪四君子湯主之
若三血證在行陰二十五度見當歸四逆加吳茱萸主之

吐血衄血便血其人陰虚陽走其脈沉而散其外虚内寒無熱候宜烏金丸散止之法宜上用散下用丸次以木香理中湯和大七氣湯入川芎煎調蘇合香丸温之　仁齋直指云血遇熱則宣流故止血多用涼藥然亦有氣虚挾寒陰陽不相為守榮氣虚散血亦錯行所謂陽虚陰必走是耳外必有虚冷之狀法當温中使血自歸於經絡可用理中湯加南木香或局方七氣湯加川芎或甘草乾薑湯其效甚著又有火

食傷胃或胃虛不能傳化其氣逆上亦令吐衄
木香理中湯甘草乾薑湯　出血諸證每以胃
藥收功木香理中湯或參苓白朮散二分枳殼
散一分夾和米湯調下或真方四君子湯
夾和小烏沉湯米湯調下已上並用薑棗略煎
亦得右藥不惟養胃蓋以調氣葷與之並行若
夫桔梗枳殼湯夾和二陳湯薑棗同煎入蘇合
香丸少許佐之又調氣之上藥也
經云歲火太過炎暑流行肺金受邪民病血溢

血泄又云少陽之復火氣內發血溢血泄是火
氣能使人失血者也而又云太陽司天寒淫所
勝血變於中民病嘔血血泄鼽衄善悲又云太
陽在泉寒淫所勝民病血見是寒氣能使人失
血也又云太陰在泉濕淫所勝民病血見是濕
氣能使人失血也又云少陰司天之政水火寒
熱持於氣交熱病生於上冷病生於下寒熱凌
犯而爭於中民病血溢血泄是寒熱凌犯能使
人失血也太陰司天之政初之氣風濕相薄民

病血溢是風濕相薄血溢也又云歲金太過燥
氣流行肝木受邪咳逆甚而血溢是燥氣亦能使
人失血也然經言六氣皆能使人失血何獨火乎
攖寧生卮言云古人言諸見血非寒證皆以血
爲熱迫遂至妄行然皆復有所挾也或挾風或
挾濕或挾氣又有因藥石而發者其本皆熱上
中下治各有所宜在上則梔子黃芩黃連芍藥
犀角蒲黃而濟以生地黃牡丹皮之類胃血古
人有胃風湯正是以陽明火邪爲風所扇而血

爲之動中間有桂取其能伐木也若蒼朮地榆
白芍藥之類而濟以火劑大腸血以手陽明火
其以風爲濕也治以火劑風劑風能勝濕也如
黃連黃芩芍藥蘗皮荊芥防風羌活之類兼用
鶩面取其用又述類之義也　驚而動血者屬心
怒而動血者屬肝憂而動血者屬肺思而動血
者屬脾勞而動血者屬腎　血溢血泄諸蓄妄
證其始也予率以桃仁大黃行血破瘀之劑折
其銳氣而後區別治之雖往往獲中然猶不得

其所以然也後來四明遇故人蘇伊舉閒論諸家之術伊舉曰吾鄉有善醫者每治失血蓄妄必先以快藥下之或問失血復下虛何以當則曰血既妄行迷失故道不去蓄利瘀則以妄為常曷以禦之且去者自去生者自生何虛之有予聞之愕然曰名言也昔者之疑今釋然矣婦人之於血也經水蓄而為胞胎則蓄者自蓄生者自生及其產育為惡露則去者自去生者自生其醞而為乳則無復下滿而為月矣失血

為血家妄逆產婦為婦人常事其去其生則一也失血家須用下劑破血蓋施之於蓄妄之初亡血虛家不可下蓋戒之於亡失之後

髮灰散　南天竺飲主之或用血餘灰自髮為佳無郎父子一氣者次則男胎髮又次則亂髮皂角水淨洗晒乾燒灰為末每二錢以茅草根車前草煎湯調下　荆葉擣取汁酒和服一荊芥一搓絞汁酒半盞和服如無生者擣乾者為末冷水調二錢

[illegible]　名曰肌衄用人中白不拘多少刮在新瓦上用火逼乾研令極細每服二錢入麝香少許溫酒調下外以男胎髮燒灰醶之末效以鬱金末水調鵝翎掃之即止　九靈山房集云淛心寺僧履師偶搔腘中疥忽自出血汨汨如湧泉竟日不止瘍醫治療弗効邀呂元膺往視時已困極無氣可語及持其脈惟尺脈如蛛絲他部皆無即告之曰夫脈血氣之先也今血妄溢故榮氣暴衰然兩尺尚可按惟當益榮

以瀉其陰火乃作四神湯加荊芥穗防風不間晝夜併進明日脈漸出更服十全大補湯一劑遂痊

凡九竅出血皆可用　墻頭苔蘚可以塞　車前草汁可以滴　火燒蓮房用水調　鍋底黑煤可以吹　石榴花片可以塞　生萊菔汁可以滴　火燒龍骨可以吹　水煎茅花可以喫

玉機微義曰[illegible]者水穀之精也和調五藏灑陳於六府乃能入於脈也源源而來生化

於脾總統於心藏受於肝宣布於肺施泄於腎灌溉一身目得之而能視耳得之而能聽手得之而能攝掌得之而能握足得之而能步臟得之而能液腑得之而能氣是以出入升降濡潤宣通者由此使然也注之於脈少則濇充則實常以飲食日滋故能陽生陰長取汁變化而赤為血也生化旺則諸經恃此而長養衰耗竭則百脉由此而空虛可不謹養哉故曰血者神氣也得之則存失之則亡是知血盛則形盛血弱

則形衰神靜則陰生形役則陽亢陽盛則陰必衰又何言陽旺而生陰血也蓋謂血氣之常陰從乎陽隨氣運行於內苟無陰以羈束則氣何以樹立故其致病也易調治也難以其比陽常虧而又損之則陽易亢陰易乏之論可以見矣諸經有云陽道實陰道虛陰道常乏陽常有餘陰常不足婦人之生也年至十四經行四十九而經斷可見陰血之難成易虧如此陰氣一傷所變之證妄行於上則吐衄衰涸於外則虛勞

忘反於下則便紅積熱膀胱則癃閉溺血滲透腸間則為腸風陰虛陽搏則為崩中濕蒸熱瘀則為滯下熱極腐化則為膿血火極似水血色紫黑熱勝於陰發為瘡瘍濕滯於血則為痛痒癮疹皮膚則為冷痺畜之在上則人喜忘畜之在下則人喜狂墮恐跌仆則瘀惡內凝若分部位身半以上同天之陽身半以下同地之陰此特舉其所顯之證者治血必血屬之藥欲求血藥其四物之謂乎河間謂隨證輔佐謂之六合

湯者詳言之矣予故陳其氣味專司之要不可不察夫川芎血中氣藥也通肝經性味辛散能行血滯於氣也地黃血中血藥也通腎經性味甘寒能生真陰之虛也當歸分三治血中主藥也通肝經性味辛溫全用能活血各歸其經也芍藥陰分藥也通脾經性味酸寒能和血治虛腹痛也若求陰藥之屬必於此而取則焉脾胃論有云若善治者隨證損益摘其一二味之所宜為主治可也此特論血病而求血藥之屬者

也若氣虛血弱又當如長沙血虛以人參補之陽旺則生陰血也若四物者獨能主血分受傷爲氣不虛也輔佐之劑若桃仁紅花蘇木血竭牡丹皮者血滯所宜蒲黃阿膠地榆百草霜棕櫚灰者血崩所宜乳香沒藥五靈脂凌霄花者血痛所宜蓯蓉瑣陽牛膝枸杞子益母草夏枯草敗龜板者血虛所宜乳酪血液之物血燥所宜乾薑肉桂血寒所宜生地黃苦參血熱所宜特取其正治大畧耳人能觸類而長可以應無窮之變矣

診　脫血而脈實者難治　病若吐血復鼽衄脈當沉細反浮大而牢者死　吐血衄血脈滑弱小者生實大者死　汗出若衄其脈滑小者生大躁者死　嘔血胸滿引背脈小而疾者逆也　脈至而搏血衄身熱者死　吐血欬逆上氣其脈數而有熱不得臥者死　諸見血身熱脈大者難治難治者邪勝也身涼脈靜者易治易治者正氣復也　衄血者若但頭汗出身無汗及汗出不至足者死　血溢上行或唾或嘔或吐皆凶也若變而下行爲惡利者順也血上行爲逆其治難下行爲順其治易故仲景云蓄血證下血者當自愈若無病之人忽然下利者其病進也今病血證上行而復下行惡利者其邪欲去是知吉也

鼻衄出血

三因方云衄者因傷風寒暑濕流傳經絡涌泄於清氣道中而致者皆外所因積怒傷肝積憂傷肺煩思傷脾失志傷腎暴喜傷心皆能動血隨氣上溢而致者屬內所因飲酒過多啖炙煿辛熱或墮墜車馬傷損致者皆非內非外因也　衄出於腦血上溢於腦所以從鼻而出宜茅花湯調止衄散時進折二泔仍令其以麻油滴入鼻或以蘿蔔汁滴入亦可茅花白芍藥對半

尤穩　糯米炒微黃為末新水下二錢　亂髮燒灰存性細研水服方寸匕併吹鼻中　韭菜根搗汁每一盞入生薑汁半盞相和時時細呷

・竹蛀屑水飲調　百藥煎半燒半生水酒調服　白芨末新汲水調下神效　治鼻衄久不止或素有熱而暴作者諸藥不效神法以大白紙一張作十數摺於冷水內浸濕置頂中以熱熨斗熨之至一重或二重紙乾立止　又方用線紮中指中節如左鼻孔出血紮左指右鼻孔出血紮右指兩鼻孔齊出則左右俱紮之　血衄不愈以三稜針於氣衝上出血又用五味子十粒麥門冬當歸黃芪生地人參各一錢水煎空心熱服　六脈細弦而濇按之空虛其色必白而夭不澤者脾胃虛此大寒證以辛溫補血養血以甘溫甘熱滑潤之劑佐之即愈理中湯小建中湯　六脈俱大按之空虛心動面赤善驚上熱乃手少陰心脈也此氣盛多而亡血以甘寒鎮墜之劑大瀉其氣以墜氣浮以甘辛溫

微苦峻補其血三黃補血湯　實熱衄血先湯硃砂蛤粉次服木香黃連大便結者下之用大黃芩芍藥甘草生地漸愈者梔子黃芩黃連犀角地黃湯可選用之　有頭風自衄頭風纔發則衄不止宜芎附飲間進一字散　下虛上盛而衄不宜過用涼劑宜四物湯加參芪麥門五味磨沉香下養正丹八味地黃丸　傷濕而衄腎著湯加川芎名除濕湯　伏暑而衄茅花湯調五苓散　上膈極熱而衄金沸草散去麻黃

良加茅花如荊芥數或用黃芩芍藥湯加茅花一攝虛者茯苓補心湯生料雞蘇散　飲酒過多衄血茅花湯加乾葛雞矩子或理中湯去乾薑用乾葛加茅花　衄而衄不止蘇合香丸一丸或以小烏沉湯一錢白湯調下或煎濃紫蘇湯獨調小烏沉湯或添入黑神散一錢鹽湯調下亦得仍蘇熱以水噀其面使驚則血止非特擷而衄凡五竅出血皆治　曾病衄後血因舊路一月或三四衄又有洗面而衄日以爲常此

即水不通借路之意並宜止衄散茅花煎湯調下或四物湯加石菖蒲阿膠蒲黃各半錢煎熟調火煅石膏末一匙頭許兼進養正丹前諸證服藥不效大衄不止者養正丹多服仍佐以蘇子降氣湯使血隨氣下　衄後頭暈四物湯十全大補湯　有先因衄血衄止而變生諸證或寒熱間作或喘急無寐病狀不一漸成勞傷當於虛損諸證詳之

舌衄

舌上忽出血如線用槐花炒研末摻之麥門冬煎湯調炒香散　香薷汁服一升日三　髮灰二錢米醋調服且傅血出處　文蛤散治熱壅舌上出血如泉五倍子白膠香牡蠣粉等分爲末每用少許摻患處或燒熱鐵烙孔上

齒衄

血從齒縫中或齒齦中出謂之齒衄亦曰牙宣有風壅有腎虛風壅者消風散內服外擦[illegible]

腎虛者以腎主骨牙者骨之餘火乘水虛而上炎服涼藥而愈甚宜鹽湯下安腎丸間黑錫丹仍用青鹽炒香附黑色爲末擦之亦有胃熱牙疼而齦間出血以至崩落口臭不可近人者內服清胃散甘露飲外用大黃[illegible]生地黃[illegible]一味旋切各用一二片合定貼所患牙上一夜而愈[illegible]嘗治一人不欲[illegible]而血見口中[illegible]用[illegible]腎水瀉相火治之不[illegible]又有婦女十歲因[illegible]

動搖以苧麻摘之血出不止一日夜積十一盆用[illegible]止其處少頃復從口出診其脈皆洪大有力以三[illegible]大黃末二錢枳殼湯少加童便調下[illegible]其血頓止一男子每齒根出血盈盆一月一發百藥不効知其人好飲投前劑一服而安一老嫗患此一發五七日日約升餘投前劑亦安所下皆有黑糞是知此疾多陽明熱盛所致緣衝任二脉皆附陽明陽明一經氣血俱多故一發如潮涌急則治其標故投以釜

底抽薪之法應手而愈要知腎虛血出者其血必點滴而出齒亦攸攸而疼必不如此之暴且甚也

耳衄

耳中出血以龍骨吹入即止左關脈弦洪柴胡清肝散尺脈或躁或弱六味地黃丸

吐血

夫口鼻出血皆係上盛下虛有升無降血隨氣上越出上竅法當順其氣氣降則血歸經矣宜蘇子降氣湯加人參阿膠各一錢下養正丹亦有氣虛不能攝血者其脈必微弱虛軟精神疲憊宜獨參湯或人參飲子團參丸　上膈壅熱吐血脈洪大弦長按之有力精神不倦或覺胸中滿痛或血是紫黑塊者用生地黃赤芍當歸牡丹皮荊芥阿膠滑石大黃玄明粉桃仁泥

之屬從大便導之此釜底抽薪法也　血從下出者順從上出者逆一應血上溢之證苟非脾虛泄瀉羸瘦不禁者皆當以大黃醋製和生地黃汁及桃仁泥牡丹皮之屬引入血分使血下行以轉逆為順此妙法也人不知此而日從事於[illegible]之屬[illegible]門[illegible]之使氣血俱傷脾[illegible]敗[illegible]有一生者耶　血證下行之後用[illegible]仁[illegible]百合麥門冬鮮地骨皮款冬花枇杷葉五味子桑根白皮[illegible]

母皆氣薄味淡西方兌金之本藥因其衰而減
之自不再發於虛勞證爲尤宜　急欲止之用
血餘一二錢以白湯化阿膠二錢入童便生藕
汁刺薊汁[illegible]黃汁各一杯仍用好墨磨濃黑
頻溫服　[illegible]煩熱吐血不止口[illegible]頭疼
石膏散　[illegible]湯溢於經絡血妄行從鼻
則衄[illegible]行清道吐行濁道流入胃脘令人吐血
用[illegible]加川芎最止浴室中發衄　吐
血在[illegible]入病人口渴面垢頭暈乾嘔煎茅花燈

心麥門冬湯仍入藕節汁側柏汁茅根汁生
薑汁少許生蜜亦少許調五苓散血止用生地
黃當歸牡丹皮赤芍藥百草霜末煎服一二貼
却用黃芪六一湯調理　怒氣傷肝者[illegible]
用當歸雞蘇丸煎四物湯吞下并用十四友丸
[illegible]心麥門冬湯吞下蓋其中有理肝之藥　打
撲損[illegible]先以藕節汁側柏汁茅根汁韭
[illegible]汁化阿膠止之却以川芎當歸白
[illegible]茶[illegible]阿膠牡丹皮紫金藤大黃滑

石紅花煎湯調番降香末白芨末與[illegible]
先用蘇合香丸却以黑神散和小烏沉湯[illegible]
調治　勞心吐血用[illegible]心[illegible]十粒糯米五十粒
[illegible]溫酒調服[illegible]　勞力太過吐血
不止蘇子降氣湯[illegible]阿膠用豬肝煮熟蘸
白芨末食之　吐血人不止松花散百花煎并
常服大阿膠丸[illegible]以伏龍肝二錢米飲調下
速止　或飲酒過後聞吐之時血從吐後出或
因喫辛熱[illegible]血之證名曰[illegible]宜大薊散

古方用紅棗燒存性百藥煎[illegible]等分爲末米飲
調服二錢　飲酒傷胃吐血理中湯加金[illegible]子
乾葛茅花　酒色過度饑飽吐血劫方枇杷葉
款冬花北紫苑杏仁鹿茸桑白皮木通大黃爲
末煉蜜丸噙化　內損吐血下血或飲酒太過
勞傷於內其血妄行出如涌泉口鼻皆流須臾
不救卽死用側柏葉[illegible]一兩半荊芥穗燒灰
人參各[illegible]一錢新汲水調
[illegible]　傷胃吐血因飲食太飽

之後胃中冷不能消化便煩悶強嘔吐使所食之物與氣共上衝蹴因傷裂胃口吐血色鮮正赤腹亦絞痛自汗其脉緊而數者爲難治也宜理中湯加川芎乾葛各半錢或只依理中本方加川芎扁荳尤好不必乾葛若渴甚用葛丸則白术丸　曹氏必用方云吐血須煎乾薑甘草作湯與服或四物理中湯亦可如此無不愈者若服生地黃竹茹藕汁去生便遠三因方云理中湯能止傷胃吐血以其方最理中脘分利陰

陽安定血脉按患人果身受寒氣口受冷物邪入血分血得冷而凝不歸經絡而妄行者其血必黯黑其色必白而夭其脉必微遲其身必清涼不用薑桂而用涼血之劑殆矣臨病之工宜審焉　有時或吐血兩口隨即無事數日又發經年累月不愈者宜黑神散和小烏沉湯常服　吐血人多發渴名爲血渴十全大補湯或量其人參五味子地黃麥門冬葛根枇杷葉量胃氣虛實用之　吐甚頭怖發爲寒熱者降氣

湯合四物湯各半貼加阿膠一錢若單發熱者茯苓補心湯　吐血之後有潮熱咳嗽脉洪大而數五至以上不可治也　金匱方心氣不足吐血衄血瀉心湯主之大黃二兩黃連黃芩各一兩水三升煮取一升頓服之此正謂心手少陰經之陰氣不足本經之陽亢甚無所輔肺肝俱受其火而病作以致陰血妄行而飛越故用大黃泄去亢甚之火黃芩救肺黃連救肝使之和平則陰血自復而歸經矣雲岐子加生地名

生地黃湯　又云吐血不止栢葉湯主之栢葉乾薑各　兩艾三把以水五升取馬通汁一升合煮取一升分溫再服凡吐血不已則氣血皆虛虛則生寒是故用栢葉栢葉生而西向乃稟兌金之氣而生可制肝木木主升金主降取其升降相配夫婦之道和則血得以歸藏於肝矣故用是爲君乾薑性熱止而不走用補虛寒之血艾葉之溫能入內而不炎於上可使陰陽之氣入歸於裏以補其寒用二味爲佐馬通者

為血生於心心屬午於是用午獸之通主降火消停血引領而行為使仲景治吐血唯此二方可以為準繩觸類而長之

欬嗽血

或問欬血止從肺出他無可言耶曰肺不獨欬血而亦唾血蓋肺主氣氣逆為欬腎主水水化液為唾腎脈上入肺循喉嚨挾舌本其支者從肺出絡心注胸中故二臟相連病則俱病於是皆有欬唾血也亦有可分別者涎唾中有少血散漫者此腎從相火炎上之血也若血如紅縷在痰中欬而出者此肺絡受熱傷之血也其病難已若欬白血必死白血淺紅色似肉似肺也

然肝亦唾血肝藏血肺藏氣肝血不藏亂氣自兩脇逆上唾而出之內經有血枯證先唾血為氣竭傷肝也　熱壅於肺能嗽血久嗽損肺亦能嗽血壅於肺者易治不過涼之而已損於肺者難治以其已成勞也熱嗽有血宜金沸草散加阿膠一錢痰盛加瓜蔞仁貝母勞嗽有血宜補肺湯加阿膠白芨一錢嗽血而氣急者補肺湯加阿膠杏仁桑白皮各一錢吞養正丹或三炒丹間進百花膏亦可用七傷散大阿膠丸

溪云欬血乃火升痰盛　身熱多是血虛　痰帶血絲出童便竹瀝止之　經血逆行或血腥吐血唾血韭汁服立効　韭汁童便合和隔湯頓熱磨鬱金濃汁盪勻服之其血自消　千金方治一切肺病欬唾唾膿血用好酥三十斤煉取凝當中醍醐服一合日三升卽止　薏苡仁十兩杵碎水三升煎取一升入酒少許服或以薏苡仁細末煮猪肺白蘸食之　上氣喘息欬嗽唾血咯血人參細末雞子清調三錢五更初

服便去枕仰臥忌酸醎酢醬麪等物及過醉飽　嗽咯血成勞眼睛疼四肢困倦脚膝無力五味子黃芪散　脉大發熱喉中痛是氣虛用參芪蜜炙黃栢荊芥地黃當歸韭汁童便少加薑汁磨鬱金飲之　嗽血久而成勞或勞病成而嗽血肌肉消瘦四肢倦怠五心煩熱咽乾頰赤心忪潮熱盜汗減食黃芪鼈甲散人參黃芪散
陰虛火動而嗽血者滋陰保肺湯　二三年間肺氣上喘咳嗽咯唾膿血滿面生瘡徧身黃

腫人參蛤蚧散　蛤蚧補肺勞虛喘有功治久嗽不愈肺間積虛熱久則成瘡故嗽出膿血曉夕不止喉中氣塞胸膈噎痛用蛤蚧阿膠生犀角鹿角膠羚羊角各一兩除膠外皆爲屑次入磁合同服任用河水二升於銀石器內慢火熬至半升濾去滓臨臥微溫細細呷之其查候服盡再挺都作一服以水三升煎至半升如前服　傷寒後肺欬唾膿血胸膈脹滿上氣羸瘦麥門冬湯　脉浮大皆作虛治用前虛勞條

諸補藥若浮大而上盛甚者雞蘇丸　脉沉滑有火者當用攻攻中有補　丹溪治台州林德芳年三十餘得咳而咯血發熱肌體漸瘦眾醫以補藥調治數年其證愈甚診其六脉皆濇此因好色而多怒精血耗少又因補塞藥太多榮衞不行瘀血內積肺氣壅遏不能下降治肝壅非吐不可精血耗少非補不可唯倒倉法二者俱備但使吐多於瀉耳兼灸肺俞五次而愈　脉沉數而欬者灸之必唾血嘔血而脉浮大

其不可又可知也　脉經云肺傷者其人勞
倦則欬血　血此為一項以人之其脉細緊浮數皆
唾血此為躁擾嗔怒得之肺傷氣壅所致此為一項
以□□□之　猪心一箇竹刀切開勿令相離
以沉香末一錢半夏七箇入在縫中紙裹蘸
小便內令濕煨熟取出去半夏只喫猪心此方
嗽血吐血均治　熱嗽咽疼痰帶血絲或痰中
多血其色鮮者並宜金沸草散若服涼藥不愈
其色瘀者此非熱證宜杏子湯　欬嗽甚而吐
血者鮮桑白皮一斤米泔浸三宿淨刮上黃皮
剉細入糯米四兩焙乾一處搗為末每服一二
錢米飲調下　久嗽咯血成肺痿又吐白涎胸
膈滿悶不食宜扁豆散　肺痿吐膿血甘桔加阿
膠紫菀湯　肺痿痰嗽痰中有紅線盜汗發熱
熱過即冷食減劫勞散薏苡仁一味方　欬
而胸滿心胸甲錯振寒脉數咽乾不渴時出濁
唾腥臭久久吐膿如粥者肺癰也然待吐膿而
後覺□□□□□□金云欬唾膿血其脉數

實者為肺癰若口中欬即胸中隱痛脉反滑數
此肺癰也更於本門細考之

咯血

咯血不嗽而咯出血也咯與唾少異唾出於氣上無所阻咯出於痰氣鬱於喉嚨之下滯不得出咯而乃出求其所屬之藏咯唾同出於腎也治咯血之方宜用□□使□□以瀉手足少陽三焦與膽所合之□火而薑汁爲佐用四物地黃牛膝薑以補□□安其血也 攖寧生卮言云咯血爲病最重且難治者以肺手太陰之經氣多血少又所主者金象爲清肅之藏金爲火所制

咯血 醫壘元戎 之二

迫而上行以爲咯血逆之甚矣上氣見血下聞病音謂喘而咯血且咳嗽也 初得病且宜白扁豆散去半夏加貝母入生地黃藕節丸作及濃磨京墨調黑神散小烏沉湯各一錢或新掘生地黃淨洗生薑少許搗汁去滓溫進又有以生薑一片四面蘸百草霜含嚥如百草霜已淡吐出再蘸如前已無味則吐出易之 勞瘵吐咯血七珍散加阿膠當歸各半錢惡甜人更加□□□□半錢作蜜鍊乳粉丸作一味□□

糯米飲調吐血嗽血亦治 因飽屈身傷肺吐咯血者白芨枇杷丸或白芨蓮鬚散 治咯血黃藥子漢防己各一兩爲末每服一錢匕水一盞小麥二十粒同煎食後溫服 白芨一兩藕節半兩爲末每一錢湯調服 新綿灰半錢酒調下 杏仁爲末熟煮豬胰切片蘸藥食後微空時取食之 青黛一錢杏仁四十粒去皮尖以黃蠟煎黃色取出研細二味同研勻却以□□黃蠟少許溶開和之捏作錢大餅子每服

咯血 醫壘元戎 之二

用乾柿一箇中破開入藥一餅合定以濕紙裹慢火煨熟取出糯米粥嚼下

溲血

痛者爲血淋不痛者爲溺血血淋別見淋門經云悲哀太甚則胞絡絕胞絡絕則陽氣內動發則心下崩數溲血也又云胞移熱於膀胱則癃溺血是溺血未有不本於熱者陳無擇以爲心腎氣結所致或有不思聖人之言循意博舉一而再十者也血雖主於心其四藏皆無血以爲養所尿之血豈尚於心腎氣結者哉若此類推之則五藏凡有損傷妄行之血皆得如心下崩者

滲於胞中五藏之熱皆得如膀胱之移熱傳於下焦何以言之肺金者腎水之母謂之連藏況恃之通調水道下輸膀胱者也肺有損傷妄行之血若氣逆上者既爲嘔血矣氣不逆者如之何不從水道下降入於胞中耶其熱亦直抵腎與膀胱可知也脾土者勝水之賊邪也水精不布則壅成濕熱濕熱必陷下傷於水道腎與膀胱俱受其害害則陰絡傷傷則血散入胞中矣肝屬陽主生化主疏泄主納血腎屬陰主[illegible]

而不固必滲入胞中正與內經所謂傷肝血枯症時時前後血者類也大抵溲血淋血便血三者雖以前後陰所出之竅血有不同然於受病則一也故治分標本亦一也其散血止血之藥無越於數十品之間惟引導佐使各走其鄉者少異耳　先與生料五苓散和四物湯若服藥不効其人素病於色者此屬虛證宜五苓散和膠艾湯吞鹿茸丸或八味地黃丸或鹿角膠丸或辰砂妙香散和五苓散吞二項丸子若小便

自清後有數點血者五苓散加赤芍藥一錢亦有如砂石而色紅却無石淋之痛亦屬虛證宜五苓散和膠艾湯或五苓散和辰砂妙香散吞鹿茸丸八味丸鹿角膠丸　乾膠炒爲末酒和服鹿角膠尤妙每服一二兩　髮灰二錢茅根車前草煎湯調下　當歸四兩酒二升煮取一升頓服　鏡面草自然汁加生蜜一匙服之以八正散加麥門冬葱煎服　小便澀痛藥內調海金砂末　夏枯草燒灰存性爲末米飲或涼

水調下。車前草自然汁數合空心服　實者可以調胃承氣湯加當歸下之　脉經云尺脉滑氣血實婦人經脉不利男子尿血宜服朴硝煎大黃湯下去經血針關元瀉之

咳而且溲血脫形其脉小勁是逆也　咳溲血形肉脫脉搏是逆也

下血　腸風　臟毒

血之在身有陰有陽陽者順氣而行循流脉中調和五臟灑陳六府如是者謂之榮血也陰者居於絡脉專守臟府滋養神氣濡潤筋骨若其感內外之邪傷則或循經之陽血至其傷處為邪氣所阻漏泄經外或居絡之陰血因著留之邪潰裂而出則皆滲入腸胃而泄矣世俗每見下血率以腸風名之不知風乃六淫中之一耳或風有從腸胃經脉而入客者或肝經風木之邪內乘於腸胃者則可謂之腸風若其他不因風邪而腸胃受火熱二淫與寒燥濕怫鬱其氣及飲食用力過度傷其陰絡之血者亦謂之腸風可乎許學士謂下清血色鮮者腸風也血濁而色黯者臟毒也肛門射如血線者蟲痔也亦有腸風挾濕者亦下如豆汁及紫黑瘀血不必盡鮮正當以久暫為別耳然要之皆俗名也世俗編書者或以濁血為腸風或分濁血與腸風為兩條乃一門中事也　先血而後便此近血也

由手陽明隨經下行滲入大腸傳於廣腸而下者也赤小荳當歸散主之　先便而後血此遠血也由足陽明隨經入胃淫溢而下者也黃土湯主之　下血腹中不痛謂之濕毒下血血色不鮮或紫黑或如豆汁黃連湯主之　下血腹中痛謂之熱毒下血血色鮮芍藥黃連湯主之

東垣治宿有腸血症因五月大熱喫杏腸澼下血遠三四尺散漫如篩腰沉沉然腹中不痛血色紫黑是陽明少陽經血證升麻補胃湯

太陰陽明腹痛大便常溏泄若不泄即秘而難見在後傳作濕熱毒下鮮紅血腹中微痛脇下急縮脉緩而洪弦中指下得之按之空虚和中益胃湯　腸澼下血另作一派其血唧出有力而遠射四散如篩下腹中大作痛乃陽明氣衝熱毒所作也升陽除濕和血湯

腸澼下血紅或深紫黑色腹中痛腹皮惡寒右三部脉中指下得之俱弦按之無力關脉甚緊肌表陽明分涼腹皮熱而喜熱物熨之內寒明矣益智和中湯　夫腸澼者爲水穀與血另作一派如唧桶涌出也夏濕熱太甚正當客氣盛而主氣弱故腸澼之病甚也以涼血地黃湯主之黃栢知母炒各一錢青皮炒槐子炒當歸熟地各五分水一盞煎七分溫服如小便澀臍下悶或大便前後重調木香檳榔細末各半錢稍熱於食前空心服如裏急後重又不去者當下之如腹中動搖有水聲而小便不調者停飲也診是何藏以去水飲藥瀉之假令脉洪大

用瀉火利小便之類是也如胃虛不能食而大渴不止不可用淡滲之藥止之乃胃中元氣少故也與七味白朮散補之如發熱惡熱煩躁大渴不止肌熱不欲近衣其脉洪大按之無力或無目痛鼻乾者非白虎湯證也此血虛發躁當以黃芪一兩當歸二錢㕮咀水煎服如大便秘塞或裏急後重數至圊而不能便或少有白膿或少有血慎勿利之利之則必致病重及鬱結不通以升陽除風湯升其陽則陰氣自降

矣　素問云結陰者便血一升再結二升三結三升駱龍吉云結陰之病陰氣内結不得外行血無所稟滲入腸間故便血也其脉虚澀者是也因血結不行入下有方有結陰丹羅謙甫治[illegible]飲酸酒[illegible]次傳泄瀉十餘日便後見血或紅或紫肚腹痛服涼藥如故仍不欲食食則嘔酸心下痞惡冷物口乾煩躁不得安臥其脉弦細而微遲手足稍冷以平胃地榆湯温中散寒除濕和胃數服病減大半又灸中脘二

七壯引胃氣上升次灸氣海百壯生發元氣灸則强食生肉又以還少丹服之至春再灸三里二七壯温脾壯胃生發元氣次服芳香之劑慎言語節飲食而愈　八物湯去生地黄甘草加官桂名胃風湯治風冷乘虚入客腸胃水穀不化泄瀉注下及腸胃濕毒下如豆汁或下瘀血日夜無度荅亦結陰之類也爲陰氣内結故去甘寒而加辛熱結者散之也　潔古云如下血防風爲上使黄連爲中使地榆爲下使　若血

瘀色紫者陳血也加熟地黄　若血鮮色紅者新血也加生地黄　若寒熱者加柴胡　若肌熱者加地骨皮　此證乃甲欺皮也風在胃口中焦濕盛不止濕既去盡而反生燥庚欺甲也本經[illegible]以甲勝戊虧庚爲母復[illegible]故經曰亢則害承乃制是反制勝己之化也若脉洪實痛甚者[illegible]加大黄　戴復菴以色鮮爲熱色瘀爲寒熱血連翹散寒血理物湯血色鮮紅者多因内蘊熱毒毒氣入腸胃或因飲酒過多及

啖糟藏炙煿引血入大腸故瀉鮮血宜連翹散吞黄連阿膠丸及香連丸或一味黄連煎飲大瀉不止者四物湯加黄連槐花仍取血見愁草少許生搗取汁和米飲服於血見愁草中加入側栢葉與生薑同搗汁尤好　有蠱毒入腸胃下血者一味黄連阿膠湯飲　腸風下血以香附末加百草霜米飲調服加入麝香少許其應尤捷　冷氣入客腸胃下瘀血理中湯不効宜黑神散米飲調下或用膠艾湯加米湯煎吞震

靈丹　顛撲內損惡血入腸胃下出濁物如淤
血者宜黑神散加老黃茄爲末酒調　酒積下
血不止糞後見用神麯一兩半白酒藥二丸同
爲末清水調捏作餅子慢火上炙黃爲細末每
服二錢白湯調下亦治泄瀉　海藏治梅師大
醉醒發渴飲水及冰茶後病便鮮紅先與吳茱
萸丸翌日又與平胃五苓各半散三大服血止
復自利又與神應丸四服自利乃止或問何不
用黃連之類以解毒曰若用寒藥其疾大變難

治寒飲內傷復用寒藥非其治也況血爲寒所
凝入大腸間而便下血溫之乃行所以得熱則
自止　脾生病因飲酪水及食生物下利紫黑
血十餘行脾胃受寒濕毒與六神平胃散半兩
加白术三錢以利腰臍間血一服愈以擇守生
[illegible]腸風則足陽明積熱久而爲風風有以
動之也臟毒則足太陰積熱久而生濕從而下
流也風則陽受之濕則陰受之戴氏要式云[illegible]
[illegible]總[illegible]氣久而始見腸風者邪氣外入隨

臧蹉見三因方五痔臟毒腸風之辯[illegible]臟毒
腸風之血出於腸藏間五痔之血出於[illegible]
孔邊治各不同[illegible]
[illegible]腸風臟毒不拘糞前糞後並
[illegible]發散下酒蒸黃連丸或枳殼散
下[illegible]乃因登廁糞中有血却與瀉血不
同[illegible]湯和黑神散米飲調下血色清
鮮[illegible]以厚朴煨炙研細米飲調服宜減桂五苓
散[illegible]花[illegible]錢吞荊梅花丸仍以側栢葉同蘿

搗爛令水解下侵些米飲作如血色淡濁者胃
風湯吞[illegible]連丸或烏荊丸或棕灰散仍以米飲
調香附末或三灰散　腸風腹中有痛下清血
[illegible]解毒湯[illegible]風邪甚者肛門腫疼敗毒散加
[illegible]或槐花湯枳殼散　臟毒腹內略疼
濁血[illegible]紅[illegible]或肛門腫脹或大腸頭突
出大[illegible]以[illegible]刺之出惡血膿
[illegible]用人虛兼以參
[illegible]腸風[illegible]宜生銀

各四十九箇去殼股爛研入百藥煎末丸如梧
子大每服三丸空心細嚼米飲下　下血久而
面萎黃漸成虛憊下元衰弱宜黃芪四君子湯
下斷紅丸或十全大補湯或黃芪飲　[illegible]
[illegible]下血如雞肝如爛肉其證噤水沉心腹
絞痛者是也治之方　馬蔺根末水服方寸匕隨
吐則出　[illegible]新[illegible]蓆安病人席下勿令病人
知覺自呼蠱主姓名　蚯蚓十四枚以苦酒三
升漬之服其汁　蝟毛燒末水服方寸匕亦吐

苦瓠一枚水二升煮取一升服吐　或用苦酒一
升煮瓠令消服之
[illegible]腎脈小搏沉為腸澼下血血溫身熱者死
[illegible]血[illegible]精身熱色夭然及酒後下血血篤重
[illegible]也　心肝澼亦下血二藏同病者可治其
脈小沉濇為腸澼其身熱者死熱見七日死
腸澼[illegible]則生[illegible]寒則生　脈懸絕則死滑大則生
腸澼下膿血脈沉小留連者生數疾且大有熱者死　腹
脹復絕脈大而絕是逆也如此者不及一時而

死矣　[illegible]於熱於脾傳為虛腸澼死不治　脾
脈外鼓沉為腸澼久自已　肝脈小緩為腸澼
易治

夫人飲食起居一失其宜皆能使血瘀滯不行故百病由污血者多而醫者分別病症在上氣而無蓄血乎故醫者之辨血蓄血上焦 心下手不可近蓄血中焦 臍腹小腹下手有血下焦 三焦蓄血脉俱在左手中 有血上焦活人犀角地黃湯 蓄血中焦仲景桃仁承氣湯 蓄血下焦仲景抵當湯韓氏地黃湯生漆湯 海藏云蓄血可用仲景抵當湯丸恐庸醫

不知藥性用之太過有不止損血之候其最虛人之禁也故立生地黃湯蘇蟲木蛭大黃桃仁內加生地黃乾漆生藕藍葉之輩也 又云生漆湯一方亦恐抵當湯丸下之太過也是以知乾漆為破血之劑比之抵當湯則輕用之通則重用之破積治食則重也食藥內乾漆硇砂非氣實不可用也 如牙齒等蝕數年不愈當作陽明蓄血治之以桃仁承氣湯細末煉蜜丸如桐子大服之好飲者多有此疾屢服有効 [illegible]

高墜下重物撞打箭鏃刃傷心腹胸中停積鬱血不散以上中下三焦部分分之以易老犀角地黃湯桃仁承氣湯抵當湯丸之類下之亦有以小便同酒煎治之者更有內加生地黃當歸煎服者亦有加大黃者 又法虛人不禁下之者以四物湯加穿山甲煎服妙亦有用花蕊石散以童子小便煎服或酒調下 此藥與寒藥正分陰陽不可不辨也

證治準繩第四冊目錄

諸痛門
頭痛 偏頭風 雷頭風 真頭痛 大頭痛 眉稜骨痛 頭風屑 頭重 頭搖
面痛 頸項強痛
心痛胃脘痛 胸痛
腹痛 少腹痛 脇痛
腰痛 腎著 腰胯痛 脊痛脊強
肩背痛 臂痛
身體痛 身體拘急
痿痺門
痺 行痺 即走注疼痛
痛痺 即痛風 著痺 即麻木
痿 痿厥
脚氣

證治準繩第四冊

金壇王肯堂輯

頭痛 偏頭風 雷頭風 真頭痛 大頭痛 眉稜骨痛 頭風屑 頭重 頭搖

醫書多分頭痛頭風爲二門然一病也但有新久去留之分耳淺而近者名頭痛其痛卒然而至易於解散速安也深而遠者爲頭風其痛作止不常愈後遇觸復發也皆當驗其邪所從來而治之 世俗治頭痛不從風則從寒安知其有不一之邪乎試考內經論頭痛所因以明之如風從外入振寒汗出頭痛新沐中風爲首風當先風一日則病甚頭痛不可以出內大寒內至骨髓髓以腦爲主腦逆故頭痛齒亦痛少陽司天之政初之氣風勝乃搖候乃大溫其病氣怫於上頭痛二之氣火反鬱白埃四起其病熱鬱於上頭痛少陽司天火淫所勝民病頭痛發熱惡寒如瘧歲金不及炎火乃行復則陰厥且格陽反上行頭腦戶痛延及腦頂發熱太陽之勝熱反上行頭項囟頂腦戶中痛目如脫太陽之復心

痛痞滿頭痛太陰司天濕淫所勝腰脊頭項痛
時眩太陰在泉濕淫所勝病衝頭痛目似脫項
似拔太陰之復頭頂痛重而掉瘛尤甚少陽之
復欬噦煩心病在膈中頭痛傷寒一日巨陽受
之頭項痛腰脊强靈樞論風痺股脛爍足如履
氷時如入湯煩心頭痛時眩悲恐短氣不出三
年死凡此皆六氣相侵與清陽之眞氣相薄而
痛者也至於頭痛甚則腦盡痛手足寒至節死
頭痛巔病下虛上實注以腎虛不能引膀胱之

氣故爾心煩頭痛耳鳴九竅不利腸胃之所生
心熱病者卒心痛煩悶頭痛面赤刺手少陰太
陽肺熱病者頭痛不堪汗出而寒刺手太陰陽
明脾熱病者項痛員員澹澹然刺足少陰太陽
靈樞謂厥頭痛面若腫起而煩心取足陽明太
陰厥頭痛頭脈痛心悲善泣取血與厥陰厥頭
痛貞貞頭重而痛取手足少陰厥頭痛意善忘
按之不得取頭面左右動脈後取足太陰厥頭
痛項先痛腰脊爲應先取天柱後取足太陽厥

頭痛頭痛甚耳前後脈湧有熱瀉出其血後取
足少陽頭項痛不可取於腧者有所擊墮惡血在
於內若肉傷痛未已可側取不可遠取也頭痛
不可刺者大痺爲惡日作者可令少愈不可已
頭半寒痛先取手少陽陽明後取足少陽陽明
膀胱足太陽所生病頭囟項腦戶中痛膽足少
陽所生病頭痛凡此皆臟府經脈之氣逆亂
於頭之清道致其不得運行壅遏經隧而痛者
也蓋頭象天三陽六府清陽之氣皆會於此三

陰五藏精華之血亦皆注於此於是天氣所發
六淫之邪人氣所變五賊之逆皆能相害或蔽
覆其清明或瘀塞其經絡因與其氣相薄鬱而
成熱則脈滿滿則痛若邪氣稽留則脈亦滿而
氣血亂故痛甚是痛皆爲實也若寒濕所侵雖
眞氣虛不與相薄成熱然其邪客於脈外則血
泣脈寒寒則脈縮卷緊急外引小絡而痛得溫
則痛止是痛爲虛也如因風木痛者則抽掣惡
風或有汗而痛因暑熱痛者或有汗或無汗則

皆惡熱而痛因濕而痛者則頭重而痛遇天陰尤甚因痰飲而痛者亦頭昏重而痛憒憒欲吐因寒而痛者絀急惡寒而痛各與本藏所傷風寒濕熱之氣兼為之狀而痛更有氣虛而痛者遇勞則痛甚其脉大有血虛而痛者善驚惕其脉芤用是者分之更兼所見證察之無不得之矣　東垣曰金匱真言論云東風生於春病在肝俞在頸項故春氣者病在頭又諸陽會於頭面如足太陽膀胱之脉起於目內眥上額交巔直入絡腦還出別下項病則衝頭痛又足少陽膽之脉起於目銳眥上抵頭角病則頭角額痛夫風從上受之風寒傷上邪從外入客經絡令人振寒頭痛身重惡寒治在風池風府調其陰陽不足則補有餘則瀉汗之則愈此傷寒頭痛也頭痛耳鳴九竅不利者腸胃之所生乃氣虛頭痛也如氣上不下頭痛巔疾者下虛上實也過在足少陰巨陽甚則入腎寒濕頭痛也有厥逆頭痛者所犯大寒內至骨髓髓以腦為主

腦逆故令頭痛齒亦痛有心煩頭痛者病在膈中過在手巨陽少陰乃濕熱頭痛也　凡頭痛皆以風藥治之者總其大體而言之也高巔之上惟風可到故味之薄者陰中之陽自地升天者也然亦有三陰三陽之異　太陽經頭痛惡風寒脉浮緊用羌獨活之類為主　少陽經頭痛脉弦細往來寒熱用柴胡黃芩主之　陽明經頭痛自汗發熱不惡寒脉浮緩長實者升麻葛根石膏白芷主之　太陰經頭痛必有痰體重或腹痛為痰癖脉沉緩者蒼朮半夏南星主之　少陰經頭痛三陰三陽經不流行而足寒氣逆為寒厥其脉沉細麻黃附子細辛湯主之　厥陰經頭項痛或吐痰沫冷厥其脉浮緩吳茱萸湯主之　三陽頭痛藥羌活防風荊芥升麻葛根白芷柴胡川芎芍藥細辛葱白連鬚　陰證頭痛只用溫中藥如理中薑附之類　風濕熱頭痛上壅損目及腦痛偏正頭痛年深不愈並以清空膏主之如苦頭痛每料中加細辛

二錢如太陰脉緩有痰名曰痰厥頭痛去羌活防風川芎甘草加半夏一兩半如偏頭痛服之不愈減羌活防風川芎一半加柴胡一倍如發熱惡熱而渴此陽明頭痛只與白虎湯加白芷東垣云東垣清空膏諸般頭痛皆治惟血虛頭痛從魚尾相連痛者不治又云治少陽頭痛如痛在太陽厥陰者勿用蓋謂巔頂痛也　頭旋眼黑頭痛宜安神散川芎散　熱厥頭痛雖嚴寒猶喜風寒微來暖處或見煙火其痛復作宜清上瀉火湯後用補氣湯　風熱頭疼石膏散荊芥散　冬月大寒犯腦令人腦痛齒亦痛名曰厥逆出奇病論中宜羌活附子湯　頭痛胸中痛食減少咽嗌不利寒冷脉左寸弦急宜麻黃吳茱萸湯　濕熱在頭而頭痛者必以苦吐之輕者用透頂散搐鼻取涎　新沐中風為首風頭面多汗惡風當先風一日則痛甚至其風日則少愈大川芎丸主之　風氣循風府而上則為腦風項背怯寒腦戶極冷神聖散主之　凡治頭痛皆用芎芷羌防等辛溫氣味藥升散者由風木虛不能升

頭痛　六

散而土寒於是得以壅塞而痛故用此助[illegible]散其壅塞也若風熱於頭太過而痛服辛散藥反甚者則宜用酸澀收而降之乃愈乳香盞落散之類是也綱目　頭痛耳鳴九竅不利腸胃之所生東垣以為此氣虛頭痛也用人參黃芪主之　羅謙甫治柏參謀六十一歲先患頭昏悶微痛醫作傷寒解之汗出後痛轉加復汗解痛轉加而頭愈痛每召醫用藥當同到今痛甚不得安卧惡風寒不喜飲食脉弦細而微氣短促懶言語經曰春氣病在頭今年高氣弱清氣不能上升頭面故昏悶此病本無表邪因發汗數四清陽之氣愈虧損不能上榮亦不能外固所以頭痛甚宜升陽補氣頭痛自愈製順氣和中湯經曰陽氣者衛外而為固也誤汗之衛外之氣損故黃芪甘溫補衛實表為君人參甘溫補氣當歸辛溫補血芍藥味酸收衛氣為臣白朮陳皮炙甘草苦甘溫養衛氣生發陽氣上實皮毛肤腠為佐柴胡升麻苦辛引少陽陽明之

頭痛　七

氣上升通百脉灌溉周身者也川芎蔓荆子細
辛辛温體輕浮清利空竅為使一服減半再服
全愈　血虚頭痛自魚尾（眉尖後近髮際曰魚尾）上攻頭
痛當歸川芎主之　當歸一兩酒一升煮取六
合飲至醉効　當歸川芎連翹熟苄各二錢水
煎去查入龍腦薄荷末二錢乘沸泡之鼻吸其
氣候温即服服即安卧効　氣血俱虚頭痛者
於調中益氣湯加川芎蔓荆子細辛其効如神
痰厥頭痛眼黑頭旋惡心煩亂半夏白术天

麻湯主之痰厥頭痛非半夏不能療眼黑頭旋
風虚内作非天麻不能解天麻苗謂之定風草
獨不為風所搖以治内風之神藥内風者虚風
是也黄芪甘温瀉火補元氣實表虚止自汗人
參甘温調中補氣瀉火二术甘温除濕補中益
氣澤瀉茯苓利小便導濕橘皮苦温益氣調中
而升陽炒麯消食蕩胃中滯氣麥芽寬中助胃
氣乾薑辛熱以滌中寒黄蘗苦寒用酒洗以療
冬月少火在泉而發躁也　東垣北方頭痛

每發時兩頰青黄眩運目不欲開嬾於言語身
體沉重兀兀欲吐數日方過潔古老人曰此厥
陰太陰合而為病名曰風痰宜以局方玉壺丸
治之可加雄黄白术以治風濕更有水煮金花
丸灸侠溪二穴各二七壯不旬日愈　鼻齅腹
臚頭痛病在胃經云陽明所謂客孫脉則頭痛
鼻齅腹腫者陽明并於上上者則其孫絡太陰
也故頭痛鼻齅腹腫也　動作頭重痛熱氣潮
者屬胃　丹溪云頭痛如破酒炒大黄半兩茶

煎服　樓全善云病在胃而頭痛者必下之方
愈也如孫兆以利膈藥下張學士傷食頭痛郭
茂恂以黑龍丹下其嫂產後污血頭痛皆下咽
即安是也　心煩頭痛病在膈中過在手巨陽
少陰乃東垣清空膏之類治之　頭痛巔病下虚
上實過在足少陰巨陽甚則入腎許學士謂之
腎厥頭痛其脉舉之則弦按之則堅用玉真
丸治之或灸後用正元散或大三五七散入鹽
湯服或於正元散内入炒椒十五粒下來復丹

聞進黑錫丹有服諸藥不効其痛愈甚宜茸珠丹 素問曰頭痛巔疾下虛上實過在足少陰巨陽甚則入腎徇蒙招尤目瞑耳聾 下實上虛過在足少陽厥陰甚則入肝下虛者腎虛也故腎虛則頭痛上虛者肝虛也故肝虛則頭暈徇蒙者如以物蒙其首招搖不定目眩耳聾皆暈之狀也故肝厥頭暈腎厥巔痛不同如此肝厥宜鈎藤散 傷食頭痛胸膈痞塞咽酸噫敗卵臭畏食雖發熱而身不痛宜治中湯加砂仁一

錢或紅丸子 傷酒頭痛惡心嘔吐出宿酒昏冒眩暈宜葛花解酲湯 怒氣傷肝及肝氣不順上衝於腦令人頭痛宜沉香降氣散并蘇子降氣湯下養正丹 上熱頭目赤腫而痛胸膈煩悶不得安卧身半已下皆寒足𩩲尤甚大便微秘宜既濟解毒湯 外有臭毒頭痛一味吃炒香附愈 頭痛連腦痛石膏荊芥子炒為末茶清食前調下 頭風搐鼻白芷散川芎散如金散火鬱神妙散火鬱散藥各卷

偏頭風 頭半邊痛者是也丹溪云有痰者多 右左屬風荊芥薄荷 左屬血虛川芎當歸 右屬痰蒼术半夏 右屬熱黃芩 川芎散 細辛散 并捻猪膽搐鼻中 蓖麻子半兩去皮大棗十五枚去核右共搗令熟塗紙上用筯一隻捲之去筯納鼻中良久取下清涕即止 生蘿蔔汁仰卧注鼻中左痛注右右痛注左 一婦人患偏頭痛一邊鼻塞不聞香臭常流清涕時作臭氣服偏治頭痛藥如芎蝎等皆不効後

一醫人教服局方芎犀丸不十數服忽作嚏突出一餅稠膿其疾遂愈

雷頭風 頭痛而起核塊者是也或云頭如雷之鳴也為風邪所客風動則作聲也 夫治雷頭風諸藥不効者證與藥不相對也夫雷者震也震仰盂故東垣製藥用荷葉者象震之形其色又青乃述類象形當煎荷方中升麻湯主之名曰清震湯 張子和用茶調散吐之次用神芎丸下之然後服烏丸及愈風餅子之類衰者

用涼膈散消風散熱　頭上赤腫結核或如瘢
疹狀用排針出血則愈　亦有因痰火者痰生
熱熱生風故也痰火上升壅於氣道兼乎風化
則自然有聲轟如雷鳴頭面加之雷聲故名雷頭風
也用半夏一兩薑汁浸　大黃二兩酒浸透濕紙包煨再浸再煨三次
白殭蠶連翹橘紅桔梗天麻各五錢　片芩七錢酒炒　薄
荷葉三錢　白芷青礞石粉草各一錢　末之水浸蒸餅
丸如菉豆大食後臨卧茶吞二錢以痰利為度
然後用清痰降火煎藥調理

真頭痛　天門真痛上引泥丸夕發旦死旦發夕
死為腦為髓海真氣之所聚卒不受邪受邪則
死不可治古方云與黑錫丹灸百會猛進參沉
烏附或可生然天柱折者亦難為力矣

大頭瘟　頭腫大如斗是也是天行時疫病　東
垣監濟源稅時長夏多疫癘初覺憎寒體重次
傳面目腫盛目不能開上喘咽喉不利舌乾口
燥俗云大頭天行親戚不相訪問如染之多不
救張縣丞亦患此醫以承氣湯加藍根下之稍
緩與日其病如故下之又緩終莫能愈漸至危
篤東垣診視具說其由曰夫身半已上天之氣
也身半已下地之氣也此雖邪熱客於心肺之
間上攻頭目為腫盛以承氣下之瀉胃中之實
熱是誅罰無過殊不知適其病所為故遂處方
用黃連黃芩味苦寒瀉心肺間熱以為君橘紅
玄參苦寒生甘草甘寒瀉火補氣以為臣連翹
鼠粘子薄荷葉苦辛平板藍根味甘寒馬屁勃
白殭蠶味苦平散腫消毒定喘以為佐新升麻

柴胡苦平行少陽陽明二經不得伸桔梗味辛
溫為舟楫不令下行共為細末用湯調時時服
之拌蜜為丸噙化服盡良愈乃施其方全活甚
眾名普濟消毒飲子　海藏云大頭病者雖在
身半已上熱伏於經以感天地四時非節瘟疫
之氣所着以成此疾至於潰裂膿出而又染他
人所以謂之疫癘也大抵足陽明邪熱太甚實
資少陽相火為之熾多在少陽或在陽明甚則
逆傳太陽視其腫勢在何部分隨其經而取之濕熱

爲腫木盛爲痛此邪發於首多在兩耳前後所
先見出者爲主爲根治之宜早藥不宜速恐過
其病所謂上熱未除中寒已作有傷人命矣此
疾是自外而之內者是爲血病況頭部分受邪
見於無形之迹至高之分當先緩而後急先緩
者謂邪氣在上着無形之部分既着無形所傳
無定若用重劑大瀉之則其邪不去反過其病
矣雖用緩藥若又急服之或食前或頓服咸失
緩體則藥不能除病矣當徐徐漬無形之邪或

頭痛　一百

藥性味形體據象服餌皆須不離緩體及寒藥
或酒炒浸之類皆是也後急者謂前緩劑已經
高分爲邪氣入於中是到陰部染於有形質之
所[illegible]不速去反損陰也此却爲客邪當急去之
是治客以急也且治主當緩者謂陽邪在上陰
邪在下各爲本家病也若急治之不惟不能解
其紛而反致其亂矣此所以治主當緩也治客
當急者謂陽分受陰邪陰分受陽邪主也陰分
之[illegible]邪[illegible]分受陽邪客也凡所謂客者當急去

之此治客以急也　假令少陽陽明之爲病少
陽爲邪者出於耳前後也陽明者首面大腫也
先以黃芩黃連甘草通炒過剉煎少少不住服
呷之或服後再用大黃或酒浸或煨又以鼠粘
子新瓦上炒香㕮咀煎去查內芒硝各等分亦
細細呷之食後用徐得微利及邪氣已只服
前藥如不已再服後藥依前次第用之取大便
利邪已即止如陽明渴者加石膏少陽渴者加
瓜蔞根湯陽明行經加升麻葛根芍藥之類太

[illegible]　十二

陽行經加羌活防風荊芥之類選而加之並與
上藥均合不可獨用散也　黑白散　甘桔湯
加鼠粘子連翹大黃玄明粉白殭蠶荊芥　殭
蠶一兩錦紋大黃二兩薑汁丸彈子大新汲泉
水和生薑調服　外用井底泥調大黃芒硝末
敷之

眉稜骨痛眉骨者目系之所過上抵於腦爲目
系於腦也若因風熱或挾外邪鬱成風熱毒上
攻於頭腦下注於目睛遂從目系過眉骨相併

而痛若心肝壅熱上攻目睛而痛與[illegible]目系與
眉骨牽連併痛若胸膈風痰上攻者亦然若太
陰之[illegible]濕氣內鬱寒迫下焦痛留項[illegible]引眉間
其[illegible]有[illegible]製者有重者有昏悶者使可
審是[illegible]也 [illegible]選奇湯治眉骨痛不
可忍[illegible] 丹溪[illegible]風熱與痰治類頭風風
熱者[illegible]祛風清上散因痰者二陳湯加酒黃芩
白芷因風寒者[illegible]散 戴云眼眶痛有二證
皆屬肝 有肝虛而痛纔見光明則眼眶骨痛

甚宜生熟地黃丸 有肝經停飲發則眉稜骨
痛不可[illegible]夜劇宜導痰湯或小芎辛湯加
半[illegible]紅[illegible]白茯苓
[illegible] 羅謙甫云肝經風盛木自搖動尚書
[illegible]木[illegible]六物壯則老故木陵脾土金來
[illegible]為脾復仇也使梳頭有雪皮見肺
[illegible]也天[illegible]清肺丸[illegible]之虛者人
[illegible] 養荊[illegible]丸治頭多白屑每
[illegible] 按上治法必有[illegible]

熱上攻頭目眩痛諸證而後用之若止是眉
但宜[illegible]之偏外治而已
[illegible]人之濕淫外着[illegible]人之
濕[illegible]之陰氣逆於上也皆得而
頭重[illegible]氣於人其氣極清[illegible]濁
地者[illegible]外有內蒸必致清道致
氣血[illegible]脈絡故[illegible]內經曰陽氣
者因[illegible]是外濕蔽者者也又曰脾熱
病者[illegible]引其熱上於頭也太陰之

復[illegible]內逆太陽上留而重痛附中
[illegible]濕氣內鬱亦頭重[illegible]湯之
[illegible]發[illegible]名曰
[illegible]頭上下當有[illegible]在右別走太
[illegible]之[illegible]之所別
[illegible]頭重[illegible]由此濕氣在頭也紅豆散
[illegible]連翹各[illegible] 紅豆半錢
[illegible]所濕藥則過病所誅罰無
[illegible]之[illegible]在高巔之上必射而取之

也　丹溪云壯實人氣實有痰或頭痛或眩暈
大黃酒炒三次爲末茶調服
眩暈者　風也火也　風主動會之於前乃爲
搖　肝經目徇蒙招尤目瞑耳聾下實上虛過
在足少陽厥陰　甚則頭眩蒙目不明招掉搖
不寧尤甚也目　不明首掉尤甚又太陰之
復頭項痛重掉搖尤甚　濕氣內逆太陽上
留胸中而掉眩　督脉之別表強虛則
頭重高搖之　然病機有謂諸風掉眩皆屬肝木

夫頭之巔足太陽之所過督脉與厥陰之所會
是故三經所逆之火留聚於此者皆從風木而
爲掉搖也張仲景又言心絕者亦直視搖頭也
【脉】　寸口之脉中手短者曰頭痛　推而下之
下而不上頭項痛　寸口緊急或短或弦或浮
皆頭痛　浮滑爲風痰易治　短濇難治　浮
緊爲太陽　弦細少陽　浮緩長陽明　沉緩
太陰　沉細少陰　浮緩厥陰　浮弦爲風
浮洪爲火　右寸滑或大或弦而有力皆痰火

積熱　細或緩兼體重者濕　左脉不足血虛
右脉不足氣虛　左右俱不足氣血俱虛　寸
右寸緊盛食積　右關洪大爲胃熱上攻
口弦細爲內有風涎冷痰或濕　沉細爲
陰虛作寒而頭痛身不熱也　又頭痛目痛久
視無所見者死　病苦頭痛目痛脉急短濇死

子139-220

面痛

面痛皆屬火盖諸陽之會皆在於面而火陽類也心者生之本神之變其華在面而心君火也暴痛多實久痛多虛高者抑之鬱者開之血熱者涼血氣虛者補氣不可專以苦寒瀉火爲事

許學士醫檢正患鼻頞間痛或麻痺不仁如是數年忽一日連口唇頰車髮際皆痛不開口言語飲食皆妨在頞與頰上常如糊手觸之則痛此足陽明經絡受風毒傳入經絡血凝滯而

不行故有此證或以排風小續命透髓丹之類與之皆不效製犀角升麻湯贈之數日愈夫足陽明胃也經云腸胃爲市又云陽明多血多氣胃之中腥羶五味無所不納如市廛無所不有也以其腠熟飲食之毒聚於胃此方以犀角爲主解飲食之毒也陽明經脉環唇挾舌起於鼻合頞中循頰車上耳前過客主人循髮際至額顱今所患皆一經絡也故以升麻佐之餘藥皆滌除風熱升麻黃芩專入胃經 老朋有一人

年累歲患頰車痛每多言傷氣不寐傷血則大發發之劇則上連頭下至喉内及牙齦皆如針刺火灼不可手觸乃至口不得開言語飲食並廢自覺火光如閃電尋常涎唾稠粘如絲不斷每勞[illegible]甚得卧與食則稍安知其虛也始以清胃[illegible]角升麻湯人參白虎湯[illegible]湯加芎[illegible]皆不效後改用[illegible]代白术芎歸升柴甘[illegible]之類稍佐以芩梔[illegible]連翹黍粘空腹進之而食遠則服加減甘露飲於[illegible]安第老人性

躁不耐閒勞與多言時有之不能除去病根然發亦稀少[illegible]亦不如往歲之劇矣 從子鍇因[illegible]多[illegible]鹿角膠諸種子藥或於食後臨[illegible]以[illegible]積成胃熱遂患[illegible]如老[illegible]服[illegible]散甘露飲大加[illegible]而見虛[illegible]又服[illegible]當而後見火證門人施[illegible]以[illegible]加[illegible]屬[illegible]其鬱結而始[illegible]安 [illegible]門今[illegible]且其最[illegible]條[illegible]不可執[illegible]之人

以盡是病也

頸項强痛

經云東風生於春病在肝腧在頸項　諸痓項强皆屬於濕　缺盆之中任脉也名曰天突　一次任脉側之動脉足陽明也名曰人迎　二次脉手陽明也名曰扶突　三次脉手太陽也名曰天牕　四次脉足少陽也名曰天容　五次脉手少陽也名曰天牖　六次脉足太陽也名曰天柱（挾項大筋中）　七次脉頸中央之脉督脉也名曰風府　足陽明挾喉之動脉也其腧在膺中　手陽明次在其腧外不至曲頰一寸　太陽當曲頰　足少陽在耳下曲頰之後　手少陽出耳後上加完骨之上　足太陽挾項大筋之中　然則頸項强急之證多由邪客三陽經也寒搏則筋急風搏則筋弛左多屬血右多屬痰　頸項强急發熱惡寒脉浮而緊此風寒客三陽經也宜驅邪湯

頸項强急動則微痛脉弦而數實右爲甚作痰

熱客三陽經治宜消風豁痰湯　頸項强急腰
則微痛脉弦而濇左爲甚作血虛邪客太陽陽
明經治宜疎風滋血湯　頸項强急寒熱往來
或嘔吐或脇痛宜小柴胡湯升麻防荆湯　頸
項强急腰似折項似拔加味勝濕湯　精神短
少不得睡項筋脇急難伸禁甘温宜苦寒養神
湯主之　本事方椒附散治腎氣上攻項背不
能轉側於[illegible]爲宜　丹溪治一男子項强
不能回顧動則微痛其脉弦而數實右手爲甚

作痰客太陽經治之用二陳湯加酒洗黄芩羌
活紅花服後二日愈　許學士治一人患筋急
項不得轉側自午後發至黄昏時定此患必從
足起經言十二經絡各有筋惟足太陽之筋自
足至項大抵筋者肝之合也日中至黄昏天之
陽陽中之陰也又曰陽中之陰肺也自離至兑
陰旺陽弱之時故靈寶畢法云離至乾腎氣絶
而肝氣弱肝腎二藏受陰氣故發於是時授以
木瓜煎方三服而愈　戴云頸痛非[illegible]

是氣挫亦有落枕而成痛者並宜和氣飲食後
服　[illegible]人多有挫閃及久坐失枕而致項强不
可[illegible]腎虚不能生肝肝虚無以養筋
故[illegible]宜六味地黄丸常服　内經刺灸
[illegible]其一取足手太陽治項後痛經
云足[illegible]脉是動則病項如拔視虚盛寒熱
陷下取之又云項痛不可俛仰刺足太陽不可
以顧刺手太陽又云大風項頸痛刺風府風府
在上椎又云邪客於足太陽之絡令人頭項肩

痛刺足小指爪甲上與肉交者各一痏立已不
已刺外踝下三痏左取右右取左如食頃是
也[illegible]取足手陽明治項前痛經云足陽明
之脉[illegible]手陽明之脉是動則
病[illegible]陷下取之也

心痛胃脘痛附心脾

或問丹溪言心痛即胃脘痛然乎曰心與胃各一藏其病形不同因胃脘痛處在心下故有當心而痛之名豈胃脘痛即心痛者哉歷代方論將二者混同敘於一門誤自此始蓋心之藏君火也是神靈之舍與手少陰之正經邪皆不得而傷其受傷者乃手心主包絡也如包絡引邪入於心之正經藏而痛者則謂之真心痛必死不可治夫心統性情始由怵惕思慮則傷神神

傷藏乃應而心虛矣心虛則邪干之故手心主包絡受其邪而痛也心主諸陽又主血是以因邪而陽氣鬱伏過於熱者痛陽氣不及惟邪勝之者亦痛血因邪泣在絡而不行者痛血因邪勝而虛者亦痛然方論雖有九種心痛曰飲曰食曰風曰冷曰熱曰悸曰蟲曰疰曰去來其因固多終不得聖人之旨豈復識六淫五邪不一之因哉且五藏六府任督支脈絡於心藏府經脈挾其淫氣自支脈乘於心而爲痛者必有府

藏病形與之相應而痛如靈樞謂厥心痛與背相控善瘛如從後觸其心傴僂者腎心痛也厥心痛腹脹胸滿心尤痛甚胃心痛也厥心痛痛如以錐針刺其心心痛甚者脾心痛也厥心痛色蒼蒼如死狀終日不得太息肝心痛也厥心痛臥若徒居心痛間動作痛益甚色不變肺心痛也更以陽明有餘上歸於心滑則病心疝又心痛引少腹滿上下無定處溲便難者取足厥陰心痛腹脹嗇然大便不利取足太陰心痛短

氣不足以息取手太陰心痛引背不得息刺足少陰不已取手少陽與夫內經於六氣五運司上下勝復淫邪應藏氣盛衰而相乘者亦必有諸淫氣之病狀與心而痛是故苟不能徧識諸藏府所從來之病因將何以施治哉胃脘痛亦如心痛有不一之因蓋胃之真濕土也位居中焦稟沖和之氣多氣多血是水穀之海爲三陽之總司五藏六府十二經脈皆受氣於此是以足之六經自下而上凡壯則氣行而已胃脘弱

則蓄而成病其沖和之氣[illegible]之
木穀不消停留水飲食積[illegible]
木之相乘者尤甚胃脘當心而痛上支兩脇裏
急飲食不下膈咽不通食則嘔食痺者謂食已
心下痛吐出乃止又腎氣上逆者次之逆則寒
厥入胃亦痛矣如是胃脘之受邪非止其自病
者多然胃脘逼近於心移其邪上攻於心爲心
痛者亦多若夫心痛之病形如前所云者則詳
矣今欲分胃脘不一病因之狀當何如曰胃之

濕上干乎居故胃病者或滿或脹或食不下或
嘔吐或吞酸或大便難或瀉利面色浮而黃者
皆是胃之本病也其有六淫五邪相乘於胃者
大率與前所列心痛之形狀相類但其間必與
胃本病參雜而見之也　活法機要云諸心痛
者皆少陰厥陰氣上衝也有熱厥心痛者身熱
足寒痛甚則煩躁而吐額自汗出知其爲熱也
其脉浮大而洪當灸太谿及崑崙謂表裏俱瀉
之是謂熱病汗不出引熱下行表汗通身而出

者愈也灸畢服金鈴子散則愈痛止服枳朮丸
去其餘邪也有大實心中痛者因氣而食卒然
發痛大便或秘久而注悶心胸高起按之愈痛
不能飲食急以煮黃丸利之利後以藁本湯去
其邪也有寒厥心痛者手足厥逆而通身冷汗
出便溺清利或大便利而不渴氣微力弱急以
朮附湯溫之寒厥暴痛非久病也朝發暮死急
當救之是知久病無寒暴病非熱也　丹溪云
凡心脾痛須分新久若明知身受寒氣口喫寒

物而得者於初得之日當與溫散或溫利之
溫散謂治身受寒氣於外者如陳無擇麻黃桂
枝湯治外因心痛之類是也　溫利謂治口食
寒物於裏者如仲景九痛丸潔古煮黃丸治大
實心痛之類是也　病得之稍久則成鬱矣鬱
則蒸熱熱則生火若欲行溫散溫利寧無助火
添病耶故古方中多以山梔仁爲熱藥之向導
則邪易伏病易退正氣復而病安矣　大槩胃
口有熱而作痛者非山梔不可須薑汁佐之多用

台芎開之　金匱要畧云心中寒者其人苦病心如噉蒜狀劇者心痛徹背背痛徹心譬如蠱注其脉浮者自吐乃愈　心痛徹背背痛徹心烏頭赤石脂丸主之　胸痺不得臥心痛徹背者栝蔞薤白半夏湯主之　心胸中大寒痛嘔不能飲食腹中寒上衝皮起出見有頭足上下痛而不可觸近大建中湯主之　心中痞諸逆心懸痛桂枝生薑枳實湯主之　右仲景方大抵皆温散之劑有寒結而痛者宜之　左脉浮弦

或緊兼惡風寒者有外邪宜藿香正氣散或五積散加減之類　外吸涼風內食冷物寒氣客於腸胃之間則卒然而痛者二陳草果乾薑吳茱萸扶陽助胃湯草荳蔲丸之類　心膈痛[illegible]宜山梔子炒黑二兩川芎香附[illegible]各一兩黃連[illegible]黃芩木香檳榔各二錢五分[illegible]降香各五錢共為細末生薑汁童子小便各半盞調二錢臨時呷下　仲景云按之心下滿痛者此為實也當下之宜大柴胡湯凡脉堅實不大便腹滿不可按並可承氣湯下之　有實積者脉沉滑氣口[illegible]按之痛宜小胃丹津下十五丸亦可服[illegible]丸　痰積作痛星半安中湯海蛤丸　[illegible]中湯　心膈大痛攻走腰背發厥[illegible]不納者就吐中以鵝翎探吐之以盡其痰積而痛自止　外臺治卒心痛黃連八兩水七升煮五升絞去滓温服五合日三　肘後治卒心痛龍膽草四兩酒三升煮一升

半頓服　仲景云心傷者其人勞倦即頭面赤而下重心中痛而自煩發熱臍跳其脉弦此為心藏所傷也可服妙香散錢氏云心虛者炒鹽補之[illegible]治心痛皆心傷之正藥也　以物拄按而痛者挾虛以二陳湯加炒乾薑和之　按之痛止者為虛宜酸以收之勿食辛散之劑　又有[illegible]久氣血虛損及素作勞羸弱之人患心痛者皆虛痛也有服大補之劑而愈者不可不知　氣攻刺而痛宜加味七氣湯

沉香降氣散正氣天香散治心痛但忽氣則發者 死血作痛脉必澀作時飲湯水下或作呃壯人用桃仁承氣湯下弱人用歸尾川芎牡丹皮□□紅花玄胡索桂心桃仁泥赤麴番降香通草大麥芽穿山甲之屬煎成入童便酒韭汁大劑飲之 或失笑散 蟲痛面上白斑唇紅能食或食即痛或痛後便能飲食或口中沫出上半月蟲頭向上易治下半月蟲頭向下難治先以雞肉汁及糖蜜飲之引蟲頭向上用集效丸

或萬應丸芳紅丸之類下之 若因蚘作痛蚘攻嚙心痛有休止其人吐蚘或與之湯飲藥餌輒入輒吐蓋緣物入則蚘動蚘動則令人惡心而吐用川椒十數粒煎湯下烏梅丸 仲景云蚘蟲爲病令人吐涎心痛發作有時毒藥不止甘草粉蜜湯主之爲脾受肝制而急故蟲不安用甘味之甘緩以安之 有腎氣逆上攻心以致心痛用生韭研汁和五苓散爲丸空心茴香湯下 病人舊有酒積食積痰積在胃脘一□

觸犯便作疼痛挾風寒參蘇飲加薑葱挾怒氣二陳加青皮香附薑汁炒黃連挾飲食二陳加炒山梔藿香草果山查挾火熱者二陳加枳實厚朴炒黃連山梔加減越鞠丸川芎蒼朮香附□□貝母炒梔子砂仁草果察前脉病施治 脾虛致痛多致脾胃虛弱胃脘痛宜溫胃湯 寒濕鬱客每發沉重胃脘痛面色痿黃宜朮桂湯 心脾痛用荔枝核爲末每服一錢熱醋湯調下 劉寄奴末六錢玄胡索末四錢薑汁

熱酒調服效 白礬皮多糊丸好醋吞下神效 心胃發勝散痛二陳加蒼朮諸香藥治之或沉香降氣散不愈則和其血 熱飲痛黃連甘遂作丸服之 冬寒停飲桂黃散 心極痛以牛蜾黃汁調麪煎喫打下蟲積效 實痛者手不可近六脉沉細甚有汗大承氣加桂強壯痛甚者加桂倍附子連小腹虛寒作痛小建中湯宜熟嘔吐寒痛脉沉弦大柴胡湯 脾虛積黃芩芍藥甘草湯 胃虛感冷而痛理中湯 內

傷發熱[illegible]食胃口作痛[illegible]

熱痛如蝕子　肥人心脾胃脘當心痛或[illegible]
不食消草荳蔻鈔二錢白朮各一兩白荳蔻仁
[illegible]遠志[illegible]丁皮木香[illegible]炊餅
[illegible]子大[illegible]五十丸　胃脘停濕者
[illegible]丸　脾[illegible]痛大安丸　因氣者加
[illegible]木香檳榔丸　[illegible]逆上氣痰飲心痛海蛤粉
[illegible]瓜蔞仁[illegible]分[illegible]朮和勻米糊丸　丹[illegible]
治[illegible]支飲[illegible]飲食作痰成心脾痛後獨[illegible]

腿骨痛[illegible]以[illegible]歲丹爲附治十餘年[illegible]
[illegible]痛加胯難開合脾疼時胯[illegible]
[illegible]脚疼止此初因中脘有食積痰飲續胃寒
[illegible]經絡氣血不行津液不通痰飲注入骨
[illegible]如瀉上則爲脾疼降下則爲胯痛須
[illegible]以日遂末一錢入豬腰子內煨食之連
[illegible]使能[illegible]後嘔吐大作不食[illegible]
不[illegible]金匱[illegible]短氣不足以息[illegible]
[illegible]病多年鬱結一旦洩之徒引動[illegible]

勢無他制御之藥故也仍以吐劑達其上焦次
第治及中下二焦連日用瓜蒂藜蘆苦參等藥
俱吐不透而噦躁愈甚乃用附子尖三枚和漿
水以蜜飲之方大吐膠痰一大桶以朴硝滑石
黃芩石膏連翹等一斤濃煎置井中極冷飲之
四日服四斤後腹微痛二便秘脈歇至於卯酉
時予謂卯酉爲手足陽明之應此乃胃與大腸
有積滯未盡當速瀉之諸醫惑阻乃作紫雪三
日服至五兩腹減稍安後又小便閉痛飲以蘿

蔔子汁得吐立通又小腹滿痛以大黃牽牛等
分水丸服至三百丸下如爛魚腸者二升許脈
不歇又大便澀痛小腹滿悶又與前丸藥百粒
與大絞痛腰胯重眼火出不言語瀉下穢物如
爛魚腸一升許肛門如火以水沃之自病半月
不食不語至此方啜稀粥始有生意數日平安
自嘔吐至安日脈皆平常弦大次年行倒倉法
全愈　治一人以酒飲牛乳患心痛年久無汗
醫多以丁附療弱食減每痛以物拄之[illegible]

而濇，又苦吞酸，以二陳加芩連白朮桃仁郁李仁澤瀉，每旦服之，湧出酸苦黑水并如爛木耳者，服至二百餘貼，脈濇退，至添純弦而漸充滿。時令暖，意其欲汗，而血氣未充，以參朮歸芍陳皮半夏[illegible]補綴，與麻黃蒼朮芎歸，纔下咽，忽暈厥，須臾而甦，大汗痛止。一童子久痛方愈，心脾痛，六脈伏，痛減脈[illegible]，氣口緊盛，餘部弦而實，意其宿食，詢之，果傷冷油麵食，以小胃丹津嚥下十餘粒，禁餘食三日，與藥十二次，痛止後，又與穀太早，忽大痛連脇，乃禁食，亦不與藥，蓋宿食已消，今因新穀與餘積相迸而痛，若再藥攻，必傷胃氣，至夜心嘈索食，先以白朮黃連陳皮丸服之，以止其嘈，此非饑也，乃餘飲未了，因氣而動，若與食，復痛，詢其饑作，胸悶滿悶，又與前丸一二貼，夜不饑而昏睡，後少與粥，漸漸安。一婦因久積憂患後，心痛，食減羸瘦，渴不能飲，心與頭更換而痛，不寐，大便燥結，以四物加陳皮甘草百餘貼，未効。予曰：此肺久為[illegible]

不得行，血亦蓄塞，遂成污濁，氣壅則頭痛，血不流則心痛，通一病也，治肺當自愈。遂效東垣清空膏例，以黃芩細切，酒浸透，炒赤色，為細末，湯下，頭稍汗，十餘貼，汗渾身而愈。因其膝下無汗，瘦弱脈濇，小便數，大便澀，當補血以防後患，以四物湯加陳皮甘草桃仁酒芩服之愈。一婦春末心脾疼，自言腹脹滿，手足寒時，膝須綿裹火烘，胸畏熱，喜掀露風涼，脈沉細濇，稍重則絕，輕似弦而短，渴喜熱飲，不食，以草豆蔻仁三倍加黃連滑石神麯為丸，以白朮為君，茯苓為佐，陳皮為使，作湯下百丸，至二斤而安。一婦[illegible]，形瘦色黑，味厚，幼時曾以火烘濕薪，燃氣上襲，致時時[illegible]，不服丁香熱藥，時作時止，至是心痛，有痞塊，略吐食，脈皆微弦，重似濇，輕稍和，與左金丸二十四粒，[illegible]湯下，十餘次，食不進。予曰：結已開矣，且止藥，或思飲，與水間與青綠丸，[illegible]快，次漸食與人參酒芍藥湯，引金[illegible]漸漸思食，若大便燥結，以[illegible]加陳皮桃仁人參[illegible]又

以蜜導便通食進　一老人心腹大痛昏厥脉洪大不食不勝一味攻擊之藥用四君子加川歸沉香麻黄服愈　東垣治一婦人重娠六箇月冬至因悲哭口吸風寒忽病心痛不可忍渾身冷氣欲絶曰此乃客寒犯胃故胃脘當心而痛急與草豆蔻半夏乾生薑炙甘草益智仁之類或曰姙身有小毒重娠服之可乎曰乃有故而用也岐伯曰有故無殞故無殞也服之愈　滑伯仁治一婦人盛暑洞泄厥逆惡寒胃脘當

心而痛自腹引脇轉爲滯下嘔噦不食人皆以中暑霍亂治之益甚脉三部俱微短沉弱不應呼吸此陰寒極矣不亟溫之則無生意遂以薑附　因進闇以丹藥脉稍有力厥逆漸退更服薑附七日而安　厥心痛者他藏病干之而痛皆有治也真心痛者心藏自病而痛故夕發旦死旦發夕死無治也然心藏之經絡有病在標者其心亦痛而有治經云心手少陰之脉是動則病嗌乾心痛渴而欲飲又心主手少陰之[illegible]

所生病者心痛掌中熱皆視盛虚熱寒陷下取之又經云手心主之別名曰内關去腕二寸出於兩筋之間實則心痛取之兩筋間也又云邪在心則病心痛喜悲時眩仆視有餘不及調其俞是也　【[illegible]】若脉洪大而數其人火熱盛者用前黄連瀉心湯草豆蔻丸之若無熱者荔枝核之類治之若中惡心痛腹脹大便不通者走馬湯治之　海上方急救男子婦人心疼牙關緊急欲死者用隔年陳葱白三五根去皮鬚

葉搗爲膏將病人口斡開用匙將膏送入咽喉用香油四兩灌送下油不以多少但得葱下喉其人必甦一方用香油頓服　一盆亦妙　經云邪客於足少陰之絡令人卒心痛暴脹胸脇支滿無積者刺然骨之前出血如食頃而已不已左取右右取左病新發者五日已　【胃脘】與心痛不同心痛則在岐骨陷處本非心痛乃心支別絡痛耳膈痛則痛横滿胸間比之心痛爲輕痛之得名俗爲之稱耳諸方稱爲煩[illegible]

其證也五苓散瀉心小腸之熱恐非其對不若用四物湯十全大補湯去桂生血而益陰此以水制火之義　膈痛多因積冷與痰氣而成宜五膈寬中散或四七湯加木香桂各半錢或撾膈湯加木香膈痛而氣上急者宜蘇子降氣湯去前胡加木香如數　痰涎壅盛而痛者宜小半夏茯苓湯加枳實一錢間進半硫丸 [illegible] 亦痰飲所致俗名飲瘕有胃口熱食易消故瘕素問謂之食痺亦類消中之狀俗名肚瘕痰氣

宜小半夏茯苓湯加枳實一錢胃中熱宜二陳湯加黃連一錢或五苓散去桂加辰砂　亦有病瘥呷薑湯數口或進乾薑劑而愈此膈上停寒中有伏飲見辛熱則消　予濱中秘書精館師韓敬堂先生常患膈痛診其脉洪大而濇予用山梔仁赤麴通草大麥芽香附當歸川芎煎湯加薑汁韭汁童便竹瀝之類飲之而止一日勞倦忍饑痛大發亦遂予至火房問曰晨起痛甚不能待公脈家兒槃粲下咽如刀割痛甚甚不可忍何也予曰得非二陳平胃爲藥粲之屬乎曰然曰是則何怪乎其增病也夫勞餓而發飽逸則止知其虛也假以十全大補湯一劑而痛止

診　脉多見於右關　陰弦爲痛　微急爲痛　微大爲心痺引背痛　短數爲痛　濇爲痛　痛甚者脉必伏　久是久痛　洪大數屬火熱　滑大屬痰　右手實者痰積　沉滑者有宿食　弦遲者有寒　沉細而遲者可治　堅

大而實浮大而長滑而利數而緊皆難治　眞心痛手足俱青至節者不治

胸痛[illegible]宜與此[illegible]參看

經云南風生於夏病在心俞在胸脇又云仲夏善病胸脇此則胸連脇痛屬心　肝虛則胸痛引背脇肝實則胸痛不得轉側喜太息肝著則常欲蹈其胸經云春脉如弦其氣不實而微此謂不及令人胸痛引背下則兩脇脹滿此肝虛而其脉證見於春如此也宜補肝湯　金匱云肝中寒者兩臂不舉舌本燥喜太息胸中痛不得轉側食則吐而出汗也　肝著其人常欲

蹈其胸上先未苦時但欲飲熱旋覆花湯主之

素問曰陽明所謂胸痛短氣者水氣在藏府也水者陰氣也陰氣在中故胸痛少氣也輕者五苓散重者用張子和法取之　脉經云寸口脉沉胸中引脇痛胸中有水氣宜澤漆湯及刺巨闕瀉之　綱目　[illegible]治胸脇痛徹背心腹痞滿氣不得通及治痰飲人結胸去積取子熱炒[illegible]大米飲下五十丸

[illegible]用半夏洗淨焙乾搗羅為末生薑自然汁和為餅子用濕紙裹於慢火中煨令香熟水一盞用餅子一塊如彈丸大入鹽半分煎取半盞溫服　醫　丹溪治一人兩有一點相引痛吸氣皮覺急用滑石一兩桃仁半兩枳殼炒一兩黃連炒半兩甘草炙二錢為細末每服錢半以蘿蔔汁煎熟飲之一日五六次又治一人因喫熱補藥又妄自學吐納以致氣亂血熱嗽血消瘦遂與行倒倉法今嗽血消瘦已除因喫炒豆米膈間有一點氣梗痛

似有一條絲垂映在腰與小腹亦痛大半偏在左此肝部有污血行未盡也用滑石一兩黃芩一錢枳殼一錢黃連五錢生甘草二錢紅花一錢柴胡五錢桃仁二兩為細末每服一錢半以蘿蔔汁煎沸服之　胸痛連脇脇支滿膺背肩胛兩臂內亦痛經云歲火太過則有此證其脉若洪數宜用降火涼劑　胸痛引背兩脇滿且痛引少腹經謂歲金太過與歲土不及風木大行皆得令復則有此疾是為金邪傷肝宜用補

肝之劑　胸中痛連大腹小腹亦痛者爲腎虚宜先取其經少陰太陽血後用補腎之藥　胸連脇肋髀膝外皆痛爲膽足少陽木所生病詳盛虚熱寒陷下取之　手心主之筋其病當所過者支轉筋前及胸痛息賁治在燔鍼刼刺以知爲數以痛爲輸又足太陽之筋足少陽之筋痛皆引胸痛治在燔鍼刼刺以知爲數以痛爲輸也

腹痛

或問腹痛何由而生曰邪正相搏是以作痛夫經脈者乃天真流行出入藏府之道路也所以水穀之精悍爲榮衛行於脈之内外而統大其用是故行六氣運五行調和五藏洒陳六府法四時升降浮沉之氣以生長化收藏其正經之别脈絡在内者分守藏府部位各司其屬與之出納氣血凡此榮衛之妙用者皆天真也故經曰血氣人之神不可不謹養養之則邪弗能傷

矣失之則榮氣散解而諸邪皆得從其藏府所虚之舍而入客焉入客則氣停液聚爲積爲痰血凝不行或瘀或畜脈絡皆滿邪正相搏眞氣迫促故作痛也脾胃内舍心腹心肺内舍胸膺肉脇肝内舍胠脇小腹腎内舍小腹腰脊大小腸偏在皆在小腹此藏府所過之部位也曰舉痛論敘腹痛　十四條論熱者止一條餘皆屬寒後世方論因論作風冷客之攻擊而作痛今[illegible]諸明何哉曰方論不會通諸篇之旨因

不解篇末復細曰百病皆生於氣列九氣之狀其
間雖不言痛必亦爲或有作痛者故也不然何
乃出於諸痛篇之末耶試以靈樞百病始生篇
觀之其旨則顯然矣所論邪有三部風雨傷於
上清濕傷於下傳於上者病從外入內從上下
也次第傳入舍於輸之時六經不通或着絡脈
或着經脈或着輸脈或着伏衝之脉或着腸胃
之膜原皆得成積而痛傷於下者病起於足故
積之始生得寒乃生厥乃成積厥氣生足悗悗

生脛寒脛寒則血脈凝濇血脈凝濇則寒氣上
入於腸胃入於腸胃則䐜脹腸外之汁沫迫聚
不得散日以成積傷於藏者病起於陰故卒然
多食飲則腸滿起居不節用力過度則絡脈傷
陽絡傷則血外溢血外溢則衂血陰絡傷則血
內溢血內溢則後血腸胃之絡傷則血溢於腸
外腸外有寒汁沫與血相搏則并合凝聚不得
散而積成矣卒然外中於寒若內傷於憂怒則
氣上逆氣上逆則六輸不通溫氣不行凝結蘊

裹而不散津液濇滲着而不去而積皆成矣自
今觀之此篇所謂成積作痛未至於癥瘕結塊
之積乃汁沫聚而不散之積也與舉痛論所謂
血氣稽留不得行而成積同也豈七情敘於篇
末者之不同然於作痛乎然推原二篇之意百
病始生篇在乎三部之邪會而爲痛故相連而
爲言舉痛論在乎其邪各自爲病所以獨引寒
淫一者亦爲寒邪之能閉塞陽氣最甚故也用
是爲例其他則可自此而推之矣至如七情之

氣逆即傷其榮衛而不行榮衛不行則液聚血
凝及飲食用力過度者亦然皆不待與寒相會
始成積作痛也且如諸篇有言胃氣實而血虛
其脉耎散者當病食痺胃食則痛也有言歲土
太過濕淫所勝大腹小腹痛者有言衝脉之病
其氣溢於大腸而着於肓肓之原在臍下故環
臍而痛有言脾傳之腎少腹寃熱而痛有言肝
熱病者腹痛身熱有言腎虚者亦大腹小腹痛
有言厥陰之厥小腹腫脹太陰厥逆心痛引背

有言六氣司上下之勝之後等邪各隨其所入之部分而痛豈非諸邪各有自徑入作痛彻無與寒相關者耶難經云臍上牢若痛心內證也臍下牢若痛腎內證也臍右牢若痛肺內證也臍左牢若痛肝內證也此分論之未備者不獨此而已至若厥心痛五邪相乘者亦不能推及四藏與之無異豈五五二十五陽之相移獨心而已哉更於五藏之痛不下淡於腎先止在腹中痛者猶未明也止知諸脉急者為痛未知脉滑

微有熱者亦病痛也其詳備見痛條且劉河間嘗解急脉之意急脉固是寒之象然寒脉當短小而遲非急數而洪也由緊脉主痛急而為痛甚所以痛而脉有緊急者脉為心之所養也凡六氣為病則心神不寧而緊急不得舒緩故脉亦從之而見也欲知何氣之為病者適其緊急相兼之脉而可知也如緊急洪數則為熱痛之類也此論可謂善推脉理病情者也曰諸邪之作痛則聞命矣然其邪之博也奈何以治將亦

有所守要約之方乎曰自博而求約何患約之無其道不自博而從事於約約必失其道失其道寧無實實虛虛誅伐無過之患乎然其道要在於審經脉氣血之虛實辨六淫五邪之有無兼究於是擇至真大要諸治法中併五鬱者之所當施治後選其經分袪邪補正適所宜之藥配君臣佐使以為方夫如是而約之則猶約囊也無不切中其病矣　東垣云夫心胃痛及腹中諸痛皆因勞力過甚飲食失節中氣不足寒

邪乘虛而入客之故卒然而作大痛經言得炅則止炅者熱也以熱治寒治之正也然腹痛有部分藏府有高下治之者亦宜分之如厥心痛者乃寒邪客於心包絡也前人以良薑菖蒲大辛熱之味末之酒調服其痛立止此直折之耳真心痛者寒邪傷其君也手足青至節甚則旦發夕死夕發旦死中脘痛者太陰也理中建中草荳蔻丸之類主之臍腹痛者少陰也四逆真附子湯之類主之少腹痛者厥陰也正陽散

回陽丹當歸四逆湯之類主之雜證而痛者苦練湯酒煮當歸丸丁香練實丸之類主之是隨高下治之也更循各藏部分穴俞而灸刺之如厥心痛者痛如針刺其心甚者脾之痛也取之然谷大谿餘藏皆然如腹中不和而痛者甘草芍藥湯主之如傷寒悞下傳太陰腹滿而痛者桂枝加芍藥湯主之痛甚者桂枝加大黃湯主之夏月肌熱惡熱脈洪疾而痛者黃芩芍藥湯主之又有諸蟲痛者如心腹懊憹作痛聚往來

上下行痛有休止腹熱喜渴涎出面色乍青乍白乍赤嘔吐水者蛔咬也以手緊按而堅持之無令得脫以針刺之久持之蟲不動乃出針也或局方化蟲丸及諸蟲之藥量虛實用之不可一例治也　海藏云秋腹痛肌寒惡寒脈沉微足太陰足少陰主之桂枝芍藥湯　中脘痛太陰也理中建中黃芪湯之類　臍腹痛少陰也四逆真武附子湯之類　小腹痛厥陰也重則正陽散回陽丹之類輕則當歸四逆湯之類

太陰傳少陰痛甚者當變下利而止　夏腹痛肌熱惡熱脈洪疾手太陰足陽明主之芍藥黃芩湯治腹痛脈洪數　肚腹痛者芍藥甘草湯主之稼穡作甘甘者己也曲直作酸酸者甲也甲己化土此仲景妙方也　脈緩傷水加桂枝生薑　脈洪傷金加黃芩大棗　脈濇傷血加當歸　脈弦傷氣加芍藥　脈遲傷火加乾薑

丹溪云有寒有熱有食積有濕痰有死血綿綿痛而無增減欲得熱手按及喜熱食其脈

遲者寒也當用香砂理中湯或治中湯小建中湯五積散等藥若冷痛用溫藥不效痛愈甚大便不甚通當微利之用藿香正氣散每服加官桂木香枳殼各半錢吞下來復丹或用蘇感丸不利則量虛實用神保丸　時痛時止熱手按而不散其脈洪大而數者熱也宜二陳平胃炒芩連或四順清涼飲黃連解毒湯神芎丸金花丸之類若腹中常覺有熱而痛此為積熱宜調胃承氣湯　感暑而痛或泄利併作其脈必虛

鬱宜十味香薷飲六和湯　感濕而痛小便不
利大便溏泄其脉必細宜胃苓湯　痰積作痛
或時眩運或嘔冷涎或下白積或小便不利或
得辛辣熱湯則暫止其脉必滑宜二陳加行氣
之劑及星半安中湯　食積作痛痛甚欲大便
利後痛減其脉必弦或沉滑宜二陳平胃加山
查神麯麥芽砂仁草果溫中丸枳术丸保和丸
木香檳榔丸之類　酒積腹痛用三稜蓬术香
附官桂蒼术厚朴陳皮甘草茯苓木香檳榔主

之多年敗田螺殼煅存性加三倍於木香檳榔
丸中更加山茵陳等分其効甚速　氣滯作痛
痛則腹脹其脉必沉宜木香順氣散　死血作
痛痛有常處而不移其脉必澀或芤宜桃仁承
氣湯虛者加歸地蠲丸服以緩除之或用牡丹
皮江西紅麴麥芽香附川通草穿山甲番降香
紅花蘇木山查玄胡索桃仁泥酒童便各一鍾
煎至一鍾入韭汁服　七情內結或寒氣外攻
積聚堅牢如杯心腹絞痛不能飲食時發時止

發即欲死宜七氣湯　腹痛有作止者有塊耕
起往來者吐清水者皆是蟲痛或以雞汁吞萬
應丸下之或以椒湯吞烏梅丸安之　金匱要
略問曰病腹痛有蟲其脉何以別之師曰腹中
痛其脉當沉若弦反洪大故有蚘蟲　關上脉
緊而滑者蚘毒　脉沉而滑者寸白　肘後蟲
以下三四寸熱者腸中有蟲　脾胃虛而心火
乘之不能滋榮上焦元氣遇冬腎與膀胱之寒
水旺時子能令母實致肺金大腸相輔而來尅

心乘脾胃此大復其讎也經曰大勝必大復故
皮毛血脉分肉之間元氣已絕於外又大寒大
燥二氣併乘之則苦惡風寒耳鳴及腰背相引
胸中而痛鼻息不通不聞香臭額寒腦痛目時
眩目不欲開腹中為寒水反乘痰唾涎沫食入
反出腹中常痛及心胃痛脇下急縮有時而痛
腹不能努大便多瀉而少秘下氣不絕或腸鳴
此脾胃虛之極也胸中氣亂心煩不安而為霍
亂之漸膈咽不通噎塞極則有聲

日陽中或暖房內稍緩口吸風寒則復作四肢
厥冷身體沉重不能轉側不可回顧小便溲而
時燥以草荳蔻丸主之此主秋冬寒涼大復氣
之藥也　復氣乘冬足太陽寒氣足少陰腎水
之旺子能令母實手太陰肺實反來侮土火木
受邪腰背胸膈閉塞疼痛善嚏口中涎目中泣
鼻中流濁涕不止或有息肉不聞香臭咳嗽痰
沫上熱如火下寒如水頭作陣痛目中流火視
物䀮䀮耳鳴耳聾頭並口鼻或惡風寒喜日陽

夜卧不安常覺痰塞膈咽不通口無滋味兩脇
縮急而痛牙齒動搖不能嚼物腰臍間及尻臀
膝足寒冷陰汗前陰冷行步欹側起居艱難掌
中寒風痹麻木小便數而晝多夜頻而少氣短
喘喝少氣不足以息卒遺失無度婦人白帶陰
戶中大痛牽心而痛黧黑失色男子控睾牽心
腹陰陰而痛面如赭色食少大小便不調煩心霍
亂逆氣裏急而腹皮色白後出餘氣腹不能努
或腸鳴膝下筋急肩胛大痛此皆寒水來復火

土之讎也以神聖復氣湯主之　季秋心腹中
大痛煩躁冷汗自出宜益智和中丸　季秋客
寒犯胃心胃大痛不可忍者麻黃草荳蔻丸
脾胃虛寒心腹滿及秋冬客寒犯胃時作疼痛
宜厚朴湯為戊火已衰不能運化又加客氣聚
為滿痛散以辛熱佐以苦甘溫以淡泄之扶持
胃氣以與平也　腹痛或大便利或用手重按
痛處不痛者為虛宜於已上治寒痛方中選用
之無寒者芍藥甘草湯　仲景云虛勞裏急腹

中痛小建中湯主之此補例也溫例也痛而秘
者厚朴三物湯主之此瀉例也寒例也　三陰
受邪於心臍少二腹疼痛氣風等證當歸丸主
之　失笑散治心腹痛欲死心痛門有劉寄奴玄
胡索方亦治腹痛此是通理氣血之劑也　有全
不思食其人本體素怯弱而又加以腹冷疼者
養胃湯[illegible]以人[illegible]木仍加桂朱萸各半錢
木香三分[illegible]心脾疼者加生薑均治
又[illegible]則止者[illegible]之用熟艾半斤

以白紙一張鋪於腹上紙上[illegible]又令勻又以蒸
葱數枝批作兩半片鋪於[illegible]再用白紙一張
覆之以慢火熨十數之冷則易之覺腹中熱腹
皮暖不禁以帛[illegible]搭[illegible]縛之待冷方解一
法用鹽炒布裹熨[illegible]　腹痛證治上條
列之詳矣但有因[illegible]而致痛者不可不明且
如疝致腹痛必是[illegible]而腫疼牽引而痛或邊有
一條衝腹而痛[illegible]霍亂腹痛必吐利兼作甚有不
嘔不利四肢厥冷痛極者名乾霍亂又名攪腸

沙急用樟木煎湯大吐之或用白礬末一錢清
湯調服探吐[illegible]或用台芎為末每一錢許入薑
汁[illegible]湯調服甚者面青昏倒不省人事急
以[illegible]　合研為細末滾湯調溶稍温口服之
或[illegible]腰中折十指出血腸內生癰亦常腹痛但
小便數似淋脉滑數身甲錯腹皮急按之濡如
腫狀或遶臍生瘡治法見本門凡此數證要當
審辨[illegible]因而施治毋苟且而誤人也
[illegible]傷寒畜血在下焦宜抵當[illegible]

氣之類若因氣鬱而痛以青皮主之寒者以桂
枝吳茱萸溫之[illegible]　若因疝奔豚瘕聚
者更檢本門施治若身甲錯腹皮急按之濡如
腫狀或遶臍生瘡者小腸癰也急宜下之或以
雲母膏[illegible]服

診　脉多細小[illegible]　滑為痰　弦為食　陰
弦或[illegible]或[illegible]實或伏者可下　細小遲者
生　堅大疾者[illegible]浮大而長者死　痛
而喘臍下或大痛人中黑色者不治

脇痛

或問脇痛從肝治復有可言者乎曰肝病內舍胠脇而脇痛也則何異於心肺內舍膺脇而痛者哉若謂肝實病而胠脇痛也則何異於肝木不及陽明所勝之胠脇痛者哉若謂由是厥陰肝經所過而痛也則何異於足少陽手心主所過而脇痛者哉若謂獨經脉挾邪而痛也則何異於經筋所過而痛者哉豈執一說而可已乎非察色按脉徧識各經氣變雖在一病之中而

辨其異狀者卒不能也且夫左右者陰陽之道路也是故肝生於左肺藏於右所以左屬肝肝藏血肝陽也血陰也乃外陽而內陰也右屬肺肺主氣肺陰也氣陽也外陰而內陽也由陰陽分藏其左脇多因留血作痛右脇悉是痰積作痛其兩脇之病人所以一槩而可乎若論其致病之邪凡外之六淫內之七情勞役飲食皆足以致痰氣積血之病雖然痰氣固亦有流注於左者然必與血相搏而痛不似右脇之痛無關於血也　戴云傷寒脇痛屬少陽經合用小柴胡湯痛甚而不大便者於內加枳殼若尋常脇痛不係正傷寒時身體發熱者本事方中枳殼煮散用枳殼桔梗細辛川芎防風各四分乾葛錢半甘草一錢若只是脇痛別無雜證其痛在左為肝經受邪宜用川芎枳殼甘草其痛在右為肝經移病於肺宜用片薑黃枳殼桂心甘草此二方出嚴氏濟生續集加減在人又有肝膽經停痰伏飲或一邊脇痛宜用嚴氏導痰湯痰

結成癖間逆生施先蓋枳殼乃治脇痛的劑所以諸方中皆不可少曾見潘子先說有人脇痛下青龍湯痛止兼嗽得可此其痛必在右脇故也灼然知是寒氣作痛枳實理中湯為宜　挾外感風寒者太醫宜芎葛湯　中脘不快腹脇脹滿香橘湯　腹脇疼痛氣促喘急分氣紫蘇飲　悲哀傷肝氣引兩脇疼痛枳殼煮散　右脇痛推氣散　左脇痛枳芎散或柴胡疏肝散

死血者日輕夜重或午後發熱脈短澀或芤桃

仁承氣湯加鱉甲青皮柴胡芎歸之屬　若跌撲脇痛者亦是死血宜復元活血湯破血散疼湯　怒氣者脉弦實有力大劑香附合芎歸之屬　痰飲停伏者脉沉弦滑導痰湯加白芥子　戴云停飲脇痛本事方麫丸最佳　食積痛凡痛有一條扛起者是也用保和丸或吳茱萸炒黃連神麴麥芽山査蓬术三稜青皮發寒熱脇痛覺有積塊當歸龍薈丸　經云肝病者兩脇下痛引少腹善怒又云肝氣實則怒左關必

弦實鼓擊獨大於諸脉知肝火盛也龍薈丸治肝實脇痛其人氣收者善怒是也甚則用薑汁呑下經云風木淫勝治以辛涼是也　因驚傷肝脇痛桂枝散　仲景云脇下偏痛發熱其脉弦緊此寒也以溫藥下之宜大黃附子湯　煮黃丸治脇下痃癖痛如神　控涎丹治一身氣痛及脇走痛痰挾死血加桃仁泥凡脇有痰流注　陳加南星川芎蒼术實者控涎丹下之枳實散攻中有補虛人可用　戴云曾有人脇

痛連腸進諸氣藥并自大便導之其痛殊甚後用辛熱補劑下黑錫丹方愈此乃虛冷作痛愈疎而愈虛耳　肝氣不足兩脇下滿筋急不得太息四肢厥冷發搶心腹痛目不明了爪甲枯口面青宜補肝湯　左脇偏痛久宿食不消并目䀮肮昏風淚出見物不審而逆風寒偏甚宜補肝散　肝虛寒脇下痛脹滿氣急目昏濁視物不明其脉沉弱者宜檳榔湯　肝氣虛視物不明兩脇脹滿筋脉拘急面色青小腹痛用山

茱萸當歸山藥黃芪五味子木瓜川芎各一兩半熟地黃白术各一兩獨活酸棗仁各四銖為末每二錢入棗一枚水一盞煎取八分空心服

房勞過多腎虛羸怯之人胸脇之間多有隱隱微痛此腎虛不能約氣氣虛不能生血之故氣與血猶水也盛則流暢少則壅滯故氣血不虛則不滯既虛則鮮有不滯者所以作痛宜用破故紙之類補腎芎歸之類和血若作滯[illegible]當[illegible]　一人六月途行受熱過[illegible]

躁暴忽左脇痛皮膚上一片紅如碗大發水泡瘡三五點脉七至而弦夜重於晝醫作肝經鬱火治之以黃連青皮香附川芎柴胡之類進一服其夜痛極且增熱次早視之皮膚上紅大如盤水泡瘡又加至三十餘粒醫教以水調白礬末敷仍於前藥加青黛龍膽草進之夜痛益甚脇中如鉤摘之狀次早視之紅已及半身矣水泡又増至百數乃載以詢黃古潭爲訂一方以大瓜蔞一枚重一二兩者連皮擣爛加粉草二

錢紅花五分進藥少頃卽得睡比覺已不痛矣蓋病勢已急而時醫執尋常瀉肝正治之劑又多苦寒愈資其燥故病轉增劇水泡瘡發於外者肝鬱旣久不得發越乃侮所不勝故皮膚爲之潰也瓜蔞味甘寒經云泄其肝者緩其中且其爲物柔而滑潤於鬱不逆甘緩潤下又如油之洗物未嘗不潔此其所以奏効之捷也歟

九靈山房集六甲鋪姚者一男子病脇痛衆醫以爲癰也投諸香薑桂之屬益甚項彦章診其脉告曰此腎邪病法當先温利而後竭之投神保丸下黑溲痛止卽令更服神芎丸或疑其太過彦章曰向用神保丸以腎邪透膜非全蝎不能引導然巴豆性熱非得芒硝大黃蕩滌之後遇熱必再作乃大泄數出病已彦章所以知男子之病者以陽脉弦陰脉微濇弦者痛也濇者腎邪有餘也腎邪上薄於脇不能下且腎方惡燥今以燥熱發之非得利不愈經曰痛隨利減殆謂此也　雲中秦文山掌教平湖與家兄同

官每患脇痛遇勞忽餓則發介家兄書來求方予爲處以人參黃芪白术當歸川芎地黃牛膝木瓜山茱萸石斛薏苡仁酸棗仁柏子仁桃仁之屬令常服之後來謝云自服藥後積久之疾一朝而愈不復發矣聞魏崑溟吏部亦以勞餓得脇痛無大病也而醫者投以枳殼青皮破氣之藥痛愈甚不數日而殞予故著之以爲世戒

[illegible]　合腋張脇者肺下肺下則居賁迫肺善脇下痛　青色粗理者肝大肝大則逼胃迫咽則

苦脇中且脇下痛　凡脇骨偏舉者肝偏傾肝偏傾則脇下痛　揭脊者脾，脾高則眇引季脇而痛　寸口脉弦者，即脇下拘急而痛其人嗇嗇惡寒也　脉雙弦是兩手俱弦也沉濇是鬱細緊或弦者怒氣

腰痛附腎着 腰軟　髀胯痛

六元正紀論云太陽所至為腰痛又云巨陽即太陽也虛則頭項腰背痛足太陽膀胱之脉所過還出別下項循肩髆內挾脊抵腰中故為病項如拔挾脊痛腰似折髀不可以曲是經氣虛則邪客之痛病生矣夫邪者是風熱濕燥寒皆能為病大抵寒濕多而風熱少然有房室勞傷腎虛腰痛者是陽氣虛弱不能運動故也經云腰者腎之府轉搖不能腎將憊矣宜腎氣丸茴香丸之類以補陽之不足也膏粱之人久服湯藥醉以入房損其真氣則腎氣熱腎氣熱則腰脊痛而不能舉久則髓減骨枯發為骨痿宜六味地黃丸滋腎丸封髓丹之類以補陰之不足也靈樞云腰痛上寒取足太陽陽明上熱取足厥陰不可俛仰取足少陽蓋足之三陽從頭走足足之三陰從足走腹經所過處皆能為痛治之者當審其何經所過分野循其空穴而刺之審何寒熱而藥之假令足太陽令人腰痛引項

脊尻背如重狀刺其郄中太陽二經出血餘皆倣此彼執一方治諸腰痛者固不通矣　有風　有濕　有寒　有熱　有挫閃　有瘀血　有滞氣　有痰積　皆標也腎虚其本也　風傷腎而痛其脉必帶浮或左或右痛無常處牽引兩足宜五積散每服加防風半錢全蝎三箇小續命湯獨活寄生湯皆可選用一方小續命湯加炒去皮桃仁治風腰痛最妙　仍吞三仙丹杜仲薑汁炒研末每一錢温酒調空心服治腎氣腰痛兼治風冷爲

患名杜仲酒　二因又有牛膝酒治腎傷風毒攻刺腰痛不可忍者　傷濕而痛如坐水中蓋腎屬水久坐水濕處或爲雨露所着兩水相得以致腰痛其脉必帶緩遇天陰或久坐必發身體必帶沉重宜滲濕湯主之不効宜腎著湯或生附湯　風濕腰痛獨活寄生湯　寒濕腰痛五積散加桃仁川芎肉桂湯麻黄蒼朮湯并摩腰膏　濕熱腰痛蒼朮湯獨活湯羌活湯東垣云如[illegible]腰[illegible]乃經中有濕熱也於羌活勝濕湯中加黄檗一錢附子五分蒼朮二錢　感寒而痛者腰間如冰其脉必緊見熱則减見寒則增宜五積散去桔梗加吳茱萸半錢或蒼附湯[illegible]桂杜仲外用摩腰膏　傷熱而痛者脉必洪數而渴發熱便閉宜甘豆湯加續斷天麻間服敗毒散　若因閃挫或顛撲傷損而痛者宜乳香趂痛散及黑神散和復元通氣散酒調下不効則必有惡血停滞宜先用酒調下蘇合香丸仍以五積散加桃仁大黄蘇木各一錢當

歸倍原數若因勞役負重而痛宜和氣飲或普賢正氣散或十補湯下青娥丸　挫閃腰痛不能轉側用陳久神麯一大塊燒通紅淬老酒去麯以酒通口吞青娥丸仰卧片時未効再服不用丸亦得又方以茴香根同紅麯擂爛好熱酒調服　東垣云打撲傷損從高墜下惡血在太陽經中令人腰脊痛或胻腨臂膊中痛不可忍鼻壅塞不通地龍湯主之　橘核酒　熱大黄湯　丹溪治徐質夫年六十因墜馬腰痛不可

轉側六脉散大重取則弦小而長稍堅此雖有惡血未可驟逐且以補接爲先遂令煎蘇木人參黃芪川芎當歸陳皮木通甘草服至半月飲食漸進遂與前藥調下自然銅等藥一月而安

瘀血爲病其脉必濇轉側若錐刀之刺大便黑小便赤黃或黑日輕夜重名瀝血腰痛宜調榮活絡飲或桃仁酒調黑神散或四物湯加桃仁紅花之類丹溪用補陰丸中加桃仁紅花主之 氣滯而痛其脉必沉宜人參順氣散或烏

藥順氣散加五加皮木香入少甘草煎湯調下或用降眞香檀香沉香共一兩重煎湯空心服 痰注而痛其脉必滑或伏宜二陳湯加南星香附烏藥枳殼主之 食積腰腿痛用龜板[illegible]栢葉[illegible]香附[illegible]辣芥子凌霄花[illegible]酒糊丸煎四物湯加陳皮甘草一分吞下 食積痰積如氣實脉有力者宜下之 葳靈仙治痛之要藥爲細末每服二錢猪腰子一隻批開摻藥在內紙包煨熟五更細嚼熱酒下以微利爲度

本事方治五般腰痛用胡桃肉[illegible]去皮[illegible]研爲膏五靈脂黑牽牛[illegible]白牽牛[illegible]各[illegible]狗脊[illegible]半兩萆薢[illegible]三錢沒藥三十文[illegible]五粒用濕紙[illegible]肉去油右爲末入前胡桃膏醋糊丸如[illegible]大每服十五丸風腰疼[illegible]淋無灰酒下[illegible]葱白酒下血腰疼當歸酒下打撲腰疼[illegible]木酒下 張子和治[illegible]進[illegible]病腰疼一年不愈診其兩手脉沉重有力以通經散[illegible]下五七行次以杜仲去麤

皮細切炒斷絲爲末每服三錢猪腰子一枚薄批五七片先以椒鹽淹去腥水摻藥在內裹以荷葉以濕紙數重封文武火燒熟臨臥細嚼溫酒送下每日以無比山藥丸[illegible]數日而愈 治腰痛牽引足膝腳[illegible]用神功杜仲薑汁炒去絲[illegible]牛[illegible]破故紙[illegible]仁炒去皮尖玄胡索各等分爲細末[illegible]調胡桃肉和丸如桐子大每服五七十丸食前溫酒白湯任下[illegible]

[illegible] 腰胯連脚膝曉夜疼痛宜虎骨散[illegible]

骨脂丸百倍丸養腎散選而用之　大抵諸腰
痛皆起腎虚既挾邪氣則須除其邪如無外邪
積滯而自痛則惟補腎而已腰腹痿弱身體疲
倦脚膝痿輭脉或洪或細而皆無力痛亦攸攸
隱隱而不甚是其候也亦分寒熱二證脉細而
無力怯怯短氣小便清利是爲陽虚宜腎氣丸
茴香丸鹿茸羊腎之屬或以大建中湯加川椒
十粒吞下腰腎丸及生料鹿茸丸之類仍以茴
香炒研末破開猪腰子作薄片勿令斷層層摻

藥末水紙裹煨熟細嚼酒嚥此皆所以補陽之
不足也其脉洪而無力小便黄赤虚火時炎是
謂陰虚東垣所謂膏粱之人久服湯藥醉以入
房損其真氣則腎氣熱腎氣熱則腰脊痛而不
能舉久則髓減骨枯發爲骨痿宜六味丸滋腎
丸封髓丹補陰丸之類以補陰之不足也　楊
仁齋云經云腰者腎之府轉搖不能腎將憊矣
審如是則病在少陰必究其受病之源而處之
爲得雖然宗筋聚於陰器肝者腎之同系也五

藏皆取氣於穀脾者腎之倉廪也鬱怒傷肝則
諸筋縱弛憂思傷脾則胃氣不行二者又能爲
腰痛之冦故併及之[illegible]發爲腰痛宜調
肝散主之憂思傷脾發爲[illegible]宜沉香降氣湯
和調氣散[illegible]主之　腰腎丸治肝腎損及
脾損穀不化腰痛不[illegible]神效　又有泄判失
志傷腎而痛者[illegible]加白茯苓少加
乳香沉香主之　産後腰痛及婦人月經後
腰痛俱屬虚宜[illegible]於補氣血藥中加杜仲側柏

葉主之　丹溪云久腰痛必用官桂開之方止
腹脇痛亦然茴香丸治腰痛經久不瘥亦用官
桂開之之意也
[illegible]爲病其體重腰冷如氷飲食如故小便自
利腰以下冷痛如帶五千錢治宜流濕兼用溫
散腎著湯
[illegible]腰痛足太陽膀胱經也腰痛足少陽膽
經也[illegible]若因傷於寒濕流注經絡結滯骨
節[illegible]不和[illegible]致腰胯痛者宜除濕丹或滲濕

湯加芍藥青皮蒼朮檳榔有痰積鬱滯經絡流搏瘀血內亦作痛用導痰湯加檳榔青皮芍藥實者為攻散濕熱腰胯作疼宜清濕散【腰痛】丹溪以為腎肝伏熱治宜黃蘗防已

【脈】大者腎虛　濇為瘀血　緩為寒濕　或滑或伏為痰　尺沉為腰背痛　尺脈沉而弦沉為滯弦為虛　沉弦而緊為寒　沉弦而浮為風　沉弦而濇細為濕　沉弦而實閃肭

腎憊及盛怒傷志則腰失強不能轉搖而死經云腰者腎之府轉搖不能腎將憊矣得強則生失強則死又云腎盛怒而不止則傷志志傷則喜忘其前言腰脊不可以俛仰屈伸毛悴色夭死於季夏是也

脊痛脊強

內經刺灸脊痛脊強有三法　其一取督脈經云督脈之別名曰長強別走太陽實則脊強取之所別也　其二取足太陽經曰厥挾脊而痛者至頂頭沉沉然目䀮䀮然腰脊強取足太陽膕中血絡是也　其三取小腸經云小腹控睪引腰脊上衝心在小腸取之肓原以散之刺太陰厥陰以下之取巨虛下廉以去之是也　脊痛項強腰似折項似拔衝頭痛乃是太陽經不行也羌活勝濕湯主之　打撲傷損從高墜下惡血在太陽經中腰脊痛不可忍地龍湯主之

肩背痛

肩背分野屬肺經云西風生於秋病在肺腧在肩背故秋氣者病在肩背又云肺病者喘咳逆氣肩背痛汗出又云秋脈太過爲病在外則令人逆氣背痛慍慍然又云肺手太陰之脉氣盛有餘則肩背痛風寒汗出氣虛則肩背痛寒少氣不足以息此肺金自病也　經云歲火太過民病肩背熱又云少陰司天熱淫所勝病肩背臑缺盆中痛此肺金受火邪而病也　經云邪在腎則病肩背頸項痛取之涌泉崑崙視有血者盡取之是腎氣逆上而痛也　東垣云肩背痛不可回顧此手太陽氣鬱而不行以風藥散之　脉經云風寒汗出肩背痛中風小便數而欠者風熱乘其肺使肺氣鬱甚也當瀉風熱以通氣防風湯主之　按風寒汗出而肩背痛小便數者旣以爲風熱之藥通肺氣之壅則寒熱氣不足以息而肩背痛小便遺失者當以人參黄芪之屬補肺氣之虛不言可知也　濕熱相

搏肩背沉重而疼者當歸拈痛湯　當肩背一片冷痛背膂疼痛古方用神保丸愈者此有積氣故也　其人素有痰飲流注肩背作痛宜星香散或導痰湯下五套丸　有腎氣不循故道氣逆挾脊而上致肩背作痛宜和氣飲加鹽炒小茴香半錢炒川椒十粒　或看書對奕久坐而致脊背疼者補中益氣湯或八物湯加黄芪　有素虛人及病後心膈間痛或牽引乳脇或走注肩背此乃元氣上逆當引使歸元不可復下疏刷之[illegible]愈痛發汗人患此者衆惟宜溫補猶於正氣補法之說誤矣汗者心之液陽受氣於胸中汗過多則心液耗陽氣不足故致疼也　丹溪治一男子忽患背胛縫有一線疼起上跨肩至胸前側脇而止其痛晝夜不息不可忍其脉弦而數重取豁大左大於右夫胛小腸經也胸脇膽經也此必思慮傷心心藏未病而[illegible]府先病故從背胛起及慮不能決又歸之膽故痛至胸脇而止乃小腸火乘膽木子來乘

母足爲實邪謂之衆因謀事不遂而病以人參四錢木通二錢煎湯下龍薈丸數服而愈

【脉】脉洪大洪爲熱大爲風　脉促上擊者肩背痛　脉沉而滑者背膂痛

臂痛

臂痛有六道經絡究其痛在何經絡之間以行本經藥行其氣血血氣通則愈矣　以兩手伸直其臂貼身垂下大指居前小指居後而定之則其臂臑之前廉痛者屬陽明經以升麻白芷乾葛行之　後廉痛者屬太陽經以藁本羌活行之外廉痛者屬少陽經以柴胡行之內廉痛者屬厥陰經以柴胡青皮行之內前廉痛者屬太陰經以升麻白芷葱白行之內後廉痛者屬少陰經以細辛獨活行之并用針灸法視其何經而取之　臂爲風寒濕所搏或飲液流入或因提挈重物皆致臂痛有腫者有不腫者除飲證外其餘諸痛並可五積散及烏藥順氣散或蠲痹湯　若坐臥爲風濕所搏或睡後手在被外爲寒邪所襲遂令臂痛宜五積散及蠲痹湯烏藥順氣散審知是濕蠲痹湯每服加蒼朮三匙防己四分又□□□痛□少　曾有挈重傷筋以致臂痛□□□□□□□服或和氣飲每服加白薑

黄半錢以薑黃能入臂故也　痰飲流入四肢令人肩背痠疼兩手軟痺醫誤以為風則非其治宜導痰湯加木香[illegible]薑黃各半錢如未効輕者指迷茯苓丸重者控涎丹[illegible]
[illegible]外有血虛不榮於筋而致臂痛宜蠲痺湯四物湯各半貼和勻煎服　有氣血凝滯經絡不行而致臂痛宜舒筋湯　治臂痛半夏一錢陳皮半錢茯苓五分蒼朮二錢威靈仙五分酒芩白朮南星香附各一錢甘草少許　紅花神麴炒為末　薑黃四兩甘草羌活各一兩白朮二兩　茯苓丸治臂痛如神赤茯苓防風細辛白朮澤瀉官桂各半兩瓜蔞根紫菀[illegible]附子黃芪芍藥甘草炙各七錢半生地黃牛膝[illegible]山芋獨活半夏[illegible]山茱萸各二錢半為細末煉蜜丸如桐子大每服十丸溫酒下
[illegible]戍常指此臂髀痛宜五痺湯蠲痺湯　薄桂味淡能橫行手臂令他藥至痛處
[illegible]臂尤妙

身體痛　身體拘急

體痛謂一身盡痛傷寒霍亂中暑陰毒濕痺痛痺皆有體痛但看兼證及問因診脈而別之治法已分見各門其留連難已者於此求之　寒而一身痛者甘草附子湯　熱者拈痛湯　內傷勞倦飲食兼感風濕相搏一身盡痛者補中益氣湯加羌活防風升麻藁本蒼朮治之　濕熱相搏肩背沉重疼痛上熱胸膈不利偏身疼痛宜拈痛湯　陰室中汗出懶語四肢困倦乏力走注疼痛乃下焦伏火不得伸浮而躁熱汗出一身盡痛蓋風濕相搏也以麻黃發汗漸漸發之存[illegible]亦宜發汗況值季春之月脈緩而遲尤宜發之令風濕去而陽氣升困倦乃退血氣俱得生旺也麻黃復煎湯[illegible]之丹溪用蒼朮[illegible]威靈仙各一錢半薑擂服
偏身皆痛如勞[illegible]用黃芪人參甘草附子[illegible]羌活木香知母芍藥川芎前胡枳殼桔梗白朮當歸茯苓半夏[illegible]已上各五錢柴胡

鱉甲(醋炙)各一兩　桂心　酸棗仁各三分　杏仁[illegible]半
兩右為末每服四錢水一盞薑三片棗二箇烏
梅三枚葱白三寸同煎至七分空心溫服但少
年虛損冷憊老人諸疾並皆治之惟傷寒身體
痛者不可服　活[illegible]各半湯相
表裏治徧身骨節疼痛如神

[illegible]　[illegible]寒與寒濕風濕經云諸寒收
引皆屬於腎又云太陰司天之政民病寒厥拘
急初之氣風濕相搏民病經絡拘彊關節不利
身體[illegible]
治法宜小續命湯仲景三黃湯[illegible]

[illegible]　傷寒太陽經表證[illegible]　陰毒傷寒
身如被杖[illegible]氣血
表[illegible]風濕相
[illegible]轉側脈緩　虛勞人氣血虛
[illegible]人氏豁大

痹

內經謂風寒濕三氣雜至合而為痹[illegible]
為行痹[illegible]
為痛痹[illegible]
為著痹[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]以冬遇此為骨痹以春遇此為
筋痹以夏遇此為脈痹以至陰遇此為肌痹以
秋遇此為皮痹[illegible]之處
痹[illegible]皮痹也　陳無擇云
三氣襲人經絡入於骨則重而不舉入於脉則
血凝不流入於筋則屈而不伸入於肉則不仁
入於皮則寒久不已則入五藏煩滿喘嘔者肺
也上氣嗌乾厥脹者心也多飲數溲夜臥則驚
者肝也尻以代踵脊以代頭者腎也四肢解惰
發欬嘔沫者脾也大[illegible]則難治矣又有
腸痹胞痹及六府各有俞風寒濕所中治之隨
其府俞以施針灸之法仍服發散等劑則病自

除又有血痺周痺支飲作痺皆以類相從也
風痺者遊行上下隨其虛邪與血氣相搏聚於關節筋脈弛縱而不收宜防風湯　寒痺者四肢攣痛關節浮腫宜五積散　濕痺者留而不移汗多四肢緩弱皮膚不仁精神昏塞宜茯苓川芎湯　熱痺者臟腑移熱復遇外邪客搏經絡留而不行陽遭其陰故㾦痺熻然而悶肌肉熱極體上如鼠走之狀唇口反裂皮膚色變宜升麻湯　三氣合而爲痺則皮膚頑厚或肌肉痠痛此爲邪中周身搏於血脉積年不已則成癮疹風瘡搔之不痛頭髮脫落宜疎風滋血之劑　胞痺者數飲而小便不通中氣喘爭時作飧泄宜五苓散加桑皮木通麥門冬或吳茱萸散　腸痺者少腹膀胱按之內痛若沃以湯濇於小便上爲清涕宜腎著湯腎瀝湯　血痺者邪入於陰血之分其狀體常如被風所吹骨弱勞瘦汗出臥則不時搖動宜當歸湯　周痺者在血脉之中上下遊行周身俱痛也宜蠲痺湯

支飲者手足麻痺臂痛不舉多睡眩冒忍尿不便膝冷成痺宜茯苓湯　五藏痺宜五痺湯肝痺加酸棗仁柴胡　心痺加遠志茯苓麥門冬犀角　脾痺加厚朴枳實砂仁神麴　肺痺加半夏紫菀杏仁麻黃　腎痺加獨活官桂杜仲牛膝黃耆萆薢　痺在五藏之合者可治其入藏者死

【診】麄理而肉不堅者善病痺　闕中薄澤爲風衝濁爲痺　浮絡多青則痛黑則痺　絡脉暴黑者留久痺也　脉大而濇爲痺　脉來急亦爲痺　肺脉微大爲肺痺引胸背起惡日光　心脉微爲心痺引背善淚出　右寸沉而遲濇爲皮痺　左寸結不流利爲血痺　右關脉舉按皆無力而濇爲肉痺　左關弦緊而數浮沉有力爲筋痺　遲爲寒　數爲熱　濇爲濕　滑爲痰　豁大弦小爲虛

行痺 即走注疼痛

行痺走注無定防風湯主之　黄檗蒼朮各二錢各用酒炒煎熟調酒威靈仙末羚羊角灰臣苓朮佐芥子使用薑一片入藥末一錢擂碎以熱酒温服　[illegible]沉重走注疼痛濕熱相搏而風熱鬱不得伸附著於有形也宜蒼朮黄檗之類　濕鬱燥腎不養肝肝自生風遂成風濕流注四肢筋骨或入左右髃肌肉疼痛漸入左指中遺苡仁散主之　兩手十指一指

疼了一指疼疼後又腫骨頭裏痛膝痛左膝痛了右膝痛發時多則五日少則三日晝輕夜重痛時發熱行則痛輕腫却重解云先血後氣乃先氣後血形傷氣也和血散痛湯主之　走注[illegible]骨節不同[illegible]節但走腹節疼痛未必行也網目未見流滴今以[illegible]走注疼痛方具於後

如意通聖散　虎骨散　桂心散　仙靈脾散　[illegible]　小[illegible]丸　没藥丸　虎骨丸　[illegible]　骨碎補丸　定痛丸　八神丹

一粒金丹　乳香應痛丸　地龍一兩去土炒水蛭半兩糯米內炒熟麝香二錢半另研右為細末每服一錢以温酒調下不拘時候　外貼方牛皮膠一兩水鎔成膏芸薹子安息香川椒附子各半兩右為細末入膠中和成膏塗紙上隨痛處貼之　草麻子一兩去皮草烏頭半兩乳香一錢另研右以猪肚脂煉去沫成膏方入藥攪勻塗摩攻注之處以手心摩熨如火之熱却塗摩患處妙

陳無擇云凡人忽胸背手腳頸項腰膝隱痛不可忍連筋骨牽引釣痛坐臥不寧時時走易不定俗醫不曉謂之走注便用風藥及針灸皆無益又疑是風毒結聚欲為癰疽亂投藥餌亦非也此是痰涎伏在心膈上下變為疾或令人頭痛不可舉或神思昏倦多睡或飲食無味痰唾稠粘夜間喉中如鋸聲口流涎唾手腳重腿冷痺氣不通誤認為癱瘓亦非也凡有此疾但用控涎丹不過數服其疾如失　痰挾死血丹溪

控涎散

痛痺 行痛風

留着之邪與流行榮衛真氣相擊搏則作痛痺若不干其流行出入之道則不痛但痿痺耳隨其痺所在或陽多陰少則為痺熱或陰多陽少則為痺寒歸曰風寒濕三氣雜至合而為痺至四時刺逆從論於六經皆云有餘不足悉為痺註曰痺痛也此非人氣之邪亦作痛耶且人身體痛在外有皮肉脉筋骨之異由病有不同之邪所以欲正其名名不正將何以施治如邪是

六淫者便須治邪是人氣者便須補瀉其氣病在六經四屬者各從其氣故制方須分別藥之輕重緩急適當其所無得紀意　有風　有濕　有痰　有火　有血虛　有瘀血　診其脉浮者風也　緩細者濕也　滑者痰也　洪大者火也　芤者血虛也　澀者瘀血也　因於風者加減小續命湯或烏藥順氣散大乾薑加羌活防風　因於濕者遇陰雨即發身體沉重宜除濕蠲痛湯佐以竹瀝薑汁或大橘皮湯傷

濕而兼感風寒者汗出身重惡風喘滿骨節煩疼大如歷節風勝下連脚冷痹不能屈伸宜防已黄耆湯或五痺湯　因痰者王隱君滾痰湯二陳湯加薑汁竹瀝　因火者潛行散加竹瀝　因濕熱者二妙散　因於血虚者四物蒼朮各半湯合補血丹　因瘀血者芎歸桃仁紅花大黄入麝香少許　肥人多濕痰瘦人多血虚與熱　上部痛羌活桂枝桔梗葳靈仙　下部痛牛膝防已木通黄蘗　上部腫痛五積散烏藥順氣散加薑葱煎發其汗下部腫痛五苓入正大橘皮湯加燈心竹葉利小便　若腫痛而大便不通者大柴胡湯防風通聖散□之　大勢既退當隨其所因之本病治之若其內發忌羊肉法酒濕麵房勞　寒濕相合腦戶痛惡寒項筋脊強肩背髀卵痛膝臏痛無力行步能食身沉重其脉沉緩洪上急宜蒼朮復煎散　因如火腫痛兩足及伏兔骨筋痛膝少力身重腰痛夜惡寒痰嗽項頸筋骨皆急痛目多眵淚食不下宜緩筋湯　風濕客於腎經血脉凝滯腰背腫疼不能轉側皮膚不仁偏身麻木上項頭目虚腫耳內常鳴下注脚膝重痛少力行履艱難項背拘急不得舒暢宜活血應痛丸　晝則靜夜則動其痛徹骨如虎之嚙名曰白虎病痛如掣者爲寒多腫滿如脫者爲濕多汗出者爲風多於上藥中求之通用虎骨二兩犀角屑沉香青木香當歸赤芍藥牛膝羌活秦艽骨碎補桃仁各一兩甘草半兩檞芽

一握每服五錢水煎臨服入麝香少許　一人感風濕得白虎歷節風證徧身抽掣疼痛足不能履地者三年百方不效一日夢與木通湯愈遂以四物湯加木通服不效後以木通二兩剉細長流水煎汁頓服服後一時許徧身癢甚上體發紅丹如小豆大粒舉家驚惶隨手沒去出汗至腰而止　而不痛矣次日又如前煎服下體又發紅丹□出汗至足底汗乾後通身舒暢而無痛矣　一月後人能行步履如初後以治

數人皆驗益痛則不通通則不痛也　熨法靈
樞經寒痹之為病也留而不去時痛而皮不仁
刺布衣者以火焠之刺大人者以藥熨之用醇
酒二十斤蜀椒一升乾薑一斤桂心一斤凡四
種皆㕮咀漬酒中用綿絮一斤細白布四丈并
納酒中置酒馬矢煴中蓋封塗勿使泄五日五
夜出布綿絮曝乾之乾復漬以盡其汁每漬必
晬其日乃出乾之并用滓與綿絮複布為複巾
長六七尺為六七巾則用之生桑炭炙巾以熨

寒痹所刺之處令熱入至於病所寒復炙巾以
熨之三十遍而止汗出以巾拭其身亦三十遍
而止起步內中無見風每刺必熨如此病已矣
此所謂內熱也此熨熱之外治法　外臺方以三年釅醋
五升熱煎三四沸切葱白二三升煮一沸濾出
布裹熱罨病上裂之痰為度　熏洗法用樟
木屑一斗置大桶內桶邊放一兀凳以急流水
一擔熬沸泡之桶內安一矮凳子令人坐桶
故腳在桶內外以草薦圍之勿令湯氣

肢節痛虛痛屬火腫屬濕兼受風寒而發動於
經絡之中流注於肢節之間用麻黃去節赤芍
藥各一錢防風荊芥羌活獨活白芷蒼朮威靈
仙酒片芩枳實桔梗葛根川芎各五分當歸甘
草升麻各二分下焦加酒黃檗腫多加檳榔大
腹皮痛多加沒藥婦人加酒紅花　風濕相搏
肢節疼痛宜大羌活湯　金匱方諸肢節疼痛
身體尪羸腳腫如脫頭眩短氣兀兀欲吐桂枝
芍藥知母湯主之　肥人多是風濕與痰飲流

注經絡而痛宜南星半夏瘦人是血虛與熱四
物加防風羌活酒芩瘦人或性急躁而痛發熱
是血熱四物加酒炒芩檗脈滯滑者用燥濕蒼
朮南星兼行氣以木香枳殼檳榔脈澀數為瘀
血芎歸桃仁泥紅花加大黃微利之倦怠無力
而痛用參朮南星半夏之類　風熱成歷節攻
手指作赤腫麻木甚則攻肩背兩膝遇暑熱或
大便秘節作宜牛蒡子散此病胸膈生痰久則
赤腫附著肢節久久不退遂成癘風宜早治之

着痺 即麻木

原病式列麻於在六氣燥金諸澀條下釋之曰物得濕則滑澤乾則澀滯麻猶澀也由水液聚少而燥澀氣行壅滯而不得滑澤通行氣強攻衝而為麻也俗方治麻病多用烏附者令氣行之暴甚以故轉麻因之衝開道路以得通利而麻愈也然六氣不必一氣獨為病氣有相兼若亡液為燥或麻木無熱證即當此法或風熱勝濕為燥因而病麻則宜以退風散熱活血養液

潤燥通氣之凉藥調之東垣則曰麻者氣之虛也真氣弱不能流通填塞經絡四肢俱虛故生麻木不仁或在手或在足或通身皮膚盡麻者皆以黃芪人參白朮甘草五味芍藥當歸升麻柴胡之類隨時令所兼之氣出入為方但補其虛全不用攻衝之劑為詳劉李二公生同時居同地無世運方土之異宜何乃凡病遽有補攻之別如此蓋因悟入理入之道不同劉以人稟天賦本無虧欠因邪入擾亂其氣而後成病所以攻邪為要邪退則正氣自安李以人之真氣榮養百骸周於性命凡真氣失調少有所虧則五邪六淫便得乘間而入所以補正為要正復則邪氣自卻今宜兩用二公之法當攻當補從中調治無執泥其間可也又分麻木為二以麻止羽羽然尚無氣血攻衝不行之狀木則氣血已痺不仁莫知其痛癢也為風初起者其手足必先木而後皮膚瘙癢與大癩疾者手足亦時麻木當自求之本門　素問曰榮氣虛則不仁

衛氣虛則不用榮衛俱虛則不仁且不用靈樞曰衛氣不行則為麻木東垣治麻痺必補衛氣而行之蓋本諸此　渾身麻木不仁或左或右半身麻木或面或頭或手臂或腳腿麻木不仁並補中益氣湯　皮膚間有麻木此肺氣不行也芍藥補氣湯　如肌肉麻必待瀉營氣而愈如濕熱相合而成宜清濕熱　治杜彥達患左腿麻木□□大指次指亦常麻木至腰已兩月矣諸醫不效求治問之明之遂製人

參益氣湯服二日便覺手心熱手指中間如氣
滿脹至三日後又覺兩手指中間皮肉如不敢
觸者似痒痛滿脹之意指上瑟瑟不敢用手擦
傍爲之此真氣徧至矣遂於兩手指甲傍各以
三稜針一刺之微見血如黍粘許則痒自息矣
又爲處第二第三服之大効　左腿麻木沉重
除濕補氣湯　金匱方血痺陰陽俱微寸口關
上微尺中小緊外證身體不仁如風痺狀黃芪
桂枝五物湯主之　李正臣夫人病診得六脈

中俱弦洪緩相合按之無力弦在其上是風熱
下陷入陰中陽道不行其證閉目則渾身麻木
晝減而夜甚覺而目開則麻木漸退久則絕止
常開其目此證不作懼其麻木不敢合眼故不
得眠身體皆重時有痰嗽覺胸中常是有痰而
不利時煩躁氣短促而喘肌膚充盛飲食大小
便如常惟畏麻木不敢合眼爲最苦觀其色脉
形病相應而不逆內經曰陽盛瞋目而動輕陰
病閉目而靜又云諸脉皆屬於目靈樞曰開

目則陽道行陽氣徧布周身閉目則陽道閉而
不行如晝夜之分知其陽衰而陰旺也且麻木
爲風雖三尺之童皆以爲然細校之則非如久
坐而起亦有麻木假爲繩繫縛之人釋之覺麻
木作而不敢動久則自已以此驗之非有風邪
乃氣不行也不須治風當補其肺中之氣則麻
木自去矣知其經脉陰火乘其陽分火動於中
爲麻木也當兼去陰火則愈矣時痰嗽者秋涼
在外濕在上作也當實其皮毛以溫劑身重脉

緩者濕氣伏匿而作也時見躁作當升陽助氣
益血微瀉陰火去濕通行經脉調其陰陽則已
非五藏六府之本有邪也補氣升陽和中湯主
之　李夫人立冬嚴霜時得病四肢無力乃痿
厥濕熱在下焦也醋心者是濁氣不降欲滿也
合眼麻木者陽道不行也開眼不麻木者目開
助陽道故陰寒之氣少退也頭旋眩運者風氣
下陷於血分不伸越而作也溫經除濕湯主之
淚亂風溫不退眩運麻木不已除風濕羌活

湯主之　停蓄支飲手足麻痺多睡眩冒茯苓湯主之　本事方治風寒濕痺麻木不仁粥法川烏生爲末用白米作粥半碗入藥末四錢同米用慢火熬熟要稀薄不要稠下薑汁一茶匙許蜜三大匙攪勻空心啜之溫爲佳如是濕更入薏苡仁二錢增米作一鍾服此粥治四肢不隨痛重不能舉者左氏曰風淫末疾謂四肢爲四末也脾主四肢風邪客於肝則淫脾脾爲肝尅故疾在末穀氣引風濕之藥徑入脾經故四肢得安然必眞有風寒中於衛氣致衛氣不行

而不仁者外必有惡風寒等證然後可服　榮虛衛實肌肉不仁致令癉重名曰肉苛宜前胡散苦參丸　丹溪曰手麻是氣虛木是濕痰死血十指麻木胃中有濕痰死血氣虛者補中益氣湯或四君子加黃芪天麻麥門冬川歸濕痰者二陳湯加蒼白朮少佐附子行經死血者四物湯加桃仁紅花韭汁　戴人以苦劑湧寒痰次與淡劑　白朮[illegible]茯苓[illegible]桂[illegible]附[illegible]

内經針灸着痺分新久新者[illegible]灸之久者淬針刺之[illegible]　陝帥郭[illegible]濟[illegible]指着痺足不能伸迎[illegible]之以[illegible]針刺委中深至骨而不知痛出血一二升其色如墨又且繆刺之如是者六七服藥三月病良愈　大理少卿韓珠泉偏身麻痺不能舉動求治於予予以神效黃芪湯方加減授之用芪一兩二錢參芍各六錢他稱是一服減半彼欲速効遂併兩劑爲一服之旬日而[illegible]矣予以元氣初復[illegible]以

[illegible]之完固而後可出[illegible]不能從[illegible]朝[illegible]客[illegible]偶從朝房出上馬[illegible]從者扶[illegible]部[illegible]予視之[illegible]不治數日而[illegible]嗚呼行百里者半於九十可不戒哉

痿

痿者手足痿軟而無力百節緩縱而不收也聖人以痿病在諸證爲切要故特著篇目分五藏之熱名病其所屬皮脈筋肉骨之痿致足不任於地及敍五藏得熱之邪則以一藏因一邪所傷觀其微旨是用五志五勞六淫從藏氣所要者各舉其一以爲例耳若會通八十一篇而言便見五勞五志六淫盡得成五藏之熱以爲痿也何則言肺氣熱則皮痿因有所失亡所求不

得者與他篇之謂始富後貧雖不傷邪皮焦筋屈痿躄爲攣者同是一於七情之不揚若病機之謂諸痿喘嘔諸氣憤鬱皆屬於上者言之卽此可推何熱而不爲痿何脈而不爲熱也如言心氣熱爲脈痿因得之悲哀太甚陽氣內動而血崩大經空虛乃爲脈痿此以心爲神明之官主脈爲要者言耳及乎推之五藏各有神各有志若怒則氣上甚則嘔血之類亦五志所動以熱傷血血逆行於經脈亦必空虛有若形樂

志若病生於脈則是五志皆得以痿其脈不獨悲哀一因也且五志之在各藏自傷其所屬若怒甚傷筋縱其若不容與形樂志樂病生於肉形苦志苦病生於筋又若憂恐喜怒因太虛則五藏相乘故病有五五二十五變皆至於大骨枯槁大肉陷下之病其神志在五藏之爲熱病者不可勝計如言肝藏氣熱因思想無窮所願不得循肺之所求不得也其入房太甚宗筋弛縱亦循腎之遠行勞倦也卽此可見五勞各得傷

其五藏所合之皮肉筋骨矣如言脾藏氣熱因得之有[illegible]以水爲事者若歲運太陰濕土司天在泉之濕皆致肌肉痿足痿不收此是從五藏中舉外感者爲例耳諸藏皆然少陰之復爲骨痿以濕之復爲脈痿陽明司天之政四之氣[illegible]天風氣下臨脾氣上從而[illegible]痿[illegible]於濕者[illegible]不攘大筋緩[illegible]有入風[illegible]傷骨與邪[illegible]

熱多則筋弛骨消肉爍夫其外淫而生五藏痿
病者如此然有不言邪止從經藏之虛而論者
謂脾病者身重肌肉痿足痿不收行善瘛謂腎
虛者爲跛爲痱謂三陽有餘三陰不足爲偏枯
謂足少陽之別虛則痿躄坐不能起足陽明之
別虛則足不收脛枯又有飲食所傷味過於鹹
則大骨氣勞味過於辛則筋脈沮弛與夫膏粱
之人病偏枯痿厥已上所陳止就本條足痿不
用者言耳至若五藏盡熱神昏仆倒手足俱不

用世俗所謂癱瘓者其非亦是痿之大者也又
若下條肺痿之爲藏病者而經又有心氣痿者
死則是五藏盡有其痿蓋可知矣原病式論小
便遺失謂肝熱客於腎部干於足厥陰之經而
氣血不得宣通則痿痺故神無所用而不遂其
機因致溲便遺失由是論之凡神機氣血或劣
弱或閉塞即藏府經絡四屬若內若外隨處而
不用故內經[illegible]出諸篇後之覽者莫失
其[illegible]其方論者或[illegible]虛勞諸或并見風門類

丹溪始發揮千餘年之惑表而出之而復詳論
不詳可惜也曰若論陽明衝脈合宗筋會於氣
街[illegible]陽明虛故宗筋縱帶脈不引而足痿所以
獨取陽明今子所謂[illegible]之邪及諸痿證又將
若之何治曰聖人[illegible]一推之而可十可百
豈惜足[illegible]而已乎所謂各補其榮而通其俞調
其虛實和其逆順則治邪之法盡在其中矣
所云筋脈骨肉各以其時受月則病已者治四
屬內外諸痿之法亦在其中矣然而諸痿之病

未有不因[illegible]虛而得者何以言之按經有
謂[illegible]於天與穀氣并而充身者人謂穀
始入於胃[illegible]兩焦以溉五藏別出兩行營衛之
道[illegible]積於胸中命曰氣海
[illegible]足大絡者[illegible]絡
[illegible]陽明者表也五藏
[illegible]陽藏府各因其
[illegible]不得
[illegible]不和筋骨[illegible]

以生故不用焉而衝脈者出於腎下與任脈起於胞中治血海亦云爲五藏六府之海也五藏六府皆禀焉其上行者滲三陽灌諸精其下行者滲三陰灌諸絡而温肌肉與陽明宗筋會於氣衝因言陽明虚則宗筋縱帶脈不引故足痿不用也卽此而觀眞氣者天之道也穀氣者地之道也地非天不生天非地不成是故眞氣與穀氣并而後生成形氣之道立矣故陽明虚於五藏無所禀則不能行血氣營陰陽濡筋骨利

關節氣海無所受則衛氣不能温分肉充皮膚肥腠理司開闔血海無所受則上下內外之絡脉空虚於是精神氣血之奉生身周於性命者劣弱矣故自髓中隨其不得受水穀氣處則不用而爲痿治痿不獨取陽明而何哉　丹溪云肺金體燥居上而主氣畏火者也脾土性濕居中而主四肢畏木者也火性炎上若嗜慾無節則水失所養火寡於畏而侮所勝肺得火邪而熱矣木性剛急肺受熱邪則金失所養木寡於

畏而侮所勝脾得木邪而傷矣肺熱則不能管攝一身脾傷則四肢不能爲用而諸痿作矣瀉南方則肺金淸而東方不實何脾傷之有補北方則心火降而西方不虚何肺熱之有故陽明實則宗筋潤能束骨而利機關矣治痿之法無出於此駱龍吉亦曰風火相熾當滋腎水東垣先生取黃蘗爲君黃耆等藥爲輔佐而無一定之方有兼痰積者有濕多者有熱多者有濕熱相半者有挾寒者臨病製方其善於治痿乎雖

然藥中肯綮矣若將理失宜聖醫不治也天產作陽厚味發熱凡病痿者若不淡薄滋味吾知其必不能安全也　按丹溪以瀉南方補北之法論治痿之方亦是衆其例因若胃口不開飲食少進者當以芳香辛温之劑進之不可拘於此例宜[illegible]治法者也況依內經當分五藏　肺[illegible]則生痿躄肺者藏之長也爲心之蓋也有所失亡所求不得則發肺鳴鳴則肺熱葉焦故曰五藏因肺熱[illegible]

葉焦發爲痿躄又曰肺熱者色白而毛敗宜黃耆天麥門冬石斛百合山藥犀角通草桔梗枯芩梔子仁杏仁秦艽之屬主之　心氣熱則下脉厥而上上則下脉虛虛則生脉痿樞折挈脛縱而不任地悲哀太甚則胞絡絕胞絡絕則陽氣內動發則心下崩數溲血也故本病曰大經空虛發爲肌痺傳爲脉痿又曰心熱者色赤而絡脉溢宜鐵粉銀屑黃連苦參龍膽石蜜牛黃龍齒秦艽白鮮皮牡丹皮地骨皮雷丸犀角之

屬主之　肝氣熱則膽泄口苦筋膜乾筋膜乾則筋急而攣發爲筋痿思想無窮所願不得意淫於外入房太甚宗筋弛縱發爲筋痿及爲白淫故下經曰筋痿者生於肝使內也又曰肝熱者色蒼而爪枯宜生地黃天門冬百合紫葳白蒺藜杜仲萆薢兔絲子川牛膝防風黃芩黃連之屬主之又方治筋痿兩手握固無力兩腿行動無力[illegible]忽生痰涎忽然睡中[illegible]頭項強急小便澀

白不定大府忽冷忽熱不調用連翹防風荊芥穗蔓荊子羌活獨活牡丹皮山梔仁秦艽麻黃去根木香各等分爲細末每服一錢食後白湯調下　脾氣熱則胃乾而渴肌肉不仁發爲肉痿有漸於濕以水爲事若有所留居處相濕肌肉濡漬痺而不仁發爲肉痿故下經曰肉痿者得之濕地也又曰脾熱者色黃而肉蠕動宜蒼白朮二陳入霞天膏之屬主之　腎氣熱則腰脊不舉骨枯而髓減發爲骨痿有所遠行勞倦逢

大熱而渴渴則陽氣內伐內伐則熱舍於腎腎者水藏也今水不勝火則骨枯而髓虛故足不任身發爲骨痿故下經曰骨痿者生於大熱也又曰腎熱者色黑而齒槁宜金剛丸　腎肝俱損骨痿不能起於牀筋弱不能收持宜益精緩中宜牛膝丸加味四斤丸　腎肝脾俱損穀不化宜[illegible]丸　丹溪云痿屬濕熱　有濕痰者　有氣虛者　有血虛者　有食積妨礙不降者　有死血者　[illegible]

健步丸加黃蘗蒼术黃芩或清燥湯　濕痰二陳加蒼术黃蘗之類入竹瀝薑汁　血虛四物湯加蒼术黃蘗下補陰丸　氣虛四君子湯加蒼术黃蘗　氣血俱虛十全大補湯　食積木香檳榔丸　死血桃仁紅花蓬术歸稍赤芍藥之類　痿病食積妨礙不得降者亦有死血者俱宜下之　保命集云四肢不舉俗曰攤瘓經所謂脾太過則令人四肢不舉又曰土太過則敦阜阜高也敦厚也既厚而又高則令除去此

眞所謂膏粱之疾其治則瀉令氣弱陽衰土平而愈或三化湯或調胃承氣湯選而用之若脾虛則不用也經所謂土不及則卑陷卑下也陷坑也故脾病四肢不舉四肢皆稟氣於胃而不能至經必因於脾乃得稟受今脾病不能與胃行其津液四肢不得稟水穀氣氣日以衰脉道不利筋骨肌肉皆無氣以生故不用焉其治可十全散加減四物去邪留正　又云心熱盛則火獨光火炎上腎之脉常下行今火盛而上炎

用事故腎脉亦隨火炎爍而逆上行陰氣厥逆火復内焰陰上隔陽下不守位心氣通脉故生脉痿膝腕樞如折去而不相提挈經筋縱緩而不任地故也可下數百行而愈　東垣補益腎肝丸　蕭炳神龜滋陰丸　丹溪補益丸　虎潛丸　王啓玄傳玄珠耘苗丹　經驗方何首烏牛膝等分酒浸蜜丸　皆補益腎肝壯筋骨之藥下虛者選而用之　痿發於夏俗名注夏當從東垣法治之詳見傷暑門

痿厥

足痿輭不收爲痿厥有二　一屬腎膀胱經云
恐懼不解則傷精精傷則骨痠痿厥精時自下
是腎傷精脫也又云三陽爲病發寒熱下爲癰
腫及爲痿厥腨痟是膀胱在下發病也　二屬
脾濕傷腎經云凡治痿厥發逆肥貴人則膏粱
之疾又云秋傷於濕上逆而欬發爲痿厥是也
目中溜火視物昏花耳聾耳鳴困倦乏力寢
汗憎風行步不正兩脚欹側臥而多驚腰膝無

力腰以下消瘦宜補益腎肝丸　膝中無力伸
不能屈屈不能伸腰膝腿脚沉重行步艱難宜
健步丸愈風湯送下　腿脚沉重無力者於羌
活勝濕湯中加酒洗漢防己五分輕則附子重
則川烏少許以爲引用而行經也　嘗治一老
人痿厥累用虎潛丸不愈後於虎潛丸加附子
片愈如神蓋附反佐之力　東垣治中書粘合
公四十一歲病脚膝痿弱臍下尻陰皆冷陰汗
臊臭精滑不固服鹿茸丸十旬不減今立脈沉

數而有力此醉酒膏粱滋火於內逼陰於外
見其症不知陽强不能密緻皮膚以爲內實有
寒投以熱劑反瀉其陰而補其陽是實實虛虛
也不危幸矣復何望效耶即處以滋腎大苦寒
之劑制之以急寒因熱用飲入下焦適其病所
瀉命門相火之盛再服而愈求方不與亦不著
其方然旨恐過用之則故病未已新病復起也
此必滋腎丸或滋陰丸之類中病則已可常
服乎　本事方治脚膝無力用兔絲子五兩

石蓮內山藥茴香各二兩白茯苓一兩五味子
五錢糊丸每服五十丸木瓜酒或鹽湯下空心
晚食前各一服　人參酒浸服之治風軟脚
弱可逐奔馬故曰奔馬草曾用有効　仲景
方內極熱則身體津脫腠理開汗大泄厲風氣
下焦脚弱宜越婢加朮湯　千門方用商陸
根切以豆煮熟入羹同粥煮爲飯食之及本事方
有[illegible]丹皆有濕痰污血阻凝經絡而
然也[illegible]

脚氣

脚氣之名起自後代其頑麻腫痛者則經所謂痺厥也痿軟不收者則經所謂痿厥也其衝心者則經所謂厥逆也　東垣云脚氣之疾實水濕之所為也葢濕之害人皮肉筋脉而屬於下然亦有二焉一則自外而感一則自內而致其治法自應不同故詳而論之其為病也有證無名脚氣之稱自晉蘇敬始關中河朔無有也惟南方地下水寒其清濕之氣中於人必自足始

故經曰清濕襲虛則病起於下或者難曰今茲北方其地則風土高寒其人則腠理緻密而復多此疾者豈是地濕之氣感之而為耶答曰南方之疾自外而感者也北方之疾自內而致者也何以言之北方之人常食潼乳又飲酒無節過傷而不厭且潼乳之為物其氣味則濕其形質則水也酒醴亦然人之水穀入胃胃氣蒸騰其氣與味宣之於經絡化之為血氣水穀內本於五藏六府周而復始以應刻數焉合而

天地之紀此皆元氣充足脾胃之氣無所傷之然也苟元氣不充則胃氣之本自弱飲食既倍則脾胃之氣有傷既不能蒸化所食之物其氣與味亦不能宣暢旁通其水濕之性流下而致之其自外而入者止於下脛腫而痛自內而致者乃或至於手節也經云足脛腫曰水太陰所至為重胕腫此但言其自外者也所治之法前人方論備矣自內而致者治法則未有也楊大受云脚氣是為壅疾治以宣通之劑使氣不能

成壅也壅既成而盛者砭惡血而去其重勢經曰蓄則腫熱砭射之後以藥治之　按東垣論南方脚氣外感清濕作寒治北方脚氣內傷酒乳作濕熱治此實前人之未發者後學泥之遂成南北二派[illegible]南[illegible]北者因彼所論乃北方病也彼所治乃北方法也不可施於南北[illegible]南者[illegible]南方病也彼所治乃南方[illegible]之論之始不究內經首[illegible]人守其說者知其一

不知其二故相乖迕若此夫素靈諸篇上窮天文下究地理中知人事之變疊出不一皆者為天地以二氣食於人而人以六經三陰三陽上本之是故三陰三陽亦是在人之六經之氣也內以養於藏府壯精神運水穀以為生化百骸之用及乎天地六氣一有不正則變變則襲人身形之虛入客以為病者謂之外邪若人之三陰三陽一有不正則變變則淫泆為病者謂之內邪二者皆得致周身之百病況足之六經皆起

於脚五指行過於腿膝上屬藏府統身半以下氣血之運行故外入之邪客之則壅閉其經氣凝泣其絡血若人氣內注之邪着而留之則亦必知外邪壅閉氣血者無異也及其衝痛痿痺[illegible]之狀亦無異也於是皆以脚氣名也此四方之所因分乃以南方者比中外邪之濕北方者比中內注之濕[illegible]理也哉然北方縱無地之卑濕其在[illegible]下[illegible]足皆濕也況夫脫卸鞾襪汗出而風吹之而血凝於足者亦與南方地之濕同類皆屬外中者乎南方雖無湩乳之濕其在酒食與藏府所傷津液水穀停積之濕亦下注者皆不異北方湩乳同類皆屬內注者乎能達此理猶當自責辨邪之不易矣暇相毀哉　千金云凡脚氣之病始起甚微多不令人識或飲食嬉戲氣力如故惟卒起脚屈弱不能動有此為異耳　凡脚氣之候或見食嘔吐憎聞食臭或有腹痛下利或大小便閉澁不通或胸中衝悸不欲見光明或精神昏憒或

喜迷忘語言錯亂或壯熱頭痛或身體極冷疼煩或覺轉筋或腫或不腫或胜腿頑痺或時緩縱不隨或復百節攣急或小腹不仁此皆脚氣狀貌也　方書以腫者為濕脚氣不腫者為乾脚氣　不問久近乾濕及屬何經並可用除濕湯加木瓜檳榔白芷各半錢或芎芷香蘇散加赤芍藥[illegible]各半錢仍各木瓜[illegible]　脚氣發動兩[illegible]加全蝎三五個入酒[illegible]大類傷寒若卒起

脚弱或少腹不仁或舉體轉筋或見食嘔逆或
兩脛赤腫便當作脚氣治乾者於前二藥中或
更加萊菔子炒研半錢濕者於前二藥中加青
橘皮十數片　千金云若脉大而緩宜服續命
湯一劑立瘥[illegible]
若風盛宜作越婢湯加白术二兩若脉浮大而
緊轉駃宜作竹瀝湯[illegible]脉微而弱宜
服風引湯此人脉多是因虛而得之若大虛短
氣力乏可間作補湯隨病冷熱而用之若未愈

更服竹瀝湯即止竹瀝湯若不及熱服輒停在
胸膈更爲人患毎服當使極熱若服竹瀝湯得
下者必佳也若加服數劑病及脉勢未折而苦
脹滿者可以大鼈甲湯下之湯勢盡而不得下
可以丸助湯令下下後更服竹瀝湯令脉勢
折氣息料理乃佳　東垣云外臺所録皆謂南
方因濕氣所發之地其民腠理疎陽氣不能
外固因而入之[illegible]清濕襲虛病起於下此因血
虛氣弱受清濕之邪氣與血併行於膚腠邪氣

盛正氣少故血氣[illegible]痺虛則弱故令[illegible]
也後人名曰脚氣[illegible]當灸患處二三十壯以
導引濕氣外出及[illegible]以通經散邪所制之
方[illegible]用蒼朮川烏草附之類內
[illegible]之麻黃苦溫發之者也
川[illegible]熱[illegible]通行[illegible]辛甘大熱
助陽退陰[illegible]之邪又緊足之三陰三
陽是何經絡[illegible]主治復審六氣
中何氣當[illegible]治以佐使之藥　按前廉爲陽明

宜以白芷升麻葛根爲引用　後廉爲太陽宜
以羌活防風爲引用　外廉爲少陽宜以柴胡
爲引用　內廉爲厥陰宜以青皮吳茱萸川芎
爲引用　內前廉爲太陰宜以蒼术白芍藥爲
引用　[illegible]陽者自汗走注其脉浮而弦宜發散
[illegible]陰者無汗[illegible]其脉遲
[illegible]濕勝者腫痛重著
[illegible]暑勝者煩渴熱
[illegible]益氣湯　若內氣

兼見但推其多者爲勝分其表裏以施治也
太陽經脚氣病者頭痛目眩項强腰脊身體經
絡外踝之後循京骨至小指外側皆痛宜隨四
時之氣發散爲麻黃左經湯　陽明經脚氣
病者翕翕寒熱呻欠口鼻乾腹脹髀膝䯒中循
䯒外廉下足趺入中趾內間皆痛宜隨四時氣
微利之大黃左經湯　少陽經脚氣病者口苦
上喘脇痛面垢體無光澤頭目皆痛缺盆并腋
下如馬刀腫自汗振寒發熱胸中脇肋髀膝外

至䯒絕骨外踝及諸節指皆痛宜隨四氣和解
之半夏左經湯　三陽并合脚氣病者憎寒壯
熱自汗惡風或無汗惡寒暈眩重着關節掣痛
手足拘攣疼痛冷痺腰腿緩縱不隨心躁氣上
嘔吐下利其脉必浮弦緊數宜大料神秘左經
湯加味敗毒散　太陰經脚氣病者腹滿夾咽
連舌系急胸脇滿循䯒骨下股膝內前廉內
踝過核骨後連足大趾之端內側皆痛宜六物
附子湯　少陰經脚氣病者腰脊痛小趾之下

連足心循內踝入跟中上腨內出膕中內廉股
內皆痛上衝胸咽飢不欲食面黑小便淋閉咳
唾不已善恐心惕惕如將捕之小腹不仁者難
治以四氣偏勝各隨其氣所中輕重而温之宜八
味丸　厥陰經脚氣病者腰脇偏疼從足大趾
連足趺上廉上膕至內廉循股環陰抵小腹夾
脇諸處脹痛兩脚攣急嗌乾嘔逆洞泄各隨四
氣所中輕重而調之神應養真丹　三陰併合
脚氣四肢拘攣上氣喘滿小便秘澀心熱煩悶

徧身浮腫脚弱緩縱不能行步宜追毒湯　已
上六經受風寒暑濕流注自汗爲風勝無汗疼
痛爲寒勝熱煩爲暑勝重着腫滿爲濕勝各隨
其氣所勝者而偏調之不可拘於一方也　濕
熱爲病肢節煩疼肩背沉重胸膈不利兼徧身
疼痛流注手足足脛腫痛不可忍者當歸拈痛
湯主之本草十劑云宣可去壅通可去滯內經
云濕淫所勝治以苦温兼以苦辛透關節勝濕
防風[illegible]濕[illegible]經絡中留濕故以爲君本[illegible]

下升麻葛根苦辛平味之薄者陰中之陽引而上行以苦發之也白术苦甘溫和平除濕蒼术體輕浮氣力雄壯能除腐腠間濕故以爲臣夫血壅而不流則爲痛當歸身辛溫以散之使血氣各有所歸人參甘草甘溫補脾養正氣使苦藥不能傷脾胃仲景云濕熱相合肢節煩疼苦參黃芩知母茵蔯苦寒乃苦以泄之者也凡酒製炒以爲因用治濕不利小便非其治也猪苓甘溫平澤瀉鹹平淡以滲之又能導其留飲故以爲佐氣味相合上下分流其濕使壅滯之氣得宣通也　錫大受謂脚氣之疾自古皆尚疎下爲疾壅故也然不可太過太過則損傷脾胃使營運之氣不能上行反下注爲脚氣又不可不及不及則使壅氣不能消散今立三方於後詳虛實而用之　脚氣初發一身盡痛或肢節腫痛便溺阻隔先以羌活導滯湯導之後用當歸拈痛湯除之　飲食不消心下痞悶皆屬結導飲丸　治[illegible]

始發頭面渾身肢節微腫皆赤色足脛赤[illegible]不可忍不敢扶[illegible]着皮膚其[illegible]晝夜[illegible]楚此以北土高[illegible]飲酒積久傷脾不能運化飲食下注[illegible]以當歸拈痛湯一兩二錢[illegible]減半[illegible]除止有左手指末微赤腫以三稜[illegible]刺甲端多出黑血赤腫全去不數日因食[illegible]肢體[illegible]痛再以枳實大黃湯治之夫脚[illegible]水濕之爲也熱溢其濕血壅血不行故肢節煩疼經云風勝濕羌活辛溫透關節[illegible]故以爲主血留而不能行則痛當歸[illegible]痛根實之苦寒治痞消食故以爲[illegible]以苦[illegible]之濕熱治諸老血留結[illegible]故以爲使也服後[illegible]下府行痛止　[illegible]一錢檳榔木瓜各一兩卷柏[illegible]以鹽水煮半日次日白水煮半日同[illegible]丸每三十丸加至四五十丸利下惡物立効[illegible]七十杯後患脚氣[illegible]巴豆[illegible]半兩糯米同炒米焦

色不用米大黃一兩剉炒同為末熟蜜為丸溫水下五七十丸仍禁酒遂愈　腎臟風壅積腰膝沉重威靈仙末蜜和丸如桐子大酒下八十丸平明微利惡物如青膿桃膠即是風毒　脚氣多屬肺氣經云肺病者汗出尻陰股膝髀腨胻足皆痛故戴人治脚氣用涌法者良由此也又千金方多汗之者亦瀉肺之意也古方用紫蘇陳皮生薑湯調檳榔末服之於疎通肺氣為佳　三因十全丹續斷丸薏苡仁酒虎骨酒皆

藥性平良病人下虛而無實積者可以常服

[illegible]丹溪用四物湯加炒蘗以附子末津調傅湧泉穴以艾灸泄引其熱下行　金匱八味丸治脚氣上攻入少腹不仁已上虛者宜之　檳榔為末童便調服　三脘散　大腹子散　桑白皮散　薏苡仁散　已上實者宜之　犀角散　熱者宜之　茱萸木瓜湯　沉香散　無熱者宜之

[illegible]紫蘇葉三兩桑白皮剉炒一兩前胡去蘆一兩㕮咀每服八錢水一盞半檳榔一枚杏仁去皮尖二十枚生薑五片煎至一盞[illegible]溫服無時　脚氣喘急此係入腹宜蘇子降氣湯仍佐以養正丹或四磨飲　脚氣迫肺令人喘嗽宜小青龍湯每服入檳榔一錢煎服　[illegible]宜八味平胃散加木瓜一錢[illegible]食者宜生料平胃散加木瓜一錢二證並可用半夏散橘皮湯　[illegible]用生料五苓散一貼除濕湯一貼加木瓜二錢重分二服　[illegible]羌活導滯湯　[illegible]

[illegible]檳榔丸或五苓散和復元通氣散　[illegible][illegible]散加木瓜一錢或用敗毒散五積散各半貼和勻名交加散更加木瓜一錢　若久[illegible]復感[illegible]兩脚或腫或瘡五苓散或和氣飲加木瓜檳榔子各半錢大黃一錢　脚氣日久脚肢枯細或寒或熱或疼或痒或一脚偏患輭弱[illegible]狀如偏風者宜小續命湯加木瓜或獨活寄生湯[illegible]活絡丹虎骨四斤丸之類　[illegible]脚痛心神煩熱犀角散　[illegible]

氣腿腕生瘡用鹿茸丸芎歸散　脚氣生瘡腫
痛用漏蘆白斂槐白皮五加皮甘草各七錢半
蒺藜子二兩㕮咀水煎去查看冷熱於無風處
淋洗之　脚氣跟注一孔深半寸許每下半日
痛異常此乃脚氣注成漏以人中白於火上煅
中有水出滴入瘡口[illegible]者宜大聖散二
錢重入木瓜末一錢苦淋酒調仍用川椒香白
芷草烏煎湯洗　脚氣隱痛行步艱辛用平胃
散加赤麴同煎服最妙雞鳴散亦佳　脚氣有

壅者加減檳榔湯　無壅者牛膝湯川牛膝酒洗
白茯苓黄芪人參當歸各一兩當歸去蘆半兩為細末
每服二錢木香心湯酒調服　脚氣兩脛腫滿是
濕壅疾南方多見兩足[illegible]大與疾偕老者初起
常以[illegible]通[illegible]滯成[illegible]惡血而去其重勢後
以[illegible]射之也[illegible]活人
書[illegible]脚氣服[illegible]及川湯淋洗皆禁之大禁
由[illegible]南方[illegible]爲腫痛而[illegible]非
為[illegible]內受濕氣注下脚痛而言也[illegible]

能外達宜淋渫開導泄越其邪名曰導氣除濕
湯
外臺云第一忌嗔嗔則心煩煩則脚氣發第二
禁大語大語則傷肺肺傷亦發動又不得露足
當風入水以冷水洗脚兩脚脛尤不宜令雖暑
月常須着綿袴至冬寒倍令兩脛溫暖得微汗
大佳依此將息氣漸薄損每至寅丑日割手足
甲割少侵肉去氣夏時腠理開不宜當風卧睡
睡覺令人按接勿使邪氣稽留數勞動關節常

令通暢此並養生之要拒風邪之法也尋常有
力每食後行五百步疲倦便止脚中惡氣隨
即下散雖浮腫氣不能上也　凡治此疾每旦
早飲任意飽食午飯少食晚飯不食彌佳恐傷
脾胃營運之氣失其天度況夜食則血氣壅滯
而實道愈增壅痛矣　第一凡飲食酒及湩酪
勿使過度過則傷損脾胃下注於足脛跗腫遂
成脚疾第二欲不可縱嗜慾多則脚氣發凡飲
食之後宜緩行二三百步不至汗出覺困則止

如此則不能成瘫也經云逆者行之又云病濕痺忌溫食飽食濕地濡衣

【脉】脉浮弦爲虚濡細爲濕洪數爲熱遲滑爲寒微滑爲虚牢堅爲實浮爲表沉爲裏沉弦爲風沉緊爲寒沉細爲濕沉數爲熱結因氣散因憂緊因怒細因悲入心則恍惚謬妄嘔吐食不入眠不安脉左寸乍大乍小乍無者不治入腎則腰脚指腫小便不通呻吟口額黑衝胸而喘左尺絕者不治　但見心下急氣喘不停或自汗數出乍寒乍熱其脉促短而數嘔吐不止者死

證治準繩第五冊目錄

諸風門
癘風　破傷風
痓　瘈瘲
顫振　攣
眩暈
神志門
癲狂癇總論　癲
狂　癇
煩躁總論　虚煩
躁　譫妄 尸疰
循衣摸牀　喜笑不休
怒　善太息
悲　驚悸恐總論
驚　悸
恐　健忘
雜門
汗總論　自汗 無汗 頭汗

盜汗　臥門總論
不得臥　多臥
怠惰嗜臥　身重
不能食 饑不能食 惡食　痞
消癉 口燥咽乾　黃疸 食勞疳黃 口黃
嘈雜　欠嚔

證治準繩第五冊

金壇王肯堂輯

癘風

素問脉要精微論曰脉風成為癘風論曰風寒客於脉而不去名曰癘風癘風者榮衛熱胕其氣不清故使鼻柱壞而色敗皮膚瘍潰又謂風氣與太陽俱入行諸脉俞散諸分肉之間與衛氣相干其道不利故使肌肉憤䐜而有瘍衛氣有所凝而不行故其肉有不仁也長刺節論曰大風骨節重鬚眉墮名曰大風刺肌肉為故汗出百日王註以泄衛氣之怫熱刺骨髓汗出百日王註以泄榮氣之怫熱二百日鬚眉生而止鍼㮣曰癘風者數刺其腫上已刺以銳針針其處按出其惡氣腫盡乃止常食方食毋食他食今觀經之論治分榮衛者如此若古方雖多但混淆其風熱於榮衛又無先後之分至東垣丹溪始分上下治法彼要人先桦皮散從少至多服[illegible]灸承漿穴七壯灸瘡愈再灸再愈[illegible]

之後服二聖散泄熱袪血之風邪戒房室三年
病愈此先治其衛後治其榮也試効方治段庫
使用補氣瀉榮湯此治榮多於治衛也丹溪云
須分在上在下在上者以醉僊散取臭惡血於
齒縫中出在下者以通天再造散取惡物蟲於
於穀道中出所出雖有上下道路之異然皆不
外於陽明一經而已看其瘡搭上先見在上體
多者病在上也下先見在下體多者病在下也
上下同得者病在上復在下也陽明主胃與大

腸無物不受此風之入人也氣受之在上多血
受之在下多血氣俱受者上下皆多自非醫者
神手病者鐵心罕有免者夫氣爲陽爲衛血爲
陰爲榮身半已上陽先受之身半已下陰先受
之是故再造散治其病在陰者用皂角刺出風
毒於榮血中肝主血惡血留止其屬肝也蟲亦
生於厥陰風木所化必用是治其藏氣殺蟲爲
主以大黃引入腸胃外面之分利出瘀惡蟲物
醉僊散治其病在陽者用鼠粘子出風毒徧身

惡瘡胡麻逐風補肺潤皮膚蒺藜主惡血身體
風痒通鼻氣防風治諸風栝蔞根治瘀血消熱
胕腫枸杞消風熱散瘡毒蔓荊子主賊風苦參
治熱毒風皮肌煩躁生瘡赤癩眉脫八味藥治
功固至矣然必銀粉爲使銀粉乃是下膈通大
腸之要劑所以用其驅諸藥入陽明經開其風
熱怫鬱痞膈逐出惡風臭穢之毒殺所生之蟲
循經上行至牙齒嫩薄之分而出其臭毒之涎
水服此藥若有傷於齒則以黃連末揩之或先

固齒以解銀粉之毒銀粉在醉僊散有奪旗斬
將之功遂成此方之妙用非他方可企及故丹
溪取二方分用之如破敵之先鋒至於餘邪未
除者但調和榮衛藥中少加驅逐劑耳
薛新甫曰大抵此證多由勞傷氣血腠理不密
或醉後房勞沐浴或登山涉水外邪所乘衛氣
相搏濕熱相火血隨火化而致故淮陽閩廣間
多患之眉毛先落者毒在肺面發紫泡者毒在
肝腳底先痛或穿者毒在腎徧身如癬者毒在

脾曰先損者毒在心此五臟受病之重者也一曰皮死麻木不仁二曰肉死針刺不痛三曰血死爛潰四曰筋死指脫五曰骨死身柱壞此五臟受傷之不可治也若聲啞目盲尤爲難治治當辨本證兼證變證類證陰陽虛實而斟酌焉若妄投燥熱之劑膿水淋漓則肝血愈燥風熱愈熾腎水愈枯相火愈旺反成壞證矣

本證治法　癘瘍所患非止一臟然其氣血無有弗傷兼證無有弗雜況積歲而發現於外須

分經絡之上下病勢之虛實不可槩施攻毒之藥當先助胃壯氣使根本堅固而後治其瘡可也　癘瘍當知有變有類之不同而治法有汗有下有砭刺攻補之不一蓋兼證當審輕重變證當察先後類證當詳真僞而汗下砭刺攻補之法又當量其人之虛實究其病之源委而施治焉蓋虛者形氣虛也實者病氣實而形氣則虛也　癘瘍砭刺之法子和張先生謂一汗抵千針蓋以砭血不如發汗之周徧也然發汗即出血出血即發汗二者一律若惡血凝滯在肌表經絡者宜刺宜汗取委中出血則效若惡毒蘊結於臟非蕩滌其內則不能瘥若毒在外者非砭刺徧身患處及兩臂腿腕兩手足指縫各出血其毒必不能散若表裏俱受毒者非外砭內泄其毒决不能退若上體患多宜用醉僊散取其內蓄惡血於齒縫中出及刺手指縫并臂腕以去肌表毒血下體患多宜用再造散令惡血陳蟲於穀道中出仍針足指縫并腿腕隔一

二日更刺之以血赤爲度如有寒熱頭疼等證當大補血氣　癘瘍服輕粉之劑若腹痛去後兼有膿穢之物不可用藥止之若口舌腫痛穢水時流作渴發熱喜冷此爲上焦熱毒宜用瀉黃散若寒熱往來宜用小柴胡湯加知母若口齒縫出血發熱而大便秘結此爲熱毒內淫宜用黃連解毒湯若大便調和用濟生犀角地黃湯若穢水雖盡口舌不愈或發熱作渴而不飲冷此爲虛熱也宜用七味白朮散

或腿臂或各指拳攣者由陰火熾盛[illegible]氣血
當用加味逍遙散加生地黃及[illegible]
若[illegible]生蟲者五方風[illegible]火[illegible]金木[illegible]所
化[illegible]於外也宜用升麻湯送瀉
[illegible]或樺皮[illegible]用之邪外炙[illegible]以疏
[illegible]則蟲不生矣肝經虛熱者
[illegible]以加味逍遙散六味地黃丸

兼證治法 [illegible]若右寸關脈浮而無力
脾肺氣虛也用補中益氣湯若左關尺脈數而

無力肝腎陰虛也用六味地黃丸若右寸尺脈
浮大或微細陽氣虛也用八味地黃丸血虛者
四物湯加參苓白朮氣虛者四君子湯加當歸
黃芪用經實熱者柴胡清肝散肝經虛熱者六
味地黃丸脾氣虛弱者補中益氣湯脾虛有痰
者[illegible]朮天麻湯[illegible]過多者芎歸湯發熱
[illegible]愈湯[illegible]熱則真氣傷矣不可用
若[illegible] [illegible]若手足[illegible]
搐或[illegible]用[illegible]血虛風熱用加味[illegible]

散六味地黃丸以生肝血滋腎水若寒熱往來
或耳[illegible]痛屬肝木熾盛先用小柴胡合四物
湯以清肝火生肝血若筋[illegible]骨痛或不能動履
用六味地黃丸補中益氣湯以滋化源若因服
[illegible]設者用四物湯加生甘草金銀花以解
[illegible]益陰血凡此[illegible]所致須用六
味地黃丸補中益氣湯為主若因怒氣房勞而
甚者用六味地黃丸十全大補湯為主若因勞
傷形體而甚者用補中益氣湯十全大補湯為

主[illegible]若飲食不甘頭目眩暈偏
身酸軟或兩腿麻木口渴自汗氣促身熱小便
黃數大便稀溏濕熱傷元氣也用清燥湯如在
夏令用清暑益氣湯若自汗盜汗氣高而喘身
熱脉大元氣內傷也用補中益氣湯若嘔吐少
食肚腹痞悶大便不實脾胃受傷也用六君子
湯若胸腹不利飲食少思吐痰不止脾胃虛痞
也用[illegible]氣[illegible]肢體麻木飲食少
思[illegible]氣[illegible]用人參益氣湯[illegible]若

夜安晝熱者熱在氣分也用清心蓮子飲晝安
夜熱者熱在血分也用四物二連湯俱佐以六
味地黃丸若寒熱往來者肝經血虛也用加味
逍遥散六味地黃丸 **飲食不甘** 若因服燥藥
而致者用四物湯加炒黑黃蘗知母生甘草以
滋陰血若勞役而色黃者用四物湯加參术麥
門五味子以生氣血若短而色黃者用補中益
氣湯加山藥麥門五味以滋化源 **大便不通**
若血虛內熱而澀滯者用四物湯加麥門五味

子以生血潤燥若因燥熱之藥而患者用四物
湯加連翹生甘草以生血清熱若服尅伐之藥
而致者用四君子湯加芎歸以助氣生血若作
渴飲冷者熱淫於內也用竹葉石膏湯以清胃
火若作渴飲湯者腸胃虛熱也用竹葉黃芪湯
以補氣生津若內熱作渴而亦飲湯者用四物
湯送潤腸丸以涼血潤燥若腸胃滿脹燥作直
腸而不通者用豬膽汁導之腸胃氣虛血涸而
不通者用十全大補湯若肝膽邪盛脾土受侮

而不能輸化者用小柴胡湯加山梔郁李仁枳
殼治之 [illegible] 內熱
熱作渴飲湯脹滿倦怠此肝血虛有火動也用
四君子加芎歸若思慮傷脾動火而致用歸脾
湯加山梔若發熱六補熱用八珍湯加酸棗仁茯
神遠志若因心血虛損用柏子仁散大抵此證
皆心脾血少所致但調補胃氣則痰清而神自
安不必專於清熱治痰 **發熱惡寒** 若肢體倦
怠煩躁作渴氣高而喘頭痛自汗者此內傷氣

血也用補中益氣湯加五味麥門倦怠食少大
便不調小便頻數灑淅惡寒者此脾肺氣虛也
用升陽益胃湯煩躁作渴體倦少食或食而不
化者此脾氣虛熱也用六君子湯 **發熱** 在午
前脈數而有力者氣分熱也用清心蓮子飲脈
數而無力者陽氣虛也用補中益氣湯午後脈
數而有力者血分熱也用四物湯加牡丹皮脈
數而無力者陰血虛也用四物湯加參术熱從
兩脇起者肝虛也用四物湯加參术黃芪從臍

下起者腎虛也用四物湯加參朮黃檗知母五味麥門肉桂或六味丸其熱晝見夜伏夜見晝止或去來無定時或起作無定處或從腳起者此無根虛火也須用加減八味丸及十全大補湯加麥門五味更以附子末唾津調搽湧泉穴若形體惡寒喜熱飲食者陽氣虛寒也急用八味丸 [illegible] 若惡冷飲食者胃氣虛而不能生津液也用七味白朮散若喜冷飲食者胃火盛而消爍津液也須用竹葉石膏湯夜間發熱口

渴者腎水弱而不能上潤也當用六味地黃丸若因汗下之後而有前患胃氣虛也宜用八珍湯 [illegible] 若煩躁飲冷者屬上焦實熱用涼膈散若大便秘結者屬下焦實熱用清涼飲若用剋伐之藥而渴者氣血虛也急用八珍湯六味丸 [illegible] 若左寸關脈弦數者心肝二經虛熱也用四物湯加山梔柴胡生陰血右寸關脈浮大者脾肺二經虛熱也用補中益氣湯加山梔桔梗培陽氣若因怒便作用小柴胡湯加

山梔芎歸清肝涼血若午前甚用小柴胡湯加參芪歸朮補氣清肝午後甚用四物湯加酒炒黑黃檗知母五味補陰[illegible]兩足心熱[illegible]者虛用六味丸以壯水之主[illegible]兩足冷[illegible]陽虛用八味丸以益火之源 [illegible] 若氣血虛而發痙也[illegible]足太陽病發汗太多則痙風病下之則痙復發汗則加拘急瘡家發汗則痙蓋風能散氣故有汗而不惡寒曰柔痙寒能澀血故無汗而惡寒曰剛痙皆因內虛復汗

亡津血筋無所養而然悉屬虛象非風證也當大補氣血為主故產婦潰瘍勞傷氣血濕熱相火誤服克伐之劑者多患之其義可見 [illegible]

[illegible] 若因鬱火傷脾以歸脾湯加山梔丹皮氣血俱虛以八珍湯加山梔丹皮若因服燥藥傷血以四物湯加生甘草若經候過期而來者氣血虛也八珍湯倍用參朮先期而來者血虛熱也四物湯倍加參朮丹皮將來而作痛者氣[illegible]加味四物湯加茯苓白朮香附色紫而成

塊者血熱也四物湯加山梔丹皮作痛而色淡
者血氣虛也用八珍湯其血崩之證肝火不能
藏血者用加味逍遙散脾虛不能統血者用補
中益氣湯凡此皆六淫七情虧損元氣所致當
審其因而調補[illegible]

變證治法

[illegible]寒熱 若寒熱
往來者肝經氣[illegible]而有火也用八珍散加丹
皮柴胡寒熱内[illegible]血氣弱而虛熱也用八珍
散倍用參朮若惡寒形寒者陽氣虛寒也用十

全大補湯若脈虛搔如帛隔者氣血不能外榮
也用人參養榮湯若兩部搔之麻痒者氣血不
能上榮也用補中益氣湯若痿軟筋攣者血氣
不能滋養也用補中益氣湯佐以六味地黃丸

[illegible] 若飲食寒冷大便秘
結者實熱也用四順清涼飲服熱藥煩渴引
飲者血虛也用當歸補血湯飲冷惡寒大便不
實者[illegible]十全大補湯熱從下或從足起
者[illegible]也用加減八味丸若飲食難化四肢
逆冷者命門火衰也用八味地黃丸

[illegible] [illegible]或牙齦潰爛者[illegible]惡寒[illegible]胃火加味清胃
散爲主[illegible]補中益氣湯爲主

[illegible] [illegible]氣虛用補中[illegible]湯送六味地黃丸盜
[illegible]弱血虛用當歸六黃湯[illegible]送六味地
黃丸若[illegible]心血[illegible]以歸脾湯倍用茯神酸棗
仁

[illegible] 若右寸脈浮緩者肺氣虛也
用六君子湯加桔梗若右寸脈洪滑者肺經有熱
也用瀉白散若右關脈浮緩遲弱者脾肺氣[illegible]

也用六君子湯加桔梗黃芪若右關脈洪滑遲
緩者脾熱傳肺也用瀉白瀉黃二散若右尺脈微
弱者命門火衰而脾肺虛也用人參理中丸如
不應用八味地黃丸若右寸脈洪數者心火尅肺
金也用人參平肺散如不應用六味地黃丸若左
寸關脈洪弦數者心肝二經有熱也用柴胡清
肝散[illegible]以牛黃清心丸清其風熱仍用
六味地黃丸以[illegible]在尺脈數而無力者腎
[illegible]也用六味地黃丸加五味子以滋

陰如脈浮細或手足冷或兼喘促急用八味地黃丸以補陽[illegible]或生芒刺兼作渴引飲或小便赤數不時發熱或熱無定處或足心熱起者乃腎水乾涸心火亢盛用加減八味丸主之佐以補中益氣湯若誤用寒涼之劑必變虛寒而死矣[illegible]作渴不止[illegible]或晝熱夜止或夜熱晝止小便頻數其熱或從足心或從兩脇或從小腹中起外熱而無定處者此足三陰虧損之證也用加減八味丸爲主佐以

十全大補湯若誤用寒涼治火之劑復傷脾胃胸腹虛痞飲食少思或大便不實小便不利胸腹膨脹肢體患腫或手足俱冷者此足三陰虧損之虛寒證也急用加減金匱腎氣丸亦有復生者[illegible]若[illegible]寬[illegible]屬陰虛[illegible]朝[illegible]皆[illegible]陽俱虛也陽虛者朝用六君子湯夕用加減腎氣丸陰虛者朝用四物湯加參朮夕用加減腎氣丸真陽虛者朝用八味地黃丸夕用補中益氣湯若肚腹痞滿肢體腫脹手足並冷飲食難化或大便泄瀉口吸氣冷者此真陽衰敗脾肺腎虛寒不能司攝而水泛行也急用加減腎氣丸否則不救

[illegible]若寸脈微名陽氣不足陰氣上入陽中則惡[illegible]寒也用補中益氣湯尺部脈弱名陰氣不足陽氣下陷於陰中則發熱也用六味地黃丸若暑熱令人肢體倦怠此濕熱所乘屬形氣虛而病氣實也當專補陽氣用補中益氣湯若發熱大渴引飲目赤面紅此血虛發熱屬形病俱虛也

當專補陰血用當歸補血湯[illegible]若右寸關脈浮大而無力者脾肺之氣虛也用補中益氣湯數而有力者脾肺之氣熱也用竹葉石膏湯右寸脈微數而無力者肺氣虛熱也用竹葉黃芪湯右尺脈微細或微數而無力者命門火衰也用八味地黃丸左寸關脈數而有力者心肝之氣熱也用[illegible]散數而無力者心肝之氣虛也用[illegible]左尺脈微而無力者腎經虛也用加減八味丸大凡瘡愈後[illegible]或先

渴而悲啼或口舌生瘡或咽喉腫痛或唇裂舌
黃目赤痰涎上湧者皆敗證也非此丸不能救
[眼目]昏弱或內障黑花屬血虛神勞用滋陰
腎氣丸若視物無力或見非常之狀屬陰精虛
弱用滋陰地黃丸若視物無力或視物皆大屬
陽盛陰虛用六味地黃丸若目緊體倦或肌膚
麻木屬脾肺氣虛用神效黃芪湯若至夜目暗
燈下亦暗屬陽虛下陷用決明夜靈散若眼暗
體倦內障耳鳴屬脾胃氣虛用益智聰明湯益

癘風　言錄　十六

五藏六府之精氣皆禀受於脾土上貫於目脾
為諸陰之首目為血脉之宗當補脾土為善・
[illegible]若左寸關脉數而無力血虛也四物
加參术等而無力氣虛也補中益氣湯尺脉數
或無力腎虛也六味地黃丸右寸關脉數而有
力者肺胃熱也犀角地黃湯數而無力者肺胃
虛熱也先用濟生犀角地黃湯後用四物湯加
參芪白术尺脉數無力陰虛也用六味地黃丸
若面黃目澀眵多手麻者脾肺虛也用黃芪芍

藥湯[illegible]若因胃氣虛而不能食用四
君子湯若因脾氣虛而不能化用六君子湯若大
便不實或嘔吐者脾氣虛寒也用六君子湯加
乾薑木香若作嘔[illegible]或過冷飲食者胃氣虛
熱也用五味異功[illegible]飲食者胃氣實熱也
用瀉黃散[illegible]若經行產後外邪入胞傳於
五藏而致之其證[illegible]者屬於肝用加味逍遙散
加防風濕熱[illegible]帶小便赤澀用前散加炒黑龍
膽草肝血不足或燥熱風熱用六味丸逍遙散

癘風　言錄　十七

色赤者屬於心用小柴胡湯加黃連山梔當歸
思慮過傷者用妙香散六味丸色白者屬於肺
用六味丸補中益氣湯加山梔色黃者屬於脾
用六味丸六君子湯加山梔柴胡不應用歸脾
湯色黑者屬於腎用六味丸氣血俱虛用八珍
湯陽氣下陷用補中益氣湯濕熱下注前湯加
茯苓半夏蒼朮黃檗氣虛痰飲四七湯送六味
丸若病久元氣下陷或攻伐所傷但升脾胃升
陽氣為主若推於人之肥瘦而用燥濕瀉火之

藥反傷脾胃爲患不淺[illegible]若右關脈
浮數氣虛而熱也用四君子加升麻當歸人脈
浮大或微弱元氣下陷也用補中益氣湯左關
脈[illegible]血虛也用四物湯加炒山梔升麻秦艽
[illegible]遲緩或浮大氣虛也用四君子湯加升麻炮
薑[illegible]洪數或無力者腎虛也用六味地黃丸
若[illegible]勞傷損精氣陰虛火動而小便下血諸
血[illegible]不問脈證自端但用前丸料煎服爲善
[illegible]在五更或侵晨乃脾腎虛五更服四神

丸日間服[illegible]散或不應或愈而復作急用八
味丸補命門火以生脾土其瀉自止[illegible]
[illegible]脾肺鬱損大腸津液乾涸或血虛火鑠不
潤[illegible]日期飲食數多必待腹滿脹自欲去而
不能[illegible]熱在直腸間者用豬胆汁潤之若妄服
[illegible]散之劑[illegible]傷[illegible]而不止或成中
痞[illegible]者用八珍湯加麻子仁腸胃
[illegible]麻子仁[illegible]夜不能[illegible]
[illegible]黃丸加麻子仁若厚味積熱小[illegible]

秘者肝腎虛也用六味地黃丸以滋腎水用補
中益氣湯以補脾胃若發熱晡熱用六君子湯
加味逍遙散養陰血清風熱若暴筋[illegible]用
透經解攣湯秦艽地黃[illegible]用八珍散加牡丹
皮柴胡主之若[illegible]血者用易老
祛風丸若肉肢或陰[illegible]必用四生散地
黃丸爲善若誤服[illegible]或敷巴豆砒
石等味肥肉腐[illegible]治者審之[illegible]
[illegible]肺經風熱用人參消風散

樺皮散[illegible]補中益氣湯加天麻蟬蛻血虛
用加味[illegible]散加鉤藤鉤面發紫泡或成塊或
鬢毛[illegible]用[illegible]經風熱先用小柴胡湯加山梔
丹皮鉤藤鉤後用加味逍遙散凡瘡屬肝經血
燥生風但宜滋腎水生肝血則火自息風自定
[illegible]自止[illegible]此風熱傷血
用[illegible]者佐以補中益氣湯加山
[illegible]佐以加味逍遙散加鉤藤
[illegible]

皮此風熱而秘濇用清胃散加芍藥蓋脾胃表
於二陰精血不足則大便秘塞而不通矣須用
六味地黃丸補中益氣湯以滋化源　小便
不利　若不渴而不利者熱在下焦血分也用滋腎
丸　渴而不利者熱在上焦氣分也用清肺散　腎
經陰虛而不利者用六味地黃丸　熱結膀胱而
不利者用五淋散　元氣虛而不能輸化者用補
中益氣湯　脾肺之氣燥而不能化生者用黃芩
清肺飲　若轉筋便閉氣喘不問男女孕婦急用

八味丸緩則不救　口瘍　足三陰經虛之屬厚
味濕熱所致者用加味清胃散　肝腎虛熱者用
六味地黃丸為主佐以逍遙散　脾腎虛熱者用
六味丸佐以六君子湯　肝脾鬱滯者六味丸佐
以歸脾湯　脾肺氣虛者六味丸佐以補中益氣
湯　氣虛下注者益氣湯佐以六味丸
類瘍治法　兩臁如癬搔痒久則腫水淋漓或
搔起白皮者名腎臟風也用四生散以祛風邪
用八味地黃丸以補腎水若頭目不清內熱口

乾體倦痰熱血燥秋間益甚故俗名濕來風宜
用羌活白芷散加味逍遙散氣虛者佐以補中
益氣湯加皂角刺釣藤鉤血虛者佐以八物湯
加柴胡牡丹皮或加味逍遙散兼服　肢體或
腿臂腕間患[illegible]而遊走不定者赤曰赤遊風
白曰白遊風為血虛陰火內動外邪所搏之證
白用人參消風散赤用加味逍遙散氣血俱虛
用八珍湯晡熱內熱用加味逍遙散六味地黃
丸　遍身或頭面起疙瘩或如霞片或破而膿

水淋漓或痒痛寒熱乃肝火血虛也用加味逍
遙散若口苦脇痛小便淋瀝肝火血熱也用柴
胡清肝散若婦女夜間譫語發熱熱入血室也
用小柴胡湯加山梔生地黃血虛者四物合小
柴胡湯病退却用逍遙散以從肝脾生陰血此
證多有因怒氣而發者皆治當審之　婦人肢體
瘙痒搔破成瘡久而不愈水淋漓熱渴眩暈日晡
益甚者用小柴胡湯加山梔丹皮清肝火補
脾血不足煩熱惡寒頭目不清用八珍散加丹皮

山梔補脾氣生陰血若自汗盜汗月水不調肚腹作痛用八珍湯六味丸若食少體倦心忪盜汗經閉寒熱用八珍湯佐以加味逍遙散若病久元氣怯弱用十全大補湯佐以歸脾湯　女子十三四或十六七而天癸未至或婦人月經不調發赤斑痒痛此屬肝火血熱用小柴胡湯加山梔生地黃牡丹皮防風　生蟲者乃相火制金不能平木而化耳非風邪所生也但滋腎水生肝血或佐以炎承蘗之類說見本證　敷

砒霜患處作痛或腐潰用濕泥頻塗換之若毒入腹胸膈苦楚或作吐瀉飲冷米醋一二杯即止多亦不妨生菉荳末芝蔴油俱可　敷貼雄黃藥悶亂或吐瀉用防己煎湯解之　服辛熱藥而鬚髮脫落者乃肝經血傷而火動非風也用四物湯六味丸以滋肝血生腎水　服川烏草烏等藥悶亂流涎或昏憒嘔吐或出血吐血用大荳遠志防風甘草任用一味煎湯解之大凡服風藥過多皆宜用之未應急用甘草生荳汁　敷貼巴荳之藥患處作痛肌肉潰爛以生黃連爲末水調敷之若毒入內吐瀉等證更以水調服一二錢大小荳菖蒲汁俱可　敷貼藜蘆毒入內煎葱湯解之　服祛風剋伐之藥嘔吐少食胸膈不利或形氣倦怠等證用六君子湯以補陽氣若煩躁作渴飲食不思或晡熱內熱面赤發熱用四物湯加參朮以生陰血餘從各門治之

薛新甫以邪之所湊其氣必虛世醫治癘止知

攻邪而不知補虛非徒無益而又害之故作癘瘍機要三卷循其法雖不能去病亦可以延天年無夭枉之患故備述於篇乃至去病之法則前再造醉僊之外千金翼有耆婆治惡病阿魏雷丸散諸方先服藥出蟲有其形狀青黃赤白黑然後與藥療之此出西域異人龍宮所秘病者能洗滌身心懺悔業障精虔修治而用之萬無不瘥也詳具類方中茲不贅

破傷風

夫風者百病之始也清淨則腠理閉拒雖有大風苛毒莫之能害諸瘡不瘥榮衛虛肌肉不生瘡眼不合而風邪入之爲破傷風之候亦有因瘡熱鬱結多着白痂瘡口閉塞氣難宣通故熱甚而生風者先辨瘡口平無汁者中風也邊自出黃水者中水也並欲作痓急治之○東垣云破傷風者通於表裏分別陰陽同傷寒證治人知有發表不知有攻裏和解夫脉浮而無力太

陽也在表宜汗脉長而有力陽明也在裏宜下脉浮而弦小者少陽也半在表半在裏宜和解明此三法而治不中病者未之有也[illegible] 河間云破傷風風熱燥甚怫鬱在表而裏氣尚平者善伸數欠筋脉拘急或時惡寒或筋惕而搐脉浮數而弦也宜以辛熱治風之藥開衝結滯而愈猶傷寒表熱怫鬱而以麻黃湯辛熱發散也凡用辛熱開衝風熱結滯宜以寒藥佐之則良免致藥中病而風熱轉甚也如治傷寒發熱用麻黃桂枝加黃芩知母石膏之類是也若止以甘草滑石葱豉寒藥發散甚妙若表不已漸傳入裏裏又未太甚而脉弦小者宜以退風熱開結滯之寒藥調之或微加治風辛熱亦得猶傷寒在半表半裏而以小柴胡和解之也若裏勢已甚而舌强口噤項背反張驚惕搐搦涎唾稠粘胸腹滿塞便溺秘結或時汗出脉沉洪數而弦也然汗出者由

風熱鬱甚於裏而表熱稍罷則腠理疎泄而心火熱甚故汗出也法宜除風散結寒藥下之後以退風熱開結滯之寒藥調之則熱退結散而風自愈矣

解表羌活防風湯 防風湯 九味羌活湯[illegible]蜈蚣散 解後實之白术防風湯 攻裏大芎黃湯[illegible]後服小羌活湯 和解羌活湯 地榆防風散 小柴胡湯 日久氣血漸虛邪氣入胃宜養血四物湯加防風藁本白芷

[illegible]爲麤末每服五錢水煎 服

風藥過多自汗出者白术黃芪湯　大汗不止
筋攣搐搦白术升麻湯　搐痓不已獨痓湯
背後搐者羌活獨活防風甘草向前搐者升麻
白芷獨活防風甘草兩傍搐者柴胡防風甘草
右搐加滑石　手足顫掉不已朱砂指甲散
四般惡證不可治第一頭目青黑色第二額上
汗珠不流第三眼小目瞪第四身上汗出如油
又痛不在瘡處者傷經絡亦死證也　外治初
覺瘡腫起白泡身寒熱急用玉真散傅之或用

杏仁去皮細嚼和雄黃飛羅白麪傅之一方只用杏仁白麪等分和勻新汲水調傅腫漸消為度　若腰脊反張
四肢強直牙關口噤用鼠一頭和尾燒作灰細
研以臘月豬脂和傅　牙關緊不能開用蜈蚣
一條焙乾研細末擦牙吐涎立甦　狗咬破傷
風人參不拘多少桑柴火上燒令煙絕用盞子
合研為末摻瘡上仍以魚膠煮烊封固　嬰童
自問云縣丹張公嘗言吾有一妙方治破傷風
如神用　䖟堆內蠐螬蟲一枚剛草房上亦

有之捏住其脊待其蟲口中吐水就抹在瘡口
上覺麻即汗出立愈後試之果然其蟲仍埋故
處勿傷其命

痓（說文痙彊急也而集韻痓字廣韻云惡也非彊直明矣作痓者誤今正之）

金匱云病者身熱足寒頸項強急惡寒時頭熱面赤目赤獨頭動搖卒口噤背反張者痓病也（面目赤頭動搖外邪發熱惡寒與傷寒相似但其脈沉遲身體強直反張為異耳）太陽病發熱無汗反惡寒者名曰剛痓　太陽病發熱汗出而不惡寒名曰柔痓　太陽病其證備身體強几几然脉反沉遲此為痓栝蔞桂枝湯主之　太陽病無汗而小便反少氣上衝胸口噤不得語欲作剛痓葛根湯主之　剛痓為病胸滿口噤臥不著席脚攣急必齘齒可與大承氣湯（[illegible]）

按世知治痓之法創自仲景而不知仲景之論傷寒皆自內經中來其所謂剛痓者為中風發熱重感於寒而得之與內經所謂赫曦之紀上羽其病痓其義[illegible]赫曦之熱與火運之熱無少異其重感於寒與[illegible]上羽之寒同是外鬱者熱因鬱則愈甚甚則熱兼燥化而無汗血氣不得宣通大小筋俱受熱害而強直故曰剛痓也其所謂柔痓者為太陽發熱重感於濕而得之即內經所謂諸痓項強皆屬於濕又謂因於濕首如裹濕熱不攘大筋緛短小筋弛長緛短為拘弛長為痿原病式亦謂傳為柔痓註云柔謂筋柔而無力痓謂骨強而不隨三者之義比之仲景所言重感於濕為柔痓者豈不同是小筋得濕則痿弛而無力者乎其搖頭發熱頸項強急腰背反張瘛瘲口噤與剛痓形狀等者又豈不同是大筋受熱則拘攣強直者乎後代方論乃以無汗為表實有汗為表虛不思濕勝者自多汗出乃以為表虛而用薑附溫熱等劑寧不重增大筋之熱歟及守仲景方者但知剛痓用葛根湯柔痓用桂枝加葛根湯而不解命意於柔痓之脉沉遲者在桂枝湯不加葛根而加栝蔞根蓋用葛根不惟取其解肌之熱而取其體輕可生在表陽分之津以潤筋之燥急今因沉遲沉乃衛氣

不足故用桂枝以和之遲乃榮血不足故用[illegible]
㿉根其體重可生在表陰分之津此仲景選脈
浮沉用藥淺深之法也至於太陽傳入陽明胸
滿口噤卧不着席脚攣急齘齒者與大承氣亦可
見治痓與傷寒分六經表裏無纖毫之異矣至
若所謂太陽病發汗太過及瘡家不可汗而汗
之因致痓者太陽病發熱脈沉細而病痓者病
者身熱足寒頸項強急惡寒時頭熱面赤獨頭
動搖卒口噤背反張若發其汗寒濕相得其表
痓　准繩　三十
益虛卽惡寒甚發其汗已其脈如蛇者暴腹脹
大爲欲解脈如故反伏弦爲痓者皆不出方言
治雖然能識療傷寒隨機應變之法則無患方
之不足用也　海藏云發汗太多因致痓身熱
足寒項強惡寒頭熱面腫目赤頭搖口噤背反
張者太陽痓也　若頭低視下手足牽引肘膝
相構陽明痓也　若一目或左右斜視并一手
一足搐搦者少陽痓也　汗之止之和之下之
各隨其經可使必已　太陽痓屬表無汗宜汗之有汗宜止之陽明痓屬裏宜下之少陽痓屬半表半裏宜和之[illegible]　神术湯加羌活
麻黄治剛痓解利無汗　白术湯加桂心黄芪
治柔痓解利有汗　太陽陽明加川芎荊芥穗
正陽陽明加羌活[illegible]大黄　少陽陽明加防
風柴胡根　熱而在[illegible]者加黄芩　寒而在表
者加桂枝黄芪[illegible]　熱而在裏者加大黄
寒而在裏者加[illegible]附子　右王氏分經
論痓因得仲景傷寒之法失其門用仲景方去
葛根栝蔞根與風痓者始從風痓筋強而然也
痓　准繩　三十一
及厥病式云筋脈項強而不柔和者則不然乃
邪在濕痓條下謂土主安靜故耳亢則害承乃
制故濕過極反兼風化制之然兼化者虛象而
實非風也豈可盡從風治乎又海藏分六經不
及厥陰厥陰固有痓矣經云厥陰在泉客勝則
大關節不利內爲痓強拘瘛外爲不便者非乎
靈樞又謂足少陰筋病主癇瘛及痓此非六陰
經亦病之一端乎抑海藏所遺非獨此而已至若
內經有謂太陽所至爲竅汗痓手陽明少陽厥

逆發嘔喉痹痓者乃是人之六經所屬風寒濕熱燥火之氣自相盛衰變而爲痓者也亦皆勿論予嘗思夫外感内傷之邪病痓治法迥别不可不辨天氣因入風之變鼓舞六淫而入是爲經風外傷貽禍内觸五臟故治邪必兼治風人氣因五性勞役感動厥陽君相二火相扇六經之淫邪而起遂有五陽勝負之變故勝者瀉負者補必兼治火調胃土以復火傷之氣蓋不可差也苟於内傷而用外感藥以散邪則原氣愈耗血竭神離而至於不救矣　丹溪云大率與癇相似比癇爲甚蓋因氣血大虚挾痰挾火而成藥宜人參竹瀝之類不可用風藥　一男子二十餘歲患痘瘡靨謝後忽患口噤不開四肢强直不能屈時或遶臍腹痛一陣則冷汗如雨痛定則汗止時作時止其脉極弦緊而急此因勞倦傷血山居多風寒乘虚而感又因痘瘡其血愈虚當用辛温養血辛凉散風遂用當歸身芍藥川芎青皮釣藤爲臣白术陳皮甘草

爲佐桂枝木香黄連爲使更加紅花少許煎十二貼而安　薛新甫云痓病因傷寒汗下過度與産婦潰瘍等病及因尅伐之劑傷損氣血而[illegible]者金衰木旺先用瀉青丸後用異功散腎水虚用六味丸肝火旺先用加味小柴胡湯次用加味四物湯發熱用加味逍遙散若木侮脾土用補中益氣加芍藥山梔脾經鬱結用加味歸脾湯脾土濕熱用三一承氣湯大凡病後氣血虚弱用參术濃煎佐以薑汁竹瀝時時用之如不應用十全大補湯更不應急加附子或用參附湯緩則不救　虞摶治一婦人年三十餘身形瘦弱月經後忽發痓口噤手足攣縮角弓反張此人血虚受風邪乘虚而入用四物湯加防風羌活荆芥少加附子行經二貼病減半六貼病全安　張子和治呂君玉妻年三十餘病風搐目眩角弓反張數日不食諸醫皆作風治不效夫諸風掉眩皆屬肝木曲直動揺風之用也陽主動陰主靜由火盛制金金衰不能平木肝

木茂而自痢因湧風涎二三升次以寒劑下十餘行又以排針刺百會穴出血一杯立愈（[illegible]）

痓既以有汗無汗辨剛柔又以厥逆不厥逆辨陰陽仲景雖曰痓皆身熱足寒然陽痓不厥逆其厥逆者皆陰也陽痓已前見　陰痓一二日面腫手足厥冷筋脉拘急汗不出恐陰氣內傷宜八物白朮散　若發熱脉沉而細者附太陰也必以桂枝加芍藥防風防巳湯又宜小續命湯　陰痓手足厥逆筋脉拘急汗出不止頭項強直頭搖口噤宜附子散桂心白朮湯附子防風散（右二陰劑）

診　太陽病發其脉沉而細者名曰痓為難治

痓脉伏按之緊如弦堅直上下行（脉經云凡痓脉皆伏）

弦緊　痓病發其汗已其脉浛浛如蛇暴腹脹大者為欲解脉如故反伏弦者痓（此痓字恐當作死字）

痓病有灸瘡難治

產後發痓　多由風寒濕乘虛而感皆從太陽經（[illegible]）　薛氏云若心肝風熱用釣藤湯肝脾血虛加味逍遙散肝脾鬱怒加味歸脾湯氣逆痰滯紫蘇飲肝火風熱鈞藤散脾[illegible]一二匙薑汁竹瀝

[illegible]　良方云產後汗多變痙因氣血虧損腠理不密風邪所[illegible]口噤背強如癇或搖頭[illegible]斷不[illegible]如絕宜速灌小續命湯若汗出兩手拭不及者不治　千金治產中風口噤[illegible]　[illegible]竹瀝一升分為五服微温頻服大效　[illegible]云小續命湯[illegible]拜散大豆紫湯皆治產後痙太陽[illegible]邪實脉浮弦有力者固宜但產後血氣大虛之人不宜輕發其表第用防風當歸散治之為妙　薛氏云產後痙由亡血過多筋無所養與傷寒汗下過多潰瘍膿血大泄[illegible]急以十全大補湯[illegible]加附子亦有[illegible]六淫七情所致者

瘈瘲

瘈者筋脉拘急也瘲者筋脉張縱也俗謂之搐是也　原病式云諸熱瞀瘈皆屬於火熱勝風搏併於經絡風主動而不寧風火相乘是以熱瞀瘈生矣治法祛風滌熱之劑折其火熱瞀瘈可立愈若妄加灼艾或飲以發表之劑則死不旋踵矣　素問云心脉急甚者為瘈瘲此心火虚寒也治宜補心牛黄散主之　靈樞云心脉滿大癇瘈筋攣此心火實熱也治宜瀉心火涼驚丸主之　肝脉小急亦癇瘈筋攣此肝虚也續斷丸主之　若肝脉盛者先救脾宜加減建中湯　素問云脾脉急甚者亦為瘈瘲此脾虚肝乘之而瘈也故宜實土瀉肝木之劑　熱傷元氣四肢困倦手指麻木時時瘈瘲人參益氣湯主之　尹氏表姑年近七十暑月得病手足常自搐搦如小兒驚風狀醫者不識以訊予予曰此[illegible]風也緣先傷於暑毛孔開而風乘之宜[illegible]防風各[illegible]錢黄芪一錢白芍藥一錢半二劑而病如失　風虚昏憒不自覺知手足瘈瘲或為寒熱血虚不能服發汗藥獨活湯主之　虚風證能食麻木牙關緊急手足瘈瘲目肉蠕瞤[illegible]脹此胃中有風胃風湯主之　肝勞虚寒[illegible]脹滿眼昏不食攣縮瘈瘲續斷丸主之　風[illegible]留滯心中昏憒四肢無力口眼瞤動或時搐搦或渴或自汗續命煮散主之

運氣瘈瘲有二其一曰火經曰火鬱之發民病嘔逆瘈瘲又曰少陽所至為暴注瞤瘈又曰少陽司天客勝則為瘈瘲是也其二曰水經曰陽明司天燥氣下臨木氣上從民病脇痛目赤掉振鼓慄又曰歲土太過雨濕流行民病足痿不收行善瘈又曰太陰之復頭頂痛重而掉瘈尤甚是也

[illegible]　經云肝主筋而藏血蓋肝氣為陽為火肝血為陰為水前證因產後陰血去多陽火熾盛筋無所養而然耳故[illegible]水過多金[illegible]散亦多致此治者當用

加味逍遙散或八珍散加丹皮鈎藤以生陰血則陰火自退諸證自愈如不應當用四君芎歸丹皮鈎藤以補脾土蓋血生於至陰至陰者脾土也故小兒吐瀉之後脾胃虧損亦多患之乃虚象也無風可逐無痰可消若屬陽氣脱陷者用補中益氣加薑桂陽氣虚敗者用十全大補加桂附亦有復生者此等證候若服祛風化痰瀉火之藥者且爲直狀若脉浮大發熱煩渴此爲假象惟當固本爲善無力抽搐戴眼反折汗出如珠者皆不治　古方海藏愈風湯　交加散

增損柴胡湯　秦艽湯

顫振

顫搖也振動也筋脉約束不住而莫能任持風之象也内經云諸風掉眩皆屬肝木肝主風風爲陽氣陽主動此木氣太過而尅脾土脾主四肢四肢者諸陽之末木氣鼓之故動經謂風淫末疾者此也亦有頭動而手足不動者蓋頭乃諸陽之首木氣上衝故頭獨動而手足不動散於四末則手足動而頭不動也皆木氣太過而兼火之化也木之畏在金金者土之子土爲木

尅何暇生金素問曰肝一陽也心二陽也腎孤藏也一水不能勝二火由是木挾火勢而寡於畏反侮所不勝直犯無憚難經謂木横乘金者是也此病壯年鮮有中年已後乃有之老年尤多夫老年陰血不足少水不能制盛火極爲難治前哲畧不及之唯張戴人治新寨馬叟作木火兼痰而治得効遇此證者當參酌厥旨而運其精思人　新寨馬叟年五十九因秋欠税官杖六十得驚氣成風搐已三年矣病大發則手

足顫掉不能持物食則令人代哺口目張瞬唇舌嚼爛抖擻之狀如線引傀儡每發市人皆聚觀夜間發熱不被盡蹇痛身燥痒中熱而反外寒久欲自盡手不能擧須宅求醫至破其家而病益堅叟之子亦月皆小吏也以父母病訊戴人戴人曰此病甚易治若隆暑時不過一湧再湧奪則愈矣今已秋寒可三之如未更刺腧穴必愈先以通聖散汗之繼服湧劑湧痰一二升至晚又下五七行其疾小愈待五日再一湧出

痰三四升如雞黃成塊狀如湯熱叟以手顫不能自探反與代探咽嗌腫傷昏憒如醉約一二時許稍稍省又下數行立覺足輕顫減熱亦不作足亦能步手能巾櫛自持匙筯未至三湧病去如濯病後但覺極寒戴人曰當以食補之久則自退盖大疾之去衛氣未復故宜以散風導氣之藥切不可以熱劑温之恐反成他病也

按此手擻戴人此治非真知為痰火盛實莫敢如此今世本之有餘由金之衰弱所致者眾亦有始同而終異者況吐汗下之後調經不足補養可平病之輕者或可用補金平木清痰調氣之法在人自斟酌之　中風手足嚲曳星附散獨活散金牙酒無熱者宜之摧肝丸鎮火平肝消痰定顫有熱者宜之　氣虛而振參术湯補之　心虛而振補心丸養之　挾痰導痰湯加竹瀝　老人戰振宜定振丸

攣

内經言攣皆屬肝肝主身之筋故也又陽明之復甚則入肝驚駭筋攣又脾移寒於肝癰腫筋攣　有熱　有寒　有虛　有實　熱攣者經所謂肝氣熱則筋膜乾筋膜乾則筋急而攣又云因於濕首如裹濕熱不攘大筋緛短小筋弛長緛短爲拘弛長爲痿之類是也丹溪云大筋緛短者熱傷血不能養故爲拘攣小筋弛長者濕傷血不能束骨故爲痿弱　筋膜乾者用生苄當歸之屬滋之大筋緛短者薏苡仁散主

之衍義云筋急拘攣有兩等素問大筋受熱則縮而短故攣急不伸則可用薏苡仁若素問言因寒筋急不可用也　寒攣者經所謂寒多則筋攣骨痛者是也烏頭湯千金薏苡仁湯　虛攣者經所謂虛邪搏於筋則爲筋攣又云脉弗榮則筋急又仲景云血虛則筋急此皆血脉弗榮於筋而筋成攣故丹溪治攣用四物加減本事治筋急極用養血地黃丸蓋本乎此　實攣者丹溪治一村夫背偏僂而足攣已成廢人診其脉兩手皆沉弦而滑遂以戴人煨腎散與之上吐下瀉過月餘久吐瀉交作如此凡三貼然後平復　東垣治董監軍臘月大雪初霽出外忽覺有風氣暴至診得六脉俱弦甚按之洪實有力其證手攣急大便秘澀面赤熱此風寒始至加於身也四肢者脾也以風寒之邪傷之則搐急而攣痺乃風淫末疾而寒在外也內經云寒則筋攣正此謂也本人素多飲酒內有實熱乘於腸胃之間故大便閉澀而面赤熱內則手

足陽明受邪外則足太陰脾經受風寒之邪用桂枝甘草以却其寒邪而緩其急搐用黃蘗之苦寒滑以瀉實而潤燥急救腎水用升麻葛根以升陽氣行手足陽明之經不令遏絕更以桂枝辛熱入手陽明之經爲引用潤燥復以芍藥之酸微寒專補脾氣使不受風寒之邪而退木邪專瀉肺金加人參以補元氣爲之輔佐加當歸身辛溫而和血潤燥名之曰活血通經湯更令暖房近火摩搓其手乃愈　本事方養

服參血地黃丸　秋服羚羊角湯　冬服烏頭
湯　下虛則挾腰膝疼痛防風散　上虛則挾
心神煩熱不得睡卧麥門冬散黃耆丸　外感
風濕四肢[illegible][illegible][illegible]蒼耳子搗末煎服　酒煮木瓜
令煖[illegible][illegible][illegible]用裹筋急處冷即易　灸筋急
不能[illegible]內踝筋急灸內踝四十壯外踝筋急灸
外踝三十壯立愈

眩暈

眩謂眼黑眩也運如運轉之運世謂之頭旋是
也　內經論眩皆屬肝木屬上虛丹溪論眩主
於痰[illegible]治痰降火[illegible][illegible]治眩亦以痰飲爲先也
趙以德曰丹溪先生主火而言者道也然道
無所之而不在道之謂何陰陽水火是也其順
淨清謐者水之化動擾撓亂者火之用也腦者
地氣之所生故藏於陰目之瞳子亦腎水至陰
所主所以二者皆喜靜謐而惡動擾靜謐則清

明內持動擾則掉擾散亂是故腦轉目眩者皆
由火也靈樞曰五藏六府之精氣皆上注目而
爲之精筋骨血氣之精與脈并爲目系上屬於
腦後出於項中故邪中於項因逢其身之虛其
入深則隨眼系以入於腦入於腦則腦轉腦轉
則引目系急目系急則目眩以轉矣所謂邪者
[illegible][illegible][illegible]外之諸邪也然諸邪盡謂以火之
[illegible][illegible][illegible]者何內經謂諸風掉眩皆屬肝木者是
[illegible][illegible][illegible]原病式釋之曰風火皆屬陽多爲

兼化陽主乎動兩動相搏則頭目爲之眩運而旋轉火本動也焰得風則自然旋轉於是乎掉眩掉搖也眩昏亂旋運也此非風邪之內火所或者數然風自內外外入者兼火化者則如是出內發者尤亦內火所生之風也及諸篇中考之所謂厥陰司天客勝耳鳴掉眩厥陰之勝者亦然此曰天之氣從上受者外入者也又謂發生之紀其藏木運太過皆掉眩巔疾善怒肝肺太過善忘忽忽冒眩巔疾又狗蒙招尤過在足

少陽厥陰者古曰瞤動蒙瞀也巢氏亦謂脇下痛頭眩者肝實也此或得於肝藏應天氣者所動或因本藏虛實之氣自動皆名之爲風非火之烈焰何能上於巔也至於木鬱之發甚則耳鳴眩轉目不識人善暴僵仆者尤是肝木中火發之甚也此天氣內應於藏與肝虛實之氣動者是皆名內發之風者也又謂太陽之勝熱反上行頭項囟頂腦中痛目如脫註文謂寒氣凌逆陽不勝之太陽之氣標在於巔入絡於腦故病如是謂太陽司天善悲時眩仆靈樞謂邪在心者病亦同二者皆是邪逆於心下致神志不安則悲心火不行則妄動上炎謂太陰之復陰氣上厥飲發於中頭項胸痛而掉瘛尤甚註文謂濕氣內逆寒氣不行太陽上留故爲是病謂太陰在泉病衝頭痛目似脫註文云亦是足太陽病也謂太陰司天頭項痛善眩靈樞謂邪在腎頸項時眩此皆濕邪害腎逆太陽之氣留於上而然也至於金匱要畧謂心下有支飲其人苦

冒眩者亦是格其心火不行而上衝也謂尺脉浮爲傷腎趺陽脉緊爲傷脾風寒相搏食穀即眩謂陽明脉遲食難用飽飽則發煩頭眩二者因脾胃虛而陽氣不足所以外見遲緊之脉內受濕飲之鬱不足之微陽者始與所鬱之熱并而衝上於胸目也用此比類以之則眩運之病非一邪而可終治矣太乙天真元氣皆待胃脘之陽以布於周身分三陰三陽之經脉六氣應天之陰陽運行於表者謂之六化布五行於五

藏屬之氣應地之陰陽運行於裏者謂之九陽雖然表裏固分爲二及乎一經合一氣相通氣而行則表裏必似二而一一而二者也然如其天之有德者化有用有變於氣交者備在身形之中經曰從游伏皆生於動動之清靜則生化治動之躁則苛疾起自此言之眩由人氣所動者豈止如金匱所云濕飲而已若此五陽六化妄動而病者又可勝數哉且夫凡有過節即濟[illegible]所動經藏之氣而妄起因名曰厥陽

之火厥陽之火有五謂之五邪五邪之變遂勝克之病作又或腎水不足或精血傷敗不能制其五臟之火獨光或中土虛衰不能隄防下氣之逆則龍雷之火得以僭竊於巔諸火上至於頭與目搏擊爲痛癢則旋轉爲眩運矣夫如是比類之道在經有之謂治病循法守度援物比類化之冥冥循上及下何必守經不引比類是知不明也[illegible]之何數或曰治諸邪當何如曰天火以爲[illegible]也各從其所動之因而治之因

實熱而動者治其熱因邪搏擊而動者治其邪因厥逆逼上者治所厥之邪因陰虛而起者補其陰抑其陽接而收之因陽虛而氣浮上者則補其陽斂其浮游之氣因五志而動者各安其臟氣以平之因鬱而發者治其所鬱之邪開之發之因精血不足者補之不已則求其屬以衰之因肥人而動者從盛衰之氣而補瀉之中氣虛延而動者補其土以安之上焦清明之氣虛不能上升而動者亦當補中焦之穀氣推而

揚之因五臟六府上注之精氣不足而動者察其何者之虛而補之如是雖不專治其火而火自息矣凡治百病之由火而生者皆然非唯掉眩而已　嚴氏云外感六淫內傷七情皆能眩運當以脈證辨之　風則脈浮有汗項強不仁宜久消風散本事川芎散羚羊角散都梁丸青州白丸子　寒則脈緊無汗筋攣掣痛不換金正氣散加川芎白芷芎朮湯則附湯濟生三五七散　暑則脈洪大而虛自汗煩悶黃連香薷

飲十味香薷飲消暑丸　濕則脉細沉重吐逆
涎沫腎著湯加川芎名除濕湯滲濕湯济生芎
朮散　風熱羌活湯鈎藤散　寒濕芎朮除眩
湯理中湯仍吞來復丹甚者養正丹　七情相
干眩運欲倒用十四友丸安腎丸二藥夾和以
和劑七氣湯送下仍間用乳香泡湯下　有氣
虛者乃清氣不能上升或汗多亡陽所致當升
陽補氣黃芪人參白朮川芎當歸甘菊花柴胡
升麻之類直指方云淫欲過度腎家不能納氣

歸元使諸氣逆奔而上此眩運出於氣虛也宜
益氣補腎湯　有血虛者乃因亡血過多陽無
所附而然當益氣補血芎歸湯之類直指方云
吐衄崩漏肝家不能收攝榮氣使諸血失道妄
行此眩暈生於血虛也宜補肝養榮湯　有因
虛致痰飲眩暈時向當以火欲得服手按之
蓋頭目乃諸陽之會陽氣不足故耳　丹溪云
一男子年七十九歲頭目昏眩而重手足無力
吐痰口口相續左手脉散大而緩右手緩而脉
大不及於左重按皆無力飲食略減而微渴大
便三四日一行衆人皆與風藥至春深必死予
曰此大虛證當以補藥作大劑服之衆怒而去
予教用人參當歸身黃芪芍藥白朮濃煎作湯
使下連翹丸三十粒如此者服一年半而精力
如少壯時連翹丸冬加乾薑少許餘三時皆依
本法連翹皆薑汁炒為細末又以薑汁煮糊為
丸　東垣云范天騋之內素有脾胃之病時顯
煩躁胸中不利大便不通初冬出外晚歸為寒

氣怫鬱悶亂大作火不得伸故也醫疑有熱治
以疏風丸大便行而病不減又疑藥力少復加
七八十丸下兩行前證仍不減復添吐逆食不
能停痰吐稠粘湧出不止眼黑頭旋惡心煩悶
氣短促上喘無力不欲言心神顛倒兀兀不止
目不敢開如在風雲中頭苦痛如裂身重如山
四肢厥冷不得安臥予謂前證乃胃氣已損復
下兩次則重虛其胃而痰厥頭痛作矣製半夏
白朮天麻湯主之而愈　中脘伏痰嘔逆眩暈

旋復花湯主之金匱方卒嘔吐心下痞膈間有水眩悸者半夏加茯苓湯主之假令瘦人臍下有悸吐涎沫而頭眩此水也五苓散主之又云心下有支飲（欬逆倚息形如腫謂之支飲）其人苦冒眩澤瀉白朮湯主之（澤瀉五兩白朮二兩水二升煮一升分溫再服）　痰閉不出者吐之　青黛散搐鼻取涎治眩神効　頭風眩運可用獨聖散吐之吐訖可用清上辛涼之藥防風通聖散加半夏等味仲景云此痰結胸中而致也　大小便結澀者微利之河間搜風丸　體虛有寒者溫之仲景云陽虛頭重眩苦極不知食味暖肌補中益精氣白朮附子湯主之　肝厥狀如癇疾不醒嘔吐醒後頭虛運發熱用麻黃鈎藤皮石膏乾葛半夏柴胡甘草枳殼甘菊為[illegible]末每服四錢水一鍾半生薑三片棗一枚同煎至八分去滓溫服　鈎藤散鈎藤陳皮半夏麥門冬茯苓石膏人參甘菊防風各等分甘草減半為細末每服四錢水一鍾半生薑七片煎八分溫服

戴復菴云有眩暈之甚抬頭則屋轉眼常黑花觀見常如有物飛動或見物為兩宜小三五七散或芎附湯生料正元飲加鹿茸一錢下靈砂丹或用正元飲加炒川椒一十五粒下茸硃丸若不効則獨用鹿茸一味每服半兩用無灰酒一盞半煎至一盞去滓入麝香少許服緣鹿茸生於頭頭暈而治以鹿茸蓋以類相從也曾有頭痛不愈服茸硃丹而効　右上一條為虛寒者設也若實熱者用之殆矣故丹溪云眩運不可當者大黃三次酒炒乾為末茶調下每服一錢至二錢　劉宗厚以眩暈為上實下虛所致而[illegible]之[illegible]所謂虛者血與氣也所謂實者痰涎風火也[illegible]然矣然針經[illegible]風篇云上虛則眩又五藏生成篇云徇蒙招尤目瞑耳聾下實上虛[illegible]此則眩運之[illegible]劉氏[illegible]與之水火乎蓋知虛者正氣[illegible]者[illegible]邪之所湊其氣必虛留而不去其[illegible]則虛[illegible]實實即虛何水炭之有

然亦當從寸部以定虛實上虛者以麻黃法治之實者以酒大黃法治之　本事方治虛風頭旋吐痰涎不已以養正丹主之稱其升降陰陽補接其氣非止頭旋而已嚴氏云世所謂氣不歸元而用丹藥鎮墜沈香降氣之法蓋香竄散氣丹藥助火其不歸之氣豈能因此而復耶內經云治病必求其本氣之歸求其本而用藥則善矣

脈　左手脈數熱多　脈濇有死血　右手脈實痰積　脈大是久病

癲狂癇總論

素問止言癲而不及癇靈樞乃有癇瘈癇厥之名諸書有言癲狂者有言癲癇者有言風癇者有言驚癇者有分癲癇爲二門者迄無定論究其獨言癲者祖素問也言癲癇言癲狂者祖靈樞也要之癲癇狂大相逕庭非名殊而實一之謂也靈樞雖編癲狂爲一門而形證兩具取治異途較之於癇又不侔矣徐嗣伯云大人曰癲小兒曰癇亦不然也素問謂癲爲母腹中受驚所致今乃曰小兒無癲可乎癇病大人每每有之婦人尤多今據經文分辨於後　癲者或狂或愚或歌或笑或悲或泣如醉如癡言語有頭無尾穢潔不知積年累月不愈俗呼心風此志願高大而不遂所欲者多有之　狂者病之發時猖狂剛暴如傷寒陽明大實發狂罵詈不避親疏甚則登高而歌棄衣而走踰垣上屋非力所能或與人語所未嘗見之事如有邪依附者是也　癇病發則昏不知人眩仆倒地不省高

下甚而瘈瘲抽掣目上視或口眼喎斜或口作六畜之聲 趙以德曰考之內經有瘨有癇以癇爲名者曰心脈滿大癇瘈筋攣註云心脈滿大則肝氣下流熱氣內搏筋乾血枯故癇瘈筋攣曰肝脈小急癇瘈筋攣註云肝養筋藏血肝氣受寒故癇瘈筋攣曰二陰急爲癇厥註云少陰也曰治癇驚脈王註云陽陵泉也陽陵泉乃足少陽合穴也曰厥狂顛疾久逆之所生也靈樞以癇名者曰足少陰筋病主癇瘈及痓曰暴

攣癇眩足不任身取天柱以瘨名者曰肺脈急甚爲癲疾腎脈急甚爲骨癲疾癲狂篇曰目癲疾始生先不樂頭重痛視舉目赤甚作極已而煩心候之於顏取手太陽陽明太陰血變而止治癲疾者常與之居察其所當取之處病至視之有過者瀉之置其血於瓠壺之中至其發時血獨動矣不動灸窮骨二十壯窮骨者骶骨也骨癲疾者顑齒諸腧分肉皆滿而骨居汗出煩悗嘔多沃沫氣下泄不治筋癲疾者身倦攣急大刺項大經之大杼嘔多沃沫氣下泄不治脈癲疾者暴仆四肢之脈皆脹而縱脈滿盡刺之出血不滿灸之挾項太陽灸帶脈於腰相去三寸諸分肉本輸嘔多沃沫氣下泄不治癲疾發如狂者死不治氣下泄不治者癲本由邪入於陰陰氣滿則陽塞於下而逆上今氣下泄則自腎間正氣盡脫於下故死癲發如狂死不治者由心之陽不勝其陰氣之逆神明散亂陽氣暴絕故如狂猶燈將滅而明也雖然未可以一槩論也

蓋必診脈而後定陰下脫者尺脈不應如往者寸脈不應若尺寸俱實則是陰陽交錯既癲而又狂則不可與此同語矣何以言之內經復謂陽明之厥則癲疾欲走腹滿不得臥而妄言者爲足陽明者胃脈也與足太陰脾爲表裏脾爲陰胃爲陽陰脈從足而上行陽脈從頭而下行二者有更虛更實之變是故陽明之厥者由太陰之脈逆上陽明之脈不得下行而返上故曰厥癲則胃積於中爲之未甚則癲甚則爲熱熱

則狂而妄言也不獨陽明之厥有是證凡足三陽之厥皆然何則如經所謂癲疾厥狂久逆之所生是也靈樞經脉篇言足太陽脉所生病者爲狂癲之疾凡經脉稱是動者爲氣病所生病爲血病[illegible][illegible]陰也足太陽内與腎少陰爲表裏外與[illegible][illegible][illegible]故得爲癲亦得爲狂也及考越人[illegible][illegible]難曰經言脉有陰陽更有相乘更相伏也脉居陰部而反陽脉見者爲陽乘陰也雖時沉澀而短此謂陽中伏陰也脉居陽部而

反陰脉見者爲陰乘陽也脉雖時浮滑而長爲陰中伏陽也重陽者狂重陰者癲此難經之言自陰陽相伏相乘至於重陰重陽皆爲癲狂之證從此諸陰陽之交錯盡能致其病非一因而已矣如是始與内經之意合奈何諸家之註止從重陰重陽爲癲狂於前乘伏則勿論及按王叔和脉經云陰附陽則狂陽附陰則癲者則與難經伏匿之[illegible]節是捨巳宮觀而之彼邪者何以言之脉經論熱病條謂陽附陰者腰已下至足熱腰已上寒陰附陽者腰已上至頭熱腰以下寒蓋陰虛氣不能治於内則附陽而上升陽無承而不下降故上熱而下寒陽虛氣不能衛於外則下陷附於陰故下熱上寒及用脉論癲狂則謂心脉急甚爲瘈瘲肝脉微澀爲瘈瘲筋攣脾脉急甚爲瘈瘲脉氣弦急病在肝少食腹滿頭眩筋攣癲疾脉大脉堅實者癲病脉洪大長者風眩癲疾心氣虛者精神離散陰氣衰則爲癲疾陽氣衰則爲狂及定生死脉則云診癲

病虛則可治實則死脉實堅者生脉沉細小者死脉搏大滑久久自已沉小急實不可治小堅急亦不可治脉實而緊急癲癇可治又有論奇經之癲癇者前部左右彈者陽蹻也動苦腰痛癲癇惡風偏枯僵仆羊鳴身強皮痺取陽蹻在外踝上三寸直骨是後部左右彈者陰蹻也動苦癲癇寒熱皮膚強痺從少陽斜至太陽是陽維也動苦癲癇僵仆羊鳴手足相引甚者失音不能言癲疾直取客主人兩陽維脉在外踝絕骨

下二寸從少陰斜至厥陰是陰維也動苦癲癇尺寸俱浮直下直上此爲督脉腰背强痛不得俛仰大人癲病小兒癇疾脉來中央浮直上下痛者督脉也動苦腰背膝寒大人癲小兒癇也灸頂上三丸或曰奇經之癲癇古今所無脉經獨言之何也曰豈無所自者哉按越人難經曰奇經八脉者不拘於十二經何也蓋經有十二絡有十五凡二十七氣相隨上下獨八脉不拘於經也比於聖人圖設溝渠溝渠滿溢流入深

湖故聖人不能拘通也而人脉隆盛入於八脉而不環周故十二經亦不能拘之其受邪氣畜則腫熱砭射之也今於衝任帶且勿論獨用五脉治癲癇者言督脉者註云其脉之流行起自下極循脊中上行至大椎與手足三陽脉交會上至瘖門穴與陽維會上至百會與太陽交會下至於鼻柱下水溝穴與手陽明交會據此推之督爲諸陽之海陽脉之都綱也病則脊强而厥陽維陰維者維絡一身陽維維於陽陰維

於陰爲病心苦痛陽蹻脉者起於跟中循外踝上行入風池陰蹻脉者亦起跟中循內踝上行至咽喉註云蹻捷疾也言此脉是人行走之機要動足之所由故曰蹻脉焉陰蹻爲病陽緩而陰急陽蹻爲病陰緩而陽急然而言二蹻之所行尚未及二脉皆上交會於目內眥陽脉交於陰則目閉陰脉交於陽則目開若靈樞癲狂篇首敘目之外內上下眥者正爲癲則目閉狂則目開之不同也故大惑諸篇亦曰衛氣留於陰

不得行於陽留於陰則陰氣盛陰氣盛則陰蹻滿不得入於陽則陽氣虚故目閉也衛氣不得入於陰常留於陽留於陽則陽氣滿陽氣滿則陽蹻盛不得入於陰則陰氣虚故目瞑矣由是而推晝夜榮衛行五十度而寤寐之機豈不在二脉乎二脉者足少陰腎之別脉也督與腎之大絡同起於會陰脉經謂陽維從少陽斜至太陽陰維從少陰斜至厥陰自其腎肝同在下焦上由追貫[illegible]上之可見五脉皆是輔相天機動

用於形體之要者也故不隨十二經之環周嗟乎巢氏方不逵王叔和之指撰為病源不復收採於是後失傳焉不獨此也至於聖人之旨亦不皆及輙立五癲之說一曰陽癲發如死人遺尿食頃乃解二曰陰癲初生小兒臍瘡未愈數洗浴因此得之三曰風癲發時眼目相引牽縱反彊羊鳴食頃乃解由熱作汗出當風因房室過度醉飲令人心意逼迫短氣脉悸得之四曰濕癲眉頭痛身重坐熱沐頭濕結腦沸未止得

之五曰馬癲發時反目口噤手足相引身體皆然皆癲發則仆地吐沫無知若強倞起如狂及遺糞者難治脉虛則可治實則死由是後代錢氏方論遂增五獸所屬為五臟之癲各有其狀犬癇者反折上竄犬吠肝也雞癇者驚跳反折雞叫肺也羊癲者目瞪吐舌搖頭羊叫心也牛癇者目直視腹滿牛叫脾也猪癇者如尸吐沫猪叫腎也却無馬癲及三因方論則復有馬癇者作嘶鳴搐搦臘蹌多因挾熱者驚心動膽攝

鬱涎入心之所致也諸方皆以初因涎鬱閉塞臟氣不動因之倒仆口吐涎沫也安知口吐涎沫豈止素積於胸中者哉大抵癲癇之發厥乃成厥由腎中陰火上逆而肝從之故作搐搦搐搦則爲身之脂液促迫而上隨逆氣吐出於口也然諸方不察其病源故論如此其源何如大抵皆因癲由邪入於陰然如前所云相乘相附分作三變於所病經脉一一當較量而治更分其有從標而得者有從本而得者標者止在經

脉氣不通肢運倒仆本者深入兩腎間動氣中當時腎受傷而虛腎藏志志不足則神躁擾所以靈樞云其先不樂也所謂腎間者以腎居兩傍各有腎俞一穴離脊中一寸半又有志室二穴謂上齊骨七節之傍中有小心者指此也越人分之左屬腎右為命門命門者精神之所舍原氣之所繫及論右腎之氣與左腎相通則謂之兩腎間動氣是人生命也係於生氣之原五藏六府十二經脉之根本呼吸之門也夫如是者

即內經所謂腎治於裏者是也所謂生氣者腎
從陰極而生即蒼天之氣所自起之分也故經
曰蒼天之氣清淨則志意治順之則陽氣固雖
有賊邪弗能害也或經脈引入外感內傷深入
於根本傷其生氣之原邪正混亂天樞不發衛
氣固留於陰而不行不行則陰氣畜滿鬱極乃
發發則命門之相火自下焦逆上填塞其音聲
惟迫出其羊鳴者一二聲而已徧身之脂液脾
之涎沫皆迫而上胸臆流出於口五藏六府十

二經脈[illegible]內皆不勝其衝逆故卒倒而不知
也俟陽火氣退散乃醒醒後若邪氣從病發而
散[illegible]不得復則癲不再作或邪不散仍與生氣
混[illegible]或邪鬱退而生氣之原尚虛當時不治則
邪易入而復作也如此者多成常發故內經曰
癲疾者初病歲一發不治月四五發也或曰子
以癲癇之疾有由邪入兩腎間而後作者此言
上文未[illegible]將有所自乎曰方論未之考而內
經[illegible]癲[illegible]又有足少陰筋病[illegible]癇

二陰非腎之經乎腎間動氣非腎之氣乎更以
胎癇言之便可推之腎間動氣本受父母精氣
既為[illegible]命之門安得各經引邪深入者不上於
此乎[illegible]以胎始[illegible]之則七節之傍命門穴在
其後[illegible]其前腎在兩傍胎在其中是故子臍
係以[illegible]隨母呼吸母呼亦呼母吸亦吸通母
之生[illegible]發氣以化育內外百骸之形者皆
是腎間動氣所致也當母受驚之邪子在母腹
隨母呼吸得之與腎間動氣混在其中雖生出腹

後一二歲始發或入九歲後發蓋小兒初生之
腎[illegible]如日方升邪不易入故癇未發必待復感之
邪入[illegible]與所感母腹之邪相搏而後作夫如是
大人與小兒病此癲疾者縱得稟質強壯終因
邪[illegible]其生命之原難得中[illegible]若發頻而志愚者
促[illegible]四十陰氣衰半而已小兒質弱日發者則
不過歲月遂亦難出成人之年蓋腎間生命之
氣[illegible]不復故不得[illegible]也諸方中所治皆不及
此 [illegible]發從陽蹻夜發灸照海為二

蹻能行下焦之陰陽陰陽行則動氣中之邪因
而可散故也

癲

癲病俗謂之失心風多因抑鬱不遂侘傺無聊
而成精神恍惚言語錯亂喜怒不常有狂之意
不如狂之甚狂者暴病癲則久病也宜星香散
加石菖蒲人參各半錢和竹瀝薑汁下壽星丸
或以涌劑涌去痰涎後服寧神之劑　因驚而
得者抱膽丸　思慮傷心而得者酒調天門冬
地黃膏多服取效　有心經蓄熱發作不常或
時煩躁鼻眼覺有熱氣不能自由有類心風稍

定復作清心湯加石菖蒲　有病癲人專服四
七湯而癒蓋痰迷為癲氣結為痰故也　四川
真蟬肚鬱金七兩明礬三兩細末薄荷丸如桐
子大每服五六十丸湯水任下此病由七情得
之痰涎包絡心竅此藥能去鬱痰　孫兆治相
國寺僧充忽患癲疾半年名醫皆不効召孫療
之孫曰但有鹹物任與食之但待云渴可來取
藥今夜睡著明日便愈也至夜僧果渴孫乃與
溫酒一角調藥[illegible]有頃再索酒與之半角

其僧遂睡兩晝夜乃覺人事如故僧謝之問其治法曰衆人能安神矣而不能使神昏得睡此乃靈苑方中硃砂酸棗仁乳香散也人不能用耳　陳良甫治一女人眼見鬼物言語失常循衣直視服用心藥不效投養正丹二貼煎乳香湯送下以三生飲佐之立愈　滑伯仁治一僧病發狂譫妄視人皆爲鬼診其脉累累如薏苡子且喘且搏曰此得之陽明胃實素問云陽明主肉其經血氣俱多甚則棄衣升高踰垣妄罵遂以三化湯三四下復進以火劑即愈　一妓心癡狂歌哭裸裎妄罵瞪視默默脉之沉堅而結曰得之憂憤沉鬱食與痰交積胸中涌之[illegible]復與火劑清上膈而愈　一人方[illegible]四搏燭中[illegible]似狂[illegible]且喃喃罵人[illegible]而[illegible]脉[illegible]弦上下行而左手寸[illegible]心脫絡也法當涌其痰而凝其神涌出痰沫四五升即熟睡次日乃寤寤則[illegible]其神之劑調之如舊　若脉

乍大乍小乍有乍無忽六部一息四至如常忽如雀啄如屋漏如蝦游魚戲此鬼祟之徵也宜以針灸治之　扁鵲曰百邪所病者針有十三穴也凡針之體先從鬼宮起次針鬼信便至鬼壘又至鬼心未必須併針止五六穴即可知矣若是邪蠱之精便自言說論其由來往驗有實立得其精[illegible]必須盡其命求去治之男從左起針女從右起針若數處不言便徧穴針也依訣而行針灸等處並宜主之仍須依法治之萬不失一　黃帝掌訣別是術家秘要縛鬼禁劫五嶽四瀆山精鬼魅並悉禁之有在人兩手中十指節間　第一針人中名鬼宮從左邊下針右邊出之　第二針手大指爪甲下名鬼信入肉三分　第三針足大指爪甲下名鬼壘入肉二分　第四針掌後橫紋名鬼心即太淵穴也入半寸　第五針外踝下白肉際足太陽名鬼路火針七鋥鋥三下　第六針大椎上入髮際一寸名鬼枕火針七鋥鋥三下　第七針耳前髮際宛宛中耳垂下五分名鬼牀火針七鋥鋥三下　第八針

承漿名鬼市從左出右　第九針手横紋上三寸兩筋間名鬼路[illegible]　第十針直鼻上入髮際一寸名鬼堂[illegible]　十一針陰下縫灸三壯女人即玉門頭名鬼藏　十二針足澤横紋外頭接白肉際名鬼臣[illegible]　十三針舌頭一寸當舌中下縫刺貫出舌上名鬼封仍以一板横口吻先針頭令舌不得動　已前若是手足皆相對針兩穴若是孤穴即單針之

秦承祖灸鬼法以病者兩手大拇指相並用細索縛扎縛定以大艾炷騎縫灸之甲及兩指角肉四處着火一處不着即無效灸七壯神驗

癲[illegible]

狂

難經曰狂之始發少臥而不饑自高賢也自辯智也自貴倨也妄笑好歌樂妄行不休是也

素問病能篇帝曰有病怒狂者此病安生岐伯曰生於陽也陽氣者暴折而難決故善怒病名曰陽厥曰何以知之曰陽明者常動巨陽少陽不動不動而動大疾此其候也治之奪其食即已夫食入於陰長氣於陽故奪其食即已使之服以生鐵洛為飲夫生鐵洛者下氣疾也[illegible]

狂[illegible]

陽明脉解篇帝曰陽明病甚則棄衣而走登高而歌或至不食數日踰垣上屋所上之處皆非其素所能也病反能者何也岐伯曰四肢者諸陽之本也陽盛則四肢實實則能登高也熱盛於身故棄衣欲走也陽盛則使人妄[illegible]而不欲食不欲食故妄走也[illegible]

是也　治法上實者從高抑之生鐵落飲抱膽丸養正丹　在上者因而越之瓜蒂散來甦膏子和治一人落馬發狂以車軸埋之地中約高二丈許上安中等車輪其輞上鑿一穴如作盆之狀縛病人在其上使之伏臥以[illegible]視之又令一人於下坐機一枚以棒攪之轉千百遭病人吐出青黃涎沫一二斗許病人自言不堪因解之索米與冷水飲數升而瘉　陽明實則脈伏宜下之大承氣湯 海藏治許氏病陽厥狂怒罵詈親疏或哭或歌六脈無力按[illegible]

無力身表如冰石發即叫呼聲高因不與之食[illegible]大承氣[illegible]之得奪食數升狂稍寧數日復[illegible]發[illegible]此五七次行大便數十次[illegible]痰　當歸承氣湯[illegible]此陽狂[illegible]不[illegible]當[illegible]甘草[illegible]引[illegible]以大利為度微續以瓜蒂散入防風末藜蘆吐之其病立安後用調心散洗心散涼膈散解毒湯等調之[illegible]一作[illegible]叫[illegible]法[illegible]役[illegible]鬱者發之[illegible]蟲

行[illegible]大[illegible]能支[illegible]所澳[illegible]膽[illegible]藥[illegible]之[illegible]行血木　虛者補之寧志膏[illegible]辰砂散[illegible]少臥少臥則衛獨行陽不行陰故[illegible]今昏其神得睡則衛得入於陰而陰[illegible]不虛陽無衛助不盛故陰陽均平而愈矣　經云悲哀動中則傷魂魂

傷則狂妄不精不精則不正此悲哀傷魂而狂當以喜勝之以溫藥補魂之陽[illegible]　經云喜樂無極則傷魄魄傷則狂狂者意不存人此喜樂傷魄而狂當以恐勝之以涼藥補魄之陰[illegible]　初虞世用苦參末鐵丸綱了大每服下丸薄荷湯化下恭子有乃以冷君火對化故藥之味苦而氣寒者類能助水而抑火[illegible]故苦參一味[illegible]治狂[illegible]心用辰砂[illegible]

散加金箔真珠末雜青州白丸子末潑飯湯調下吞十四友丸滑石六一湯加真珠末白湯調下　熱入血室發狂不認人牛黃膏主之　金匱云病如狂狀妄行獨語不休無寒熱其脉浮防己地黃湯主之　有婦人狂言叫罵歌笑不常似祟憑依一邊眼與口角吊起或作狂治或作心風治皆不效乃是舊有頭風痰風痰使然用芎辛湯加防風數服頓瘉

癎

癎病與卒中痙病相同但癎病仆時口中作聲將醒時吐涎沫醒後又復發有連日發者有一日三五發者中風中寒中暑之類則仆時無聲醒時無涎沫醒後不復再發痙病雖亦時發時止然身強直反張如弓不如癎之身軟或如猪犬牛羊之鳴也原病式以由熱甚而風燥為其兼化涎溢胸膈燥爍而瘈瘲昏冒僵仆也三因以驚動藏氣不平鬱而生涎閉塞諸經厥而乃

成或在母腹中受驚或感六氣或飲食不節逆於藏氣而成蓋忤氣得之外驚恐得之內飲食屬不內外所因不同治法亦異如驚者安神丸以平之痰者三聖散以吐之火者清神湯以涼之可下則以承氣湯下之　丹溪大法分痰與熱多少治之以黃芩黃連括蔞半夏南星為主有熱以涼藥清其心　有痰必用吐吐後用東垣安神丸及平肝之藥青黛柴胡川芎之類子和法瘈瘲不省目瞪如愚者用三聖散投

之臾用火盆於暖室中令汗吐下三法並行次服通聖散百餘日愈矣　虛不禁吐下者星香散加人參菖蒲茯苓麥門冬各一錢全蝎三箇入竹瀝下酥角丸楊氏五癇丸犀角丸龍腦安神丸參硃丸琥珀壽星丸或用天南星九蒸九曬為末薑汁打糊丸如桐子大每服二十丸煎人參麥門冬茯神菖蒲湯入竹瀝下　治法雜論云凡病發項強直視不省人事此乃肝經有熱也或有咬牙者先用葶藶苦酒湯吐之吐後

可服瀉青丸下之次服加減通聖散辯咬牙證用導赤散治之則愈如病發者可用輕粉白礬代赭石發過米飲調下經云重劑以鎮之　海藏云治長洪伏三脉風癇驚癇發狂惡人與火者灸第三椎第九椎服局方妙香丸以針穿一眼子透冷水內浸少時服之如本方若治弦細緩三脉諸癇似狂者李仲南五生丸　晝發治陽蹻申脉夜發治陰蹻照海　先灸兩蹻各二七壯然後服前藥[illegible]　平旦發者足少陽　晨朝發者足厥陰　日中發者足太陽　黃昏發者足太陰　人定發者足陽明　半夜發者足少陰　煎藥中各加引經藥

千金云病先身熱瘈瘲驚啼而後發脉浮洪者為陽癇病在六府外在肌膚猶易治也先身冷不驚掣不啼呼病發脉沉者為陰癇病在五藏內在骨髓難治也　劉宗厚曰陰陽癇猶急慢驚陽癇不因吐下由其有痰有熱客於心胃之間因聞大驚而作若熱盛雖不聞驚亦自作

也宜用寒藥以攻治之陰癇亦本於痰熱所作醫以寒涼攻下太過損傷脾胃變而成陰宜用溫平補胃燥痰之藥治之若曰不因壞證而有陰陽之分則是指痰熱所客表裏臟府淺深而言癇病豈本自有陰寒者哉　病久成積厚朴丸從本方春秋加茯苓冬又加[illegible]料中加人參菖蒲茯苓各一兩同[illegible]和劑服之積久生蟲妙功丸取之　病久[illegible]熱藥中加養血寧神之藥如因物驚者遠志麥門冬安神丸至寶丹服

餌不輟仍加謹節疾不再作矣

【脈】脈洪長伏爲風癇　弦細緩爲諸癇　浮爲陽癇　沉爲陰癇　虛弦爲驚　沉數爲實熱　沉小急實者虛而弦急者皆不治

煩躁

成氏曰煩爲擾擾而煩躁爲憤激而躁合而言之煩躁爲熱也析而言之煩陽也躁陰也煩爲熱之輕者躁爲熱之甚者　陳氏曰内熱曰煩外熱曰躁　東垣煩躁發熱論黃帝針經五亂篇云氣亂於心則煩心密默俛首靜伏云云氣在於心者取之手少陰心主之俞又云欬喘煩寃者是腎氣之逆也又云煩寃者取足少陰又云煩寃者取足太陰仲景分之爲二煩也躁也蓋火入於肺則煩入於腎則躁俱在於腎者以道路通於肺母也大抵煩躁者皆心火爲病心者君火也火旺則金爍水虧惟火獨存故肺腎合而爲煩躁又脾經絡於心中心經起於脾中二經相搏濕熱生煩夫煩者擾擾心亂兀兀欲吐怔忡不安躁者無時而熱冷汗自出少時則止經云陰躁者是也仲景以梔子色赤而味苦入心而治煩鹽豉色黑而味鹹入腎而治躁名梔子豉湯乃神藥也若有宿食而煩者梔子大黃湯

主之　運氣煩躁有二　一曰熱助心火煩躁
經云少陽之復煩熱內作煩躁鼽嚏又云少陽
之復心熱煩躁便數憎風是也　二曰寒攻心
虛煩躁經云歲水太過寒氣流行邪害心火病
身熱煩心躁悸陰厥是也　先賢治煩躁俱作
有熱[illegible]獨寒者治獨煩不躁者多屬熱唯
悸而煩者[illegible]虛寒治獨躁不煩者多屬寒唯火
邪者為熱[illegible]煩者心中煩胸中煩為內熱也躁
者身體手足躁擾或裸體不欲近衣或欲在井
煩躁　[illegible]　八十
中為外熱也內熱者有本之熱故多屬熱外熱
者[illegible]是無根之火故屬寒也
經云　內外俱虛身體冷而汗出微嘔而煩擾手
足厥逆躁不得安靜者死　熱病七八日其脉
微細小便不利加暴口躁脉代舌焦乾黑者死

虛煩[illegible]
活人云虛煩似傷寒非傷寒也成無已云傷寒
有虛煩有心中煩有胸中煩二說不同考之於
書成無已之言實出仲景活人無據然往往有
非因傷寒而虛煩者今故兩存之　陳無擇云
虛煩身不覺熱頭目昏疼口乾嗌燥不渴清清
不寐皆虛煩也　保命集云起卧不安睡不穩
謂之煩宜梔子豉湯竹葉石膏湯　活人云但
獨熱者虛煩也諸虛煩熱與傷寒相似但不惡
虛煩　[illegible]　八十一
寒身不疼痛故知非傷寒也不可發汗頭不痛
脉不緊數故知非裏實也不可下病此者內外
皆不可攻攻之必遂煩渴當與竹葉湯若嘔者
與陳皮湯一劑不愈再與之　三因淡竹茹湯
東垣朱砂安神丸　仲景云下利後更煩按
之心下濡者為虛煩也梔子豉湯主之　素問
帝曰有病身熱汗出煩滿煩滿不為汗解此為
何病岐伯曰汗出而身熱者風也汗出而煩滿
不解者厥也病名曰風厥帝曰願卒聞之岐伯

曰巨陽主氣故先受邪少陰與其爲表裏得熱則上從之從之則厥也帝曰治之奈何岐伯曰表裏刺之飲之服湯（[illegible]）[illegible]升湯治一女子年二十餘歲在室素強健六月間發燥悶困倦不食發狂欲入井六脉皆沉細而弱數兩日後微渴衆以爲病暑治不効四五日加嘔而人瘦手心極熱喜在陰處漸成伏脉時妄語乃急制局方妙香丸如桐子大以井水下一丸半日許大便藥已出

病無退減遂以麝香水洗藥以針穿三竅次日以凉水送下半日許大便下稠痰數升是夜得睡困頓伏枕旬日而愈因記金匱云昔肥而今瘦者痰也遂作此藥治之　溫膽湯治大病後虚煩不得眠（審知有飲者用之無飲者勿用）　金匱酸棗湯治虚勞虚煩不得眠　右九法治熱煩前五法煩熱怔忡知熱在心肺也故用竹葉石膏朱砂鎮墜其熱使下行也第六法煩而下利知熱在上也故用梔豉湯吐之第七法煩而汗出不解知

表裏有邪也故用表裏飲湯第八法脉沉口渴手心熱知熱不在表也故用妙香丸下之第九法溫膽酸棗治不得眠也　凡心虚則煩心肝腎脾虚亦煩心經云夫脉者心也其不及者令人煩心又云肝虚腎虚脾虚皆令人體重煩冤是知煩多生於虚也　大法津液去多五內枯燥而煩者八珍湯加竹葉酸棗仁麥門冬　榮血不足陽勝陰微而煩者人參生地黃麥門冬地骨皮白芍藥竹茹之屬或人參養榮湯下朱

砂安神丸　腎水下竭心火上炎而煩者竹葉石膏湯下滋腎丸　病後虚煩有飲溫膽湯無飲遠志湯　産蓐漏下後虚煩爲血液耗散心神不守危症宜猛進獨參湯　煩而小便不利五苓散　心中蘊熱而煩清心蓮子飲　煩而躁不能食陳皮湯

運氣煩有二　一曰熱助心實而煩經云少陰司天熱淫所勝病胸中煩熱嗌乾又云少陽司天火淫所勝病煩心胸中熱又云少陽之勝煩

心心痛治以鹹寒是也 二曰心從水制而煩經云太陽司天寒氣下臨心氣上從寒清時舉火氣高明心熱煩是也 三曰金攻肝虛而煩經云歲金太過燥氣流行肝木受邪民病體重煩寃是也 四曰土攻腎虛而煩經云歲土太過雨濕流行腎水受邪民病體重煩寃又云歲水不及濕乃大行民病煩寃足痿是也 五曰木攻脾虛而煩經云歲木太過風氣流行脾土受邪民病體重煩寃[illegible]落肝虛腎虛皆令人體重煩寃故金太過則肝虛土太過則腎虛木太過則脾虛凡此三太過之歲則肝腎脾受邪而虛皆病體重煩寃也

灸刺煩心有四 其一取心俞經云心主手厥陰心包絡之脈所生病者煩心心痛掌中熱詳盛虛寒熱陷下取之又云氣亂於心則煩心密嘿俛首靜伏取之手少陰心主之腧是也 其二取手少陰經云手少陰是少陰之脈所生病者煩心心痛掌中熱視盛虛熱寒陷下取之又云舌縱涎下煩悗取足少陰又云足少陰之別名曰大鍾當踝後繞跟別走太陽其病氣逆則煩悶[illegible]所別也又汗出煩滿不解表裏取之巨陽少陰也 其三取肺俞經云手太陰之脈所生病者煩心胸滿視盛虛熱寒陷下取之又云振寒洒洒鼓頷不得汗出腹脹煩寃取手太陰是也 其四取脾俞經云足太陰之脈所生病者煩心心下急痛溏瘕泄水閉視盛虛熱寒陷下取之是也

[illegible] 妊娠煩悶名曰子煩以四月受少陰君火以養精六月受少陽相火以養氣若母心驚胆寒多有是證產寶云是心肺虛熱或痰積於胸若三月而煩者但熱而已若痰飲而煩者吐涎惡食 內熱者竹葉湯竹茹湯益母丸 氣滯者紫蘇飲 痰滯者二陳白术黃芩枳殼 氣鬱者分氣飲加川芎 脾胃虛弱者六君紫蘇山梔

[illegible] 令服人婦人在[illegible]

服苦煩熱頭痛者與小柴胡湯頭不痛但煩者二物黄芩湯主之　又云婦人產中虛煩亂嘔逆安中益氣竹皮大丸主之　產後餘血不盡奔心煩悶生藕汁飲二升竹瀝亦得　產後餘血攻心或下血不止心悶面青冷氣欲絶羊血一盞頓服如不定更服　產後血虛煩生地黄汁清酒各一盞相和煎一沸分二服　蒲黄方寸七以東流水和服良　產後去血過多血虛則陰虛陰虛生内熱心胸煩滿短氣頭疼悶亂晡時甚與大病後虛煩相類宜和劑人參當歸散　產後短氣欲絶心中煩悶竹葉湯甘竹湯　產後虛煩不得眠芍藥梔豉湯酸棗湯

經驗方治產後煩躁禹餘粮一枚狀如酸餡者入地埋一半四面緊築用炭一秤發頂火一斤煅去火三分耗二爲度用濕砂土罨一宿方取出打去外面一重只使裏面細研水淘澄五七度將紙襯乾再研數千徧用甘草煎湯調二錢七

躁

經云諸躁狂越皆屬於火又曰陰盛發躁名曰陰躁欲坐井中宜以熱藥治之何也成無巳曰雖躁欲坐井中但欲水不得入口是也東垣云陰躁之極欲坐井中陽已先亡醫猶不悟復指為熱重以寒藥投之其死也何疑焉況寒涼之劑入腹周身之火得水則升走矣宜霹靂煎理中湯四逆湯之類治之

丹溪虛病痰病有似鬼祟論　血氣者身之神也神既衰乏邪因而入理或有之若夫血氣兩虧痰客中焦妨礙升降不得運用以致十二官各失其職視聽言動皆有虛妄以邪治之其人必死吁哉冤乎誰執其咎憲[illegible]慎之子傅兄年十七八時暑月因大勞而渴欲飲梅漿又連得大驚　四次妄言妄見病似鬼邪診其脉兩手皆虛弦而帶沉數予曰數爲有熱虛弦是大驚又

梅漿之酸鬱於中脘補虛清熱導去痰滯病乃可安遂與人參白术陳皮茯苓芩連等藥濃煎湯入竹瀝薑汁與旬日未效衆皆尤藥之不對予脉之知其虛之未完與痰之未導也仍與前方入則瀝又旬日而安　外弟歲一日醉飽後亂言妄見詢之係伊亡兄附體言出前事甚的乃叔在邊叱之曰非邪乃食魚生與酒太過痰所為也[illegible]湯一大碗吐痰一二升汗因大作睡一宵而安　金氏婦壯年暑月赴筵歸乃姑詢其坐次失序遂赧然自愧因此成疾言語失倫其中多間一句曰奴奴不是脉大率皆數而弦予曰此非邪乃病也但與補脾清熱導痰數日當自安其家不信邀數巫者噴水而咒之旬餘而死或曰病非邪而以邪治之何遽至於死予曰暑月赴宴外境蒸熱辛辣適口內境鬱熱而況舊有積痰加之愧悶其痰與熱何可勝言今乃驚以法尺[illegible]其[illegible]不寧也噴以法水[illegible]其[illegible]使汗不得泄汗不出則蒸

熱內燔血不[illegible]則陰消而陽不能獨立遂不死何爲或曰外[illegible]禁咒一科庸可廢乎予曰移精變氣乃小術耳可治小病若內有虛邪當用正大之法自有成式昭然可考然符水惟膈上熱痰一呷冷涼胃熱得之豈不暫快亦可取安若內傷而虛與冬令嚴寒符水下咽必冰胃而致害彼鬱熱在上熱邪在表須以汗解率得清冷肺腠固密熱何由解必致內攻陰陽離散血氣乖爭去死爲近又何訝焉　仲景云下

哭使魂魄不安者血氣少也血氣少者屬於心
心氣虛者其人多畏合目欲眠夢遠行則精神
離散魂魄妄行陰氣衰者為顛陽氣衰者為狂
運氣譫妄有二　一曰火邪助心經云歲火
太過上臨少陰少陽病反譫妄狂越又云火太
過曰赫曦其動炎灼妄擾又云少陰所至為譫
妄又云少陰之復振慄譫妄又云少陽之勝心
痛煩心善驚譫妄治以鹹寒是也　二曰寒邪
傷心經云歲水太過寒氣流行邪害心火病身

熱煩心躁悸陰厥上下中寒譫妄心痛上臨太
陽濕甚妄見又云陽明司天之政四之氣寒雨
降病振慄譫妄治以甘熱是也　[illegible]或歌哭或
笑語無所不至加減續命湯　[illegible]卒心腹脹
滿目利不行如乾霍亂狀由人精神不全心志
多恐遂為邪鬼所擊或附著沉沉默默妄言譫
語誹謗罵詈訐露人事不避譏嫌口中好言未
然禍福及至其時毫髮未失人有起心已知其
故登高涉險如履平地或悲泣呻吟不欲見人
如醉如狂其狀萬端但隨方俗致驗治之
[illegible]飛尸者發無由漸昏然而至其狀心腹
刺痛氣息喘急脹滿遁尸者停遁在人肌肉血
脉之間觸即發動亦令人心腹脹滿刺痛喘急
攻腸衝心瘥後復發沉尸者發時亦心腹絞痛
脹滿喘急雖歇之後猶沉痼在人府藏令人無
處不惡風尸者在人四肢循環經絡其狀冷躍
去來沉沉默默不知痛處衝風則發伏尸者其
病隱伏五藏積年不除未發身體都如無患發

則心腹刺痛脹滿喘急又有諸尸疰候者則是
五尸內之尸疰而挾外鬼邪之氣流注身體令
人寒熱淋瀝或腹痛脹滿喘急或磥塊踊起或
攣引腰脊或舉身沉重精神雜錯恒覺昏謬每
節氣改變輒致大惡積年累月漸至頓滯以至
於死死後復易傍人乃至滅門故為尸疰皆用
忍冬藤葉剉數斛煮令濃取汁煎服日三瘥
太乙神精丹蘇合香丸治此疾第一　因喪驚
憂悲哀煩惱感尸氣成諸證變動不已似冷似

熱風氣觸則發用雄朱散　頃在徽城日常修合神精丹一料與申亨家一婦人夢中見二蒼頭一前一後手中持一物前者云到也未後應云到也擊下爆然有聲遂魘覺後心一點痛不可忍昏悶一時許予忽憶神精丹有此一證取三粒令服之少頃已無病矣云服藥覺痛止神醒今如常矣日後相識稍有邪氣與一二服無不應驗方在千金中治中風之要藥但近世少得曾青磁石爲難合耳

產後譫妄

陳氏云產後狂言譫語乃心血虛也用朱砂末酒調下龍虎丹參丸琥珀地黃丸

薛新甫云前證當固胃氣爲主而佐以見證之藥爲善若一於攻痰則誤矣　郭氏論產後乍見鬼神者何答曰心主身之血脉因產耗傷血脉心氣虛則敗血得積上干於心心不受觸遂致心中煩躁起卧不安乍見鬼神言語顛倒俗人不識呼爲風邪如此但服調經散每服加龍膽一捻得睡即安　產後發熱狂言奔走脉虛大者四物湯加柴胡不愈加甘草柴胡生地黃等分煎服亦可

循衣摸牀

循衣撮空摸牀多是大虛之候不問雜病傷寒以大補之獲痊之多有得生者　東垣云循衣撮空許學士說作肝熱風淫末疾故手爲之循衣撮空[illegible]然莫若斷之爲肺熱似爲愈矣其人必譫語妄言經云肺入火爲譫語兼上焦有疾[illegible]之手經者上焦也二者皆當其理果如何說天地互爲體用此肺之體肝之用肝主諸[illegible]皆收斂此靜體何以自動蓋肺主諸氣[illegible]氣所以鼓舞故靜得動一者說肝之用一者說肺之體此天地互爲體用二者俱爲當矣是知肝藏血自寅至申行陽二十五度諸陽用事氣爲肝所使肺主氣自申至寅行陰二十五度諸陰用事血爲肺所用　海藏云婦人血風證因大脫血崩漏或前後失血因而枯燥其熱不除循衣撮空摸牀閉目不醒揚手擲足搖動不[illegible]躁浮而在內躁熱之極也氣[illegible]上下通者此爲難治宜生地黃黃連湯主之大承氣湯氣藥也自外而之內者用之生地黃黃連湯血藥也自內而之外者用之氣血合病循衣撮空證同自氣而之血血而復之氣大承氣湯下之自血而之氣氣而復之血地黃黃連湯主之二者俱不大便

　病人循衣縫譫語者不可治　病人陰陽俱絕循衣撮空妄言者死

喜笑不休

喜笑皆屬心火經曰心藏神神有餘則笑不休又云在藏爲心在聲爲笑在志爲喜又云精氣并於心則喜又云火太過爲赫曦赫曦之紀其病笑狂妄又云少陰所至爲喜笑者是也　河間云笑蕃茂鮮淑舒榮彰顯火之化也故喜爲心火之志也喜極而笑者猶燔爍太甚而鳴笑之象也故病笑者心火之盛也　一婦病喜笑不休已半年矣衆人皆無術求治於戴人戴人

喜笑不休　六十六

曰此易治也以滄鹽成塊者二兩餘用火燒令通赤放冷研細以河水一大碗同煎至三五沸放溫分三次啜之以釵探於喉中吐出熱痰五升次服降火劑火主苦解毒是也不數日而笑定矣內經曰神有餘者笑不休也所謂神者心火是也火得風而焰故笑之象也五行之中惟火有笑常治一老男子笑不休口流涎黃連解毒湯加半夏竹葉竹瀝薑汁而笑止矣　刺灸喜笑取手心主一經經云心主手厥陰之脉是

動則病面赤目黃喜笑不休詳盛虛熱實陷下取之

喜笑不休　六十七

怒

怒在陰陽爲陰閉遏其陽而陽不得伸也經云
陰出之陽則怒又云血并於上氣并於下心煩
寃善怒東垣云多怒者風熱陷下於地是也
怒屬肝膽經云在藏爲肝在志爲怒又云肝藏
血血有餘則怒又云膽爲怒是也　丹溪治怒
方香附末六兩甘草末一兩右和勻白湯調服三錢
運氣怒皆屬木太過經云木太過曰發生發
生之紀其病怒又云歲木太過風氣流行甚則
善怒又云歲土不及風反大行民病善怒是也
怒　[illegible]
怒在禁忌多生厥逆經云陽氣者大怒則形
氣絶而血菀於上使人薄厥又云暴怒傷陽又
云怒則氣逆甚則嘔血及飧泄是也　大法以
[illegible]勝土[illegible]用藥益肺金以平肝木

善太息

運氣善太息皆屬燥邪傷肝經云陽明在泉燥
淫所勝病善太息又云陽明之勝太息嘔苦又
云少陰司天地乃燥凄滄數至脇痛善太息是
也　內經灸刺善太息皆取心膽二經經云黃
帝曰人之太息者何氣使然岐伯曰思憂則心
系急心系急則氣道約約則不利故太息以出
之補手少陰心主足少陽留之也又云膽病者
善太息口苦嘔宿汁視足少陽脈之陷下者灸
之又云膽足少陽之脈是動則病口苦善太息
太息　[illegible]
視盛虛熱寒陷下取之是也

悲

悲在藏爲肺經云在藏爲肺在志爲悲又云精氣并於肺則悲　仲景云婦人藏躁喜悲傷欲哭象如神靈所作數欠伸甘麥大棗湯主之甘草三兩小麥一升大棗十枚水六升煮三升溫分三服　羅云悲皆屬寒水攻心經云火不及曰伏明伏明之紀其病昏惑悲忘從水化也又云太陽司天客氣下臨心氣上從喜悲數欠又云太陽司天寒淫所勝善悲時眩仆又云太陽之復甚則入心善忘善悲治以諸熱是也　針灸悲有二　其一取心經云邪在心則病心痛善悲時眩仆視有餘不足而調其輸也　其二取厥陰經云厥陰根於大敦結於玉英絡於膻中厥陰爲闔闔折即氣絶而喜悲悲者取之厥陰視有餘不足虛實寒熱陷下而取之也

驚悸恐總論

或問驚悸怔忡恐怖之別曰悸即怔忡也怔忡者本無所驚自心動而不寧驚者因外有所觸而卒動張子和云驚者爲自不知故也恐者爲自知也蓋驚者聞響乃驚恐者自知如人將捕之狀及不能獨自坐臥必須人爲伴侶方不恐懼或夜必用燈照無燈燭亦恐懼者是也　內經無有稱驚怖者始於金匱要略奔豚條云有驚怖繼之云驚恐因是而見驚怖即驚恐怖懼也恐亦懼也於義且同凡連稱其名以爲提綱者多是一陰一陽對待而言如喜怒並稱者喜出於心心居於陽怒出於肝肝居於陰志意並稱者志是靜而不移意是動而不定靜則陰也動則陽也驚恐並稱者驚因觸於外事內動其心心動則神搖恐因惑於外事內歉其志志歉則精却是故內經謂驚則心無所依神無所歸慮無所定故氣亂矣恐則精却却則上焦閉閉則氣還還則下焦脹故氣不行矣又謂

嘗貴後賤嘗富後貧悲憂內結至於脫營失精病深無氣則灑然而驚此類皆是病從外事所動內之心神者也若夫在身之陰陽盛衰而致驚恐者驚是火熱爍動其心心動則神亂神用無方故驚之發態亦不一狀隨其所之與五神相應而動肝藏魂魂不安則為驚駭為驚妄肺藏魄魄不安則驚躁脾藏意意不專則驚惑腎藏志志慊則為恐心惕惕然胃雖無神然為五藏之海諸熱歸之則發驚狂若聞木音亦惕然

心欲動也恐者則是熱傷其腎腎傷則精虛精虛則志不足志本一定而不移故恐亦無他狀內經於驚之病邪有火熱二淫司天在泉勝復之氣有各經熱病所致有二陽積并有氣并於陽等為諸驚等病故病機統而言曰諸病驚駭皆屬於火也於恐病之深者有精氣并於腎則恐有血不足則恐有陰少陽入陰陽相搏則恐有胃氣熱腎氣微弱則恐腎是動病者恐然於肝之驚恐互相作者以其藏氣屬陽居陰納血

藏魂魂不安則神動神動則驚血不足則志歉志歉則恐故二者肝藏兼而有之似此之類於火熱二淫屬感邪之外餘者之驚恐皆因人氣之陰陽所動而內生者也雖然亦非獨火熱二淫而已於陽明脈病則亦為驚矣曰驚恐二病與內外所因其治法同乎異乎曰驚則安其神恐則定其志治當分陰陽之別何待而同也夫易之為卦乾坤交坎離列坎離交而後為既濟而人以五藏應之心為離火內陰而外陽腎為

坎水內陽而外陰內者是主外者是用人主內者五內也外者五氣是故心以神為主陽為用腎以志為主陰為用陽則氣也火也陰則精也水也及乎水火既濟全在陰精上奉以安其神陽氣下藏以定其志不然則神擾不安於內陽氣散於外志惑於中陰精走於下既有二藏水火之分治法安得無少異所以驚者必先安其神然後散亂之氣可斂氣斂則陽道行矣恐者必先定其志然後走失之精可固精固則陰氣

用矣於藥而有二藏君臣佐使之殊用內外所
感者亦少異焉爲外事驚者有雖子和氏謂驚者
平之平常也使病者時時聞之習熟自然不驚
固是良法不若使其平心易氣以先之而後藥
之也至於內傷內氣動其神者則不可用張氏之法
唯[illegible]其陰陽之盛衰而後[illegible]可安志可
定矣 人之所主者心心之所養者血心血一
虛[illegible]神氣失守失守則舍空舍空而痰入客之此
驚悸之所由發也或耳聞大聲目擊異物遇險

臨危觸事喪志心爲之忤使人有惕惕之狀是
則爲驚心虛而停水則胸中滲漉虛氣流動水
既上乘心火惡之心不自安使人有怏怏之狀
[illegible]驚動是則爲悸驚者與之豁痰定驚之
[illegible]者與之逐水消飲之劑所謂扶虛則養心
[illegible]心氣[illegible]若[illegible]一切以陽燥從事或者心
火自[illegible]又[illegible]生風之證

驚

素問云東方青色入通於肝其病發驚駭 脾
移熱於肝則爲驚衄 二陽一陰發病主驚駭
背痛善噫善欠名曰風厥 三陽一陰太陽
脈至[illegible]一陰不得止[illegible]外爲驚駭 胃足
陽明之脈是動則病[illegible]聞木音則惕然而驚心欲
動 陽明所謂甚則厭人與火聞木音則惕然
而驚者陽氣與陰氣相薄水火相惡故惕然而
驚也 黃帝問曰足陽明之脈病惡人與火聞

木音則惕然而驚鐘鼓不爲動聞木音而驚何
也岐伯曰陽明者胃脈也胃者土也故聞木音
而驚者土惡木也 由是觀之肝膽心脾胃皆
有驚證明矣 運氣驚悸有三 一曰肝木不
及金來乘之經曰木不及曰委和委和之紀其
發驚駭又云陽明之復則入肝驚駭筋攣是也
二曰火邪助心經云少陽所至爲驚惑又云
少陽所至爲驚躁又云少陽之勝善驚是也
三曰寒邪傷心經云歲水太過寒氣流行病煩

心躁悸是也　東垣云六脉俱大按之空虛必
面赤善驚上熱乃手少陰心之脉也此氣盛多
而亡血以甘寒鎮墜之劑瀉火與氣以墜氣浮
以甘辛溫微苦峻補其血熟地黃生地黃柴胡
升麻[illegible]皮川芎黃芪之類以補之以
防血溢上竭[illegible]　三因云五飲停
蓄閉於中[illegible]使人驚駭倚飲家五飲湯丸　心膽
虛怯觸事易驚或夢寐不祥遂致心驚膽懾氣
鬱生涎涎與氣搏變生諸證或短氣悸乏或復

自汗者溫膽湯主之嘔則以人參代竹茹
若驚悸眠多異夢隨即驚覺者宜溫膽湯加酸
棗仁蓮肉各一錢以金銀煎下十四友丸或鎮
心丹遠志丸酒調妙香散琥珀養心丹定志丸
寧志丸　卧而多驚魘真珠丹丸獨活湯　羌
活勝濕湯治卧而多驚悸多魘溲者邪在少陽
厥陰也加柴胡五分如淋加澤瀉五分此下焦
風寒二經合病也經曰腎肝之病同一治爲俱
在下焦非風藥行經不可也　丹溪云病自驚

而得者則神出於舍舍空得液則成痰矣血氣
入舍則痰拒其神不得歸焉[illegible]
驚悸因事有所大驚而成者其脉大動脉之
狀如豆厥厥動搖無頭尾者是也東垣云外物
驚宜鎮心以黃連安神丸　密佗僧研極細末
茶湯調一錢七治驚氣入心絡不能語者昔有
爲狼及大蛇所驚皆以此而安　驚則氣上故
以重劑墜之　熱鬱有痰寒水石散　氣鬱有
痰加味四七湯　虛而有痰十味溫膽湯養心

湯　金匱云病有奔豚有吐膿有驚怖有火邪
此四病皆從驚發得之　經云陽氣者開闔不
得寒氣從之乃生大僂陷脉爲瘻留連肉腠俞
氣化薄傳爲善畏及爲驚駭者是瘻瘡所爲之
驚駭也蓋俞則瘻瘡之俞竅其痛氣留連肉腠
之間恐人觸着而痛故化惕惕然之心內薄而
傳爲是驚駭之疾也
診　寸口脉動而弱動即爲驚弱即爲悸　趺
陽脉微而浮浮爲胃氣虛微則不能食如恐怖

之脉變迫所作也寸口緊趺陽浮滑氣虛是以悸驚主病者其脉止而復來其人目睛不轉不能呼氣

悸

雜病

傷寒明理論釋悸字云悸心忪也築築惕惕然動怔怔忪忪不能自安也則悸即怔忡而今人分爲兩條謬矣心悸之由不越二種一者虛也二者飲也氣虛者由陽氣內虛心下空虛火氣內動而爲悸也血虛者亦然其停飲者由水停心下心爲火而惡水水既內停心不自安故爲悸也有汗吐下後正氣內虛而悸者有邪氣交擊而悸者有榮衛涸流脉結代者則又甚焉必生津液益血以實其虛此從傷寒而論者若雜病則考諸內經云心痺者脉不通煩則心下鼓膽病者口苦嘔宿汁心下澹澹恐如人將捕之狀足陽明是動聞木音則惕然而驚心包絡是動病心中澹澹大動腎足少陰是動病善恐心惕然如人將捕之原病式云用心勞火旺其心胸躁動謂之怔忡也後知悸之爲病是心藏之氣不得其正動而爲火邪者也蓋心爲君火包絡爲相火火爲陽陽主動君火之下陰精承之相火之

下水氣承之夫如是而後得其正而清淨光明爲生之氣也若之所承則君火過而不正變爲煩熱相火妄動爲熱上必當不見心悸之證哉況心者神明居之經曰兩精相搏之謂神又曰血氣者人之神是以陽氣血在心藏未始相離也今失其陰偏傾於陽陽亦以失所承而散亂故精神怔怔忡忡不能自安矣如是者當自心藏中補其不足之陰以安其神氣不已則求其屬以壯水之主以制陽光也又包

悸　百十

絡之火故包絡心而且游行於五藏故五藏之氣妄動者皆能火也是以各藏有疾皆能與包絡之火合動而作悸如是者當自各藏補瀉其火起之由而後從包絡調之平之隨其攸利而治若各藏後熱於心而致包絡之火動者治亦如之若心氣不足腎水凌之逆上而停心者必折其逆氣瀉其水補其陽若左腎之真水不足而右腎之火上逆與包絡合動者必峻補左腎之陰以制之若內外諸邪鬱其二火不得發越隔絕營衛不得充養其正氣者則皆以治邪解鬱爲主若痰飲停於中焦礙其經絡不得舒通而鬱火與痰相擊於心下以爲怔忡者必導去其痰經脈行則病自已　丹溪云怔忡大槩屬血虛與痰　有慮便動者屬虛　時作時止者痰因火動　瘦人多是血虛　肥人多是痰飲真覺心跳者是血少宜四物安神之類　金匱云食少飲多水停心下甚者則悸微者短氣又云心下悸者半夏麻黃丸主之亦可用溫膽湯

悸　百一

或導痰湯加炒酸棗仁下壽星丸及茯苓飲子茯苓甘草湯半夏白朮湯五苓散之類火盛加黃連　脈結代而悸炙甘草湯　久思所愛觸事不意虛耗真血心血不足遂成怔忡宜養榮湯　感風寒暑濕閉塞諸經而怔忡者各見本門　氣有餘火上衝怔忡不已甚者火炎於上或頭暈眼花或齒落頭脫或手指如許長大或見異物或腹中作聲惟降火爲急也治宜滋陰抑火湯不效者十全大補養心之劑日久服降火藥不愈

加竹子從治或入參芪亦可　有失志者由所求不遂或過誤自咎懊恨嗟歎不已獨語書空若有所失宜溫膽湯去竹茹加人參柏子仁各一錢下定志丸仍佐以酒調辰砂妙香散　有痞塞不飲食心中常有所歉愛處暗室或倚門後見人則驚避似失志狀此爲卑惵之病以血不足故耳宜人參養榮湯脾胃不足者從神嘉禾散加當歸黃芪各半錢

恐

藏府恐有四　一曰腎經云在藏爲腎在志爲恐又云精氣并於腎則恐是也　二曰肝膽經云肝藏血血不足則恐戴人曰膽者敢也驚怕則膽傷矣蓋肝膽實則怒而勇敢肝膽虛則善恐而不敢也　三曰胃經云胃爲恐是也　四曰心經云心怵惕思慮則傷神神傷則恐懼自失者是也　運氣善恐皆屬肝木虛經云木不及曰委和委和之紀其病搖動注恐是也　針灸善恐有三　其一取腎經云腎足少陰之脈是動病氣不足則善恐心惕惕如人將捕之虛則補之寒則留之是也　其二取肝經云肝虛則目䀮䀮無所見耳無所聞善恐如人將捕之取其經厥陰與少陽是也　其三取膽經云膽病者善太息口苦嘔宿汁心下澹澹恐人將捕之取陽陵泉又云善嘔嘔有苦長太息心中憺憺恐人將捕之邪在膽逆在胃膽液泄則口苦胃氣逆則嘔苦故曰嘔膽取三里以下胃氣

逆則少陰血絡以閉臟，逆却調其虛實以去其邪是也　丹溪治周本心年六十形氣俱實因大恐正月間染病心不自安如人將捕之狀夜臥亦不安兩耳後亦見火光炎上食飲雖進而不知味口乾而不欲食以人參白朮當歸身為君陳皮為佐加鹽炒黃蘗炙玄參各少許煎服自愈月餘而安經云恐傷腎此用鹽炒黃蘗炙玄參引參歸等藥入補腎足少陰絡也　本事方人參散茯神散補膽防風湯皆治膽虛之劑

健忘

黃帝曰人之善忘者何氣使然岐伯曰上氣不足下氣有餘腸胃實而心氣虛虛則營衛留於下久之不以時上故善忘也　腎盛怒而不止則傷志志傷則喜忘其前言　血并於下氣并於上亂而喜忘　火不及曰伏明伏明之紀其病昏惑悲忘　太陽司天寒氣下臨心氣上從善忘　太陽之復甚則入心善忘善悲　人生氣稟不同得氣之清則心之知覺者明得氣之濁則心之知覺者昏心之明者無有限量雖千百世已往之事一過目則終身記而不忘豈得忘其目前者乎心之昏者精神既短則目前不待於傷心而不能追憶其事矣劉河間謂水清明而火昏濁故上善若水下愚若火此稟質使之然也設或稟質清濁混者則不耐於事物之擾擾則失其靈而健忘也蓋氣與血人之神也經曰靜則神藏躁則消亡靜乃水之體躁乃火之用故性靜則心有乎中情動則心忘於外動不

已則忘亦不已忘不已則存乎中者幾希存乎
中者幾希則為役使忘不俟終日已所以世人
多忘者役役擾擾紛紜交錯營營於一生其氣
血之陰者將竭必稟質在中人以上清明有所
守不為事物所亂者百難一人也由是古之藥
固有安心養血之功不若平其心易其氣養其
在已而已若夫痰之健忘者乃一時之病然病
忘之邪非獨痰也凡是心有所寄與諸火熱傷
亂其心者皆得健忘如靈樞謂盛怒傷志志傷

善忘[illegible]謂血并於下氣并於上亂而善忘夫
如是豈可不各從所由而為治耶　思慮過度
病在心脾宜歸脾湯有痰加竹瀝　有因精神
短少者人參養營湯小定志丸寧志膏　有因
痰迷心竅者導痰湯下壽星丸或加味茯苓湯
上虛下盛於補心藥中加升舉之劑　心火
不降腎水不升神志不定事多健忘宜朱雀丸
千金孔子大聖枕中方龜甲龍骨遠志菖蒲
四味等分為末酒服方寸匕日三服常令人大

聰明　治多忘方菖蒲一分茯苓茯神人參各
五分遠志七分為末酒服方寸匕日三夜一五
日効　聖惠方菖蒲遠志各一分搗為細末戊
子日服方寸匕開心不忘　肘後方治人心孔
惛塞多忘喜誤丁酉日密自至市買遠志著巾
角中為末服之勿令人知　本草商陸花主人
心惛塞多忘喜臥取花陰乾百日搗末日暮水
服方寸匕臥思念所欲事即於眼中自見

汗總論

素問云陽氣有餘為身熱無汗陰氣有餘為多汗身寒陰陽有餘則無汗而寒　又云飲食飽甚汗出於胃驚而奪精汗出於心持重遠行汗出於腎疾走恐懼汗出於肝搖體勞苦汗出於脾　凡瞑熱而汗出醒則倏收者曰盜汗亦曰寢汗不分寤寐不由發表而自然汗出者曰自汗若勞[illegible]動汗出非自汗也　傷寒脈緊麻黃發[illegible]之汗出於衛　傷寒脈緩白朮桂枝

止之汗出於榮　往來寒熱眩柴胡連翹和之汗出於少陽　體若燔炭地骨皮秦艽解之汗出於三焦　厥而抑鬱柴胡麻黃發之汗出於血　熱聚於胃大黃芒硝下之汗出於足陽明陰毒大汗附子乾薑溫之汗出於三陽

自汗　頭汗　手足汗　無汗

心之所藏在內者為血發於外者為汗汗者乃心之液而自汗之證未有不由心腎俱虛而得之故陰陽虛必腠理發熱自汗此固陰陽偏勝而致又有傷風中暑病濕兼以驚怖房室勞極則歷節腸癖痰飲產蓐等證亦能令人自汗仲景謂內熱則自津脫腠理開汗大出巢氏云虛勞病若陽氣偏虛則津發泄為汗又云心藏熱則腠理開腠理開則汗出諸家言汗出之義大

約如此嘗因是而究之汗者津之泄也津與氣同類氣之所至津即有之以故知內經之言心為汗者人受其益心是巨陽之藏陽乃火也氣也火由藏入府表裏之陽皆心藏主之以行其變化是故津者隨其陽氣所在之處而生亦隨其火擾所在之處泄出為汗其汗盡由心出也不然何內經言風言勞動言陽陰相爭者其汗各由其所在藏府而出之乎然五藏六府又必以十二經脈榮衛為要內經脈是司其出入行

氣之隧道榮行脉中以滋陰血衛行脉外以固
陽氣陽氣固則腠理肥玄府密而藏府經脉榮
衛通貫若一內之藏府與表之經脉離居則兩
者出入之機皆廢於是邪在於內則玄府不密
而汗從府藏出邪在表則腠理不固而汗從經
脉出所以自汗之由不可勝計至若藏府之陰
拒格衛氣浮散於外無所依從或胃氣虛衰水
穀氣脱散者或肺氣微弱不能宣行榮衛而津
脱者如是自汗雖病重而尚有可治獨三陽之

絕汗出者則不可治矣　陰虛陽必湊故發熱
自汗當歸六黃湯加地骨皮　陽虛陰必乘故
發厥自汗黃芪建中湯甚者加附子或芪附湯
　滑伯仁治一婦暑月身冷自汗口乾煩燥欲
臥泥水中脉浮而數按之豁然虛散曰素問云
脉至而從按之不鼓諸陽皆然此為陰盛格陽
得之飲食生冷坐臥當風以真武湯冷飲之一
進汗止再進躁去三進全安　陰陽俱虛熱不
甚寒不甚秋冬用桂枝春夏用黃芪脉證無熱

者亦用桂枝脉證有熱者亦用黃芪　或身溫
如常而汗出冷者或身體冷而汗亦冷別無他
病並屬本證　戴復菴用黃芪建中湯加浮麥
少許煎黃芪六一湯或玉屏風散　平人氣象
論云尺澀脉滑謂之多汗王註謂尺膚澀而尺
脉滑也澀者榮血內涸又針經云腠理發泄
汗出溱溱是謂津脱津脱者腠理開汗大泄按
此二經論曰汗多而血涸津脱者東垣周衛湯
雖曰治濕勝自汗內有血藥貫潤劑也可以治

此　濕勝自汗以東垣法治之東垣曰西南坤
土也在人則為脾胃陽之汗以天地之雨名之
濕才淋淫驟注者濕勝也陰滋其濕為露為雨
此陰寒隔熱火也隔者解也陰濕寒下行地之
氣也仲景云汗多則亡陽陽去則陰勝也重虛
則表陽虛極矣甚為寒中濕勝則音聲如從甕
中出若中水也相家有言土音如居深甕裏言
其音也濕甚而不中[illegible]其病[illegible]也審矣又知此二
者亦為陰寒[illegible]其氣虛則外寒雖見熱中蒸

蒸為汗終傳大寒知始為熱中者表虛無陽不任外寒終傳為寒中者多成痺寒矣夫色以候天脉以候地形者乃候地之陰陽也故以脉氣候之皆有形之可見者也　治張芸夫四月天寒陰雨寒濕相雜因官事飲食失節勞役所傷病解之後汗出不止沾濡數日惡寒重添厚衣心胸悶躁時躁熱頭目昏憒壅塞食少減此乃胃外陰火熾甚與夫雨之濕氣挾熱兩氣相合令濕熱大作汗出不休兼見風邪以助東方甲

乙以風藥去其濕以甘藥瀉其熱羌活勝濕湯主之　有痰證冷汗自出者宜七氣湯或理氣降痰湯痰去則汗自止　火氣上蒸胃中之濕亦能作汗可用涼膈散　有氣不順而自汗不止須理氣使營衛調和小建中湯加木香　素問帝曰有病身熱解惰汗出如浴惡風少氣此為何病岐伯曰病名酒風帝曰治之奈何岐伯曰以澤瀉朮各十分麋銜五分合以三指撮為後飯（麋銜一名薇銜　俗名吳風草）　又云飲酒中風則為漏

風漏風之狀或多汗常不可單衣食則汗出甚則身汗喘息惡風衣裳濡口乾善渴不能勞事河間以白朮散主之此即酒風也凡在表風皆自汗惡風　因飲食汗出日久心中虛風虛邪令人半身不遂見偏風痿痺之病先除其汗慓悍之氣按而收之安胃湯　有病後多汗服正元散[illegible]不愈唯八珍散宜之　有別處無汗獨心孔一片有汗思慮多則汗亦多病在心宜養心血用獖豬心一箇破開帶血入人參當

歸二兩縫之煮熟去藥止喫豬心仍以艾湯調茯苓末服之　若服藥汗仍出者有熱牡蠣散無熱小建中湯加熟附子一錢不去皮或正元散可以溫粉撲之大汗不止宜於諸藥中入煅牡蠣粉一錢半并吞朱砂丹或茸珠丹常自汗出經年累月者多用黑錫丹久病及大病新愈汗出者亦可用此若不宜熱補須交濟其陰陽自愈當以靈砂丹主之凡此皆為無他病而獨汗出者故非謂有兼病者也　若服諸藥欲止

汗固表而亞無効驗藥愈澁而汗愈不收止可理心血蓋汗乃心之液心無所養不能攝血故溢而爲汗宜大補黃芪湯加酸棗仁有微熱者更加石斛兼下靈砂丹　汗出如膠之粘如珠之凝及淋漓如雨揩拭不逮者難治

【診】肺脈耎而散者當病灌汗至令不復散發也　肺脈緩甚爲多汗

【頭汗】　陰陽俱虛枯燥頭汗亡津液也熱入血室頭汗傷濕額上汗因下之微喘者死胃上熱

熏額汗發黃頭汗小便不利而渴此瘀血在裏也心下懊憹頭汗傷寒結胸無大熱以水結在胸脇間頭汗往來寒熱頭汗　海藏　頭汗出劑頸而還血證也額上偏多何謂也曰首者六陽之所會也故熱熏蒸而汗出也額上偏多以部分左頰屬肝右頰屬肺鼻屬中州頤屬腎額屬心三焦之火涸其腎水溝渠之餘迫而上入於心之分故發爲頭汗而額上偏多者屬心之部而爲血證也飲酒飲食頭汗出者亦血證也

至於雜證相火迫腎水上行入於心爲盜汗或自汗傳而爲頭汗出者或心下痞者俱同血證例治之無問傷寒雜病消積下之而心下痞者血證也何以然曰下之亡陰亡陰者則損脾胃而亡血氣在胸中以下其血陷之於心之分也故心下痞世人以爲血病用氣藥導之則痞病愈甚而又下之故變而爲中滿鼓脹非其治也然則當作何治曰獨益中州脾土以血藥治之其法無以加矣　頭汗出胸脇滿小便不利往

來寒熱心煩嘔而不渴柴胡桂薑湯　身微熱表虛頭汗出不已或因醫者發汗以致表虛者[illegible]八湯

【[illegible]】　一男子手足汗醫用芩連蘗并補劑皆不効又足汗常多後以八物半苓爲君白附川烏佐使其汗即無　治腳汗白礬乾葛各等分爲末每半兩水三碗煎十數沸洗日一次三五日自然無汗

【[illegible]】　[illegible]

經云奪血者無汗奪汗者無血　東垣云真氣已虧胃中火盛汗出不休胃中真氣已竭若陰火已衰無汗反燥乃陰中之陽陽中之陽俱衰四時無汗其形不久濕衰燥旺理之常也其形不久者秋氣主殺生氣乃竭生氣者胃之穀氣也乃春少陽生化之氣也　[illegible]天盛夏浴[illegible]汗[illegible]表實治[illegible]月無汗[illegible]用半夏紫蘇[illegible]味為末入[illegible]末[illegible]流末[illegible]仁將末[illegible]以括蔞穰桃仁泥半兩為丸先服三

自汗　[illegible]　百十六

劑湯三則却服此丸子

盜汗

衛氣至夜行於陰或遇天之六淫在於表或遇人氣興衰所變如天之五邪六淫者相乘於裏或臟腑經脉之陰陽自相勝負則皆有以致陽氣之不足然而非惟寒濕燥同其陰者能傷其陽而[illegible]若風火熱同其陽者則亦能傷之而相火[illegible]者尤甚夫火與元氣不兩立故[illegible]陰衰衛與陽一也陽衰則衛虛所虛[illegible]行陰當瞑目之時則更無氣以固其表

盜汗　[illegible]　百十七

故腠理開津液泄而為汗迨寤則目張其行陰之氣復散於表則汗止矣夫如是者謂之盜汗即內經之寢汗也內經謂腎病者腹大脛腫喘咳寢汗憎風又歲水太過甚則上氣乘之者病亦若是證曰腎邪攻肺心內微心液為汗故寢汗仲景傷寒論中名盜汗謂陽明病當作寒實[illegible]脉浮者必盜汗又三陽合病目合則汗成無[illegible]謂傷寒盜[illegible]非若雜病者之責其陽虛而已[illegible]邪在半表[illegible]使然也何者若邪氣一切

在表干於衛則自汗出此則邪氣侵行於裏外連於表邪及裏則衛氣行於裏乘表中陽氣不緻津液得泄而爲盜汗亦非若自汗有爲之虛者有爲之實者其於盜汗悉當和表而已今觀仲景二論似若不同究其微旨則一而已矣何則內經論其源則心腎者乃陰陽之主所以論汗必自心之所論寢必自腎之陰仲景之云從其邪之所在以陰陽使成盜汗是指陰陽之流者其所論其源流悉是衛氣之爲用衛氣者由

穀氣之所化所藏之所衛於大腸之陽必得是而後充大衛既充則表發故生氣通天論所言陽氣者如蒼天之氣微之則陽因與陽因而上衛外者之類皆指衛氣而所以王注以衛氣合天地之陽氣若夫成無已之釋仲景者因此矣抑亦未爲至當虛勞雜病之人豈可獨責其陽虛而不有陰虛之可責者乎予每察雜病之盜汗有冷有熱豈無其故哉因熱邪乘陰虛而發者所出之汗必熱因寒邪乘陽虛而發者所出之

汗必冷其汗冷之義即內經所謂陰勝則身寒汗出身上清也非獨爲自汗雖盜汗亦然其溫汗之義殊以所乘之熱將同於傷寒傳熱在表裏而汗者也雖然邪乘之重者亢則害承乃制兼化水爲冷者有之相火出於腎挾水化而爲冷者有之此又不可不審也蓋成無已因金匱要畧微脈病云平人脈虛弱微細善盜汗又以巢氏病源以虛勞之人盜汗有陽虛所致因即謂雜病之盜汗悉由於陽虛也且以金匱要畧

言之脈虛弱者乃陽氣之虛細弱者乃陰氣之虛何獨舉陽而遺其陰亦智士之一失也然虛勞之病或得於大病後陰氣未復遺熱尚留或得之勞役七情色慾之火衰耗陰精或得之飲食藥味積成內熱皆有以傷損陰血衰憊形氣陰氣既虛不能配陽於是陽氣內蒸外爲盜汗灼而不已豈能久存而不破散乎　當歸六黃湯治盜汗之聖藥　宜潤劑者六黃湯　宜燥劑者正氣湯　無內熱者防風散白朮散　肝

火當歸龍薈丸　虛者黃芪連翹湯　實者三
黃連翹湯　身熱加地骨皮柴胡黃芩秦艽
肝虛加酸棗仁　肝實加龍膽草　右尺實大
黃蘗知母　煩心黃連生地黃當歸辰砂麥門
冬　脾虛人參白术白芍藥炒山藥白扁豆浮
麥亦可用山藥一味爲末臨臥酒調下三錢
經霜桑葉末茶調服　黃芪微炒酒漬服　外
用五倍子或何首烏爲末津唾調填臍中以帛
縛定　臟府盜汗皆屬腎經云腎病者寢汗出

盜汗　門　醫經五　百十

憎風是也　運氣盜汗皆屬寒水經云歲水太
過寒氣流行甚則寢汗出憎風又云太陽所至
爲寢汗　六元紀

多臥不得臥　臥不安附

靈樞大惑論云衛氣不得入於陰常留於陽留
於陽則陽氣滿陽氣滿則陽蹻盛不得入於陰
則陰氣虛故目不瞑矣衛氣留於陰不得行於
陽留於陰則陰氣盛陰氣盛則陰蹻滿不得入
於陽則陽氣虛故目閉也　寒熱論云足太陽
有通項入於腦者正屬目本名曰眼系頭目苦
痛取之在項中兩筋間入腦乃別陰蹻陽蹻陰
陽相交陽入陰陰出陽交於目銳眥陽氣盛則

多臥不得臥　門　醫經十　百二一

瞋目陰氣盛則瞑目　四十六難曰老人臥而
不寐少壯寐而不寤者何也然經言少壯者血
氣盛肌肉滑氣道通榮衛之行不失於常故晝
日精夜不寤老人血氣衰肌肉不滑榮衛之道
濇故晝日不能精夜不寐也故知老人不得寐
也　海藏云膽虛不眠寒也酸棗仁炒爲末竹
葉湯調服　膽實多睡熱也酸棗仁生爲末薑
茶汁調服
素問帝曰人有臥而有所不安者何也岐伯曰

藏有所傷及精有所倚則臥不安故人不能懸其病也　羌活勝濕湯治臥而多驚邪在少陽厥陰也　諸水病者故不得臥臥則驚驚則欬甚

不得臥

靈樞邪客篇帝問曰夫邪氣之客人也或令人目不瞑不臥出者何氣使然伯高曰五穀入於胃也其糟粕津液宗氣分為三隧故宗氣積於胸中出於喉嚨以貫心脈而行呼吸焉營氣者泌其津液注之於脈化以為血以榮四末內注五藏六府以應刻數焉衛氣者出其悍氣之慓疾而先行於四末分肉皮膚之間而不休者也晝日行於陽夜行於陰常從足少陰之分間行於五藏六府今厥氣客於五藏六府則衛氣獨衛其外行於陽不得入於陰行於陽則陽氣盛陽氣盛則陽蹻陷（陷當作滿）不得入於陰陰虛故目不瞑黃帝曰善治之奈何伯高曰補其不足瀉其有餘調其虛實以通其道而去其邪飲以半夏湯一劑陰陽已通其臥立至黃帝曰善此所謂決瀆壅塞經絡大通陰陽和得者也願聞其方伯高曰其湯方以流水千里以外者八升揚之萬遍取其清五升煮之炊以葦薪火沸置秫

米一升（秫米北人謂之黃米可以釀酒）治半夏五合徐炊令竭爲一升半去其滓飲汁一小杯日三稍益以知爲度故其病新發者覆杯則臥汗出則已矣久者三飲而已也　素問逆調論陽明者胃脉也胃者六府之海其氣亦下行陽明逆不得從其道故不得臥也下經曰胃不和則臥不安此之謂也　金匱虚勞虚煩不得眠酸棗湯主之本事方鱉甲丸　聖惠方治骨蒸煩心不得眠用酸棗仁一兩水一大盞半研絞取汁下米二合煑粥候熟下地黃汁一合更煑過不計時服之　胡洽治虚悸不得眠人參白朮茯苓甘草生薑酸棗仁六物煑服（[illegible]）溫膽湯治大病後虚煩不得眠（[illegible]）六一散加牛黃治煩不得眠　戴云不寐有二種有病後虚弱及年高人陽衰不寐有痰在膽經神不歸舍亦令不寐虚者六君子湯加炒酸棗仁炙黃芪[illegible]痰者宜溫膽湯減竹茹一半加南星[illegible]大抵[illegible]思

怔忡失志心風不寐皆是膽涎沃心以致心氣不足若用涼心之劑太過則心火愈微痰涎愈盛病愈不減惟當以理痰氣爲第一義（[illegible]）湯加石菖蒲半錢　喘不得臥以喘法治之　厥不得臥以脚氣法治之

多臥

靈樞大惑篇黃帝曰人之多臥者何氣使然岐伯曰此人腸胃大而皮膚濕而分肉不解焉腸胃大則衛氣留久皮膚濕則分肉不解其行遲夫衛氣者晝日常行於陽夜行於陰故陽氣盡則臥陰氣盡則寤故腸胃大則衛氣行留久皮膚濕分肉不解則行遲留於陰也久其氣不精則欲瞑故多臥矣其腸胃小皮膚滑以緩分肉解利衛氣之行於陽也久故少瞑焉黃帝曰其

非常經也卒然多臥者何氣使然岐伯曰邪氣留於上焦上焦閉而不通已食若飲湯衛氣留久於陰而不行故卒然多臥焉　運氣多睡皆屬內熱經云陽明司天之政初之氣陰始凝氣始肅民中熱善眠是也　酸棗仁一兩生用臘茶二兩以生薑汁塗炙微焦搗羅爲末每服二錢水七分盞煎六分溫服無時　灸法無名指第二節尖一壯屈手指取之

怠惰嗜臥

東垣云脉緩怠惰嗜臥四肢不收或大便泄瀉此濕勝從平胃散又云怠惰嗜臥有濕胃虛不能食或沉困或泄瀉加蒼朮自汗加白朮　食入則困倦精神昏冒而欲睡者脾虛弱也六君子湯加神麴麥芽山查之屬　四肢懶惰人參補氣湯　丹溪云脾胃受濕沉困無力怠惰嗜臥者半夏白朮肥人是氣虛宜人參二朮半夏甘草[illegible]黑瘦人是熱黃芩白朮飲食

太過時運不調枳實白芩　肢人之虛實寒熱當審脉參之方可以肥瘦爲準者無以離當[illegible]也

身重

素問示從容論有云肝虛腎虛脾虛皆令人體重煩寃　運氣身重有五　一曰濕乃濕制腎虛而重經云太陰所至爲身重又云太陰之復體重身滿又云歲土太過濕氣流行民病體重煩寃又云土鬱之發民病身重是也　二曰濕熱經云少陽司天之政四之氣炎暑間化其病滿身重是也　三曰寒濕經云太陰司天之政三之氣感於寒濕民病身重是也　四曰風乃

木制脾虛而重經云歲木太過風氣流行民病體重煩寃又云歲土不及風乃大行民病體重煩寃又云厥陰在泉風淫所勝病身體皆重是也　五曰金乃燥制肝虛而重經云歲金太過燥氣流行民病體重煩寃是也　東垣云身重者濕也補中益氣湯加五苓散去桂主之　潔古云起臥不能謂之濕身重是也小柴胡湯黃[illegible]　仲景云風濕脈浮身重汗出惡風者防己黃芪湯主之　潔古云夏月中風濕身

重如山不能轉側除風勝濕去熱之藥主之　仲景云腎著之病其人身體重腰中冷如坐水中形如水狀反不渴小便自利飲食如故病屬下焦身勞汗出衣裏冷濕久久得之腰以下冷痛腹重如帶五千錢甘薑苓朮湯主之　脾胃虛弱元氣不能營於心肺四肢沉重食後昏悶參朮湯主之　針灸身重有二法　其一取脾經云脾病者身重善肉痿取其經太陰陽明少陰血者又云脾足太陰之脈是動則病[illegible]身體

皆重視盛虛熱寒陷下取之也　其二取腎經云腎病者身重寢汗出憎風取其經少陰太陽血者[illegible]

不能食　饑不能食　惡食

心下不痞滿自不能食也　東垣云胃中元氣盛則能食而不傷過時而不饑脾胃俱旺則能食而肥脾胃俱虛則不能食而瘦故不能食皆作虛論　若傷食惡食自有本門不在此例　病人脉緩怠惰四肢重著或大便泄瀉此濕勝也從平胃散加味　病人脉弦氣弱自汗四肢發熱或大便泄瀉皮毛枯槁髮脫從黃芪建中湯加味　病人脉虛氣弱脾胃不和從四君子六

君子湯加味　有痰從二陳湯加味兼下人參半夏丸　虛而有痰用人參四兩半夏一兩薑汁浸一宿曝乾為末麪糊丸食後生薑湯下　痰積痞隔食不得下皂莢燒存性研末酒調下一錢匕　和中湯　七珍散　六神湯　錢氏異功散　皆四君子加減例開胃進食之正劑也　羅謙甫云脾胃弱而飲食難任者不可一槩用克伐之劑宜錢氏異功散補之自然能食設或嗜食太過傷脾而痞滿嘔逆權用枳實丸一服慎勿多服要全善嘗治翁氏久瘧食少汗多先用補劑加黃連枳實月餘食反不進汗亦不止因悟謙甫此言遂減去枳連純用補劑又令獨多於藥而食進又於原方內加附子三分半一服而愈　寛中進食丸　和中丸　木香枳术丸　木香乾薑枳术丸皆有行氣之劑氣弱者宜之　許學士云有人全不進食服補脾藥皆不效予授二神丸服之頓能進食此病不可全作脾氣治蓋腎氣怯弱真元衰劣是以不

能消化飲食譬之鼎釜之中置諸米穀下無火力終日米不熟其何能化黃魯直嘗記服兔絲子淘淨酒浸曝乾日挑數匙以酒下之十日外飲啖如湯沃雪亦知此理也　今按治腎虛則補其母不能食者戊己虛也火乃土之母故以破故紙補腎為癸水以肉荳蔻厚腸胃為戊土戊癸化火同為補土母之藥也楊仁齋云脾腎之氣交通則水穀自然剋化瑞竹堂方謂二神丸雖兼補脾胃但無斡旋往往常加木香以順

其氣使之斡旋空虛若廩倉廩空虛則能受物屢用見效其殆使之交通之力歟　嚴用和云人之有生不善攝養房勞過度真陽衰虛坎水不溫不能上蒸脾土沖和失布中州不運是致飲食不進胸膈痞塞或不食而脹滿或食而不消大腑溏泄古人云補腎不如補脾予謂補脾不如補腎腎氣若壯丹田火盛上蒸脾土脾土溫和中焦自治膈開能食矣　薛新甫云予嘗病脾胃服補劑及針灸脾俞等穴不應幾殆吾

鄉盧丹谷先生令予服八味丸飲食果進三料而平予兄年踰四十貌豐氣弱遇風則眩勞則口舌生瘡胸常有痰目常赤濇又一人脾虛發腫皆以八味丸而愈按此皆補腎之驗　戴復菴云脾運食而傳於肺脾氣不足故不喜食宜啓脾丸煮朴丸若脾虛而不進食者當實脾宜與橘皮煎丸若脾虛寒而不進食者理中湯未効附子理中湯加砂仁或丁香煮散心腎虛致脾氣不足以運者鹿茸橘皮煎丸脾土交於心下交於腎者也

[illegible]大惑論黃帝曰人之善飢而不嗜食者何氣使然岐伯曰精氣并於脾熱氣留於胃胃熱則消穀穀消故善飢胃氣逆上則胃脘寒故不嗜食也　[illegible]飢不欲食皆屬濕邪傷腎經云太陰司天濕淫所勝民病心如懸飢不欲食治以苦熱是也　針灸飢不欲食有二法　其一取三里經云胃者水穀之海其腧上在氣街下至三里水穀之海不足則飢不受穀食

守其腧調其虛實是也　其二取腎經云腎足少陰之脈是動則病飢不欲食心如懸若飢狀視其虛實熱寒陷下取之也

惡食　經云太陰所謂惡聞食臭者胃無氣故惡食臭也[illegible]用人[illegible]人參補之　丹溪云惡食者胸中有物導痰補脾二陳加白朮香附湯　失笑丸治瘀痞惡食

瘖

瘖者邪入陰部也經云邪搏陰則為瘖又云邪入於陰搏則為瘖然有二證一曰舌瘖乃中風舌不轉運之類是也一曰喉瘖乃勞嗽失音之類是也蓋舌瘖但舌本不能轉運言語而喉咽音聲則如故也喉瘖但喉中聲嘶而舌本則能轉運言語也

舌瘖 經云心脉濇甚為瘖又云心脉搏堅而長當病舌卷不能言　婁全善云人舌短言語不辨乃痰涎閉塞舌本之脉而然甞治一中年男子傷寒身熱師與傷寒藥五貼日後變神昏而瘖遂作體虛有痰治之人參五錢黃芪白术當歸陳皮各一錢煎湯入竹瀝薑汁飲之十二日其舌始能語得一字又服之半月舌漸能轉運言語熱除而痊蓋足少陰脉挾舌本脾足太陰之脉連舌本手少陰別繫舌本故此三脉虛則痰涎乘虛閉塞其脉道而舌不能轉運言語也若此三脉亡血則舌無血營養而瘖經云刺

足少陰脉重虛出血為舌難以言又云刺舌下中脉太過血出不止為瘖治當以前方加補血藥也又甞治一男子五十餘歲嗜酒吐血桶許後不食舌不能語但渴飲水脉略數與歸芎芍地各一兩參术各二兩陳皮一兩半甘草二錢入竹瀝童便薑汁至二十餘貼能言若此三脉風熱中之則其脉弛縱故舌亦弛縱不能轉運而瘖風寒客之則其脉縮急故舌強舌卷而瘖治在中風半身不收求之也　丹溪治一男子三十五歲因連日勞倦發喊發為瘧疾醫與瘧藥三發後變為發熱舌短言語不辨喉間痰吼有聲診其脉洪數似滑遂以獨參湯加竹瀝兩蚶殼許兩服後吐膠痰三塊舌本正而言可辨餘證未退遂煎人參黃芪湯服半月而諸證皆退粥食調補兩月方能起立　針灸瘖有二法其一取脾經云脾足太陰之脉是動則病舌本強視虛實熱寒臨下取之也　其一取心經云手少陰之別名曰通里去腕一寸五分別而

上行入於心中繫舌本虛則不能言取之掌後
一寸是也

靈樞經憂恚無言篇黃帝問於少師曰人之卒然憂恚而言無音者何道之塞何氣出行使音不彰願聞其方少師答曰咽喉者水穀之道也喉嚨者氣之所以上下者也會厭者聲音之戶也口脣者音聲之扇也舌者音聲之機也懸雍垂者音聲之關也頏顙者分氣之所泄也橫骨者神氣所使主發舌者也故人鼻洞涕

者　全書　百五六

出不收者頏顙不開分氣失也是故厭小而疾薄則發氣疾其開闔利其出氣易其厭大而厚則開闔難其氣出遲故重言也人卒然無音者寒氣客於厭則厭不能發發不能下至其開闔不致故無音黃帝曰刺之奈何岐伯曰足之少陰上繫於舌絡於橫骨終於會厭兩瀉其血脉濁氣乃辟會厭之脉上絡任脉取之天突其厭乃發也　雜病篇厥氣走喉而不能言手足清大便不利取足少陰　丹溪治俞繼道遺精誤服參芪及升浮劑遂氣壅於上焦而瘖啞不出用香附童便浸透為末調服而疎通上焦以治瘖又用蛤粉青黛為君黃蘗知母香附佐之為丸而填補下焦以治遺十餘日良愈　出聲音方訶子炮去核木通各一兩甘草半兩用水三升煎至升半入生薑地黃汁一合再煎數沸放溫分六服食後日作半料　河間訶子湯　訶子折逆氣破結氣木通通利機竅桔梗通利肺氣童便降火潤肺故諸方通用之　發聲散開

瘖　百五七

結痰　肘後方陳皮五兩水三升煮取一升去查頓服當吐下痰　千金云風寒之氣客於中帶而不發故瘖不能言宜服發表之藥不必治瘖　以紫梗荊芥根一兩研汁入酒相和溫服半盞服無時又方用蘘荷根二兩絞汁酒一大盞和勻溫服半盞無時此皆治風冷失音　冬月寒痰結咽喉不利語聲不出經云寒氣客於會厭卒然而啞是也玉粉丸主之　肺間邪氣胸中積血作痛失音蛤蚧丸　暴嗽失音宜

潤燥通聲膏　咳嗽聲嘶者此血虛受熱也用
青黛蛤粉蜜調服之　槐花瓦上炒令香熟於
地上出火毒三更後牀上仰卧隨意服治熱而
失音　杏仁三分去皮尖炒另研如泥桂一分
和取杏核大綿裹含細細嚥之日五夜三又方
以桂末着舌下嚥津妙此治寒而失音　孫兆
口訣云内侍曹都使新造一宅落成遷入經半
月飲酒大醉卧起失音不能語孫用補心氣薯
蕷丸以細辛川芎[illegible]湯下[illegible]日其病漸減二十日
後

全愈曹既安見上問誰醫曰孫兆郎中上乃召
問曰曹何疾也對曰凡新宅壁土皆濕地亦陰
多人乍來陰氣未散曹心氣素虛飲酒至醉毛
竅皆開陰濕之氣從而入乘心經心經既虛而
濕氣又乘之所以不能語臣先用薯蕷丸使心
氣壯然後以川芎細辛又去濕氣所以能語也
運氣瘖有二　一曰熱助心實經云少陰之
復暴瘖治以苦寒是也　二曰寒攻心虛經云
歲火不及寒乃大行民病暴瘖治以醎溫是也

狐惑聲啞其證默默欲眠目不能閉起居不
安是也　針灸瘖有三法　其一取足少陰篇
首所引二段經文是也　其二取足陽明經云
足陽明之別名曰豐隆去踝八寸別走太陰下
絡喉嗌其病氣逆則喉痹卒瘖取之所別是也
婁全善治一男子四十九歲久病痰嗽忽一日
感風寒食酒肉遂厥氣走喉病暴瘖與灸足陽
明豐隆二穴各三壯足少陰照海穴各一壯其
聲立出信哉聖經之言也仍用黃芩降火為君
瘖

杏仁陳皮桔梗瀉厥氣為臣訶子泄逆甘草和
元氣為佐服之良愈　其三取手陽明經云暴
瘖氣哽取扶突與舌本出血舌本廉泉穴也
[illegible]　素問黃帝曰人之重身九月而瘖此
為何也岐伯曰胞之絡脈絕也帝曰何以言之
岐伯曰胞絡者繫於腎少陰之脈貫腎繫舌本
故不能言帝曰治之奈何岐伯曰無治也當十
月復[illegible]
[illegible]　陳氏云[illegible]後不語因心氣虛而不能

通於舌則舌強不能言語者宜服七珍散餘當推其所因而治之　薛新甫曰經云大腸之脉散舌下又云脾之脉是動則病舌本強不能言又云腎之別脉上入於心繫舌本虛則不能言竊謂前證若心腎氣虛用七珍散腎虛風熱地黃飲大腸風熱加味逍遙散加防風白芷脾經風熱秦艽升麻湯肝經風熱柴胡清肝散加防風白芷脾氣鬱結加味歸脾湯加升麻肝木太過小柴胡加鈎藤鈎脾受土侮六君加升麻白

芷鈎藤鈎肝脾血虛用佛手散脾氣虛用四君子氣血俱虛八珍湯如不應用獨參湯更不應急加附子補其氣而生其血若徑用血藥則誤矣　郭氏論人心有七孔三毛産後虛弱多致停積敗血閉於心竅神志不能明了心氣通於舌心氣閉塞則舌亦強矣故令不語但服七珍散　胡氏孤鳳丹散治産後閉目不語用白礬細研每服一錢熱水調下

消癉　口燥咽乾

渴而多飲爲上消經謂膈消　消穀善饑爲中消經謂消中　渴而便數有膏爲下消經謂腎消　劉河間嘗著三消論謂五藏六府四肢皆稟氣於脾胃行其津液以濡潤養之然消渴之病本濕寒之陰氣極衰燥熱之陽氣太盛故也治當補腎水陰寒之虛而瀉心火陽熱之實除腸胃燥熱之甚濟身中津液之衰使道路散而不結津液生而不枯氣血和而不澀則病自已矣況消渴者因

飲食服餌之失宜腸胃乾涸而氣不得宣平或精神過違其度而耗亂之或因大病陰氣損而血液衰虛陽氣悍而燥熱鬱甚之所成也若飲水多而小便多曰消渴若飲食多不甚渴小便數而消瘦者名曰消中若渴而飲水不絕腿消瘦而小便有脂液者名曰腎消一皆以燥熱太甚三焦腸胃之腠理怫鬱結滯緻密壅滯復多飲於中終不能浸潤於外榮養百骸故渴不止小便多出或數溲也張戴人亦著三消之説一

從火斷謂火能消物燔木則為炭燔金則為液燔石則為灰煎海水則為鹽鼎水則乾人之心腎為君火三焦膽為相火得其平則烹煉飲食糟粕去焉不得其平則燔灼藏府而津液耗焉夫心火甚於上為膈膜之消甚於中為腸胃之消甚於下為膏液之消甚於外為肌肉之消上甚不已則消及於肺中甚不已則消及於脾下甚不已則消及於肝腎外甚不已則消及於筋骨四藏皆消盡則心始自焚而死矣故治消渴

一證渴之而不下則小潤小濡固不能殺炎上之勢下之而不渴亦旋飲旋消終不能沃膈膜之熱下之渴止而不減滋味不戒嗜慾不節喜怒病已而復作能從此三者消渴亦不足憂矣然而二公備引內經諸條言消渴者表自三消所由來之病源一皆燥熱也雖是心移寒於肺為肺消者火與寒皆來乘肺肺外為寒所薄氣不得施內為火所爍故然太陽寒水司天甚則消飲者水行凌火火氣內鬱二者消渴乃之

寒邪則已鬱成內之燥熱也或曰夫寒與熱反若冰炭之不同爐而今之燥熱由外寒所鬱也將用涼以治內熱必致外寒增而愈鬱用溫以散外寒必致內熱增而愈渴治之奈何曰先治其急處方之要備在本經謂處方而治者必明病之標本達藥之所能通氣之所宜而無加害者可以制其方也所謂標本者先病而為本後病而為標此為病之本末也標本相傳先當救其急也又六氣為本三陰三陽為標假若胃熱

者熱為本胃為標也處方者當除胃中之熱是治其本也故六氣乃以甚者為邪衰者為正法當瀉甚補衰以平為期養正除邪乃天之道也為政之理也捕賊之義也即此觀之處方之要治盡此矣若太陽司天寒水之勝心火受鬱內熱已甚即當治內熱而急內熱未甚即當散寒解鬱為急如此則治以方者內經諸證條下者其治療風而渴用牡蠣白朮防風先治漏風為主也若心移寒於肺為肺消者則以心火乘肺

傳其氣血爲急所移之寒非正當其邪也故用
黃芪人參熟地黃五味子桑白皮麥門冬枸杞
子先救氣血之衰故不用寒藥瀉内熱也若心
移熱於肺傳爲膈消者則以肺熱爲急用麥門
冬治肺中伏火止渴爲君天花粉知母瀉熱爲
臣甘草五味子生地黃葛根人參生津益氣爲
佐治心火上炎於肺者心由心有事焉不得其
正以致其藏氣血之虛故厥陽之火上逆也所
以用茯神安心定志養精神竹葉以涼之用麥

門冬之爲以安其宅則火有所歸息矣因是三
條消渴之方便見河間處方酌量標本緩急輕
重之宜視臟腑切當之藥者如此可謂深得仲
景處方之法者也仲景云男子消渴小便反多
飲一斗而小便一斗腎氣丸主之脈浮小便不
利微熱消渴者與渴欲飲水水入即吐者皆以
五苓散利之脈浮發熱渴欲飲水小便不利者
豬苓湯主之渴口乾舌燥者白虎湯加人參主
之即此便見表裏分經因病用藥豈非萬世之

準則哉　坎三乾水也氣也即小而井大而海
也兌三坤水也形也即微而露大而雨也一陽
下陷於二陰爲坎坎以氣潛行乎萬物之中爲
受命之根本故潤萬物莫如水一陰上徹於二
陽爲兌兌以形普施於萬物之上爲資生之利
澤故說萬物者莫說乎澤明此二水以悟消渴
消中[illegible]腎[illegible]消之義治之而兼明導引之說又
有水火者焉上焦爲無形之火内熱燥而津液
枯以五行有形之水制之者兌澤也權可也吾

身自有上池真水亦氣也亦無形也天一之所
生也以無形之水沃無形之火又常而可久者
是爲真水火升降既濟而自不渴矣

上消者上焦受病逆調論云心移熱於肺傳爲
膈消是也舌上赤裂大渴引飲少食大便如常
小便清利知其燥在上焦治宜流濕潤燥以白
虎加人參湯主之　能食而渴爲實熱人參石
膏湯加減地骨皮散　不能食而渴爲虛熱白
朮散門冬飲下　有汗而渴者以辛潤之　無

汗而渴者以苦堅之　太陽經渴其脉浮無汗者五苓散滑石之類主之（太陽無汗而渴不宜服白虎湯若得汗後脉洪大而渴可服之）　陽明經渴其脉長有汗者白虎湯茯苓散之類主之（陽明汗多而渴不宜服五苓散若小便不利汗少脉[illegible]浮而渴者）　少陽經渴其脉弦而嘔者小柴胡湯加括蔞之類主之　太陰經渴其脉細不欲飲縱飲思湯不思水者四君子理中湯之類主之　少陰經渴其脉沉細自利者猪苓湯三黄丸之類主之　厥陰經渴其脉微引飲者宜少

少與之　小便不利而渴知内有熱也五苓散猪苓散泄之　小便自利而渴知内有燥也甘露飲門冬飲潤之　大便自利而渴先用白芍白朮各炒為末調服後隨證用藥　大便不利而渴止渴潤燥湯　上焦渴小便自利白虎湯　中焦渴大小便俱不利調胃承氣湯　下焦渴小便赤澀大便不利大承氣湯　戴院使云心[illegible]往往因嗜欲過度食啖辛熱以致煩渴[illegible]多小便亦多當抑心火使之下降自

然不渴宜半夏瀉心湯（半夏湯洗宜用）去乾薑加括蔞乾葛如其斂吞猪肚丸或酒煮黄連丸仍佐獨味黄連湯多煎候冷遇渴恣飲久而自愈若因用心過度致心火炎上而渴者宜黄芪六一湯加蓮肉遠志各一錢吞玄兎丹仍以大麥煎湯間下靈砂丹　渴欲飲水不止仲景以文蛤一味杵為散沸湯和服方寸匕經驗方用大牡蠣於臘月或端午日黄泥裹煨通赤放冷取出為末用鯽魚煎湯下一錢匕盖一藥性收澀最能

回津綱目以為鹹與井也三因方用糯穀旋炒作爆桑根白皮各等分每服一兩水一椀煮至半椀渴即飲之人本穀之氣上蒸於肺而化為津以潄[illegible]身其金能生水之義一藥開胃藥也而又淡滲故取之保命集用蜜煎生薑湯大器傾注時時呷之法曰心肺之病莫厭頻而少飲經云補上治上宜以緩又云辛以潤之開腠理致津液肺氣下流故火氣降而燥衰矣有食韭苗而[illegible]者[illegible]下[illegible]潤[illegible]愈也丹溪云消渴飲繰絲湯

能引清氣上朝於口[illegible]與[illegible]同為升也心
也作甚用退潮之陰故能抑心火而止渴焉
飲多作積有餘水[illegible]又有神仙減水法　東
垣[illegible]云大渴清涼[illegible]上[illegible]熱飲水無度小便
數[illegible]名曰[illegible]內經云熱淫所勝
佐以甘苦以甘寫之熱則傷氣氣傷則無潤折
熱補氣非甘寒之劑不能故以石膏之甘寒為
君王太僕云壯水之主以制陽光故以檗連梔
子知母之苦寒寫熱補水為臣以當歸杏仁麥

門冬[illegible]甘草生津和血潤
燥為佐[illegible]行陽明少陽二經藥證
皆[illegible]木香藿香及佐以取之又用桔梗為
[illegible]也為末湯[illegible]為劑驅
[illegible]大每於[illegible]之[illegible]下不
[illegible]治一[illegible]病渴且飲水
[illegible]中[illegible]有伏熱與
[illegible]下[illegible]口渴止又
[illegible]治渴用以治渴效信乎藥[illegible]

變通用之　經云少陽司天之政三之氣炎暑
至民病渴又云少陰之復渴而欲飲又云少陽
之復嗌絡焦槁渴引水漿是熱助心盛而渴治
以諸寒[illegible]之所知也　經云太陽司天寒氣
下臨心火[illegible]又云太陽司天寒淫
所勝民病[illegible]渴而欲飲又云寒水太過上臨
太陽民病[illegible]是寒攻心虛而渴治以諸
熱劑則世之所未知也　東垣云消渴末傳能
食者必發腦疽背瘡不能食者必傳中滿鼓脹

聖濟總錄[illegible]必死不治之潔古分而治之
能食而渴者白虎加人參湯主之不能食而渴
者錢氏白朮散倍加葛根主之上下既平不復
傳下消矣[illegible]白朮[illegible]傳於瘡者何也此火邪勝也
其[illegible]不[illegible]亦[illegible]經曰有形
[illegible]陽之[illegible]攻其陽無攻其陰治在
下[illegible]生大[illegible]者[illegible]不傳中滿者何
[illegible]而[illegible]其道也
[illegible]心[illegible]制小其服[illegible]肝位

遠宜制大其服皆適其所至所為故知過與不
及皆違而無過之地也如膈消中消渴之太急
速通利所久而成中滿之疾且膈上熱未除中
寒復生者非藥之罪失其緩急之宜也處方之
[illegible]
[illegible]者胃也渴而[illegible]飲食而瘦自汗大便硬
小便數數亦黃能消穀知熱在中焦也宜下
之以調胃承氣湯又三黃丸主之　胃熱則善
消水穀可飲[illegible]降火之劑用黃連末生地自

藕各自然汁牛乳各一升熬成膏和黃連末一
斤丸如桐子大每服三五十丸少呷白湯下日
進十服　消渴中消自古只治燥止渴誤矣三
陽結謂之消二陽者陽明也手陽明大腸主津
液所生病熱則目黃口乾是津液不足也足陽
明主血所生病熱則消穀善饑血中伏火是血
不足也結者津液不足結而不潤皆燥熱為病
此因數食甘美而多肥故其氣上溢轉為消
渴治之以蘭除陳氣也不可服膏粱芳草石藥

其氣悍烈能助熱燥也越人云邪在六府則陽
脈不和陽脈不和則氣留之氣留之則陽脈盛
矣陽脈太盛則陰氣不得榮也故肌肉皮膚消
削是也和血益氣湯主之　戴云消脾緣脾經
燥熱食物易化皆為小便轉食轉饑然脾消又
自有三曰消中曰寒中曰熱中宜用蓮茗飲加
生地黃乾葛各一錢或烏金散或止用蓮茗飲
順利散　參蒲丸　加味錢氏白朮散　和
血益氣湯　消痞飲子　甘露膏　黃連猪肚

丸　[illegible]金丸　天門冬丸　猪腎薺苨湯　內
經言大腸移熱於胃善食而瘦謂之食㑊胃移
熱於膽亦曰食㑊食㑊者謂食移易而過不生
肌膚亦易饑也東垣云善食而瘦者胃伏火邪
於氣分則能食脾虛則肌肉削也即消中也
[illegible]氣消中皆為熱證云[illegible]陰之勝心下熱善饑
又云[illegible]之勝[illegible]於胃善饑治以寒劑是也
[illegible]消中皆[illegible]於胃經云邪在脾胃陽氣有
餘陰氣不足則熱中善饑取三里灸又云胃足

陽明之脉氣盛則身已前皆熱於胃則消穀善
饑[illegible]
腎消者病在下焦初發爲膏淋謂淋下如膏油
之狀至病成煩躁引飲而色黧黑形瘦而耳焦
小便濁而有脂液治宜養血以分其清濁而自
痊矣以六味地黃丸主之　益火之源以消陰
翳則飲自有節八味丸　壯水之主以制陽光則
渴飲不思六味丸　金匱治男子消渴小便反多
如飲水一斗小便亦一斗腎氣丸主之[illegible]

[illegible]
[illegible]要令藥不腎消者飲一溲二其
溲如膏油即膈消消中之傳變王注謂肺藏消
爍氣無所持是也蓋肺藏氣肺無病則氣能管
攝津液而津液之精微者收養筋骨血脉餘者
爲溲肺病則津液無氣管攝而精微者亦隨溲
下故飲一溲二而溲如膏油也筋骨血脉無津
液以養之故其病成漸形瘦焦乾也然肺病本
於[illegible]虛則心寡於畏妄行陵肺而移寒與
之然後肺病消故仲景治渴而小便反多用腎
氣丸補腎救肺後人因名之腎消及下消也或
曰經既云肺消死不治仲景復用腎氣丸治之
何也曰飲一溲二者死不治若飲一未至溲二
者病尚淺猶或可治故仲景腎氣丸治飲水一
斗小便亦一斗之證若小便過於所飲者亦無
及矣　腎消服滋補丸藥外宜多煎黃芪湯飲
之　戴院使云若因色欲過度水火不交腎水
下泄心火自炎以致渴消不宜備用涼心冷劑

宜堅腎水以濟心火當用黃芪飲加蓯蓉五味
各半錢吞八味丸及小兔絲子丸玄兔丹鹿茸
丸加減安腎丸或靈砂丹　消腎爲病比諸爲
重古方謂之強中又謂之內消多因恣意色慾
或餌金石腎氣既衰石氣獨在精水無所養故
常發虛陽不交精出小便無度唇口乾焦黃芪
飲吞玄兔丹八味丸鹿茸丸加減腎氣丸小兔
絲子丸靈砂丹亦可選用未効黃芪飲加蓯蓉
五味山茱萸各四分[illegible]湯送蓯蓉丸　天王補

心丹　雙補丸腎瀝散金銀箔丸白茯苓丸
[illegible]三消丸用好黄連治淨爲細末不拘多少
切冬瓜肉研取自然汁和成餅陰乾再爲細末
用汁浸和加至七次即用冬瓜汁爲丸桐子大
每服三十丸以大麥仁湯入冬瓜汁送下尋常
渴止一服効　消色過度積爲諸熱熏蒸五藏
津液枯燥血泣小便併多亂肉消瘦專嗜冷物
寒漿勿投[illegible]以[illegible]丸主之　戒人諸消不
宜用燥熱[illegible]之劑惟當滋養除消腑外心腎
消瘕[illegible]　直指
二消[illegible]用黄芪六[illegible]湯或參芪湯[illegible]丸或
玄菟用[illegible]小菟絲子丸又用竹龍散[illegible]又用
六神[illegible]亦治胃消惟腎消則加當歸去黄芪三
消小便[illegible]多大便必秘宜常服門冬湯潤其大
腸如加人參木瓜花粉在内仍忌[illegible]粥食之
[illegible]消[illegible]二亦可冷進　三消久而小便不臭
[illegible]滯其[illegible]爲甚更有浮在
[illegible]如[illegible]消此精不禁真
[illegible]小便[illegible]論之甚詳其

理未暢大抵水之在天地與人身皆有鹹有甘
甘者生氣而鹹者死氣也故仙乳泉[illegible]矣小
便本鹹而反[illegible]是生氣泄也生氣泄者脾氣下
陷入腎中者脾氣入腎者土克水也　消久
之時[illegible]日無見或手足偏廢如風疾然
此證[illegible]爲多但用治下消中諸補藥滋
生精[illegible]　消病退後而燥渴不解此有
餘熱在[illegible]可用參苓甘草少許生薑汁冷服
虚者可用人參湯　渴病愈後再劇舌白滑微
消虚　準繩　直指
腫咽喉[illegible]覺痛嗌腫時渴飲冷白沫如膠飲
冷乃止用甘草石膏丸　渴疾愈須預防發癰疽
黄芪六一湯下忍冬丸[illegible]　已發者藍葉散
玄參散薺苨丸　消渴後成水氣方書雖有紫
蘇湯[illegible]參湯[illegible]丸皆[illegible]泄之劑不若五皮飲
送濟生腎氣丸及東垣中滿分消諸方爲安
[illegible]　飲食不節勞倦所
傷以致脾胃虚弱乃血所生病主口中津液不

行故曰乾咽乾病人自以爲渴醫以五苓散治
之反加渴燥乃重竭津液以致危亡經云虛則
補其母當於心與小腸中補之乃脾胃之根蔕
也以甘温之藥爲之主以苦寒爲之使以酸爲
之主治以辛心苦緩急食酸以收之心火旺則
肺金受邪金虛則以酸補之次以甘温及甘寒
之劑於脾胃中瀉心火之亢盛是治其本也補中
[illegible]芪六一湯治自渴與病
瘥後渴者參术飲四君子湯縮脾湯俱加乾葛
消癉　準繩　百六六
或七珍散加木瓜一錢半料五苓散加人參一
錢名春澤湯以五苓散加四君子湯亦名春澤
湯在是要藥更兼作四皓粥食之　諸病久損
腎虛而渴者宜八味丸及黃芪飲四物湯加人
參木瓜各半錢或七珍散人補湯加大术加木
瓜如數　消失血及產婦蓐中渴名曰血渴宜
求益血之劑於吐血論中論之　有無病忽
然大渴少時又定只宜蜜湯及縮脾湯之類折
[illegible]數日亦可　酒渴者乾葛湯調五苓

散　又有果木渴因多食果子所致藥中宜用
麝香
脈　脈軟弱小以薄者心脆肩背薄者肺脆脇
骨弱者肝脆脣大而不堅者脾脆耳大不堅者
腎脆皆善病消癉易傷　心脈微小爲消癉滑
甚爲善渴[illegible]　肺肝脾腎脈微小皆爲消
[illegible]　心脈濡而散者
當消渴自已　諸散者氣實血虛　洪大者陰
餘陽虧　寸口脈浮而遲浮爲虛衛氣不足遲爲
消癉　準繩　百六七
勞榮氣竭　趺陽脈浮而數浮爲風數消穀
[illegible]大病久可治懸小堅病久不可治　數大
者生　細小浮短者死　病若開目而渴心下
牢者脈當得緊實而數反得沉濇而微者死也
心移寒於肺肺消者飲一溲二不治

黃疸日曬食勞病黃

色如熏黃一身盡痛乃濕病也色如橘子黃身不痛乃疸病也疸分為五　黃汗　黃疸　穀疸　酒疸　女勞疸

【黃汗】汗出染衣如檗汁是也　問曰黃汗之為病身體腫一作發熱汗出而渴狀如風水汗沾衣色正黃如檗汁脉自沉何從得之師曰以汗出入水中浴水從汗孔入得之宜芪芍桂酒湯主之　黃汗之病兩脛自冷假令發熱此

屬歷節食已汗出又身常暮盜汗出者此勞氣也若汗出已反發熱者久久其身必甲錯若發熱不止者必生惡瘡若身重汗出已輒輕者久久必身瞤又胸痛腰上有汗腰下無汗腰髖弛痛如有物在皮中狀劇者不能食身疼重煩躁小便不利者此為黃汗桂枝加黃芪湯主之

按汗出浴水亦是偶然之事一端耳多由脾胃有熱汗出逢濕濕熱鬱而成者宜黃芪湯

[illegible]以知為度每服[illegible]

小便中痛少許弟子各會乞日色斬艮白則痊不過服五升而愈

【黃疸】食已即饑徧身俱黃臥時身體帶青帶赤憎寒壯熱此飲食過度臟府熱水穀併積於脾胃風濕相搏熱氣熏蒸而得之　師曰病黃疸發熱煩喘胸滿口燥者以病發時火劫其汗兩熱所得然黃皆從濕得之一身發熱而黃肚熱熱在裏當下之　黃疸脉浮而腹中和者宜汗之宜桂枝加黃芪湯熱服須臾飲熱粥以助藥力取微汗為度未汗更服若腹滿欲嘔吐懊憹

而不和者宜吐之不宜汗　黃疸腹滿小便不利而赤自汗出此為表和裏實當下之宜大黃硝石湯　黃疸病小便色不變欲自利腹滿而喘不可除熱熱除必噦噦者小半夏湯主之

黃疸病茵蔯五苓散主之

【穀疸】食畢即頭眩心中怫鬱不安徧身發黃

趺陽脉緊而數數則為熱熱則消穀緊則為寒食即為滿尺脉浮為傷腎趺陽脉緊為傷脾風寒相搏食穀即眩穀氣不消胃中苦濁濁氣

下流小便不通陰被其寒熱流膀胱身體盡黃名曰穀疸　陽明病脈遲者食難用飽飽則發煩頭眩心煩小便難此欲作穀疸雖下之腹滿如故所以然者脈遲故也　穀疸之爲病寒熱不食食即頭眩心胸不安久久發黃爲穀疸茵蔯湯主之　續法穀疸丸　寶鑑茵蔯梔子湯紅丸子

酒疸　身目發黃腹如水狀不治則心下懊憹而熱不能食時時欲吐 足脛滿小便黃面發赤斑[illegible]大醉當風入水所致

四難經 百十

夫病酒黃疸者必小便不利其候心中熱足下熱是其證也　酒黃疸者或無熱靖言了了腹滿欲吐鼻燥其脈浮者先吐之沉弦者先下之　酒疸心中熱欲嘔者吐之即愈　酒疸下之久久爲黑疸目青面黑心中如噉蒜韲狀大便正黑皮膚爪之不仁其脈浮弱雖黑微黃故知之 [illegible]　酒黃疸心中懊憹或熱痛梔子大黃湯主之　續法葛根湯小柴胡加茵蔯或大黃黃連葛根湯　戴云飲酒即睡酒毒熏肺脾土生肺金肺爲脾之子子移病而歸於母故黃又肺主身之皮膚肺爲酒毒熏蒸故外發於皮而黃法宜合脾肺而治宜藿枇飲葛根煎湯或梔子仁煎湯調五苓散或生料五苓散加乾葛一錢或葛花解酲湯　酒疸發黃心胸堅滿不進飲食小便黃赤其脈弦澀當歸白朮湯　酒疸後變成腹脹漸至面足俱腫或脾疼宜藿香脾飲加木香麥蘖各半錢

女勞疸　額上黑微汗出手足中熱薄暮即發

四難經 百七十一

膀胱急小便自利 [illegible]　腹如水狀不治　黃家日晡時發熱而反惡寒此爲女勞得之膀胱急少腹滿一身盡黃額上黑足下熱因作黑疸其腹脹如水狀大便黑或時溏此女勞之病非水也腹滿者難治硝石散主之　續法加味四君子湯 脾腎不健大便不實　滑石散 [illegible]　東垣腎疸湯

[illegible]　丹溪云五疸不要分同是濕熱如盦麴相似輕者小溫中丸　重者大溫中丸　按丹

溪之言已得大意其用藥則未備也考之內經
病有上中下之分有謂目黃曰黃疸者有謂黃
疸暴病久逆之所生者及少陰厥陰司天之政
四之氣溽暑者皆發黃疸者悉是上焦濕熱病也
有謂食已如饑曰胃疸者與脾風發癉腹中熱
出黃者又脾脈搏堅而長其色黃者靈樞謂脾
所生病黃癉皆中焦濕熱病也有謂溺黃赤安
臥者黃疸及腎脈搏堅而長其色黃者靈樞謂
腎所生病皆下焦濕熱也獨張仲景妙得其旨

推之於傷寒證中或以邪熱入裏與脾濕相交
則發黃或由內熱已盛復被火者兩陽熏灼其
身亦黃或陽明熱盛無汗小便不利濕熱不得
泄亦發黃或發汗已身目俱黃者爲寒濕在裏
不解而黃也或食難用飽飽則頭眩必小便難
欲作穀疸者爲此單陽而無陰也成無已釋
諸黃皆由濕熱　者何則黃濕家之黃黃而
色暗不明熱盛之黃其黃如橘子色大抵黃家
屬太陰太陰者脾之經也脾屬土黃色脾經受
濕熱蒸之則色見於外或脈沉小腹不利者乃
血在下焦之黃也凡此必須當其病用其藥直
造病所庶無誅伐無過夭札之失也　大法宜
利小便除濕熱　脈浮腹中和宜汗　脈浮心
中熱腹滿欲吐者宜吐　脈沉心中懊憹或熱
痛腹滿小便不利而赤自汗出宜下　脈不浮
不沉微弦腹痛而嘔宜和解　脈沉細無力身
冷而黃或自汗泄利小便清白爲陰黃宜溫
男子黃大便自利宜補　饑飽勞役內傷中州

變寒病生黃非外感而得宜補　治疸須分新
久新病初起即當消導攻滲如茵蔯五苓散胃
苓飲茯苓滲濕湯之類無不效者久病又當變
法也脾胃受傷日久則氣血虛弱必用補劑如
參朮健脾湯當歸秦艽散使正氣盛則邪氣退
庶可收功若口淡怔忡耳鳴脚軟或微寒熱小
便赤白濁又當作虛治宜養榮湯或四君子湯
下八味丸五味子丸者皆可用不可過用涼
劑強通小便恐腎水枯竭久而面黑黃色不可

治突然有元氣素弱遲滲利之害過服滋補以致濕熱愈增者則又不可拘於久病調補之例也 發汗桂枝加黃芪湯麻黃醇酒湯 吐瓜蒂散搐鼻瓜蒂散二陳湯探吐 下梔子大黃湯大黃硝石湯茵陳散 利小便五苓散益元散 除濕熱茵陳五苓散茯苓滲濕湯 和解小柴胡湯 [illegible]瓜蒂散 溫茵陳附子乾薑湯 補養榮湯補中湯人小建中湯理中湯 乾黃燥也小便自利四肢不沉重渴而引飲梔子柴

黃疸 [illegible]

皮湯 濕黃脾也小便不利四肢沉重似渴不欲飲者大茵陳湯 大便自利而黃有實熱者茵陳梔子黃連三物湯無實熱者小建中湯 往來寒熱一身盡黃者小柴胡加梔子湯 腹滿[illegible]者小柴胡湯 諸疸小便不利為裏實宜利小便或下之 無汗為表實宜發汗或吐之吐中有汗 諸疸小便黃赤色者為濕熱可服利小便清熱滲濕之藥若小便色白是無熱也不可除熱若有虛寒證者當作虛勞治之故

仲景云男子黃小便自利當與虛勞小建中湯若欲自利腹滿而喘不可除熱而除之必噦小半夏湯主之要當詳審勿令誤也 海藏云內感傷寒勞役形體飲食失節中州變寒病生黃非外感而得只用理中大小建中足矣不必用茵陳 戴[illegible]諸失血後多令面黃為血為榮面色紅[illegible]血榮之也血去則面見黃色譬之竹木[illegible]綠遇秋葉黃潤與燥之別也宜養榮湯[illegible]湯十全大補湯妨食者四君子湯

黃疸 [illegible]

加黃芪扁豆各一錢飢黃芪四君子湯加陳皮名異攻散亦有[illegible]身黃者但不及耳目 病癒後多黃者脾受病故色見於面宜理脾為先異攻散加黃芪扁豆各一錢諸病後黃者皆宜 黑疸已前見酒疸女勞疸二條此證多死宜急治用土瓜根一斤搗碎絞汁六合頓服當有黃水隨小便出更服之

[illegible]故仲[illegible]病也

大溫中丸 小溫中丸 暖

中丸　棗礬丸　右前三方以針砂醋之類伐
肝以朮米之類助脾後一方以礬醋之酸瀉肝
以棗肉之甘補脾貧人及田家作苦之人宜之
若素人與嬌養柔脆者宜佐以補劑

【綱】[illegible]　經云風氣
自陽明入胃循脈而上至目眥其人肥風氣不
得外泄則為熱中而目黃[illegible]　河間青龍散
主之　黃疸目黃不除以瓜蒂散搐鼻取黃水

【經】脈沉渴欲飲水小便不利者皆發黃　腹
脹滿而痿黃躁不得睡屬黃家　黃疸之病當
以十八日為期治之十日以上宜瘥反劇為難
治　疸病渴者難治不渴者可治　脈洪大大
便利而渴者死　脈微小小便利不渴者生
發於陰部其人必嘔　發於陽部其人必振寒
而發熱　凡黃家候其寸口脈近掌無脈口鼻
冷並不可治　疸毒入腹喘滿者危　凡年壯
氣實脈來洪大者易愈年老氣虛脈來微濇者
難瘥[illegible]五十[illegible]飲酒七情不遂而[illegible]

黑疸臟大便自利手足寒冷飲食不進肢體倦
怠服建中理中滲濕諸藥不効者不可為也

嘈雜

嘈雜與吞酸一類皆由肺受火傷不能平木木挾相火乘肺則脾沖和之氣索矣穀之精微不行濁液攢聚爲痰爲飲其痰亦或從火木之成化酸肝木摇動中土故中土擾擾不寧而爲嘈雜如饑狀每求食以自救苟得少食則嘈雜亦少止止而復作蓋土虚不禁木所摇故治法必當補土伐木治痰飲若不以補土爲君務攻其邪久久而虚必變爲反胃爲瀉爲痞滿爲眩運

之病矣　脉洪大者火多二陳湯加薑汁炒山梔黄連　脉滑大者痰多二陳湯加南星栝蔞黄芩黄連梔子　肥人嘈雜二陳湯少加撫芎蒼术白术炒梔子　脉弦細身倦怠者六君子湯加撫芎蒼术白术薑汁炒梔子　有用消尅藥過多饑不能食精神漸減四君子加白芍陳皮薑汁炒黄連　心懸懸如饑欲食之時勿與以食只服三聖丸佳　心下嘈雜者導飲丸最妙

欠嚏

腎主欠嚏經云腎爲欠爲嚏是也　運氣欠嚏有三　一曰寒經云太陽司天寒氣下臨心氣上從寒清時舉鼽嚏喜悲數欠是也　二曰火經云少陽司天之政三之氣炎暑至民病嚏欠是也　三曰濕鬱其火經云陽明司天之政初之氣陰始凝民病中熱嚏欠是也

[illegible]　經云二陽一陰發病主驚駭背痛善噫善欠王註云氣鬱於胃故欠生焉　運氣欠伸皆屬風經云厥陰在泉風淫所勝病善伸數欠

治以辛是也　靈樞口問篇黄帝曰人之欠者何氣使然岐伯曰衛氣晝日行於陽夜半則行於陰陰者主夜夜者卧陽者主上陰者主下故陰氣積於下陽氣未盡陽引而上陰引而下陰陽相引故數欠陽氣盡陰氣盛則目瞑陰氣盡而陽氣盛則寤矣瀉足少陰補足太陽　針灸欠伸有二法其一取腎其二取胃經云胃足陽明之脉是動則病洒洒振寒善伸數欠視盛虚實寒陷

下調之也　仲景云中寒家善欠

[經] 靈樞口問篇黃帝曰人之嚏者何氣使然岐伯曰陽氣和利滿於心出於鼻故為嚏補足太陽榮眉本一曰眉上也　運氣嚏有三一曰熱火經云少陰司天之政熱病生於上民病血溢鼽嚏又云少陰司天熱氣下臨肺氣上從病嚏鼽衄又云少陰之復燠熱內作煩躁鼽嚏又云少陽所至為鼽嚏又云少陽司天火氣下臨肺氣上從欬嚏鼽衄治以諸寒是也　二曰金

火嚏　[illegible] 在經　百千

不及火乘之經曰金不及曰從革從革之紀其病嚏欬鼽衄從火化者是也　三曰燥金經云陽明所至為鼽嚏是也　劉河間云嚏鼻中因痒而氣噴作於聲也鼻為肺竅痒為火化心火邪熱干於陽明發於鼻而痒則嚏也或故以物擾之痒而嚏者擾痒屬火故也或視日而嚏者由目為五藏神華太陽真火晃曜於目心神躁亂而熱發於上則鼻中痒而嚏也　仲景云其人清涕出發熱色和者善嚏　五冊終

證治準繩第六冊目錄

大小腑門

泄瀉滯下總論　泄瀉

滯下 [illegible]　大小便不通

大便不通　關格遺溺總論

小便不通　淋 [illegible]

小便數　小便不禁

小便黃赤　遺精

赤白濁

[門] [illegible]

前陰諸疾 [illegible]

疝　交腸

腸鳴　脫肛

穀道痒痛　痔

泄瀉滯下總論

金壇王肯堂輯

泄瀉之證水穀或化或不化並無努責惟覺困倦若滯下則不然或膿或血或膿血相雜或腸垢或無糟粕或糟粕相雜雖有痛不痛之異然皆裏急後重逼迫惱人

潔古論曰臟府瀉利其證多種大抵從風濕熱論之是知寒少熱多寒則不能久也故曰暴泄非陰久泄非陽論云春宜緩形形緩動則肝木乃榮反靜密則是行秋令金能制木風氣內藏夏至則火盛而金去獨火木旺而脾土損矣輕則飧瀉身熱脈洪穀不能化重則下利膿血稠粘裏急後重故曰諸泄稠粘皆屬於火經曰溲而便膿血知氣行而血止也宜大黃湯下之是為重劑黃芩芍藥湯是為輕劑是實則泄其子木能自虛而脾土實矣故經曰春傷於風夏為飧泄此逆四時之氣人所自為也此謂飧熱泄所謂滯下也

有自太陰脾經受濕而為水泄虛滑身重微滿不知穀味假令春宜益黃散補之夏宜泄之法云宜補宜泄宜和宜止和則芍藥湯止則訶子湯久則防變而為[illegible]傳受於腎謂之賊邪故難愈[illegible]謂之微邪故易安也此皆脾土受濕之所為也雖聖智不能逃也[illegible]而入成積於臟而為水泄也[illegible]下利不止其[illegible]流而濁[illegible]獨積此為難治宜麻黃

湯小續命湯[illegible]有表邪縮於內當散表邪[illegible]有暴下無聲身冷自汗小便清利大便不禁氣難布息脈微嘔吐急以[illegible]之驟水散是也[illegible]故法曰[illegible]除濕脈弦者[illegible]風[illegible]以[illegible]冷自汗者以[illegible]內[illegible]汗之則愈[illegible]為利[illegible]又[illegible]在表者發之[illegible]在[illegible]下[illegible]表熱者[illegible]

便澀者分利之。又曰盛者和之去者送之過者止之兵法曰避其來銳擊其惰歸此之謂也

凡病泄而惡寒太陰傳少陰爲土來尅水也用除濕白术茯苓安脾芍藥桂枝黃連破血火邪不能勝水太陰經不能傳少陰而反助火邪上乘肺經而痢必白膿也加當歸芍藥之類是已

又裏急後重脉大而洪實爲裏熱而痢甚是有物結墜也宜下之若脉浮大愼不可下雖裏急後重脉沉細而弱者謂寒邪在內而氣

散也可溫養而自安　裏急後重閉者大腸氣不宣通也宜加檳榔木香宣通其氣若四肢懶倦小便少或不利大便走沉困飲食減少宜調胃去濕白术芍藥茯苓三味水煎服白术除脾胃之濕芍藥除胃之濕熱四肢困倦茯苓能通水道走濕　如發熱惡寒腹不痛加黃芩爲主如未見膿而惡寒乃太陰欲傳少陰也加黃連爲主桂枝佐之如腹痛甚加當歸倍芍藥如見血加黃連爲主桂枝當歸佐之　如煩燥或先

便白膿後血或發熱或惡寒非黃連不能止上部血也。如惡寒脉沉先血後便非地榆不能除下部血也。如惡寒脉沉或腰痛或臍下痛非黃芩不能除中部血也[illegible]便膿血相雜而脉浮大[illegible]勿以大黃下之下之必[illegible]謂氣下竭也而陽無所收[illegible]惟以分陰陽之法治之

又曰[illegible]泄非陰久泄非陽[illegible]脉[illegible]身動聲亮暴注下迫此[illegible]者脉沉而細身困鼻息微者[illegible]不禁[illegible]湯主之　渴

引飲[illegible]水多入則自臍入胃中胃本[illegible]不勝其水胃受水攻故水穀一時下[illegible]人[illegible]五[illegible]立已乃督脉瀉也如[illegible]丸白术茯苓之類五苓散亦[illegible]　又[illegible]泄者大腹滿而泄又有鶩溏者是[illegible]腸也人便如水其中有少結糞者[illegible]之類　又法[illegible]不及拈衣未便已[illegible]則數至圊而不便俗云

虛坐努責是也。裏急後重，皆依前法進退大承氣湯主之。太陽病為挾熱痢，涼膈散主之。（表證悞下，因而下利不止，為挾熱利）陽明為痼瘕，進退大承氣湯主之。太陰濕勝濡泄，不可下而可溫，四逆湯主之。少陰蟄風不動，禁固可澀，赤石脂丸、乾薑湯主之。厥陰風泄，以風治宜小續命湯、消風湯主之。少陽風氣自動，大柴胡湯主之。胃泄飲食不化（色黃）。脾泄腹脹滿泄注，食即嘔吐逆。大腸泄食已窘迫，大便

色白，腸鳴切痛。小腸泄溲而便膿血，少腹痛。大瘕泄裏急後重，數至圊而不能便，莖中痛。五泄之病，胃、小腸、大瘕三證，皆以清涼飲子主之，其泄自止。厥陰證加甘草以緩之。少陰證裏急後重，故加大黃。又有太陰陽明二證，進退大承氣湯主之。太陰證不能食是也，當先補而後泄之，乃進藥法也。先煎厚朴半兩，製，水煎二三服後未已，謂有宿食未消，又加枳實二錢同煎，二三服泄又未已，如稍進食，尚

有熱毒，又加大黃三錢，推過泄止住藥。如泄未止，為腸胃有久塵垢滑粘，加芒硝半合，宿垢去盡則愈也。陽明證能食是也，當先泄而後補，謂退藥法也。先用大承氣湯五錢，水煎服。如利過泄未止，去芒硝，後稍熱退，減大黃一半，再煎兩服。如熱氣雖已，其人必腹滿，又減去大黃，與枳實厚朴湯，又煎三兩服。如腹滿退，泄亦自愈，後服厚朴湯，數服則已。　按進退承氣法，須審之脈證的知有積熱及形病俱實，而後可下。此已

上雖出潔古家珍、東垣活法機要，而多出於劉河間保命集之文，故其用藥於疎滌為多，觀者會其意，毋泥其辭可矣。　東垣云：胃氣和平，飲食入胃，精氣則輸於脾，上歸於肺，行於百脈，而養榮衛也。若飲食一傷，起居不時，損其胃氣，則上升精華之氣反下降，是為飱泄，久則太陰傳少陰而為腸澼。假令傷寒冷飲食，䐜滿而脹，傳為飱泄者，宜溫熱之劑以消導之。傷濕熱之物而成膿血者，宜苦寒之劑以內疎之。風邪下陷

者升舉之濕氣內盛者分利之裏急者下之後重者調之腹痛者和之洞泄腸鳴無力不及拈衣其脉細微而弱者溫之收之膿血稠粘數至圊而不能便其脉洪大而有力者下之寒之大抵治病當求其所因察何氣之勝取相剋之藥平之隨其所利而利之以平爲期此治之大法也、瀉利久不止或暴下者皆太陰受病不可離甘草芍藥若不受濕則不利故須用白朮是以聖人立法若四時下利於芍藥白朮內各加防風炙甘加黃芩秋加厚朴冬加桂附然更詳外證寒熱處之如裏急後重須加大黃如身困倦須用白朮若自汗逆冷氣息微加桂附以溫之如或後重膿血稠粘雖在盛冬於溫藥內亦加大黃

〔脉〕胃脉虛則泄 脉滑按之虛絕者其人必下利 肺脉小甚爲泄 [illegible] 腎脉小甚爲洞泄 [illegible] 〔脉〕 尺寒脉細謂之後泄 尺膚寒其脉小者泄少氣 下利脉沉弦者下重 下利寸口反浮數尺中自濇者必清膿 溲病若腹大而泄者其脉當微細而濇反緊大而滑者死 泄而脉大者難治 病泄脉洪大是逆也 泄注脉緩時小結者生浮大數者死 下利脉大爲不止 下利日十餘行脉反實者死 大便赤瓣飧泄脉小者手足寒難已 泄脉小手足溫易已 腹鳴而滿四肢清泄其脉大是逆也如是者不過十五日死矣 腹大脹四末清脫形泄甚是逆也如是者不及一時死矣 下利手足厥冷無脉者灸之不溫若脉不還反微喘者死 下利後脉絕手足厥冷晬時脉還手足溫者生脉不還者死 [illegible]黃[illegible]而不渴胸中寒而利不止者死 後令下利寸口門上尺中悉不見脉然尺中時小見脉再舉頭者腎氣也若見損脉來爲難治 下利如魚腦者半死半生 下利如塵腐色者死 純血者死 如屋漏汁者死 下利如竹筒注者不可治 脉細皮寒氣少泄利[illegible]

後飲食不入此謂五虛不治若用參术當早救之亦有生者　下則泄瀉上則吐痰皆不已為上下俱脫死

泄瀉

金匱下利病脈證并治　夫六府氣絕於外者手足寒上氣脚縮五藏氣絕於內者利不禁甚者手足不仁　下利脈沉弦者下重脈大者為未止脈微弱數為欲自止雖發熱不死　下利手足厥冷無脈者灸之不溫若脈不還反微喘者死少陰負趺陽者為順也　下利有微熱而渴脈弱者當自愈　下利脈數有微熱汗出令當自愈設脈緊為未解　下利脈數而渴者當自愈設不差必清膿血以有熱也　下利脈反弦發熱身汗者自愈　下利氣者當利小便　下利寸脈反浮數尺中自澀者必清膿血　下利清穀不可攻其表汗出必脹滿　下利脈沉而遲其人面少赤身有微熱　下利清穀者必鬱冒汗出而解病人必微厥所以然者其面戴陽下虛故也　下利後脈絕手足厥冷晬時脈還手足溫者生脈不還者死　下利腹脹滿身體疼痛者必先溫其裏後攻其表溫裏宜四逆湯攻

表宜桂枝湯　下利三部皆平按之心下堅者急下之宜大承氣湯　下利脉遲而滑者實也利未欲止急下之宜大承氣湯　下利脉反滑者當有所去下乃愈宜大承氣湯　下利已差至半月日期後發者以病不盡故也當下之大承氣湯（[illegible]）　下利讝語者有燥矢故也小承氣湯主之　下利便膿血者桃花湯主之　熱利下重者白頭翁湯主之　下利後更煩按之心下濡者爲虛煩也梔子豉湯主之

下利清穀裏寒外熱汗出而厥者通脉四逆湯主之　下利腹痛紫參湯主之　乾嘔下利黃芩湯主之　右此下利一章後世名醫治書皆以爲淡古之所謂下利即今之所謂泄瀉也內有治傷寒雜方仲景用治雜病今全錄之使後人知古治傷寒有法治雜病有方者非也傷寒雜病同一法矣

丹溪云有濕　有氣虛　火　痰　食積　戴復菴云瀉水腹不痛者濕也飲食入胃輒瀉之完穀不化者氣虛也腹痛瀉水腸鳴痛一陣瀉一陣者火也或瀉或不瀉或多或少者痰也腹痛甚而瀉瀉後痛減者食積也　濕多成五泄戴云飧泄者水穀不化而完出濕兼風也溏泄者漸下汙積粘垢濕兼熱也鶩泄者所下澄澈清冷小便清白濕兼寒也濡泄者體重軟弱泄下多水濕自甚也滑泄者久下不能禁固濕勝氣脫也　濕瀉脉濡細乃太陰經脾土受濕洩木虛滑身重微滿不知穀味口不渴久雨泉

溢河溢或運氣濕土司令之時多有此疾宜除濕湯若戊己年作以胃苓湯重者术附湯　東垣云中病脾胃久衰視聽半失此陰盛乘陽加之氣短精神不足此由弦脉令虛多言之過也皆陽氣衰弱不得舒伸伏匿於陰中耳癸卯歲六七月間淫雨陰寒逾月不止時人多病泄利一日體重肢節疼痛大便泄并下者三而小便閉塞思其治法按內經標本論大小不利無問標本先利小便又云在下者引而竭之亦是

先利小便也又云諸泄利小便不利先分別之又云治濕不利小便非其治也皆言當利小便必用淡味滲泄之劑以利之是其法也噫聖人之法雖布在方策其不盡者可以意求耳今客邪寒濕之淫從外而入裏以暴加之若從已上法度用淡滲之劑以除之病雖即已是降之又降是復益其陰而重竭其陽則陽氣愈削而精神愈短矣是陰重強陽重衰反助其邪之謂也故必用升陽風藥即瘥以羌活獨活柴胡升麻

各一錢防風根半錢炙甘草半錢同㕮咀水二鍾煎至一盞去查稍熱服大法云濕寒之勝助風以平之又曰下者舉之得陽氣升騰而去矣又法云客者除之是因曲而爲之直也夫聖人之法可以類推舉一而知百者也若不達升降浮沉之理而一槩施治其愈者幸也　濕兼寒濕內經曰濕勝則濡泄甲乙經云寒氣客於下焦傳爲濡泄夫脾者五藏之至陰其性惡寒濕今寒濕之氣內客於脾故不能裨助胃氣腐熟水穀致清濁不分水入腸間虛莫能制故洞泄如水隨氣而下謂之濡泄法當除濕利小便也治之以對金飲子　濕兼熱瀉益元散參苓丸

濕兼風見飧泄條　寒瀉脉沉細或弦遲身冷口不渴小便清白或腹中綿綿作疼宜理中湯附子溫中湯漿水散　暴泄如水周身汗出一身盡冷脉沉而弱氣少而不能語甚者加吐此謂緊病宜以漿水散治之　若太陽經傷動傳太陰下利爲鶩溏大腸不能禁固卒然而下

中有硬物欲起而又下欲了而又不了小便多清此寒也宜溫之春夏桂枝湯秋冬白朮湯一理中湯治泄瀉加橘紅茯苓各一兩名補中湯若溏泄不已者於補中湯內加附子一兩不喜飲食水穀不化者再加砂仁一兩共成八味仲景云下利不止醫以理中與之利益甚理中者理中焦此利在下焦赤石脂禹餘糧湯主之用此加法則能理下焦矣　戴云寒瀉寒氣在腹攻刺作痛洞下清水腹內雷鳴米飲不化者

理中湯或附子補中湯吞大已寒丸或附子桂
香丸畏食者八味丸元是冷瀉因瀉而煩躁引
飲[illegible]伏暑瀉者參附湯連理湯　如寒瀉服上
[illegible]藥宜木香湯或[illegible]附湯六柱湯吞震靈丹
[illegible]手足厥[illegible]不進休砂丹藥食方入口
即下者名曰直腸難治如瀉已愈而精神未
復舊者宜十補飲寒瀉腹中大疼服前藥外兼
進乳香丸服諸熱藥以溫中並不見効登圊不
迭穢物隨出此屬下焦宜桃花丸二五粒可梨

勒丸以澀之　按戴方多過於元熱用宜審之
熱瀉脉數疾或洪大口乾燥身多動音聲響
亮暴注下迫益元散加芩連燈心淡竹葉一[illegible]
[illegible]發熱小便不利口渴者宜五苓若火
多因[illegible]加入[illegible]黃芩　泄而困倦不便者及脉
數實熱[illegible]宜參术滑石茯苓通　泄而脉滑堅者
宜[illegible]宜大承氣湯　戴云熱瀉糞色赤黃彈響
作疼[illegible]門[illegible]痛[illegible]出穀道猶如湯熱煩渴小便
不利[illegible]大散參香[illegible]丸　凡瀉津液既去口

必渴小便多是赤澀未可便作熱論的知熱瀉
方用冷劑不然勿妄投以致增劇　玉龍丸治
一切伏暑泄瀉神効　理中湯加茯苓黃連名
連理湯用之多有奇効[illegible]如今當暑月若的知
暑瀉自合用暑藥[illegible]如冷瀉自合用熱藥中間
有一等盛暑又復內傷生冷非連理湯不可下
泄無度[illegible]後[illegible]痛[illegible]則內熱小便赤澀心下
煩渴且又喜冷此藥[illegible]宜若元是暑瀉經久下
元虛甚日夜頻併[illegible]之勢已然而瀉不已復

用暑藥則[illegible]不能取効便用熱附等又似難施
疑似之[illegible]所宜用此　氣瀉腸鳴氣走胸膈痞
悶腹急而痛瀉則腹下稍可須臾又急亦有腹
急氣[illegible]而不通者此由中脘停滯氣不流轉水
穀不分所以然也法用大七香丸入米煎服久而
不愈宜五[illegible]中散吞震靈丹仍佐以米飲調
香附木　調氣散　令[illegible]調和[illegible]散治氣利
氣[illegible]用[illegible]子湯加炒麴并粟殼二錢加木
香丸　和[illegible]瀉腹心疼痛方[illegible]者是也或肚

腹滿按之堅者亦是也受病淺者宜神麯之類
消導之病深而頑者必用進退承氣之類下之
方安　傷食瀉因飲食過多脾胃之氣不足以
運化而瀉其人必噫氣如敗卵臭宜治中湯加
砂仁半錢麯蘖枳朮丸或七香丸紅丸子雜服
食積腹疼而瀉不可遽用治中兼佐宜先用消
導推蕩之藥或因食一物過傷而瀉後復食之
即瀉者以脾爲所傷未復而然宜大建脾湯寒者
可則仍燒所傷之物存性爲末三五錢重調服

因食冷物停滯傷脾脾氣不暖所食之物不能
消化瀉出而食物如故宜治中湯加乾薑吞酒
煮黃連丸　有脾氣久虛不受飲食者食畢即
腸鳴腹急盡下所食之物方快不食則無事俗
名錄食瀉經年累月宜快脾丸　因傷於酒每
晨起必瀉者宜理中湯加乾葛吞酒煮黃連丸
或葛花解酲湯吞之　因傷麪而瀉者養胃湯
加萊菔子炒研一錢痛者更加木香五分瀉甚
者去藿香加炮薑如其數　痰瀉二陳湯加海石
青黛黃芩神麯薑汁竹瀝爲丸每服三五十丸
少者必用吐法吐之方愈　一男子夜數如廁
或教以生薑一兩碎之半夏湯洗與大棗各三
十枚水一升磁瓶中慢火燒爲熟水時時呷之
數日便已　每日五更即泄瀉有酒積有寒積
有食積有腎虛俗呼脾腎泄　有人每早須大
瀉一行或腹痛或不腹痛空心服熱藥亦無効
有人教以夜食前又進熱藥一服遂安後如此
常服愈蓋暖藥雖平旦服之至夜力已盡無以

敵一夜陰氣之故也　有人每五更將天明時
必溏痢一次有人云此名腎泄服五味子散頓
愈　有人久泄早必泄一二行泄後便輕快脉
滑而少弱先與厚朴和中丸五十丸大下之後
以白朮爲君枳殼半夏茯苓爲臣厚朴炙甘草
芩連川芎滑石爲佐吳茱萸十餘粒爲使生薑
煎服十餘貼而愈　戴云有每日五更初洞瀉
服止瀉藥並無効米飲下五味丸或專以北五
味煎飲雖省飲食大段忌口但得日間上半

夜無事近五更其瀉復作此病在腎分水飲下
二神丸及椒朴丸或平胃散下小茴香丸　二
神丸合五味子散名爲四神丸治瀉尤妙　小
便不利而泄若津液偏滲於大腸大便瀉而小
便少者用胃苓散分利之若陰陽已分而小便
短少此脾肺氣虛不能生水也宜補中益氣湯
加麥門五味陰火上炎而小便赤少此肺氣受
傷不能生水也用六味地黄丸加麥門五味腎
經陰虛陽無所生而小便短少者用滋腎丸腎

氣丸腎經陽虛陰無所化而小便短少者用益
氣湯六味丸若誤用滲泄分利復傷陽氣陰無
所生而小便益不利則腫脹之證作而疾危矣
　凡大便泄服理中湯小便不利大便反泄不
知氣化之過本肺不傳化以純熱之藥治之是
以轉泄少服則不止多服則愈熱所以不分若
以青皮陳皮之類治之則可經云膀胱者州都
之官津液藏焉氣化則能出矣　泄而口渴引
飲此爲津液内亡用錢氏白术散或補中益氣

湯腎水不足之人患泄或過服分利之劑而渴
者加減八味丸失治必變小便不利水腫脹滿
等危證矣　水漬入胃名爲溢飲滑泄渴能飲
水水下復泄泄而大渴此無藥證當灸大顀在第
一椎下陷中　滑瀉東垣云中焦氣弱脾胃受寒冷
大便滑泄腹中雷鳴或因悞下末傳寒中復遇
時寒四肢厥逆心胃絞痛冷汗不止此腎之脾
胃虛也沉香温胃丸治之薛氏曰前證若脾胃
虛寒下陷者用補中益氣湯加木香肉荳蔲補

骨脂若脾氣虛寒不禁者用六君子湯加炮薑
肉桂若命門火衰脾土虛寒者用八味丸若脾
腎氣血俱虛者用十全大補湯送四神丸若大
便滑利小便閉澀或肢體漸腫喘嗽唾痰爲脾
腎氣血俱虛宜用十全大補湯送四神丸若大
便滑利小便閉澀或肢體漸腫喘嗽唾痰爲脾
胃虧損宜金匱加減腎氣丸　保命集云虛滑
久而不止者多傳變爲利太陰傳少陰是爲鬼
賊也以厚朴枳實湯防其傳變按此法實者用

之虚者不若四神丸實腎之爲得也　攸澀之劑固腸丸訶子散皆治熱滑扶脾丸桃花丸訶子丸赤石脂禹餘糧湯皆治寒滑　瀉已愈至明年此月日時復發者有積故也脾主信故至期復發熱積大承氣湯寒積感應丸虚者以保和丸加三稜蓬术之屬投之　趙以德云昔聞先生言泄瀉之病其類多端得於六淫五邪飲食所傷之外復有雜合之邪似難執法而治乃見先生治氣暴脫而虚頓瀉不知人口眼俱閉

呼吸微甚殆欲絶者急灸氣海飲人參膏十餘斤而愈治陰虚而腎不能司禁固之權者峻補其腎治積痰在肺致其所合大腸之氣不固者涌出上焦之痰則肺氣下降而大腸之虚自復矣治憂思太過脾氣結而不能升舉陷入下焦而成泄瀉者開其鬱結補其脾胃使穀氣升發也凡此之類不可枚舉因問先生治病何其神也先生曰無他圓機活法具在内經熟之自得矣

飧泄　水穀不化而完出是也史記倉公傳迵風即此　經云清氣在下則生飧泄又曰久風入中則爲腸風飧泄夫脾胃土也氣冲和以化爲事今清氣下降而不升則風邪久而干胃是木賊土也故冲和之氣不能化而令物完出謂之飧泄或飲食太過腸胃所傷亦致米穀不化此俗呼水穀利也法當下者舉之而消尅之也以加減木香散主之　東垣云清氣在下者乃人之脾胃氣衰不能升發陽氣故用升麻柴胡

助甘辛之味以引元氣之升不令下陷爲飧泄也　又云凡泄則水穀不化謂之飧泄是清氣在下乃胃氣不升上古聖人皆以升浮藥扶持胃氣一服而愈知病在中焦脾胃也脉訣曰濕多成五泄濕者胃之別名也病本在胃真氣弱真氣者穀氣也不能剋化飲食乃濕勝故也以此論之正以脾胃之弱故也初病奪食或絶不食一二日使胃氣日勝泄不作也今已成大泄矣經云治濕不利小便非其治也又云下焦如

瀆又云在下者引而竭之此證不宜此論其病得之於胃氣下流清氣不升陽道不行宜升宜舉不宜利小便經云頭有疾取之足謂陽病在陰也足有疾取之上謂陰病在陽也中有疾傍取之傍者少陽甲膽是也中者脾胃也脾胃有疾取之足少陽甲膽者甲風是也東方春也胃中穀氣者便是風化也作一體而認故曰胃中濕勝而成泄瀉宜助甲膽風勝以克之又是升陽助清氣上行之法也又一說中焦元氣

不足溲便為之變腸為之苦鳴亦緣胃氣不升故令[illegible]上行又云風勝濕也大抵此證本胃氣弱不能化食奪食則一日而可止夫奪食之理為胃弱不能化食則為泄如食不下何以作泄[illegible]以藥滋養元氣令和候泄止漸與食[illegible]以致穀食不化者於升陽風藥內加炒麴[illegible]與食入則[illegible]心[illegible]者胃之上口也必口[illegible]食入反出[illegible]胃土停寒其右手關脈中[illegible]其證是風寒濕相合穀氣不行清氣不

升為弦脈之寒所閉故不下也麴之熱亦能去之若反胃者更加半夏生薑入於風藥內同煎奪食少食欲使胃氣強盛也若藥劑大則胃不勝藥泄亦不止當漸漸與之今病人久已至衰弱當以常法治之不可多服餌也人之肉如地之土豈可人而無肉故肉消盡則死矣消瘦之人有[illegible]者入內經有七外經有一又病肌肉去盡勿治之天命也如肌肉不至瘦盡當急療之宜先奪食而益胃氣便與升陽先助真氣次

用風藥勝濕以助升騰之氣病可已矣餘皆勿論此治之[illegible]也[illegible] 春傷於風[illegible]木在時為春在人為肝在天為風風[illegible]當春之時發[illegible]令反為寒[illegible]知水為太[illegible]所勝者乘之而妄[illegible]經曰從後來[illegible]所生者少病[illegible]為

飧泄也故經曰清氣在下則生飧泄以其溫令當權故飧泄之候發之於夏也若當春之時木不發生溫令未顯止行冬令是謂傷衛以其陽氣不出經絡之外也當以麻黃湯發之麻黃味苦味之薄者乃陰中之陽也故從水中補木而瀉水發出汗液以發其汗也若春木既生溫令已當陽氣出於地之上寒再至而復折之當以輕發之謂已得少陽之氣不必用麻黃也故傷於風夏生飧泄所以病發於夏者以木絕於夏而土旺

於長夏暑熱之時有下行之體故飧泄於夏也不病於春者以其春時風雖有傷木實當權故飧泄不病於木之時而發於濕之分也經曰至而不至是為不及所勝妄行所不勝者薄之所生者受病此之謂也　仲景法下利清穀裏寒外熱汗出而厥者通脈四逆湯主之　河間法飧泄風冷入中泄利不止脈虛而細日夜數行口乾腹痛不已白朮湯主之　東垣云濕利飧泄身熱脈弦腹痛而渴及頭痛微汗宜防風芍藥湯

東垣所云內動之風也經云春傷於風夏生飧泄又云久風為飧泄又云虛邪之中人也始於皮膚留而不去傳舍於絡脈留而不去傳舍於經留而不去傳舍於輸留而不去傳舍於伏衝之脈留而不去傳舍於腸胃在腸胃之時賁響腹脹多寒則腸鳴飧泄食不化則非內動之風也若因大渴引飲多致水穀一時下者宜灸大椎三五壯或用車前子雷丸白朮茯苓及五苓散等藥治之又如久風為飧泄者則不飲

水而穀完出治法當以宣風散導之後服蒼朮防風湯　飧泄以風為根風非汗不出有病此者腹中雷鳴泄注水穀不分小便澀滯皆以脾胃虛寒故耳服荳蔻烏梅罌粟殼乾薑附子曾無一効中脘臍下灸已數十燥熱轉甚津液涸竭瘦削無力飲食減少延予視之予以應象論曰熱氣在下水穀不分化生飧泄寒氣在上則生䐜脹而氣不散何也陰靜而陽動故也診其脈兩手皆浮大而長身表微熱用桂枝麻黃湯以

薑棗煎大劑連進三服汗出終日至旦而愈次以胃風湯和其臟府調養陰陽食進而愈 經云脾虛則腹滿腸鳴泄食不化又云餐泄取三陰三陰者太陰也宜補中益氣湯以白芍藥代當歸主之 又云腎藏志志有餘腹脹餐泄瀉氣筋血 又云肝足厥陰之脉所生病者胸滿嘔逆餐泄視盛虚寒熱陷下施法 此皆內因無風者也

滯下 即痢疾

古以赤爲熱 白爲冷 至金河間李東垣始非之 劉河間謂諸痢皆由乎熱而以赤屬之心火黃屬之脾土白屬之肺金青屬肝木黑乃熱之極而反兼腎水之化其論濕熱利皆兼於濕濕主於痞以致怫鬱不得宣通濕熱甚於腸胃之中因以成腸胃之燥故裏急後重小便赤澀謂治諸痢莫若以辛苦寒藥治之或微加辛熱佐之辛能開鬱苦能燥濕寒能勝熱使氣宜平而已行血則便膿自愈調氣則後重自除 李從脾胃病者[illegible]上逆於肺爲白下傳於陰爲赤 衛生寶鑑因謂太陰主濕傳於少陰爲痢由泄而亡津液而火就燥腎惡燥居下焦血分其受邪者故便膿血然赤亦黃爲熱青白爲寒 丹溪[illegible]大熱下迫而致裏急後重 劉[illegible]八之係脾上更復一一較[illegible]治 三家皆發前代之未發[illegible]

五藏者也則可見濕熱之中具有五邪之相挾
自其上道下傳氣血者言則可見五藏六府十
二經脉之氣血諸邪皆得傳之而爲病之赤白
木自其濕熱爲病者言則可見由來致成濕熱
之勢[illegible]自其分病有虚實者言則可見凡
在[illegible]中所有之證如煩躁者咽乾舌黒者
[illegible]者腹痛者脹滿者脚痛腫弱之類悉
有[illegible]之殊是故[illegible]斷之種種爲邪
入百以成濕熱經絡受傷其氣傷則病於氣血

傷則傳於心心肺者氣血之主也氣血所行之
方[illegible]安得不歸所主之藏乎而大小腸者心
肺[illegible]出納水穀糟粕轉輸之官胃乃大小
腸之總[illegible]又是五藏六府十二經脉與氣之海
苟有內外之邪凡損傷於經藏者或移其邪入
腸胃[illegible]濕之[illegible]邪則濕氣不化怫鬱而
或[illegible]心肺[illegible]氣血之病傳之於合大腸
[illegible]而成白痢小腸獨受其病
[illegible]大小腸通受其病則赤白
相混而下胃之濕熱淫於大小腸者亦如之其
色[illegible]之黒者有二如色之焦黒此極熱
兼水化[illegible]也如黒之光若漆者此瘀血也或
曰治[illegible]世人所守之法也今乃復求其
初[illegible]受之[illegible]將何爲哉曰病在腸胃
者是[illegible]也[illegible]之邪與初受之經者是其本
也[illegible]標本各有所宜施之先後況所
傳[illegible]又與傳[illegible]與何可不求之乎
豈[illegible]已[illegible]若腸胃自感而病亦當以邪正

分或正[illegible]而受邪或因邪而致虚則以先
[illegible]積之新舊亦如之舊積
[illegible]所化之積也新積者舊積去後而
[illegible]所生者也舊積當先下之新積則不
[illegible]水穀轉輸糟粕
[illegible]功今腸胃有邪則榮衛
[illegible]不能施化故衛氣鬱而
[illegible]食結痰停於胃糟
[illegible]相挾成滯下病

矣如是者必當下之以通壅塞利榮衛之行至於升降仍不行衛氣復鬱榮血復泣又成新積故亦知新[illegible]者不必求邪以治但理衛氣以開通[illegible]以調順陰陽陰陽調腠理開則升降之[illegible]其積不治而自消矣然而舊積亦有不可[illegible]因榮衛之虛不能轉輸其食積必當先[illegible]榮衛資腸胃之真氣充溢然後下之庶無失[illegible]下數見俗方惟守十數方治利不過攻之[illegible]之而已矣安知攻病之藥皆是耗氣損血[illegible]不已甚至於氣散血亡五藏空虛[illegible]死其固濇之又皆足以增其氣[illegible]之病轉生腹脹下為足腫上為喘呼諸疾[illegible]人之法何足守乎

[illegible]調胃承氣及大小承氣[illegible]有積滯紅色夜無積食[illegible]與四十九次六十九[illegible]救此惟實者宜之虛者以芍[illegible]和丸之類消積　芍藥湯治下

血[illegible]氣經曰溲而便膿血知氣行而血止也行血則便自安調氣則後重自除　益元散治身發熱下痢赤白小便不利濕胃中積聚　下痢勢惡頻併[illegible]或久不愈諸藥不止須吐下之以開除[illegible]因積滯而使氣液宣行者宜玄青丸系之　玄珠利積丸亦可　玄珠云下痢赤白[illegible]急上滔引飲小水赤濇此積滯[illegible]其熱中用消腸丸導氣丸推其積滯而[illegible]治積聚之說輕則溫而利之清腸[illegible]人真散丹丸下之下後勿便補[illegible]氣少惡食此為挾虛證宜[illegible]尾甚者加人參若又十分重者[illegible]加陳皮補之虛回而痢自止矣　丹[illegible]生患滯下後甚逼迫[illegible]但[illegible]雖實[illegible]積[illegible]忽[illegible]三日[illegible]參朮陳皮芍[illegible]餘[illegible]胃氣[illegible]

寧免後患乎（以上醫說）　戴云痢疾古名滯下以氣滯成積積成痢治法當以順氣爲先須當開胃故謂無飽死痢疾也　凡痢初發不問赤白裏急後重頻欲登圊及去而所下無多既起而腹內復急宜用藿香正氣散加木香半錢吞感應丸或蘇合香丸吞感應丸（以上調氣）　赤痢血色鮮紅或如蛇蟲形而間有血鮮者此屬熱痢宜藿香正氣散加黑荳三十粒五苓散加木香半錢粟米少許下黃連丸或黃連阿膠丸茶梅丸熱甚服上項藥未効宜白頭翁湯　赤痢發熱者敗毒散加陳倉米一撮煎　若血色黯如瘀服涼藥而所下愈多去愈頻者當作冷痢宜理中湯或四君子湯加肉果一錢木香半錢　加減平胃散青六丸治血痢作　諸血痢不止宜多用地榆　易簡方云血痢當服胃風湯膠艾湯之類　心經伏熱下純血（血色鮮紅）用犀角生磨汁半鍾朱砂飛研一錢牛黃三分人參末二錢和丸如麻子大燈心龍眼肉煎湯下六七分　脾

經受濕下血痢用蒼术地榆湯　血痢久不止腹中不痛不裏急後重澀花丸　乾薑於火上燒黑不令成灰磁碗合放冷爲末每服一錢米飲調下治血痢神効仲景云小腸有寒者其人下重便血可以此治之（以上血痢）　東垣云大便後有白膿或只便白膿因勞倦氣虛傷大腸也以黃芪人參補之如裏急頻見汚衣者血虛也宜加當歸　如便白膿少有滑頻見汚衣者氣脫加附子皮（煨）則加御米殼如氣濇者只以甘藥補氣當安臥不言以養其氣　戴云白痢下如凍膠或如鼻涕此屬冷痢先宜多飲除濕湯加木香一錢吞感應丸繼進理中湯亦有下如鯢色或如臘茶色者亦宜用前白痢藥　白蠟治後重白膿（以上白痢）　若感暑氣而成痢疾者其人自汗發熱面垢嘔逆渴欲引飲腹內攻刺小便不通痢血頻併宜香薷飲加黃連一錢佐以五苓散益元散白湯調服不愈則用蜜水調　感暑成痢疾甚食不進六和湯藿香正氣散各半

貼名木香交加散以上治暑痢　老人深秋患痢發呃
逆嘔者黃蘗炒燥研末陳米飯爲丸小豆大
每服三十丸人參白朮茯苓三味濃煎湯下連
服三劑卽愈切不可下丁香等熱藥　治冷利
腹中不能食肉荳蔻去皮醋麪裹煨熟搗末粥
飲下二錢匕　世俗治夏中暑痢疾用黃連香
薷飲加甘草芍藥生薑神効者蓋夏月之痢多
屬於暑潔古治處暑後秋冬間下痢用厚朴丸
大効者蓋秋之痢多屬於寒積經所謂必先歲

氣無伐天和者也以上治秋痢　金匱下痢腹痛紫參
湯主之　潔古云厚朴丸治處暑後秋冬間腹
痛下痢大効　丹溪曰初下痢腹痛不可用參
朮然氣虛胃虛者可用初得之亦可用大承氣
調胃承氣下之看其氣病血病然後加減用藥
　腹痛者肺經之氣鬱在大腸之間者以苦梗
發之然後用治痢藥氣用氣藥血用血藥其或
痢後糟粕未實或食粥稍多或饑甚方食腹中
作痛切不可驚恐當以白朮陳皮各半煎湯和

之自安　粥多及食肉作痛者宜奪食奪食者
減其粥食絕其肉味也　因傷冷水瀉變作赤
白痢腹痛減食熱燥四肢困倦無力宜茯苓湯
　下痢之後小便利而腹中滿痛不可忍此名
陰陽反錯不和之甚也越桃散主之　治痢止
痛如神方揀淨川連片一兩淨枳殼片一兩槐
花二兩先用水浸片時漉淨同川連先炒老黃
色次入枳殼再炒待燥揀出槐花不用止將黃
連五錢枳殼五錢作一服水煎七分去查調乳

香沒藥乳香各七分五錢服之次照前方再服
一劑腹痛卽止痢卽稀神効此方有服之如醉
者乃藥力行也不妨　仲景建中湯治痢不分
赤白久新但腹中大痛者神効其脉弦急或濇
浮大按之空虛或舉按皆無力者是也　下利
膿血稠粘腹痛後重身熱久不愈脉洪疾者芍
藥湯主之　懷血痢無度小便不通腹中痛當
歸導氣湯主之　下利赤白裏急後重宜通丸
[illegible]從血中從爲火和[illegible]仲

景云熱利下重者白頭翁湯主之　下利膿血裏急後重日夜無度宜導氣湯　大腹泄者裏急後重數至圊而不能便莖中痛用清涼飲子主之其泄自止莖中痛者屬厥陰加甘草梢裏急後重多者屬少陰加大黃令急推去宿物則輕矣內經曰因其重而減之又云在下者引而竭之　裏急後重數至圊而不能便皆宜進退大承氣湯主之　下利赤白後重遲澀宜感應丸　或曰治後重踈通之劑羅謙甫水煮木香膏

[illegible]藥亦白术安胃散等方已盡矣又有用御米殼等固澀之劑亦愈者何也曰後重本因邪壓大腸墜下故大腸不能升上而重是以用大黃檳榔輩瀉其所壓之邪今邪已瀉其重仍在者知大腸虛滑不能自收而重是以用御米殼等澀劑固其滑收其氣用亦愈也然大腸為邪墜下之重其重至圊後不減大腸虛滑不收之重其重至圊後隨減以此辨之百不失一也　其或[illegible]急後重[illegible]至圊不[illegible]黑色而又痛甚此為死

血證法當用桃仁泥滑石粉行之或口渴及大便口燥辣是名挾熱即加黃芩或口不渴身不熱喜熱手熨盪是名挾寒即加乾薑　後重積與氣墜下服升消藥不愈者用秦艽皂角子煨大黃當歸桃仁枳殼黃連等劑[illegible]大腸風盛可作丸服　或下墜在血活之後此為氣滯證宜于前藥加檳榔一枚　後重當和氣積與氣墜下者當兼升兼消升謂升麻之類消謂木香檳榔之類　余用方泄利下重者以水五升煮薤

白三升至二升去查以四逆散方寸匕內湯中煮取一升半分溫再服　凡用諸承氣等藥挨積之後仍後重者乃陽不升也藥中當加升麻升其陽其重自去也　東垣云裏急後重數至圊而不能便或少有白膿或少血者慎勿利之宜升陽除濕防風湯[illegible]　其或氣行血和積少但虛坐努責此為亡血證倍用當歸身尾却以生地黃生芍藥生桃仁佐之復以陳皮和之血生自安　虛坐而不得大便皆因血虛也

血虚則裏急加當歸身。凡後重逼迫而得大便者爲有物而然今虚坐努責而不得大便知其血虚也故用當歸爲君生血藥佐之（以上虚坐努責）

內經膿血稠粘皆屬相火夫太陰主濕少陰主痢身先泄亡津液而火就燥腎惡燥居下焦血分其受邪者故便膿血然赤黄爲熱青白爲寒治須兩審治熱以堅中丸芷蔻丸香連丸治寒白膠香散或多熱少寒水煮木香膏虚滑頻數宜止宜濇宜養臟湯 溲而便膿血者小腸

消下　卷總六　三十九

泄也脉得五至已上洪大者宜七宣丸脉平和者立秋至春分宜香連丸春分至立秋宜芍藥蘗皮丸四時皆宜加減平胃散如有七宣丸證者亦宜服此藥去其餘邪兼平胃氣（以上膿血稠粘）

其或積滯退減十之七八穢積未盡糟粕未實當以炒芍藥炒白朮炙甘草陳皮茯苓煎湯下固腸丸三十粒然固腸丸性燥恐尚有滯氣未盡行者但當單飲此湯固腸丸未宜進用蓋固腸丸者有去濕實腸之功其或久痢體虚氣弱滑泄不止又當以訶子肉豆蔻白礬半夏之藥澀之甚者添牡蠣可擇用之然須以陳皮爲佐恐太澀亦能作疼又甚者灸天樞氣海此二穴大能止泄 仲景云下利便膿血者桃花湯主之丹溪云桃花湯主病屬下焦血虚且寒非乾薑之温石脂之澀且重不能止血用粳米之甘引入腸胃 水煮木香膏 易簡斷下湯 白朮安胃散 真人養臟湯 五倍子爲丸赤痢甘草湯下白痢乾薑湯下各十丸 烏梅二箇煎

消下　卷總六　四十

湯 石榴一箇燒灰用酸石榴一箇煎湯調二錢（以上滑脫） 東垣治一老僕脫肛日久近復下利裏急後重白多赤少不任其苦此非肉食膏粱者也必多蔬食或飲食不節天氣已寒衣蓋又薄使役形體不禁而腸頭脫下者寒也滑也真氣不禁此證不收乃血脫也此乃寒滑氣泄不固故此證下脫當以澀去其脫而除其滑以大熱之劑除寒補陽以補氣之藥升陽益氣以微酸之味固氣上收之以訶子皮散一

半再服全愈　養藏湯　地榆芍藥湯　戴云脫肛一證最難爲藥熱則肛門閉寒則肛門脫內用磁石研末每二錢食前米飲調下外用鐵鏽磨湯温洗　滯下大便不禁其大孔開如空洞不閉者用葱和花椒末搗爛塞穀道中併服澀腸之劑收之如御米殼訶子皮之類是也　痢久大孔痛亦有寒熱者熟艾黃蠟訶子燒熏之　因熱而痛檳榔木香黃連黃芩加乾薑　因寒而痛炒鹽熨之炙枳

實熨之瘡瘍用瓦片敲圓如銅錢狀燒紅投童子小便中急取起令乾紙裹安痛處因時寒恐外寒束病而入也以人參當歸陳皮作濃湯飲之食淡味自安　痢疾不納食或湯藥入口隨即吐出俗名噤口有因邪留胃氣伏而不宣脾氣因而澀滯故嘔逆而食不得入者有陽氣不足胃中宿食因之未消則噫而食卒不下者有肝乘脾胃發嘔飲食不入縱入亦反出者有水飲所停氣急而嘔穀不得入者有火氣炎上衝胃逆而食不得入者有胃虛寒冷食入反出者有胃中邪熱不欲食者有脾胃虛弱不欲食者有積熱在下惡氣熏蒸而嘔逆食不得入者當各從其所因以治之　以脈證辨之如脾胃不[illegible]心煩手足温熱未當多服[illegible]此乃[illegible]氣上衝心胸所以嘔而不食宜用敗毒散每服四錢陳倉米一百粒薑三片棗一枚水[illegible]煎八分温服若其脈微弱或心腹膨脹手足厥冷初病則不嘔因服罌

粟殼烏梅苦澀[illegible]藥太過以致閉食先嘔者此乃脾胃[illegible]藥一味剉如小豆大一半入銀石器內炒熟[illegible]作末用同爲末飯飲調下又方用[illegible]人參當心併內促爲末每服二錢[illegible]下此疾皆是胃氣上衝心脈借此以[illegible]　丹溪用人參黃連[illegible]如[illegible]一呷下[illegible]用參苓白木[illegible]米飲乘熱調下[illegible]

人參茯苓石蓮子肉入些菖蒲與之　戴復菴
用治中湯加木香半錢或縮砂一錢[illegible]
其或在下則纏滯在上則嘔食此爲毒積未化
胃氣未平[illegible]其寒則溫之熱則清之虛則
用參术補之[illegible]解積下食自進矣　泄痢久不
安臟[illegible]急後重日夜無度宜大黃湯用
大黃一兩[illegible]用好酒兩大盞浸半日同煮至一
盞半[illegible]分爲二次頓服之痢止停服未止再
服以[illegible]又服芍藥湯以和之所以徹其毒

也[illegible]藥痢已除宜以白术黃芩湯和之
丹溪[illegible]　人患痢百餘日百法不效六脈促急
沉[illegible]花左手爲甚晝夜十行視之穢物甚
少[illegible]下滿滯中有紫黑血絲食全不進此非痢
也宜作瘀血治之以桃仁乳香沒藥滑石佐以
檳榔木香神麴糊爲丸米飲下百餘粒至夜半
不動又依前法下[illegible]百粒至天明下穢如爛魚
腸者[illegible]升半困頓終日漸與粥食而安　按此
方[illegible]作大劑無則難下　又治族叔年七十

尊壯形瘦夏末患泄痢至秋百方不[illegible]
雖久而神不瘁小便澀少而不赤兩手[illegible]
[illegible]頗弦自言膈微悶食亦減因悟此必多年沉
積癖在腸胃詢其平生喜食何物曰喜食鯉魚
三年無日不用[illegible]在肺肺爲大腸之藏宜
大腸之不固也當與澄其源而流自清以茱萸
陳皮青葱鹿首根生薑煎濃湯和以砂糖飲一
碗許自以指探喉中至半時吐痰半升如膠其
夜減半次早又服又吐半升而痢自止又與平

胃散加白术黃連旬日而安　按澀用木香散
訶黎勒丸[illegible]　休息痢多因兜住太早積不盡
除或因痢愈而不善調理以致時止時作宜四
君子湯加陳皮一錢木香半錢吞駐車丸只緣
兜住積滯遂成休息再投大積用兜劑　張
文仲用虎骨炙焦[illegible]末調服日三見效　久痢
休息[illegible]用椿根白皮東南行者長流
水內[illegible]一日夜黃皮切片每一兩配人參一兩
入[illegible]木香二錢粳米一撮煎湯飲之[illegible]

痢因痢久不愈耗損精血致腸胃空虛變生他證或五心發熱如勞之狀宜黃蓮飲子多倍蓮肉白多倍山藥痢後調補宜四君子湯加陳皮一錢半即異功散或七珍散惡甜者生料平胃散加人參茯苓各半錢、諸病壞證久下膿血或如死豬肝色或五色雜下頻出無禁有類滯下俗名刮腸此乃藏府俱虛脾氣欲絕故腸胃下脫若投痢藥則誤矣六柱飲去附子加益智仁白芍藥或可救其萬一、痢後風因痢後下

虛不善調攝或多行或房勞或感外邪致兩脚痠痛若痛若痺遂成風痢獨活寄生湯吞虎骨四斤丸或用大防風湯或多以骨碎補三分之一同研取汁酒解服外以杜牛膝杉木節白芷南星萆薢煎湯熏洗、丹溪云痢後風係血入臟則下未盡復還經絡不得行故也松明節一兩以乳香二錢炒焦存性蒼术黃蘗各一兩紫葳一兩甘草半兩桃仁去皮不去尖二兩俱為末每服一錢生薑同杵細水盪起二三沸服

隣人鮑子年二十餘因患血痢用澀藥取效後患痛風號叫撼鄰予視之曰此惡血入經絡證血受濕熱久必凝濁所下未盡留滯隧道所以作痛經久不治恐成枯細遂與四物湯桃仁紅花牛膝黃芩陳皮生甘草煎生薑汁研潛行散入少酒飲之數十帖又與刺委中出黑血近三合而安　寶鑑云因如瀉痢止脾胃虛難任飲食不可一概用克伐之劑若補養其脾胃氣足自然能飲食宜錢氏方中異功散設或喜嗜

飲食太過有傷脾胃而心腹痞滿惡食惡心則宜擇此中消導之藥枳實丸之類服得快勿再服恐傷食而脾無復損胃氣和平矣

大小便不通

脉盛皮熱腹脹前後不通脊悶此謂五實　脾胃氣滯不能轉輸加以痰飲食積阻礙清道大小便秘澀不快升柴二朮二陳湯數服能令大便潤而小便長　濕熱痰火結滯脉洪盛大小便秘結[illegible]痰涼膈散通聖散金貴厚朴大黃湯[illegible]　丹溪治一婦人脾疼後患大小便不通此是痰隔中焦氣聚上焦二陳加木通初服後吐食再服　燒皂角灰為末粥清調下

推車客七箇土狗七箇二物新瓦上焙乾為末以[illegible]白樹皮[illegible]向東南者煎濃湯服之　連須蔥[illegible]一二莖帶土生薑一塊淡豆豉二十一粒鹽一匙同研爛作餅烘熱掩臍中以帛紮定良久氣透自通不通再換一餅　陰證大小便不通及諸雜病陰候大小便不通危急者用牡蠣陳粉[illegible]葛[illegible]各　兩右為細末男病用女人唾調[illegible]臍下[illegible]手[illegible]汗出愈女病用男子唾[illegible]手[illegible]緊掩二乳上得汗出愈蓋卵與乳乃男女之根蒂坎離之分屬也非[illegible]不用

大便不通

潔古云臟腑之秘不可一槩治療有虛秘 有實秘 胃實而秘者能飲食小便赤當以麻仁丸七宣丸之類主之 胃虛而秘者不能飲食小便清利厚朴湯主之 胃氣實者秘物也 胃氣虛者秘氣也 有風秘 有冷秘 有氣秘 有熱秘 有老人津液乾燥及婦人分產亡血及發汗利小便病後血氣未復皆能作秘不可[illegible]用硝黃利藥巴荳牽牛尤在所禁

風秘者由風搏肺臟傳於大腸故傳化難或其人素有風病者亦多有秘宜小續命湯去附子倍芍藥入竹瀝一杯吞潤腸丸或活血潤腸丸 冷秘由冷氣橫於腸胃凝陰固結津液不通胃氣閉塞其人腸內氣攻喜熱惡冷宜藿香正氣散加官桂枳殼各半錢吞半硫丸熱藥多秘惟硫黃暖而通冷藥多泄惟黃連肥腸而止泄 [illegible]氣不升降穀氣不行其人多噫宜蘇[illegible]降氣湯加枳殼吞養正丹或半硫丸來復丹

未効佐以木香檳榔丸 有氣作痛大便[illegible]用通劑而便愈不通又有氣秘强通之[illegible]秘[illegible]迫之使通[illegible]下血者此當[illegible]便自通又當[illegible]之劑 熱秘[illegible]身熱[illegible]胃[illegible]門[illegible]此由大腸熱結宜[illegible]潤腸丸或木香檳榔丸實者[illegible]承氣湯 仲景云脉有陽結陰結者何以別之曰其脉浮而數能食不大便者此爲實名曰陽結也期十七日當劇其脉沉而遲不能食身體

重大便反鞕名曰陰結也期十四日當劇東垣云陽結者散之陰結者熱之前所云實秘熱秘即陽結也所云虛秘冷秘即陰結也 老人虛秘及出汗利小便過多一切病後血氣未復而秘者[illegible]蘇麻湯倍加當歸[illegible]仙丸或[illegible]潤腸丸[illegible]津液耗[illegible]以[illegible]一[illegible]液津液[illegible]便[illegible]氣及食[illegible][illegible]

大便結燥又有年老氣虛津液不足而結者腎惡燥急食辛以潤之是也　血虛津液枯竭而秘結者脉必小濇面無精光大便雖軟努責不出大劑四物湯加陳皮甘草酒紅花導滯通幽湯益血丹　血少兼有熱者脉洪數口乾小便赤少大便秘硬潤燥湯活血潤燥丸四物湯加酒芩[illegible]桃仁紅花　大法云大便秘服芎丸大便不通小便反利不知燥濕之過本大腸少津液以寒燥之藥治之是以轉燥少服則不

濟多服則亡血所以不通若用四物麻子杏仁之類則可經云燥則爲枯濕劑所以潤之　金匱要略云北方黑色入通於腎開竅於二陰故腎陰虛則小大便難宜以地黃從蓉車前茯苓之屬補真陰利水道少佐辛藥開腠理致津液而潤其燥施之於老人尤宜若大小便燥結之甚求通不得登廁用力太過便仍不通而氣被掙脫下注肛門有時泄出清水而裏急後重不可忍者胸膈間梗梗作惡乾嘔有聲渴而索

水飲食不進呻吟不絕欲利之則氣已下脫命在須臾再下即絕欲閉之則[illegible]脹滿腹腸閉恐反增劇欲升之使氣自舉而穢物不爲氣所結自然通利則[illegible]不堪宜如何處家姑年八十餘嘗得此患予惟用調氣利小便之藥雖小愈而不收全功當憶之令勿急性後因不能[illegible]藥利下數行不以告予自謂稍快矣而腹急數動一止氣息奄奄顏然惕懼予知真氣已脫若不收攝恐遂無救急以生脉藥投

之數劑後結脉始退因合益血潤腸丸與服勸以勿求速効勿服他藥久之自有奇效如言調理兩月餘而二便通調四肢康勝矣便秘自是老人常事俗以爲後門閉非大患之徵而一時雖用[illegible]而後疾予所[illegible]不[illegible]大黃可以久服及表而出之　[illegible]五燥大便秘　東方其脉[illegible]治[illegible]獨活羌活防風[illegible]　南方其脉洪熱燥也宜[illegible]大黃[illegible]硝　西

南方其脉緩土燥也宜潤濕之藥治之㕒藥半夏生薑烏梅木瓜　西方其脉澀血燥也宜滋血之藥治之杏仁麻仁桃仁當歸氣結用木香檳榔枳實陳皮地黃郁李仁　北方其脉遲寒燥也宜温熱之藥治之當歸肉桂附子烏頭硫黃良薑巴豆　潤腸丸加減法　如病人不小便因大便不通而澀其邪盛者急加酒洗大黃以利之　如血燥者加桃仁酒洗大黃　如風結燥者加麻仁大黃　如風澀者加煨皂角仁

大黃秦艽以利之　如脉澀覺身癢氣澀者加郁李仁大黃以除氣燥　如寒陰之病爲寒結閉者以局方中半硫丸或加煎附子生薑湯水冷與之其病雖陰寒之證當服陽藥補之若大便恒不甚通者亦當十服中與一服利藥微通其大便不令秘結乃治之大法也　若病人雖是陰證或是陰寒之證其病顯躁脉堅實亦宜陽藥中少加苦寒之劑以去熱躁躁止勿加如陰躁欲坐井中者其二腎脉按之必虛或沉細

而遲此爲易辨如有客邪之病亦從權加之　有物有積而結者當下之　食傷太陰腸滿食不化腹響響然不能大便者以苦泄之七宣丸木香檳榔丸　桃杏仁俱治大便秘當以血氣分之年老虛人大便燥秘者脉浮在氣杏仁陳皮主之脉沉在血桃仁陳皮主之所以俱用陳皮者以手陽明病與手太陰爲表裏也又云盛則難行陽氣也敗則便難行陰血也　注夏大便澀滯者血少血中伏火也黃芪人參湯加

生地黃當歸身桃仁泥麻仁泥潤之　如潤之大便久不快利者少加煨大黃微利之　如加大黃久不快利者非血結血秘是熱則生風病必澀風證也當服黃芪人參湯只用羌活防風各半兩水四盞煎至一盞去查空心服之其大便必大走也　大便不通五日一徧小便黃赤渾身腫面上及腹尤甚色黃麻木身重如山沉困無力四肢痿軟不能舉動喘促唾清水吐穢痰白沫如膠時燥熱發欲去衣須臾而過振寒

𩕄額有時如水頞寒尤甚頭旋眼黑目中溜火冷淚鼻不聞香臭小腹急痛當臍有動氣按之堅硬而痛宜麻黃白朮湯此府宿有風寒熱伏於營血之中其水火乘於陽道爲上盛元氣短少上喘爲陰火傷其氣四肢痿在腎水之間乃所勝之病今正遇冬寒得時乘其肝木又實其母肺金克木凌火是大勝必有大復其證善怒欠鼻中如有物不聞香臭目視䀮䀮多悲健忘腹急痛徧身黃腹大脹面目腫尤甚食不下痰唾涕有血目皆瘍大便不通只二服皆愈　凡諸秘服藥不通或虛人畏服利藥者用蜜煎導　或用鹽及皂角末和入蜜煎中尤捷蓋鹽能軟堅潤燥皂角能通氣疏風故也　冷秘用醬生薑導　或於蜜煎中加草烏頭末以化寒消結　熱者猪膽汁導　烏梅湯浸去核爲丸如棗子大亦可導　醬瓜削如棗亦可導

丹溪云古方通大便皆用降氣品劑蓋肺氣不降則大便難傳送用枳殼沉香訶子杏

仁等是也又老人虛人風人津液少而秘者宜以藥而滑之用胡麻麻仁阿膠等是也如妄以峻利藥逐之則津液走氣血耗雖暫通而即秘矣必更生他病昔王少府患此疾有人以駛藥利之者屢矣後爲肺痿咯膿血卒至不通而死

閉癃遺尿

遺尿者溺出不自知也閉癃者溺閉不通而淋瀝滴點也唯肝與督脉三焦膀胱主之　肝脉督脉主之者經云肝足厥陰之脉過陰器所生病者遺尿閉癃又云督脉者女子入繫廷孔其孔溺孔之端也其男子循莖下至篡與女子等其生病癃痔遺溺故遺溺閉癃皆取厥陰俞穴及督脉俞穴也　三焦主之者經云三焦下腧在於足太陽之前少陽之後出於膕中外廉名

曰委陽足太陽絡也三焦者足太陽少陽之所將太陽之別也上踝五寸別入貫腨腸出於委陽並太陽之正入絡膀胱約下焦實則閉癃虛則遺溺遺溺則補之閉癃則瀉之是也　膀胱主之者經云膀胱不利為癃不約為遺溺是也然遺溺閉癃不取膀胱俞穴者蓋膀胱但藏溺其出溺皆從三焦及肝督脉也　閉癃合而言之一病也分而言之有暴久之殊蓋閉者暴病為溺閉點滴不出俗名小便不通是也癃者久病為溺癃淋瀝點滴而出一日數十次或百次名淋病是也今分其病立為二門

小便不通

丹溪人法小便不通有熱有濕有氣結於下宜清宜燥宜升有隔二隔三之治如因肺燥不能生水則清金此隔二如不因肺燥但膀胱有熱則宜瀉膀胱此正治也如因脾濕不運而精不升故肺不能生水則當燥脾健胃此隔三車前子茯苓清肺也黄蘗知母瀉膀胱也蒼朮白朮健胃燥脾也　實鑑小便不利有三不可一槩而論若津液偏滲於腸胃大便泄瀉而小便澀少一也宜分利而已若熱搏下焦津液則熱濕而不行二也必滲泄則愈若脾胃氣澀不能通調水道下輸膀胱而化者三也可順氣令施化而出也　東垣大法小便不通皆邪熱為病分在氣在血而治之以渴與不渴而辨之如渴而不利者熱在上焦肺分故也夫小便者是足太陽膀胱經所主也肺合生水若肺熱不能生水是絕其水之源經云虛則補其母宜清肺而滋其化源故當從肺之分助其秋令水自生焉又如雨如霧如霜皆從天而降下也正藥有氣之薄者乃陽中之陰是感秋清肅殺之氣而生可以補肺之不足淡味滲泄之藥是也茯苓澤瀉琥珀燈心通草車前子木通瞿麥萹蓄之類以清肺之氣泄其火滋水之上源也如不渴而小便不通者熱在下焦血分故不渴而小便不通也熱閉於下焦者腎也膀胱也乃陰中之陰陰受熱邪閉塞其流易上老云寒在胸中遏塞不入熱在下焦填塞不便須用感北方寒水之化氣味俱陰之藥以除其熱泄其閉塞內經云無陽則陰無以生無陰則陽無以化若服淡滲之藥其性乃陽中之陰非純陰之劑陽無以化何以補重陰之不足也須用感地之水運而生大苦之味感天之寒氣而生大寒之藥此氣味俱陰乃陰中之陰也大寒之氣人感之生膀胱寒水之運人感之生腎此藥能補腎與膀胱受陽中之陽熱火之邪而閉其下焦使小便不通也夫用大苦寒之藥治法當寒因熱用又云必伏

其所主而先其所因其始則氣同其終則氣異也如熱在上焦以梔子黃芩熱在中焦以黃連芍藥熱在下焦以黃蘗　熱在氣分渴而小便閉清肺散猪苓湯五苓散茯苓琥珀湯紅秫散　熱在血分不渴而小便閉滋腎丸黃連丸導氣除燥湯　東垣治一人病小便不利目睛突出腹脹如鼓膝已上堅硬皮膚欲裂飲食不下服甘淡滲泄之藥皆不効曰疾急矣非精思不能處思之半夜曰吾得之矣經云膀胱者津液

之府必氣化而能出焉多服淡滲之藥而病益甚是氣不化也啓玄子云無陽則陰無以生無陰則陽無以化甘淡氣薄皆陽藥獨陽無陰欲化得乎遂以滋腎丸群陰之劑投服再服即愈

渴而腹冷水氣也金匱云小便不利者有水氣其人苦渴括蔞瞿麥丸主之以小便利腹中溫爲度　小便不通腹下痛狀如覆椀痛悶難忍者乃腸胃乾涸膻中氣不下經云膀胱者州都之官津液藏焉氣化則能出矣膻中者臣使

之官三焦相火腎爲氣海也王註曰膀胱津液之府胞內居之少腹處間毛內藏胞器若得氣海之氣施化則溲便注下氣海之氣不及則隱秘不通故不得便利也先用木香沉香各三錢酒調下或八正散甚則宜上涌之令氣通達便自通利經所謂病在下上取之王註曰熱攻於上不利於下氣盛於上則溫辛散之苦以利之一方煎檳榔茯苓湯調木香沉香末服之空心下　丹溪云小便不通屬氣虛血虛有實熱痰

氣閉塞皆宜吐之以提其氣氣升則水自降蓋氣承載其水者也氣虛用參朮升麻等先服後吐或就參芪藥中調理吐之血虛用四物湯先服後吐或就芎歸湯探吐之痰多二陳湯先服後探吐之痰氣閉塞二陳加香附木通探吐之實熱當利之或用八正散蓋大便動則小便自通矣　或問以吐法通小便今論中未嘗有之理將安在曰取其氣化而已何則內經謂三焦者決瀆之官水道出焉膀胱者州都之官津液

藏焉氣化則能出矣故上中下三焦之氣有一
不化則不得如決瀆之水而出矣豈獨下焦膀
胱氣塞而已哉上焦肺者主行營衛通調水道
下輸膀胱而腎之合足三焦下輸又上連肺此
豈非小便從上焦之氣化者乎張仲景有言衛
氣行則小便宜通其義亦在是矣內經又謂脾
病則九竅不通小便不利是其一也此豈非小
便從中焦之氣化者乎由是而言之三焦所傷
之邪不一氣之變化無窮故當隨處治邪行水

求其氣化亦無窮也然而大要在乎陰與陽無
相偏負然後氣得以化若方盛衰論曰至陰虛
天氣絕至陽盛地氣不足夫腎肝在下地道也
心肺在上天道也脾胃居中氣交之分也故天
之陽絕而不交於地者尚且白露不下況人同
乎天其在上之陽不交於陰則在下之陰無以
爲化而水道其能出乎東垣引八十一難經謂
有陰陽相乘有覆有溢而爲內關不得小便者
有或在下之陰虛在上之陽盛不務其德而乘

之致腎氣之不化者必瀉其陽而舉之則陰可
得而平也若此條所敘之證皆用吐法名曰氣
道閉塞升降不前者而用耳何嘗捨衆法而獨
施是哉丹溪嘗曰吾以吐通小便譬如滴水之
器上竅閉則下竅無以自通必上竅開而下竅
之水出焉吾嘗推是開竅之法用之多驗姑書
一二醫以明之甲午秋治一婦人年五十初患
小便澀醫以八正散等劑展轉小便不通身如
芒刺加於體予以所感霖淫雨濕邪尚在表因

用蒼朮爲君附子佐之發其表一服即汗小便
即時便通又治馬參政父年八旬初患小便短
濇因服藥分利太過遂致閉塞涓滴不出予以
飲食太過傷其胃氣陷於下焦用補中益氣湯
一服小便通因先多利藥損其腎氣遂致通後
遺尿一夜不止急補其腎然後已凡醫之治是
證未有不用泄利之劑者安能顧其腎氣之虛
哉表而出之以爲世戒　有痰血而小便閉者
宜多用牛膝本事方云頃在毘陵有一貴官妻

妾小便不通臍腹脹痛不可忍衆醫皆作淋治如入正散之類數種皆治不通病愈甚予診之曰此血瘕也非瞑眩藥不可去乃用桃仁煎初服至日午大痛不可忍臥少頃下血塊如拳者數枚小便如黑豆汁一二升痛止得愈此藥猛峻氣虛血弱者宜斟酌之　大抵小腹痛脹如覆碗者爲實亦分在氣在血氣壅塞於下者木香流氣飲血汚於下者桃仁煎代抵當丸牛膝膏　經云腎合膀胱膀胱者津液之府也小腸

屬腎腎上連肺故將兩藏三焦者中瀆之府也水液出焉是屬膀胱乃腎之府也又云膀胱者州都之官津液藏焉氣化則能出矣由是言之膀胱藏水三焦出水治小便不利故刺灸法但取三焦穴不取膀胱也小腸屬腎肺故東垣用清肺飲子滋腎丸利小便也　運氣小便不利有三　其一屬濕邪攻三焦經云太陰在泉濕淫所勝病小腹痛腫不得小便又云水不及曰涸流涸流之紀上宮與正宮同其病癃閉是也

其二屬風邪攻脾經云厥陰司天風淫所勝病溏瘕泄水閉是也　其三屬燥熱經云陽明司天之政天氣急地氣明民病癃閉初之氣其病小便黃赤甚則淋又云少陰司天之政地氣肅天氣明二之氣其病淋是也　良法治小便不通諸藥不效或轉胞至死危困用猪尿胞一箇底頭出一小眼子翎筒通過放在眼兒內根底以細線繫定翎筒子口細杖子堵定上用黃蠟封尿胞口吹滿氣七分繫定了再用手捻定

翎筒根頭放了黃蠟塞其翎筒在小便出裏頭放開翎筒根頭手捻其氣透於裏小便即出神效

姙娠小便不通　姙娠胎滿逼胞多致小便不利若脬系了戾小便不通名曰轉胞丹溪以爲多因胎婦虛弱憂悶性躁食味厚古方用滑利疎導藥鮮効若脬爲胎所墜而不通但升舉其胎脬系疎而小便自行若臍腹作脹而小便淋閉此脾胃氣虛胎壓尿胞四物二陳參朮空心

服後探吐數次自安薛氏云前證亦有脾肺氣虛不能下輸膀胱者亦有氣熱鬱結膀胱津液不利者亦有金爲火爍脾土濕熱甚而不利者更當詳審施治　金匱要畧問曰婦人病飲食如故煩熱不得卧而反倚息者何也師曰此名轉胞不得溺也以胞系了戾故致此病但利小便則愈宜腎氣丸主之卽八味丸兩下十五丸至三十丸日再服

又云姙娠有水氣重身小便不利灑淅惡寒起卽頭眩葵子茯苓散主之　又云姙娠小便難

飲食如故歸母苦參丸主之　丹溪治一婦轉胞小便閉脉似濇重取則弦左稍和此得之憂患濇爲血少氣多弦爲有飲血少則胞不舉氣多有飲中焦不清而溢則胞知所避而就下故墜以四物湯加參朮半夏陳皮甘草生薑空心飲隨以指探吐之俟氣定又與至八貼而安此恐偶中後又治數人皆効　又一婦四十一歲孕九月轉胞小便閉脚腫形瘁脉左稍和而右濇此飽食氣傷胎系弱不能自舉而下墜壓着

膀胱偏在一邊氣急爲其所閉所以水竅不能出也宜補血養氣氣血既正胎系自舉則不下墜方有安之理遂用人參當歸身尾白芍藥白朮陳皮炙甘草半夏生薑煎濃湯與四貼次早以渣煎頓服探吐之小便大通皆黑水後就此方加大腹皮枳殼青葱葉砂仁二十貼與之而得以安産　孕婦小便不通脉細弱乃氣血俱虛胎壓膀胱下口用補藥升起恐遲又加急滿令穩婆以香油抹手入産户托起其胎溺出

如注却以參芪升麻大劑服之　一法將孕婦倒竪胎自運溺自出勝手托遠矣

[illegible]　簡易方用陳皮去白爲末空心[illegible]二錢服　外用鹽塡臍中却以葱白剝去粗皮十餘根作一束切作一指厚安鹽上用大艾炷滿葱餅上以火灸之覺熱氣入腹内卽時便通

按此唯氣閉不得通者宜之若氣虛源涸與夫熱結者不可泥也

淋 胞痺

淋之爲病嘗觀病源候論謂由腎虛而膀胱熱也膀胱與腎爲表裏俱主水水入小腸與胞行於陰爲溲便也若飲食不節喜怒不時虛實不調藏府不和致腎虛而膀胱熱腎虛則小便數膀胱熱則水下澀數而且澀則淋瀝不宣故謂之淋其狀小腹弦急痛引於臍小便出少氣數及分石淋勞淋血淋氣淋膏淋冷淋其石淋者有如沙石勞淋者勞倦即發血淋者心主血氣

通小腸熱甚則搏於血脉血得熱則流行入胞中與溲俱下膏淋者肥液若脂膏又名肉淋氣淋者胞內氣脹小腹堅滿出少喜數尿有餘瀝冷淋者冷氣客於下焦邪正交爭滿於胞內水道不宣先寒戰然後便數成淋可以悉病情矣考之內經則淋病之因又不止此大綱有二曰濕曰熱謂太陰作初氣病中熱脹脾受積濕之氣小便黃赤甚則淋少陽作二氣風火鬱於上而熱甚病[illegible]淋[illegible]六府十二經脉氣皆相通

移是故足太陽主表上行則統諸陽之氣下行則入膀胱又肺者通調水道下輸膀胱脾胃消化水穀或在表在上在中凡有熱則水液皆熱轉輸下之然後膀胱得之而熱矣且小腸是心之府主熱者也其水必自小腸滲入膀胱胞中諸熱應於心者其小腸必熱胞受其熱經謂胞移熱於膀胱者則癃溺血是也由此而言初起之熱邪不一其因皆得傳於膀胱而成淋若不先治其所起之本止從末流胞中之熱施治未

爲全也古當思之淋病必由熱甚生濕濕生則水液渾凝結而爲淋不獨此也更有人服金石藥者入房太甚敗精流入胞中及飲食痰積滲入者則皆成淋丹溪嘗治一小兒在胎受久服金石藥之餘毒病淋一十五年以紫雪治愈凡治病不求其本可乎　小便澀痛常急欲溺及大便滴瀝莖中痛不可忍者此五淋病生料五苓散加阿膠或車前子木通或五苓散益元散等分和服並可又火府丹佐以導赤散石葦散　浴

熱極成淋服藥不効者宜減桂五苓散加木通滑石燈心瞿麥各少許仍研麥門冬草連根車前草白龍草各自然汁和蜜水調下　氣淋氣壅不通小便淋結臍下妨悶疼痛瞿麥湯石葦散榆枝湯木香流氣飲　氣虛淋八物湯加杜牛膝黃芩汁煎服老人氣虛亦能淋參朮中加木通山梔　血受傷者補血行血自愈勿作淋治　死血作淋牛膝膏妙但虛人能損胃不宜食　千金云用牛膝以酒煮服治小便淋痛附

後方用牛膝根莖葉亦以酒煮服治小便不利莖中痛欲死及治婦人血結堅痛如神蓋牛膝治淋之聖藥也但虛人當用補劑監制之耳

血淋用側柏葉生藕節車前草等分搗汁調益元散立効散瞿麥散小薊飲子柿常散當歸湯羚羊角飲鷄蘇飲子金黃散髮灰散　戴氏云血淋一證須看血色分冷熱色鮮者心小腸實熱色瘀者腎　虛冷若的是冷淋及下元虛冷血色瘀者並宜漢椒根剉碎不以多少白水煎候冷進按血多有熱極兼水化而黑者不可便以爲冷也

膏淋鹿角霜丸沉香散沉香丸磁石丸海金砂散菟絲丸　戴云有人淋非淋小便色如米泔或便中有如鼻涕之狀此乃精溺俱出精塞溺道故便欲出不能而痛宜大菟絲子丸鹿茸丸之類按此即膏淋也

沙石淋乃是膀胱蓄熱而成正如湯瓶久在火中底結白礆而不能去理宜滌徹積熱使水道通則沙石出而可愈宜神效琥珀散如聖散石燕丸

獨聖散　石首魚腦骨十箇火煅滑石二錢琥珀三分俱爲細末每服一錢空心煎木通湯調下　鼈甲九肋者一箇醋炙令脆爲細末每服一匙酒調服當下沙石　雄鵲燒灰淋取汁飲之石即下　石淋小便澀水石下流塞其水道痛不可忍經及時日水道不通其氣上攻頭痛面腫甚則四肢八節俱腫其石大者如梅核堅硬如石後所其石小者唯碎石相結通下即碎宜服下石方用冬葵子滑石射干知母山上

各一分通草三分爲細末每服二錢半水一盞
半苦竹葉十片同煎取一盞去滓食前熱服又
大府熱頭痛若體氣壯健先進後方藥兩三盞
然後進取不方用麻黃去節羌活射干荊芥穗
紫菀防風知母蔓荊子牽牛各一分半夏二銖
爲細末每服二錢水一盞煎九分去滓食後熱
服　石淋導水用螻蛄七枚以鹽一兩同於新
瓦上鋪蓋焙乾研爲細末每服一錢七溫酒調
服　勞淋地黃丸黃芪湯白芍藥丸　冷淋肉
淋

蓯蓉丸澤瀉散沉香散檳榔散生附散臧氏云
進冷劑愈甚者此是冷淋宜地髓湯下附子八
味丸有因服五苓散等藥不効用生料鹿茸丸
却愈此皆下元虛冷之故乃劉河間則謂亦由
熱客膀胱鬱結不能滲泄非獨冷也　小便淋
莖中痛不可忍相引脇下痛宜參苓琥珀湯
有小便艱澀如淋不痛而痒者虛證也宜八味
丸生料鹿茸丸之類若因思慮過度致淋宜歸
脾湯或辰砂妙香散吞威喜丸或妙香散和五

苓散　汗多而小便赤澀者月多有之[illegible]
所致既多小便反澀少而赤緣[illegible]
爲汗津液不通小腸澀閉則水不通[illegible]
一名導逆内有[illegible]收汗猪苓澤瀉[illegible]
道收其在外[illegible]從之内又從而利[illegible]斂
之纏者通[illegible]於此然有虛勞汗多[illegible]澀
者却是五内枯燥滋腴既去不能生津故溺澀
而赤不宜過用通小便之劑竭其腎水唯當溫
養潤肺十全大補湯養榮湯之類自足選用汗
淋

者心液心主血血榮則心得所養汗止津生不
待通而溺自清矣諸失精血及患癰毒人或有
小便赤澀之證此亦是枯竭不潤之故並宜前
法

胞痺　痺論云小腹膀胱按之内痛若沃以湯
澀於小便上爲清涕夫膀胱者州都之官津液
藏焉氣化則能出矣今風寒濕邪氣客於胞中
則氣不能化出故胞滿而水道不通其證小腹
膀胱按之内痛若沃以湯澀於小便以[illegible]

經其直行者上交巔入絡腦下灌鼻竅則為清涕也　腎著湯　茯苓丸　巴戟丸　腎瀝湯

妊娠淋　乃腎與膀胱虛熱不能制水然妊婦胞繫於腎腎間虛熱而成斯證甚者心煩悶亂名曰子淋也若頸項筋攣語澁痰甚用羚羊角散　若小便澁少淋瀝用安榮散　若肝經濕熱用龍膽瀉肝湯　若肝經虛熱用加味逍遙散　腿足轉筋而小便不利急用八味丸緩則不救　若服燥劑而小便頻數或不利用生地

茯苓牛膝黃蘗知母芎歸甘草　若頻數而色黃用四物加黃蘗知母五味麥門玄參　若肺氣虛而短少用補中益氣加山藥麥門　若陰挺痿痺而頻數用地黃丸　若熱結膀胱而不利用五淋散　若脾肺燥不能化生宜黃芩清肺飲　若膀胱陰虛陽無所生用滋腎丸　若膀胱陽虛陰無所化用腎氣丸

血淋　因熱客於脬虛則頻數熱則澁痛氣虛挾熱血入胞中則血隨小便出而為血淋也

若膀胱虛熱用六味丸　若陰虛而陽無以化用滋陰腎氣丸蓋土生金金生水當滋化源

陳氏云治產前後淋其法不同產前當安胎產後當去血瞿麥蒲黃最為產後要藥　茅根湯主治產後諸淋

診　腎脉滑實為癃㿉　疝脉滑甚為㿉癃少陰脉數婦人則陰中生瘡男子則氣淋　盛大而實者生虛小而澁者死　下焦氣血乾者死　鼻頭色黃者小便難　素問奇病論有

癃者一日數十溲此不足也身熱如炭頸膺如格人迎躁盛喘息氣逆此有餘也太陰脉細微如髮者此不足也其病安在名為何病岐伯曰病在太陰其盛在胃頗在肺病名曰厥死不治

小便數

運氣小便數皆屬火經云少陽之復便數憎風是也小便數唯二藏有之一屬肺經云肺手太陰之脉氣盛有餘則肩背痛風寒汗出中風小便數而欠是也以刺言之瀉手太陰則愈一屬肝經云足厥陰之瘧令人如癃狀而小便不利又云肝痺者夜卧則驚多飲數小便是也視虛實補瀉之則愈　數而少茯苓琥珀湯利之一數而多萆薢蓮肉益智仁之屬收之　生萆薢半斤刮去皮以刀切碎於鍇中煮酒沸下萆薢不得攪待熟加鹽葱白更添酒空腹下二三盞妙　蓮肉去皮不以多少用好酒浸一兩宿猪肚一箇將酒浸蓮肉入肚中多半爲度水煮熟取出蓮肉切焙乾爲細末酒煮麫糊爲丸如芡實大每服五十丸食前米飲湯下名水芝丸　夜多小便益智二十四箇爲末鹽五分水一盞煎八分臨卧温服　衛真湯丹丸　桑螵蛸散

戴氏云小便多者乃下元虚冷腎不攝水以

致滲泄宜兔絲子丸八味丸玄兔丹生料鹿茸丸　有人每日從早至午前定尿四次一日之間人自無事此腎虛所致亦猶脾腎泄早泄而後安次日又復然是也　若小便常急徧數雖多而所出常少放了復急不澀痛卻非淋證亦有小便畢少頃將謂已盡忽再出些少者多因自忍尿或忍尿行房事而然宜生料五苓散減澤瀉之半加阿膠一錢吞加減八味丸此丸須用五味子者　有盛喜致小便多日夜無度乃喜極傷心心與小腸爲表裏宜分清飲四七湯各半貼和煎仍以辰砂妙香散吞小兔絲子丸或玄兔丹　若頻頻欲去而溺不多但不痛耳此腎與膀胱俱虛客熱乘之虛則不能制水宜補腎丸六味地黃丸　熱入水道澀而不利八正散或五苓散加黃蘗知母麥門冬木通　大便[illegible]小便[illegible]者爲脾約脾約丸主之

小便不禁

原病式云熱甚客於腎部干於足厥陰之經廷孔鬱結極甚而氣血不能宣通則痿痺神無所用故津液滲入膀胱而旋溺遺失不能收禁也玹之內經則謂督脉生病為遺溺靈樞謂肝所生病為遺溺蓋因二經循陰器繫廷孔病則禁衛不住氣血勞劣莫能約束水道之竅故遺失不禁劉河間可謂得此旨矣然內經復言膀胱不約為遺溺靈樞言手太陰之別名曰列缺其

病虛則欠故小便遺數由此觀之則又不獨病在陰器廷孔而已夫如是者內由三焦決瀆之失常也何則手少陽之脉從缺盆布膻中下鬲徧屬三焦足太陽之脉從肩髆內挾脊抵腰中入循膂屬膀胱三焦虛則膀胱虛故不約也肺從上焦通調水道下輸膀胱腎又上連肺故將兩藏是子母也母虛子亦虛此上中下三焦氣虛者是以致遺溺矣由是而知三焦所部五藏之六淫或變而為[illegible]此邪者悉能干於下焦腎肝膀胱出水之竅而為不禁之病何止於熱極鬱結痿痺皆部而已乎又自內經所謂太陰在泉客勝則客下焦溲便不時太陰之復甚則入腎竅瀉無度者觀之則知濕主於溺況是所勝之邪其不為鬱結痿痺者乎從而思之聖人之言舉一隅使當以三隅反前所謂肝腎膀胱之病不言其邪可見諸邪盡能病之也次言手太陰列缺虛者為子母藏氣之要也可見所生所勝不勝之五邪皆足以乘之也其言太陰之勝復則

濕為所勝之重者也其他風寒燥熱雖不及言可知在其中矣　治法上虛補氣　下虛澀脫

東垣云小便遺失者肺金虛也宜安卧養氣禁[illegible]勞役以黃芪人參之類補之不愈當責有熱加黃檗生地　下虛謂膀胱下焦虛經云水泉不止者是膀胱不藏也仲景云下焦竭則遺溺失便其氣不能自禁制不須治久則愈又云下焦不歸則遺溲世用桑螵蛸雞胜胵之類是也

[illegible]熱如一[illegible]用[illegible]子兔絲子[illegible]

[illegible]丸白茯苓散鹿茸散兔絲子散內有桂附
唯真虛寒者宜之　桑螵蛸散鹿角霜丸阿膠
飲鹿茸散溫補而不僭　小便不禁而淋瀝澀
滯者澤瀉散茯苓丸　滑脫者牡蠣丸　如白
薇散雞腸散內俱有寒藥內熱者宜之　要全
善治一男子遺溺不覺脉洪大盛以黃蘗知母
杜牛膝為君青皮甘草為臣木香為佐桂些少
反佐服數貼大効此法與千金白薇散皆河間
所謂熱甚廷孔鬱結神無所用不能收禁之意

也　遺尿有實熱者用神芎導水丸每服百丸
空心白湯下若一服利止後服此謂淫氣遺溺
痺聚在腎痺謂氣血不通宜也　戴云睡着遺
尿者此亦下元冷小便無禁而然宜大兔絲子
丸猪脬炙碎煎湯下凡遺尿皆屬虛　通用方
蕢以仁[illegible]炒煎[illegible]　雞腸一具以水三升煮取
一升分三服一方用雄雞燒灰為末用三指撮
溫漿水調一錢匕日三服之更良　雄雞喉嚨
及矢白雄肶胵裹黃皮燒為末麥粥清調服　羊

肝盆水煎令滿繫兩頭煮熟開取水頓服之
雞肶胵一具并腸洗淨燒灰男用雌女用雄為
細末每服二錢空心溫酒調服一方加猪脬灰
燕蓐草主眠中遺尿不覺燒令黑研水進方
寸匕　膀胱欬者欬而遺溺
[illegible]　用白薇芍藥為末酒調下或
白礬牡蠣各為末酒調一錢或雞毛灰末酒服一
匕或灸桑螵蛸益智仁為末米飲下　薛氏云
前證若肺中有熱宜加味逍遙散若脾肺氣虛

宜補中益氣湯加益智若肝腎陰虛宜六味丸
[illegible]　乃氣血不能制故也　薛氏曰
若因稟賦不順以致胞損而小便淋瀝者用八
珍湯以補氣血兼進補脬飲若因膀胱氣虛而
小便頻數當補脾肺若膀胱陰虛而小便淋瀝
須補肺腎
婦人產蓐產理不順致傷膀胱遺尿無時宜補
脬飲桑螵蛸散白薇散薛氏曰前證若脾肺陽
虛用補中益氣湯若肝腎陰虛用六味地黃丸

若肝腎之氣虛寒用八味地黃丸若肝脾氣血虛熱用加味逍遙散佐以六味丸　丹溪云嘗見尿胞因收生者不謹以致破損而得淋瀝病遂為廢疾有婦年壯難產得此因思肌肉破傷在外者可以補完胞雖在腹恐亦可治診其脈虛甚遂與峻補以參芪為君芎歸為臣桃仁陳皮黃芪茯苓為佐煎以猪羊胞中湯極饑時飲之但劑小者率用一兩至一月而安蓋令氣血驟長其胞自完恐稍緩亦難成功矣

小便黃赤

諸病水液渾濁皆屬於熱　小便黃者少腹中有熱也　臟府小便黃有四　一屬肝熱經云肝熱病者小便先黃是也　二屬胃實經云胃足陽明之脈氣盛則身以前皆熱其有餘於胃則消穀善饑溺色黃是也　三屬肺虛經云肺手太陰之脈氣虛則肩背痛寒少氣不足以息溺色變是也　四屬腎虛經云冬脈者腎脈也冬脈不及則令人眇清脊痛小便變是也　運氣小便黃有二　一屬風經云厥陰之勝胠脇氣并化而為熱小便黃赤是也　二屬熱經云少陰司天熱淫所勝病溺色變又云少陽之勝溺赤善驚又云陽明司天燥氣下臨暴熱至乃暑陽氣鬱發小便變是也蓋暴熱消爍地氣少陰之熱也　邪之所在皆為不足中氣不足溲便為之變補足外踝下留之用藥則補中益氣湯是也　小便黃無如黃蘗知母効　脈經云尺濇足脛逆冷小便赤宜服附子四逆湯足太衝

補之

遺精

丹溪書分夢遺精滑爲二門蓋夢與鬼交爲夢遺不因夢感而自遺者爲精滑然總之爲遺精也其治法無二故合之　或問精滑何因得之曰金匱要畧謂虛勞之病脉浮大手足煩陰寒精自出又謂脉弦而大此名革亡血失精又謂小腹弦急陰頭寒脉動微緊男失精女子夢交通巢氏病源以虛勞病分出五勞七傷六極二十三蒸之名於七傷中精連蒸病中玉房蒸男

則遺泄病精與尿精聞見精出及失精等候皆混同腎病虛勞門爲腎上藏精故盡作腎氣衰弱之病似若他藏無損焉豈其然哉夫五藏皆藏精者也嘗攷靈樞本神篇有謂天之在我者德也地之在我者氣也德流氣薄而生者也故生之來謂之精兩精相搏謂之神如是者通言一身主宰之精神也因心腎是水火之藏法天地施化生成之道故藏精神爲五藏之宗主其次言所以任物者謂之心心有所憶謂之意

有所存謂之志因志而存變謂之思因思而遠慕謂之慮因慮而處物謂之智如是者皆因心神隨物所感發而分之是謂五志遂有五神藏之名五神既分則於德化政令性味各司其屬者之用於是心腎之水火亦俯從五神之列然而所主之精神則並行未始相離而五神五變者亦各如此則精亦從神之所變隨處與之合矣故五藏各得藏其精神以行其用是之謂藏真主所以屬本氣之生化者也苟有一藏之真不得其正則一藏之病作矣苟一藏之精神傷甚者則必害其心腎之主精神者也如所謂怵惕思慮則傷神神傷則恐懼流淫而不止恐懼不解則傷精精傷則骨痠痿厥而不舉喜樂者憚散而不藏恐懼者蕩憚而不收是故主藏精者不可傷傷則失守而陰虛陰虛則無氣無氣則死矣如是則精神之在五藏傷之則淫邪立至心之在心為官在氣為火為熱腎之在志為恐在氣為水為寒於是怵惕思慮傷其神神

傷則火動不止火動不止則腎水恐懼之志者并矣恐甚不解則動中而腎自傷腎主藏精與所受五藏六府所輸至之精皆不得藏而時自下矣此乃以心腎主宰精神者言也至若他藏之精各得而泄有所搏乎曰內經所謂思想無窮所願不得意淫於外入房太甚宗筋弛縱發為白淫其病筋痿筋痿者生於肝使內王註以白淫謂白物淫衍如精之狀因溲而下雖亦如精始非精化未成之精而徑出者乎何以言之精者謂生來之精者先身生之精也有謂食氣入胃散精於五藏者有謂水飲自脾肺輸腎而四布五經並行之精者此水穀日生之精也然飲食日生之精皆從生來元精之所化而後分布五藏盈溢則輸之於腎腎乃元氣之本生成之根以始終也其發生之道也若飲食之精過一藏之精則其藏之食味化之不全不得入與元精之藏[illegible]泄出因大所謂脾移熱於腎少腹冤熱而痛出白者是亦如之王註謂消脂

爍肉無乃消其腎所藏之精歟蓋使二藏無所
則此自物其不爲精乎使二藏有病則所藏之
精其不變爲自物而出之乎以此比例則肺脾
二藏之精寧不有似肝藏之傷神動氣致精失
守而走泄者乎然則治當何如曰獨腎泄者治
其腎由他藏而致腎之泄者則兩治之在他藏
自泄者治其本藏必察四屬以求其治大抵精
自心而泄則血脉空虛本縱不收自肺而泄者
皮革毛焦喘急不利自脾而泄者色黃肉消四

肢懈惰自肝而泄者色青而筋痿自腎而泄者
色黑髓空而骨惰即脉亦可辨也　或問夜
夢交接之理何如曰內經曰腎者主水受五藏
六府之精而藏之又曰主蟄封藏之本精之處
也又曰陰陽之要陽密乃固故陽強不能密陰
氣乃絕陰平陽秘精神乃治陰陽離決精氣乃
絕又曰陰陽總宗筋之會會於氣街靈樞淫邪
發夢篇曰厥氣客於陰器則夢接內蓋陰器者
宗筋之所繫也而足太陰陽明少陰厥陰之筋

皆結聚於陰器與衝任督三脉之所會然厥陰
主筋故諸筋皆統屬於厥陰也腎爲陰主藏精
肝爲陽主疏泄陰器乃泄精之竅是故腎之陰
虛則精不藏肝之陽強則氣不固若遇陰邪客
於其竅與所強之陽相感則精脫出而成夢矣
所謂陽強者非藏之真陽強也乃肝藏所寄之
相火強耳蓋木爲陰火爲陽故通言火爲陽然
分言之則爲二若火盛不已反消亡其藏之真
陽也肝乃魂之居藏之真陽虛則遊魂爲變變

則爲夢與邪客病者多夢亡人無異曰如子所
言夢遺則從肝腎得之乎曰不然病之初起亦
有不在肝腎而在心肺脾胃之不足者然必傳
於肝腎而後精乃走也蓋有自然相傳之理存
焉何則宗筋者上絡胸腹挾臍下合橫骨故內
經謂其總宗筋之會會於氣街主束骨而利機
關也大抵俱有火且相火之寄於肝者善則
發生惡則爲害獨甚於他火故乎人肝氣之剛
勇充於筋而爲罷極之本也其陰器既宗筋之

所聚乃强於作用皆相火充其力也若遇接内得陰氣與合則三焦上下内外之火翕然而下從百體玄府悉開其滋生之精盡趨會於陰器以躍出豈止腎之所藏者而已哉所謂厥氣客於陰器則夢接者其厥氣亦身中陰分所逆之氣與接内之氣同是陰類故夢猶接内之精脱也若思欲不已精氣已客於陰器至卧故成夢而泄矣但夢者因真陽虚而得之故精脱之後其氣未能卒復未免形體衰憊不比平人接内之

氣一二時便可復也曰治法當何如曰病從他藏而起則以初感病者為本腎肝聚病處為標若由腎肝二藏自得者獨治腎肝由陰陽離决水火不交通者則既濟之陰陽不相抱負者則因而和之陽虚者補其氣陰虚者補其血陽强者瀉其火火有正治反治從多從少隨其攸利然用心思想無窮所願不得意淫於外入房太甚宗筋弛縱發為白淫夢遺等證先賢治法有五一曰用辰砂磁石龍骨之類鎮墜神之浮

游河間秘真丸本事八仙丹之類是也　其二思想結成痰飲迷於心竅而遺者許學士用猪苓丸之類導利其痰是也　其三思想傷陰者潔古珍珠粉丸海藏大鳳髓丹本事清心丸丹溪用海蛤粉青黛合附黃蘗知母之類降火補陰是也　其四思想傷陽者謙甫鹿茸蓯蓉兔絲子等補陽是也　其五陰陽俱虛者丹溪治一形瘦人便濁遺精心虛治用珍珠粉丸定志丸服之是也　戴氏云遺精得之有四有用

心過度心不攝腎以致失精者有因思色欲不遂致精失位輸瀉而出者有色欲太過滑泄不禁者有年壯氣盛久無色欲精氣滿泄者然其狀不一或小便後出多不可禁者或不小便而自出或莖中出而痒痛常如欲小便者並宜先用四七湯吞下白丹佐以威喜丸或分清飲別以綿裹龍骨同煎或分清飲半貼加五倍子牡蠣粉白茯苓五味子各半錢　失精夢泄亦有經絡熱而得者若以虛冷用熱劑則精愈

失本事方清心丸用黃蘗腦子者最良（大智禪師云夢遺不可作虛冷亦有經絡熱而得之[illegible]）　若是用心過度而得之宜遠志丸[illegible]交感湯加蓮肉五味子吞下仍佐以靈砂丹　若審是思色欲不遂得之且以四七湯吞白丸子甚者耳聞目見其精即出名曰白淫妙香散吞玉華白丹（[illegible]）　若審是色欲過度下元虛憊泄滑無禁宜正元飲加牡蠣粉肉蓯蓉各半錢吞養氣丹或靈砂丹仍佐以鹿茸丸山藥丸大兔絲子丸固陽丸之類（按此[illegible]）　若審是壯盛滿溢者本事方清心丸　夢遺俗謂之夜夢鬼交宜溫膽湯去竹茹加人參遠志蓮肉酸棗仁炒茯苓各半錢吞玉華白丹固陽丸夢遺亦備前四證宜（[illegible]）　嬰全善云想壯年得夢遺（[illegible]）十日必一遺累用鳳髓丹河間秘真

丸雖少効終不除根後改用菖蒲遠志韭子桑螵蛸益智酸棗仁牡蠣龍骨鎖陽等劑爲丸服之良愈又一中年男子夢遺以珍珠粉丸等藥與服了無一効亦以遠志菖蒲等劑服之隨手而愈　又云王元珪虎而泄精脉弦大累與加減八物湯吞河間秘真丸及珍珠粉丸其泄不止後以五倍子一兩茯苓二兩爲丸服之良愈此則五倍子澀脫之功敏於龍骨牡蠣也　又云詳古治夢遺方屬鬱滯者居大半庸醫不知其鬱但用龍骨牡蠣等澀劑固脫殊不知愈澀愈鬱其病反甚嘗治一壯年男子夢遺白濁少腹有氣衝上每日腰熱卯作酉涼腰熱作則手足冷前陰無氣腰熱退則前陰氣耕手足溫又且多下氣暮多噫時振膈一旬二旬必遺脉旦弦滑而大午洪大予知其有鬱滯也先用沉香和中丸大下之次用加減八物湯吞滋腎丸百粒若稍與蛤粉等澀藥則遺與濁反甚或一夜二遺遂改用導赤散大劑煎湯服之遺濁皆止

淅安又一中年男子夢遺醫或與澀藥反甚連
遺數夜愚先與神芎丸大下之却製豬苓丸服
之皆得痊安又丹溪治鎮守萬戶常作蕃便濁
精滑不禁百藥不効與試倒倉法而安於此見
夢遺精滑屬鬱滯者多矣 葉氏云遺滑之證予累
見人多作腎虛而用補澀之藥無効殊不知此
因脾胃濕熱所乘飲酒厚味痰火之人多有此
疾腎藏精其精本於脾胃飲食生化而輸於
腎若脾胃受傷濕熱內鬱使中氣濁而不清則

所化皆濁氣邪火擾動水不得而安靜故遺滑
也治以蒼白二陳湯加黃蘗升麻柴胡俾清氣
升濁氣降而脾胃健運則遺滑自止矣其有欲
心太熾思想無窮而致者當從心治心清則神
寧而火不妄起宜遠志丸茯神湯房勞無度致
腎虛者必兼見怯弱等證方可用補腎藥故治
有多端須當審察不可偏作腎虛治也 趙以
德治鄭叔魯二十餘歲攻舉子業讀書夜至四
鼓猶未已遂發此病卧間陰莖但着被與腿便
夢交接脫精懸空則不夢飲食日減倦怠少氣
此用心太過二火俱起夜不得睡血不歸肝腎
水不足火乘陰虛入客下焦鼓其精房則精不
得聚藏而欲走因玉莖着物猶厥氣客之故作
接內之夢於是上補心安神中調脾胃升舉其
陽下用益精生陰固陽之劑不三月而病安矣
一老人年六十患瘧嗽自服四獸飲多積成
濕熱乘於下焦幾致危困診其脈尺部數而有
力與補中益氣加涼劑三日與黃蘗丸次早診

之尺脈頓減問之曰夜來夢交接否曰然幸不
泄曰年老精衰固無以泄其火熱結於精房者
得泄火益陰之藥其火散走於陰器之竅病可
減矣再服二日又夢其瘧嗽全愈 亦有鬼魅
相感者大全良方論婦人夢與鬼交者由藏府
虛神不守故鬼氣得爲病也其狀不欲見人如
有對晤時獨言笑或時悲泣是也脈息乍大乍
小乍有乍無皆鬼邪之脈又脈來綿綿不知度
數而顏色不變亦其候也夫鬼本無形感而遂

通蓋因心念不正感召其鬼附邪氣而入體與
相接所以時見於夢治之之法則朱砂雄黃麝
香鬼箭虎頭骨辟邪之屬是也　蔣右丞子每
夜有夢招以德治之連二日診脉觀其動止終
不舉頭但俯視不正當人知為陰邪相着叩之
不肯言其以父之鬼狀其父遂問隨出之童僕
乃言一日至廳所廟見侍女以手於其身摩久
之三五日遂聞若此即令法師入廟毀其像小
腹泥土皆濕其病即安　試觀張仲景治下焦

眞陽與精血兩虛病小腹弦急脉芤動微緊男
子失精女子夢交通則用桂枝龍骨之屬溫之
固之若陽浮上而不降作悸衄手足煩熱咽乾
口燥陰獨居於內而為裏急腹中痛夢失精者
下建中湯和之皆可取以為法也　醫家大法
曰常治脫[illegible]不止者以澀劑收止之則不能收
不能止[illegible]不若瀉心火若瀉心火不能止之不若
用[illegible]風[illegible]之類止之非此能止之也
[illegible]氣下陷不下也

赤白濁

溺與精所出之道不同淋病在溺道故綱目列
之肝膽部濁病在精道故綱目列之腎膀胱部
今患濁者雖便時莖中如刀割火灼而溺自清
惟竅端時有穢物如瘡膿目眵淋漓不斷初與
便溺不相混淆猶河中之濟焉至易辨也每見
時醫以淋法治之五苓八正雜投不已而增劇
者不可勝數予故正之而其餘尚難以戶說也
蓋由精敗而腐者什九由濕熱流注與虛者什

一　丹溪云屬濕熱有痰有虛赤屬血由小腸
屬火故也白屬氣由大腸屬金故也或因思慮
過度嗜欲無節俾心腎不交精元失守以為赤
白二濁之患赤濁者為心虛有熱由思慮而得
之白濁者為腎虛有寒因嗜欲而得之薛氏曰單病式
[illegible]虛熱
[illegible]白濁有濕痰流注宜燥中宮
之[illegible]有胃中濁氣下流滲入
膀胱[illegible]二陳湯加升提之劑　虛

勞者用補陰藥胃弱者參术加升麻柴胡　心
經伏暑赤濁者四苓散加香薷麥門冬人參石
蓮肉　戴氏云有白濁人服玄兔丹不愈服附
子八味丸即愈者不可不知　有小便如常停
久纔方澄濁有小便出節如米泔若小兒疳病
者宜分清飲加茯苓半錢下小兔絲子丸　如
服藥未効宜四七湯吞青州白丸子及辰砂妙
香散吞玄兔丹及小兔絲子丸山藥丸如白濁
甚下淀如泥或稠粘如膠頻逆而澀痛異常此

非是熱淋此是精濁窒塞竅道而結宜五苓妙
香散吞八味丸小兔絲子丸或萆薢分清飲
精者血之所化有濁去太多精化不及赤未變
白故成赤濁此虛之甚也何以知之有人天癸
未至強力好色所泄半精半血　若溺不赤無
他熱症縱雖赤濁不可以赤為熱只宜以治白
濁法治之　若溺赤下濁亦赤口渴時發熱者
辰砂妙香散吞靈砂丹或清心蓮子飲發熱不
退目爍舌乾之甚者此乃精衕內燥腎枯不潤

四物湯吞玄兔丹和加減八味丸久服乃効　按諸
症然如此而用藥無一涼劑恐若以生地麥門冬五味鹽炒黃栢竹葉地骨皮山藥之類治之
或問丹溪云白濁之病因何與
前人所論不同將古今異也子能與我折衷乎
曰辨古今之得失必以內經為之是病自巢氏
病源候論曰白濁者由勞傷腎腎氣虛冷故也
由是歷代方論宗其說無異詞不唯白濁之理
不明所治之法亦誤不思內經本無白濁之名
唯言少陰在泉客勝溲便變少陽在泉客勝則

溲白又言思想無窮入房太甚發為白淫與脾
移熱於腎出白二者皆隨溲而下夫如是非白
濁之源乎原病式因與內經謂諸病水液渾濁
皆屬於熱言天氣熱則水渾濁寒則清潔水體
清火體濁又如清水為湯則自然白濁也可謂
發前人之旨以正千載之誤矣然不讀其書者
豈能知斯道也丹溪朱先生論白濁多因
濕熱下流膀胱而成赤白濁即靈樞所謂中氣
不足溲便為之變是也必先補中氣使升舉之

而後分其臟腑氣血赤白虛實以治與夫其他
邪熱所傷者則在瀉熱補虛設腎氣虛甚或火
熱亢極者則不宜峻用寒涼之劑必以反佐治
之要在[illegible]而已　痿論曰思想無窮所
願不得[illegible]外入房太甚宗筋弛縱發爲筋
痿及爲白淫夫腎藏天一以慳爲事志意內治
則精全[illegible]若思想外淫房室太甚則固有淫
泆不守[illegible]漫溺而下也然本於筋痿者以宗
筋弛縱也宜內補鹿茸丸茯兔丸金箔丸珍珠
丸[illegible]　[illegible]準繩六　百乙
[illegible]
[脉] 脉洪大而濇按之無力或微細或沉緊而
濇爲元氣不足若尺脉虛或浮者急疾者皆難
治遲者易治

前陰諸疾 [illegible]
前陰所過之脉有二一曰肝脉二曰督脉經云
足厥陰之脉入毛中過陰器抵少腹是肝脉所
過也又云督脉者起於小腹以下骨中央女子
入[illegible]男子循莖下至篡與女子等
也[illegible]
[illegible] 陰縮謂前陰受寒入腹內也陰縱
謂前陰受熱挺長不收也經曰足厥陰之筋傷
於寒則陰縮入傷於熱則縱挺不收治在行水
[illegible]　[illegible]準繩六　百三
[illegible]是也　丹溪治鮑兄二十餘歲玉莖挺
[illegible]不能行兩胯氣上手
[illegible]以小柴胡加黃連大劑行其濕熱略
[illegible]之氣其挺腫漸收漸減及半
[illegible]消遂以青皮爲君佐以散風
[illegible]以絲瓜汁調五倍子末傅而愈
[illegible]陰挺長腫而痛脉數
[illegible]又用三一承氣湯大
下之愈　內經刺灸前陰挺長之法有一經云

足厥陰之別名曰蠡溝去內踝五寸別走少陽其病實則挺長取之所別是也　內經診陰縮而死者皆屬肝傷經云肝悲哀動中則傷魂魂傷則狂妄不精不精則不正當陰縮而攣筋兩脇骨不舉毛悴色夭死於秋又云厥陰終者善溺舌卷卵上縮是也

陰痿　[illegible]皆耗散過度傷於肝筋所致經云足厥陰之經其病傷於內則不起是也　腎脉大甚爲陰痿　運氣陰痿皆屬濕土制腎經云

太陰司天濕氣下臨腎氣上從陰痿氣衰而不舉是也　仲景八味丸治陽事多痿不振今依藥方服加桂附一半春秋三停減一疾去精足[illegible]六味地黃丸 此法可治傷於內者　陰痿[illegible]陰汗如水小便後有餘滴臊氣尻臀并[illegible]冷[illegible]膝亦冷此肝經濕熱宜[illegible]者　腎脉大右尺[illegible]反痿宜滋腎丸或鳳髓丹

陰汗濕痒川大蒜煨剝

[illegible]

去皮爛研同淡豆豉末搜和丸如梧子大朱砂爲衣每服三十丸棗二枚燈心數莖煎湯空心送下　陰汗不止內服青蛾丸外用爐甘石一分真蛤粉半分乾撲或蜜佗僧和蛇床子研末撲之　東垣治一富者前陰間常聞臊臭又因連日飲酒腹中不和夫前陰者足厥陰之脉絡陰器出其挺末臭者心之所走散入於五方爲臭入肝爲臊臭此其一也當於肝經中瀉行間是治其本後於心經中瀉少衝以治其標如惡針

當用藥除之治法當求其本連日飲酒夫酒者氣味俱能生濕熱是風濕熱合於下焦爲邪故經云下焦如瀆又云在下者引而竭之酒者是濕熱之水亦宜決前陰以去之是合下焦二法治之宜龍膽瀉肝湯柴胡入肝爲引用澤瀉車前子木通其淡滲之味利小便亦除臊臭是謂在下者引而竭之生地黃草龍膽之苦寒瀉酒濕熱[illegible]子之類以徹肝中邪氣肝主血用當歸以滋肝中血不足也　面色痿黃身黃

脚軟弱無力陰汗陰莖有天色宜溫腎湯　前陰如水冷并冷汗兩脚痿弱無力宜補肝湯　溺黃腰臭莖澀二丸如冰陰汗浸兩股陰頭亦冷正值十二月大寒凛冽霜雪交集寒之極矣宜清震湯　陰外腎冷兩髀樞陰汗前陰痿弱陰囊濕痒臊氣宜柴胡勝濕湯　千金方有人陰冷漸漸冷氣入陰囊腫滿恐死日夜痛悶不得眠取生椒擇之洗淨以布帛裹著丸囊令厚半寸須臾熱氣大通日再易之取出瘥　本事

方曾有人陰冷漸次冷氣入陰囊腫滿晝夜悶疼不得眠煮大薊汁服立瘥　前陰兩丸濕痒秋冬尤甚冬月減宜椒粉散　腎囊濕痒先以吳茱萸煎湯洗之後用吳茱萸半兩寒水石三錢黃檗二錢半樟腦蛇床子各半兩輕粉一錢白礬三錢硫黃二錢檳榔三錢白芷三錢爲末掺之

【腎臟風】　風熱客於腎經腎虛不能宣散而腫痒　[illegible]聖惠沉香散　沉香五錢檳榔一兩丹參赤芍藥白蒺藜去刺炒製枳殼赤茯苓各七錢半空心溫服　腫而有氣上下攻注脹悶聖惠木香散木香半兩赤茯苓一兩牡丹皮澤瀉各七錢半防風半兩檳榔一兩郁李仁一兩湯泡去皮微炒爲末食前溫酒服　小蟠葱散五苓散去桂枝加四兩導依方加檳榔半兩茴香炒入金鈴川楝肉半兩蘿蔔忽煎空心服　腫痛不可忍雄黃一兩研白礬二兩甘草一尺煮水三升稍熱浴之又雞翅燒灰爲末空心粥飲調下二

錢患左取左翅患右取右翅又取伏龍肝以雞子白和傅之又馬鞭草擣汁或桃仁去皮搗爛或蛇床子末雞子黃和三者各可傅之　痛用苦練樹向陽根木香吳茱萸檳榔爲末醋糊丸熱酒不拘時服　卒痛如刺大汗出小蒜一升韭根一斤楊柳根一斤剉酒三升煎沸乘熱熏之　陰莖痛是厥陰經氣滞兼熱用甘草稍蓋欲緩其氣耳若病淋而作痛似難一槩論之必須清濁而清濁自分矣氣虛六君血虛四物

等各用黃蘗知母滑石石葦琥珀之類　婦人陰腫腎痛枳實半斤切碎炒熱布裹包熨之冷即易

〔醫鑒〕胃氣下泄陰吹而正喧此穀氣之實也膏髮煎導之

疝

或問疝病古方有以為小腸氣者有以為膀胱氣者惟丹溪專主肝經而言其說不同何以辨之曰小腸氣小腸之病膀胱氣膀胱之病疝氣肝經之病三者自是不一昔人以小腸膀胱氣為疝者誤也殊不知足厥陰之經環陰器抵少腹人之病此者其發睪丸脹痛連及少腹則疝氣之係於肝經可知矣小腸氣俗謂之橫弦豎弦遶臍走注少腹攻刺而膀胱氣則在毛

際之上小腹之分作痛與疝氣之有形如瓜有聲如蛙或上於腹或下於囊者不同也但小腸膀胱因經絡並於厥陰之經所以受病連及於肝則亦下控引睪丸為痛然只是二經之病不可以為疝也　趙以德曰此條不為睪丸之症亦未審內經以疝名者有腹中臟府之痛一以疝名者次遍及於此其腹中五臟之疝得以疝而名者其有睪丸之痛內經謂任脉為病男子內結七疝女子帶下瘕聚衝脉為病逆氣

裹急然稱任脉有七疝名無疝之狀及按諸篇以雙字命其名者曰㿗疝者以三陽爲病發寒熱痿厥其傳爲㿗疝及陽明司天與之勝復是動病足陽明筋病皆爲㿗疝謂厥疝者面黃脉之至大而虛有積氣在腹中厥氣名曰厥疝謂疝瘕以脾傳邪之間病名疝瘕少腹冤熱而痛出白一名曰蠱謂衝疝者以衝任督生病上衝心痛不得前後謂卒疝者邪客厥陰之絡則卒疝暴痛厥陰別絡滿氣逆亦有先卒疝謂㿗

癃疝者厥陰之陰盛而脉脹不通謂狐疝者肝所生病也殆非及此雙字之名者由任脉行諸經之會而有七疝者徵此外獨稱一字疝者則有太陰在泉主勝寒氣厥陽甚則爲疝有太陽在泉小腹控睾上引心痛有小腹痛不得大小便名曰疝得之寒有足太陰爲病陰器紐痛上引臍有心疝脉急小腸爲使小腸當有形有腎脉大急沉皆爲疝心脉搏滑急爲心疝肺脉沉搏爲肺疝三陰急爲疝[illegible]

甚爲㿗疝脾脉微大爲疝氣腹中裹大膿血在腸胃之外滑甚爲㿗癃腎脉滑甚爲[illegible]脉之滑者爲陽氣甚盛微有熱矣如是者名爲七疝中分邪氣之寒熱者也內經又云少陽脉滑病腎風疝太陰脉滑病脾風疝陽明脉滑病心風疝太陽脉滑病腎風疝少陽脉滑病肝風疝所言六者非外入之風由肝木陽氣動之風也故經云脉滑曰風然連以疝稱者蓋腎肝同居下焦而足厥陰佐任脉之生化因肝腎之氣並

逆所以任之陰氣爲疝肝之陽氣爲風所以風疝連稱也李東垣謂脉滑者爲丙丁火熱併於下不勝壬癸從寒水之化故生㿗疝亦用熱治內經初不見於尺部而言也豈不爲外寒變內熱之故乃因熱火從寒化恐理未當而經更有督脉者身中之機陰陽之樞津液之道也或飲食不節喜怒不時津液內溢下流於睾血道不通日久人体俛仰不便趨翔不能此病榮然有水人上不下若此者亦㿗疝之一也張仲景言

疝皆由寒邪得之亦同內經之云脉急者當濡散之或曰內經言疝似若各從諸經脉所生今予何獨歸於任脉乎曰任脉是疝病之本源各經是疝病之支流何以言之蓋腎藏以四方分部以五行言則屬五行之寒水以方位言之則屬北方之陰陰形偶故腎有兩兩其形則地道之陰也蓋爲包居兩形之間出納腎藏之精血以行坤土之化生成百骸者及夫生長壯者已之天癸與作強伎巧之用悉在於斯然而坤

土居尊不自司其職司其職者乃衝任二脉起於包中者行其化也是故五藏六府之經皆受氣於六脉因以海名之所以一脉貫乎流通而無間寒流通則天之陽氣下降與之從事故施化之道行閉寒則天之陽絕故地之陰亦結而自成作癸疝者是其一也所致任脉之病者若則內有相勝負與內外邪之感傷皆得使其陰陽不和陰偏勝則寒氣衝擊陽偏勝則熱氣內入於六經之合然後任脉爲疝雖其邪不自任脉

而起初由各經所受而得者亦必與任脉相犯故也所犯者何或所勝之經脉相傳或受不以次所乘或任脉過處與受邪之經相會或六經受氣之際挾邪犯其海則皆足以感動任脉內舍結聚不化之陰上擊藏府則爲腹中之疝下入厥陰會於陰器則爲睪丸之疝蓋疝自立名備矣任脉所職在地之陰特然起擊者而命之也若諸經受邪不與任脉相干則不名爲疝矣不然何內經舉痛篇纏綿百病始生篇專爲發

明經脉腹中諸痛者乃無一字名其疝也始可見任脉者是疝病之本源諸經所云疝者是其支流餘裔耳若大巢氏所敘七疝者曰厥疝癥疝寒疝氣疝盤疝胕疝狼疝也其厥逆心痛諸飲食吐不下名曰厥疝腹中氣乍滿心下盡痛氣積如臂名曰癥疝寒飲食即脇下腹中盡痛名曰寒疝腹中乍滿乍減而痛名曰氣疝腹中痛在臍旁名曰盤疝腹中臍下有積聚名曰胕疝小腹與陰相引而痛大便難名曰狼疝及言

諸疝之候止以陰氣積於內為寒氣所加使榮衛不調血氣虛弱故風冷入於腹內而成疝也小兒㿗者陰核腫大由啼哭躽氣不止動於陰氣結聚不散所致者也觀於五疝皆是痛在心腹之疝也爾後㿗疝爲小兒病者耳後人述其說更舉內経謂脾風傳之於腎名曰蠱疝瘕少腹冤而痛一名曰蠱者謂之蠱病又立陰疝條即㿗疝也前以足七疝之數此言五條為心腹痛者之治也則曰若因七情所傷者當調氣安

其五藏外邪以下者當溫散之治之不當內外之氣交入於目者為腎氣入於膀胱者為膀胱氣入於小腸者為小腸氣腎與膀胱一藏一府其氣通於外故小腸系於睪丸系會故也又謂陰疝一名㿉疝其種有四狐腸㿗氣㿗卵脹水㿗是也[illegible]濕之氣自迸於小腸者即小腹控睪丸而痛陰丸上下謂之腸㿗寒氣客於經筋是[illegible]飲[illegible]受邪脈[illegible]不通邪結於睪卵謂之卵脹[illegible]之人因飲食不節喜怒不時津液內結

謂之水㿗至張戴人非之曰此俗工所立謬名也蓋環陰器上抵少腹乃屬足厥陰肝經之部分是受疝之處也或在泉寒勝水氣[illegible]縮鬱於此經或司天燥勝木氣抑鬱於此經或忿怒悲哀憂抑頓挫結於此經或藥淋外固閉尾縮精壅於此[illegible]不相干膀胱腎小腸之事乃厥陰肝經之職也凡疝者非肝木受邪則肝木自甚也由是於陰疝中亦立七疝之名曰寒疝水疝筋疝血疝氣疝狐疝㿗疝也寒疝其狀囊冷結

硬如石陰莖不舉或連控睪丸而痛得於坐臥濕地及[illegible]或冬月涉水或值雨雪或風冷處使內過勞宜以溫劑下之久而無子水疝其狀腎囊腫痛陰汗時出或囊腫狀如水晶或囊癢搔出黃水或小腹按之作水聲得之飲水醉酒使內過勞汗出而遇風寒濕之氣聚於囊中故水多令人為卒疝宜以逐水之劑下之筋疝其狀陰莖腫脹或潰或膿或痛而裏急筋縮或莖中痛痛極則癢或挺縱不收或白物如精隨溲

而下得於房室勞傷及邪術所使宜以降心火之藥下之血疝其狀如黃瓜在小腹兩傍橫骨兩端約中俗云便癰得於春夏重感大燠勞於使內氣血流溢滲入脬囊留而不去結成癰膿膿少血多宜以和血之劑下之氣疝其狀上連腎區下及陰囊或因號哭忿怒則氣鬱之而脹怒哭號罷則氣散者是也宜以散氣之劑下之或小兒亦有此疾俗曰偏氣得於父已年老或年少多病陰痿精怯強力入房因而有子胎中

病也此病不治狐疝其狀如瓦臥則入小腹行立則出小腹入囊中狐則晝出穴而溺夜入穴而不溺此疝出入上下往來正與狐相類亦與氣疝大同小異令人帶鉤鈴是也宜以逐氣流經之藥下之㿗疝其狀陰囊腫縋如升如斗不癢不痛是也得之地氣卑濕所生故江淮之間湫塘之處多感此疾宜以去濕之藥下之諸疝下去之後可調則調可補則補各量病勢勿拘俗法經所謂陰盛而腹脹不通者㿗癃疝也不

可不下其論如此戴人既曰用內經靈樞明堂之論要皆疝病之源而不及於任脉生病之源何也蓋因力辨陰器與小腸膀胱了不相干是屬足厥陰部分受病之源立說所以不及於任脉然已三見於論中矣其間引治疝之穴多與任脉相會一也又稱衝任督與厥陰會於曲骨據陰器二也復言凡精滑白淫皆男子之疝也血涸不月罷腰膝上熱嗌乾少腹有塊女子之疝也但女子不謂之疝而謂之瘕即任脉內

結之病凡明者三也凡戴人辨論之詞深直專主其[illegible]則不復顧其[illegible]在㿗疝中有無六經外證之可辨若果有膀胱小腸之證者又安得不從之如[illegible]小腸病者小腹痛腰脊控睪丸[illegible]之類[illegible]治法亦當因病在下必先下之更不可[illegible]之人於[illegible]凡不可下者下之有不旋踵[illegible]後[illegible]而可[illegible]其生乎然而戴人[illegible]則[illegible]之使人豁然以去胸膺[illegible]及[illegible]

溫潤反覆之意且夫陰陽變化生病於無窮治
法亦無窮非一人所能究學者當因其已明益
其未至然後得爲善用其書者丹溪先生嘗論
睪丸連小腹急痛者或有形或無形或有聲或
無聲人皆以爲經絡得寒收引不行而作痛不
知此病始於濕熱鬱遏至久又感外寒濕熱被
鬱而作痛也其初致濕熱之故蓋大勞則火起
於筋醉飽則火起於胃房勞則火起於腎大怒
則火起於肝火鬱之久濕氣便盛濁液凝聚并

入血隧流於厥陰肝屬木性急速火性又暴烈
爲寒所束宜其痛甚而暴也此論亦就厥陰受
病者發明藏人之未至者也誠有功於後學蓋
厥疝不離此三者之邪熱則縱寒則痛濕則腫
須分三者多少而治之兩丸俱病固然也設有
偏於一者予又不能無其說焉腎有兩分左右
其左腎屬水水生肝木木生心火三部皆司血
統納左之血者肝木之職也其右屬火火生脾
土土生肺金三部皆司氣統納右之氣者肺金

之職也是故諸寒收引則血泣所以寒血從歸
歸肝下注於左丸諸氣憤鬱則濕聚所以氣濕
從而歸肺下注於右丸且夫睪丸所絡之筋非
盡由厥陰而太陰陽明之筋亦入絡也往往見
人偏患於左丸者則痛多腫少偏於右丸者則
痛少腫多此偏患之說也姑書治效者一二症以
明之予壯年時以攻讀過多積成飲癖在右脇下
隱隱然不敢復飲數年已一日山行大勞饑渴
甚遇村中食之稿飲荷積并復滯氣即時右丸

腫大寒熱交作因而思之脾肺皆主右故積飲
滯氣下陷入太陰陽明之經筋俱傷其邪從而入
於囊中著在睪丸筋膜而爲腫脹戴人有言
病分上下治然是木鬱爲疝在下則不可吐亦
當從下引而竭之竊念病有不同治可同乎今
和饑飽傷脾脾氣下陷必升擧之則胃氣不復
下陷若以同行若用藥下之恐重陷胃氣也先
服消胃之劑一二貼次早注神使氣至下焦嘔逆
而上學動下積動引中焦則吐而出之吐後瘡

腫減半次早復吐吐後和胃氣疎通經絡二三
日愈凡用此法治酒傷與飲水注右丸腫者皆
効又治一人病後飲水患左丸痛甚灸大敦用
摩腰膏內用烏附丁香者以摩其囊上抵横骨
端灸温帛覆之痛即止一宿腫亦全消矣
歷代獨治外束之寒　發明云男子七疝痛不
可忍者婦人瘕聚帶下皆任脉所主陰經也乃
肝腎受病治法同歸於一宜丁香楝實丸凡疝
氣帶下皆屬於風全蝎治風之聖藥也川楝茴

香皆入小腸經當歸玄胡索活血止痛疝氣帶
下皆積寒邪入於小腸之間故用附子佐之丁
香木香爲引導藥也　羅謙甫治火兒赤紐隣
久病疝氣復因七月間饑飽勞役過飲湩乳所
發甚如初面色青黃不澤臍腹陣痛搐撮不可
忍腰曲不能伸熱物熨之稍緩脉得細小而急
內經云厥陰之爲病男子內結七疝皆積寒於小
腸之間所致也非大熱之劑即不能愈遂製一
方名之曰沉香桂附丸治臍下撮急疼痛并臍

下周身一遭皆急痛小便頻數清其五脉急洪
緩滑沉按之皆虛獨腎脉按之不急皆虛無力
名曰腎疝宜丁香疝氣丸　男子婦女疝氣臍
下冷痛相引腰胯而痛宜當歸四逆湯　發明
天台烏藥散川苦楝散簡易木香楝子散皆用
巴豆炒祭許學士云大抵此疾因虛而得之不
可以虛驟補邪之所湊其氣必虛留而不去其
病則實故必先滌去所蓄之邪熱然後補之是
以諸藥多借巴豆氣者蓋爲此也　金匱方寒

疝腹中痛逆冷手足不仁若身疼痛灸刺諸藥
不能治抵當烏頭桂枝湯主之用烏頭一味以
蜜二斤煎減半去查以桂枝湯五合和之令得
一升後初服二合不知再服三合又不知復加
至五合其知者如醉狀得吐者爲中病海藏以
附子建中湯加蜜煎治疝即此法也　腹痛脉
弦而緊弦則衛氣不行即惡寒緊則不欲食弦
緊相搏即爲寒疝寒疝繞臍痛若發則白汗出
手足厥冷其脉沉弦者大烏頭煎主之　衍義

云葫蘆巴本經云得茴香桃仁治膀胱氣甚効背合用桃仁麩炒各等分半酒糊丸半為散每服五七十丸空心食前鹽酒下散以熱米飲調下與丸子相間空心各一二服効　寶鑑葫蘆巴丸

丹溪治內鬱之濕熱　煎方枳實炒九粒　桃仁十四個炒　山梔仁炒九個　吳茱萸炒七粒　山查四兩　生薑如指大　右六味同入擂盆擂細取順流水一鍾入瓶內煎至微沸帶查服如濕勝癩疝者加荔枝核

如痛甚者加鹽炒大茴香二錢如痛處可按者加薄桂少許　丸方山梔炒二兩　山查四兩　枳實炒　茴香炒各二兩　柴胡　牡丹皮　八角茴香炒各一兩　桃仁炒　茱萸炒各半兩　末之酒糊丸空心鹽湯下五六十丸

陽明受濕熱傳入大腸發熱惡寒小腹連毛際悶痛不可忍用梔子仁炒　桃仁炒　枳實炒　山查等分　同研細入生薑汁半合用水一小鍾盪起煎令沸熱服之一方加茱萸

寒熱兼施　靈樞云胃中熱腸中寒則疾饑小腹痛脹　丹溪云愚見有用川烏頭梔子等分作湯用之其効亦敏後因此方隨症與形加減用之無有不効蓋川烏頭治外束之寒梔子仁治內鬱之熱也　又云諸疝痛處用手按之不痛者屬虛必用桂枝炒山梔細切川烏頭等分為細末生薑自然汁打糊為丸如桐子大每服三四十丸空腹白湯下　羅謙甫云陰疝足厥陰之脈環陰器抵少腹或痛因腎虛寒水涸竭瀉邪補肝蒺藜湯主之

補例　丹溪云疝有挾虛而發者其脉不甚沉緊而大豁無力者是也然其痛亦輕唯覺重墜牽引耳當以參朮為君疏導藥佐之蓋疏導藥即桃仁山查枳實梔仁茱萸川練玄胡索丁香木香之類是也　海藏云姬提領因疾服涼劑數日遂病臍腹下大痛幾至於死與薑附等劑稍稍蘇痛不已隨本方內倍芍藥服之愈　金匱方寒疝腹中痛及脇痛裏急者當歸生薑羊肉湯主之衍義云張仲景治寒疝用生薑羊肉

湯服之無不應驗有一婦人產當寒月寒氣入
產門腹臍以下脹滿手不欲犯此寒疝也師將
治之以抵當湯謂有瘀血非其治也可服仲景
羊肉湯二服遂愈

肝氣　肝足厥陰經之病必小腹引脇而痛經
云厥陰之復小腹堅滿裏急暴痛是風氣助肝
盛而然治法當瀉肝也又云歲金太過民病兩
脇下痛小腹痛又云歲木不及燥乃大行民病
中清胠脇痛少腹痛又云歲土不及風乃大行

民病腹痛復則胸脇暴痛下引小腹者是燥邪
攻肝虛而然治法當補肝瀉金也又云寒氣客
於厥陰之脉則血泣脉急故脇肋與小腹相引
痛又云肝病者兩脇下痛引小腹取其經厥陰
小腸又云邪客厥陰之絡令人卒疝暴痛刺足
大指爪甲上與肉交者各一痏男子立已女子
有頃已左取右右取左　瀉肝山梔川芎桂芍
之劑　補用當歸生薑羊肉之屬

小腸氣　小腸之病小腹引睪丸必連腰脊而
痛經云少陰之脉心下熱善饑臍下痛又云少
陰之復煩熱內作小腹絞痛者是熱助小腸盛
而然治法當瀉小腸也又太陽在泉寒淫所勝
與太陽之復皆病小腹控睪引腰脊上衝心痛
及太陰司天大寒且至病小腹痛者是寒邪攻
小腸虛而然治法當補小腸瀉寒邪也　寶鑑
引至真要論云小腹控睪引腰脊上衝心唾
出清水及爲噦噫甚則入心善悲善忘甲乙經
曰邪在小腸也小腸病者小腹痛引腰脊貫肝

肺其經虛不足則風冷乘間而入邪氣旣入則
厥之發上衝肝肺客冷散於胸結於臍控引睪
丸上而不下痛而入腹甚則衝心胸盖其經絡
所屬所係也治之之方茴香炒練實炒食茱萸陳
皮馬蘭花醋炒各　芫花醋炒右爲末醋糊丸如
梧桐子大每服十丸至二十丸溫酒送下　又方
益智仁蓬术各半兩茴香山茱萸肉牛膝續斷
川芎葫蘆巴防風牽牛炒甘草各二錢半爲細
末每服二錢水一盞二分煎兩三沸空心連滓

服白湯調下二錢匕亦得
膀胱氣　膀胱之病小腹痛腫不得小便是也
經云太陰在泉病小腹痛腫不得小便是濕邪
攻膀胱虛而然治法當補膀胱瀉濕土邪也又
云膀胱病者小腹偏腫而痛以手按之即欲小
便而不得取委中央又云小腹痛腫不得小便
邪在三陽取之足太陽大絡委陽穴　許學士云
頂在岳歲日欲尉宋荀甫膀胱氣作疼不可忍
醫者以瞓劑與之痛愈甚小便不通三日矣膀

下虛脹心悶予因候之見其面赤黑脉洪大予
曰投熱藥太過陰陽痞塞氣不得通爲之柰何
宋尚手持四神丹數粒云醫謂不止更服此予
曰若服此定斃後無悔渠求治予適有五苓散
一兩許分三服用連鬚葱一莖茴香一撮鹽一
錢水一盞半煎至七分令接續三服中夜下小
便如墨汁者一二升臍下寬得睡翌日診之脉
已平安矣續用硇砂丸與之數日瘥　與全善
治湖人妻小腹疼痛小便不通先艾灸三陰交

以茴香丁香青皮檳榔桂茱萸玄胡索山查枳
實又倍用黃蘗煎服愈
心疝　心脉微滑爲心疝　心脉搏滑急爲心
疝　帝曰診得心脉而急此爲何病岐伯曰病
名心疝小腹當有形也心爲牡藏小腸爲之使
故曰少腹當有形也　木香散　廣藏煮散
癩疝　睾囊腫大如升如斗是也　丹溪云下
部癩氣不痛之方細思非痛斷房事與厚味不
可用藥唯促其壽若蒼术神麯白芷山查川芎

枳實半夏皆要藥人視其藥皆鄙賤之物已啓
慢心又不能斷欲以愛護其根本非惟無益而
反被其害者多矣且其藥宜隨時月寒熱更按
君臣佐使加減大抵癩疝屬濕多　蒼术神麯
白芷散　山查川芎枳實半夏南星有熱加山梔
一兩堅硬加朴硝半兩秋冬加吳茱萸二錢半
神麯糊丸　又方南星山查蒼术各二兩白芷
半夏枳實神麯各一兩海藻昆布各半兩玄明
粉吳茱萸各二錢爲末酒糊丸　又方治木腎

不痛南星半夏黃藥(酒洗)蒼朮(鹽炒)枳實山查白芷
神麯(炒)滑石(炒)茱萸昆布酒糊丸空心鹽湯下
治癩脹用香附子不拘多少爲末每用酒一
盞海藻一錢煎至半盞先撈海藻細嚼用所煎
酒調末二錢服　楮葉雄者曬乾爲末酒糊丸
空心鹽酒下(三十丸)　潔古海蛤丸　癩氣痛
者易治荔核散三層茴香丸宣胞丸地黃膏子
丸安息香丸念珠丸隨宜選用　陰囊腫脹大
小便不通宜三白散　偏墜初生用穿山甲茴

香二味爲末酒調下乾物壓之外用牡蠣(煅)良
薑各等分爲細末津唾調敷大者一遍須臾如
火熱痛即安　丹溪治一人因飲酒後飲水與
水果偏腎大時作蛙聲或作痛炒枳實一兩茴
香鹽炒梔子炒各三錢研煎下保和丸　一人
膀胱氣下墜如蛙聲臭橘子核炒十枚桃仁二
十枚蘿蔔自然汁研下保和丸　一人左腎核
腫痛此飲食中濕墜下成熱以橘核五枚桃仁
七枚細研順流水一盞煎沸熱下保和丸　木

腎以枇杷葉野紫蘇葉蒼耳葉水昌蒲[illegible]
煎湯熏洗　雄黃一兩研礬二兩生甘草半兩
水五升煎洗　川楝一兩朴硝二兩[illegible]
蘿蔔葱白煎湯熏洗　大黃末醋和塗之乾即
易　[illegible]　經云陽明
司天燥淫所勝丈夫㿗疝婦人少腹痛　又云陽
明之勝外發㿗疝[illegible]攻肝氣[illegible]然治法
當補肝爲燥金也　又云厥陰所謂㿗疝婦人
少腹腫者厥陰者辰也三月陽中之陰邪在中

故曰㿗疝少腹腫也所謂㿗癃疝膚脹者曰陰亦
盛而脈脹不通故曰㿗癃疝也　三陽爲病發
寒熱下爲癰腫及爲痿厥腨痛其傳爲㿗疝
[illegible]陰陽別論云三陽爲病發寒熱下爲癰
[illegible]腨痛其傳爲[illegible]又傳爲㿗疝夫
[illegible]也凡寒之氣也寒在外
[illegible]之氣也足太陽膀胱之
[illegible]太陽小腸之脈下行至足厥陰肝
[illegible]之脈道[illegible]

之水致陽氣下墜是風寒濕熱下出囊中致兩睪腫大謂之曰疝太甚則為㿉足厥陰之脉與大腸膀胱寒水之脉同至前陰之末傷寒家說足厥陰肝經為病煩滿囊縮急下之宜大承氣湯以瀉大熱靈樞經云足厥陰肝經筋中為寒則筋攣卵縮為大寒前說囊縮為大熱此說為大寒此說囊縮垂睪下引㿗疝脚氣為大寒風濕盛下垂為寒與上二說不同何也曰以平康不病人論之夏暑大熱囊卵累垂冬天大寒急

縮收上與前三說又不同何也是相乖耶不相乖耶答曰傷寒家囊卵縮大熱在內宜承氣湯急下之與經筋說囊卵縮大寒在外亦是熱在內與傷寒家同故再引平康人以證之冬天陽氣在內陰氣在外人亦應之故寒在外則皮急皮急則囊縮夏月陰氣在內陽氣在外人亦應之故熱在外則皮緩皮緩則囊垂此㿗疝之象也三說雖殊其理一也用藥者宜詳審之已上三論各有所主推此致討則脉證陰陽寒熱虛

實之辨判然矣　內經刺灸㿗疝有四法　其一從不取於囊中水液經云腰脊者身之大關節也股脛者人之管以趨翔也莖垂者身中之機陰精之候津液之道也故飲食不節喜怒不時津液內溢乃下流於睪血道不通日久不休俛仰不便趨翔不能此病滎然有水不上不下鈹石所取形不可匿常不得蔽命曰去爪其法今世人亦多能之睪丸囊大如斗者中藏穢液必有數升信知此出古法也　其二取肝經云

足厥陰之脉是動則病丈夫㿗疝婦人小腹腫是也足厥陰肝經視盛虛熱寒陷下而施補寫留疾灸也　其三取肝之絡經云足厥陰之別名曰蠡溝去內踝五寸別走少陽其別者循脛上睪結於莖其病氣逆則睪腫卒疝取之所別是也足於內踝上五寸貼脛骨後近肉處寫取之也　其四取足陽明筋經云足陽明之筋聚於陰器上腹其病轉筋髀前腫㿗疝腹筋急治在燔針劫刺以知為數以痛為輸是

也是於轉筋痛處用火針刺之也

狐疝　臥則入腹立則出腹偏入囊中者是也

仲景方陰狐疝氣有大小時時上下者蜘蛛散主之　內經刺灸狐疝但取足厥陰一經經云肝足厥陰之脉所生病者狐疝是也隨其經盛虛寒熱陷下取之也　耳後陷者腎下腎下則腰尻痛不可俛仰爲狐疝

通治　不問何證皆可用生料五積散每服一兩入鹽炒吳茱萸茴香各一錢生薑三片葱白

五寸煎空心熱服　服藥未效大痛攻刺不已陰縮手足厥冷宜香附子仍炒鹽乘熱用絹裹熨臍下若入小腸不甚通者五苓散加桂下青木香丸　初發或頭疼身熱或憎寒壯熱並宜參蘇飲加木香有逆上攻心下不覺痛而見心疼者宜以生韭搗取自然汁和五苓散爲丸茴香湯下有腎氣衝動心氣亦發上下俱疼者宜與攻散不能逆內消丸或且專治下下痛定則上痛定矣　此方治疝氣上衝如有物築心

胸欲死手足冷者二三服除根硫黄火中鎔化即投水中去毒研細荔核切片炒黄陳皮等分右爲末飯丸桐子大每服十四五丸溫酒下其疼立止患人自覺疼甚不能支持止與六丸不可多也　食積與瘀血作痛者導積行血則愈（於傷食蓄血二門求之）

脉　寸口弦緊爲寒疝弦則衛氣不行氣不行則惡寒緊則不欲食　寸口遲緩遲爲寒緩爲氣氣寒相搏轉絞而痛　沉緊豁大爲虛　弦

急搏皆疝視在何部而知其臟心脉微滑爲心疝肝脉滑爲㿉疝腎脉滑爲癃㿉大急沉爲腎疝肝脉大急沉爲肝疝心脉搏急爲心疝肺脉沉搏爲肺疝脾脉緊爲脾疝　寸弦而緊弦緊相搏爲寒疝　趺陽虛遲爲寒疝　肝脉滑甚爲㿉疝腎肝滑甚爲癃㿉[illegible]

[illegible]

交腸

交腸之病大小便易位而出或因醉飽或因大怒遂致臟氣乖亂不循常道法當宜吐以開提其氣使闌門淸利得司泌別之職則愈矣宜五苓散調氣散各一錢加阿膠末一錢湯調服或研黃連阿膠丸爲末加木香少許再以煎藥送下　丹溪治馬希聖年五十餘性嗜酒常痛飲不醉糟粕出前竅便溺出後竅六脉皆沉濇與四物湯加海金沙木香檳榔木通桃仁服而愈

此人酒多氣肆酒升而不降陽極虛酒濕積久生熱煎熬血乾陰亦大虛陰陽偏虛皆可補接此人中年後陰陽俱虛邪暫可活者以其形質酒中穀氣尚在三月後其人必死後果然

腸鳴

內經腸鳴有五　一曰脾虛經云脾虛則腹滿腸鳴飱泄食不化取其經太陰陽明少陰血者是也　二曰中氣不足經云中氣不足腸爲之苦鳴補足外踝下留之五分中脉穴也　三曰邪在大腸經云腸中雷鳴氣上衝胸邪在大腸刺肓之原巨虛上廉三里是也　四曰土鬱經云土鬱之發腸鳴而爲數後是也　五曰熱勝經云少陰在泉熱淫所勝病腹中腸鳴氣上衝

胸治以鹹寒是也　東垣云如胃寒泄瀉腸鳴於升陽除濕湯加益智仁五分半夏五分生薑棗子和煎　丹溪云腹中水鳴乃火擊動其水也二陳湯加芩連梔子　腹中鳴者病本於胃也　戴人云腸鳴多屬脾胃虛　一男子腸鳴食少臍下有塊耕動若得下氣多乃已已則復鳴屢用疏氣藥與服半年不效予用參朮爲君甘草連芩枳乾薑爲臣一貼腸鳴止食進又每服吞厚朴紅豆丸其氣耕亦平經云脾胃虛則

腸鳴腹滿又云中氣不足腸為之苦鳴此之謂也　脈移寒於肝為涌水涌水者按之腹不堅水氣客於大腸疾行則鳴濯濯如囊裹水漿之聲　河間葶藶丸主之

脫肛

難經云虛實出焉出者為虛入者為實肛門之脫非虛而何哉蓋實則溫溫則內氣充而有所蓄虛則寒寒則內氣餒而不能收況大腸有厚薄與肺為表裏肺藏蘊熱則閉虛則脫本草有云補可以去弱澀可以去脫若脫甚者既補之必兼澀之故不澀於內亦須澀於外古方用五倍子末托而上之一次未收至五七次必收而不復脫矣久利婦人小兒老人有此疾者産育

及欲痢用力過多小兒氣血未壯老人氣血已衰故肛易於出不得約束禁固也肛門為大腸之候大腸受熱受寒皆能脫出當審其因證寒者以香附子荊芥等分煎湯洗之熱者以五倍子朴硝煎湯洗之亦用木賊燒灰不令煙盡入麝香少許大便了貼少許或以五倍子末攤紙上貼肛緩緩揉入有腸頭作痒即腹中有蟲丈夫因酒色過度大腸者傳導之官腎者作強之官蓋腎虛而泄母氣肺因以虛大腸氣無所主

故自脫肛治法實元氣去濕熱之劑外用煎藥洗之斯治無不愈矣　大腸熱甚與腸風者涼血清腸散　瀉痢後大腸氣虛肛門脫出不腫不痛屬氣血虛宜補氣血為主赤腫有痛宜涼血祛風為主補氣血八珍湯十全散涼血生苄赤芍槐花皂角黃栝蔞雞冠花踈風防風羌活荊芥　久瀉痢者補養脾胃宜參朮實脾湯用力過多者十全大補湯參朮芎歸湯訶子人參湯內加升提藥　大腸虛而挾熱脫肛紅腫

宜縮砂湯槐花散薄荷散　大腸虛而挾寒脫肛不紅腫宜蝟皮散香荊散　日久不愈常宜服收腸養血和氣湯　澀脫龍骨散澀腸散外治陽證蟠龍散　陰證伏龍肝散　五倍子朴消湯加白礬洗　五倍荊芥小便炭煎洗荊芥龍腦薄荷朴硝煎湯洗　皂角搥碎煎湯浸　生栝蔞搗汁浸　熱湯洗軟芭蕉葉托上　生鐵三斤水一斗煮取五升出鐵以汁洗內服磁石散　鼈頭燒灰塗

穀道痒痛

穀道痒多因濕熱生蟲蝕成痔瘻宜雄黃入艾綿燒煙熏之　痒納蟯蟲丸　蟯蟲丸治肛門痒或出膿血有蟲傍生孔竅內用蟯蟲七枚五月五日收陰乾為末新牛糞半兩肥羊肉一兩炒令香共如膏丸如棗子大炙令熱以新綿薄裹納下部中半日少喫飯即大便中蟲出三五度永瘥　治穀道蠶蝕痒或痛用杏仁搗作膏傅之或炒令黃以綿蘸塗穀道中

外臺治下部蟲齧杵桃葉一斛蒸之令極熱內小口器中以下部搨上坐蟲當死　治肛門腫痛用木鼈子去殼取肉四五枚研如泥安新瓦器或木盆以沸湯衝動洗　另用少許塗患處

〔診〕腎絕陰脫其脈虛小者生緊急者死

痔

巢氏病源有五痔之論云肛邊生鼠乳出在外時時出膿血者牡痔也肛邊腫生瘡而出血者牝痔也肛邊生瘡痒而復痛出血者脉痔也肛邊腫核痛發寒熱而血出者腸痔也因便而清血隨出者血痔也又有酒痔肛邊生瘡亦有血出又有氣痔大便難而血出肛亦出外良久不肯入諸痔皆由傷風房室不慎醉飽合陰陽致勞損血氣而經脉流溢滲漏腸間衝發下部久不瘥變爲瘻也聖濟總錄敘痔之形狀謂由五痔[illegible]大腸之所受可謂得其始末矣若內經曰因而飽食筋脉橫解腸澼爲痔又謂少陰之復爲痔註又以小腸有熱則外爲痔又謂督脉生病癃痔蓋督脉[illegible]間繞纂後別[illegible]臀是督脉[illegible]與衝任本一脉[illegible]與陽明合筋會於陰器故屬於腎而爲作强者也由是或因醉飽入房精氣脫泄其脉空虛酒毒之熱乘之流着[illegible]脉或因[illegible]而强忍精不[illegible]或以藥固其精停積於脉流注於其間從其所過大腸肛門之分以作痔也與靈樞所謂膀胱足太陽之脉及筋[illegible]入絡腎其支者貫臀故主筋生痔者[illegible]與督脉病痔之理同也自此推之足[illegible]筋脉環前後二陰寧不爲痔乎每見患痔[illegible]其發則色青痛甚豈非肝苦急甚[illegible]色見耶方論有謂五痔潰皆血膿者[illegible]血腐者言也至若潰出黃水者則爲濕熱矣更宜於東垣方論求之　東垣治濕熱風燥四氣　內經曰因而飽食筋脉橫解腸澼爲痔夫大腸庚也主津本性燥清肅殺之氣本位主收其所司行津液以從足陽明中州戊土之化若旺則能生化萬物而衰亦能殞殺萬物[illegible]萬物生於土而歸於土也然手足之[illegible]其化[illegible]西方[illegible]之害蜚司[illegible]而陰[illegible]之氣歸於大腸以[illegible]以火就燥則大便閉而[illegible]當以苦寒瀉火以辛溫

三百四十

和血潤燥疎風止痛是其治也以秦艽當歸梢和血潤燥以桃仁潤血以皂角仁除風燥以地榆破血止血以枳實之苦寒補腎以下泄胃實以澤瀉之淡滲使氣歸於前陰以補清燥受胃之濕邪也白朮之苦甘以苦補燥氣之不足其甘味以瀉火而益元氣也故曰甘寒瀉火乃假枳實之寒也古人用藥為下焦如瀆又曰在下者引而竭之多為大便秘澀以大黃推去之其津血益不足以當歸和血及油潤之劑大便自

然與利矣宜作剉湯以與之是下焦有熱以急治之之法也以地榆惡人而壞胃故宿食消盡空心作丸服之曰秦艽白朮丸　又云痔漏若破潰之痔漏大便秘澀必作大痛此由風熱乘食飽不通氣逼大腸而作也受病者燥氣也爲病者胃熱也胃刑大腸則化燥火以乘燥熱之實勝風附熱而來是濕熱風燥四氣相合故大腸頭成塊者濕也作大痛者風也大便燥結者主病兼受火邪熱也當去此四者其西方肺主

諸氣其體收下亦助病為邪須當以破氣藥兼之治法全矣不可作丸以剉湯與之效如神速秦艽蒼朮湯主之　痔漏經年因而飽食筋脈橫解腸澼為痔治法當補北方瀉中央宜紅花桃仁湯　痔漏大便結燥疼痛秦艽當歸湯痔漏大便硬努出大腸頭下血苦痛不能忍當歸郁李仁湯　痔漏成塊下垂不任其痒秦艽羌活湯　痔漏積氣生於脾藏傍大腸疼痛陣難當消交補瀉三焦火莫漫多方立紀綱七

聖丸主之　痔漏每日大便時發疼痛如無疼痛者非痔漏也秦艽防風湯主之　丹溪專以涼血爲主　人參黃連生地涼血當歸和血川芎和血槐角涼血條芩涼大腸枳殼寬腸升麻提起右煎湯服之外以澀藥爲甘石童便煅牡蠣粉龍骨海蛤密陀僧之類敷之　薛立齋云初起焮痛便秘或小便不利者宜清熱涼血潤燥疎風若氣血虛而寒涼傷損者調養脾胃滋補陰精若破而久不愈多成痔漏有穿臀穿陰穿腸者宜養元

氣補陰精爲主大便秘澀或作痛者潤燥除濕肛門下墜或作痛者瀉火除濕下墜腫痛或作痒者袪風勝濕腫痛小便澀滯者清肝導濕若有患痔而兼疝患疝而兼下疳皆屬肝腎不足之變症但用地黃丸益氣湯以滋化源爲善若專服寒涼治火者無不致禍　牡痔乳香散猪蹄灰丸　牝痔檳榔散橘藤散麝香散　酒痔赤小豆散乾葛湯　氣痔橘皮湯威靈仙丸熏熨方　血痔地榆散椿皮丸猪臟丸　腸痔皂

角煎丸鼈甲丸　脉痔刺蝟皮丸槐木耳散　痛甚秦艽當歸湯七聖丸能消丸地榆散試蟲散龍腦散白聖散黑玉丹或用荔枝草煎湯入朴硝洗之效　痒甚秦艽羌活湯外用槐白皮濃煎汁安盆中坐熏之冷即再煖良久欲大便當蟲出或用水銀棗膏各二兩研勻捏如棗形薄綿裹納之明日蟲出若痛者加粉草二大分作丸或用威靈仙枳殼各一兩爲麤末煮水熏洗冷即再暖臨卧避風洗三次挹乾貼蒲黃

散或用艾入雄黃末燒烟熏之　下血不止芎歸丸黑丸子臭樗皮散二礬丸苦楝丸槐角地榆湯槐角枳殼湯外敷血竭末　氣滯發痔荆枳湯　血瘀作痛逐瘀血湯　血痔久痔潔古用黑地黃丸是之云治痔之聖藥也　運氣痔發皆屬寒水太陽之勝痔疾發治以苦熱是也則痔皆有寒者矣本事四方用椎附乃其治乎　熏痔方用無花果葉煮水熏少時再洗又法燒新磚以醋沃坐熏良　洗痔方治番花

痔用荆芥防風朴硝煎湯洗之次用木鼈子五倍子研細調傅如肛門腫熱再以朴硝末水調淋之良　又方無花果葉七片五倍二錢皮硝二錢水一碗煎八分砂鍋內乘熱熏洗　敷藥雞內金蒲黃血竭各等分爲末濕則乾摻乾則油調傅　又方茄蒂何首烏文蛤酥炙各等分蜜葱汁雞子清攪勻調傅　膏藥杏仁去皮五錢蓖麻子去殼七錢乳香二錢沒藥四錢血竭六錢片腦一錢銅綠二錢瀝青二錢松香二兩

穿山甲灰炒研末二錢入乳一酒鍾先將草麻杏仁搗如泥次入松香搗爛次第入諸藥量入人乳搗令軟硬得所再搗五六百下收磁器中封固臨時以手撚如錢樣厚紙或帛上援瘡去膿生新肉

李防禦專科治痔九方朝貴用之屢効蓋其用藥簡要有次第製造有法無苦楚而收効甚速

凡痔出外或番若蓮花便血疼痛不可坐臥甚者用下藥早上藥一次午一次晚又一次至

夜看痔頭出黃水膏如泉當夜不可再上藥且令黃水出盡次日看痔消縮一半若更上藥一二日爲好若年高人應外腎牽引疼痛可用人以火烘熱手於大小便間熨之其痛自定黃水未盡可再傅一日藥仍須勤用贖外科人早晚看照黃水流至盡是病根已去也水澄膏係護肉藥鬱金白芨二味各等分細末候痔出側臥以鹽湯洗淨拭用新水和蜜蓋內調匀却入藥末同敷在穀道四向好肉上留痔頭在外次用紙蓋藥仍用筆蘸溫水塗紙令常潤澤却用下枯藥好白礬四兩通明生砒二錢半重朱砂一錢生研如粉細三味先用砒末安建盞中次用白礬末蓋之用火煅令煙斷其砒盡從煙去止是借砒氣在白礬中將枯礬取出爲細末先看痔頭大小多寡將礬末抄上掌中加朱砂少許二味以津唾調匀得所用篦子調塗痔頭上周遭令徧日三上須仔細看痔頭顏色欲其轉焦黑乃取落之漸至夜自有黃水膏出以多爲好

方是惡毒水切勿他疑中夜再上藥一次來日依舊上三次有小疼不妨如換藥用新瓦器盛新水或溫水在痔邊以筆輕手刷洗舊藥却上新藥仍用前護藥老弱人用藥要全無疼痛只增加朱砂末於礬末內自然力慢不可住藥但可少徧數直候痔頭焦枯方可住也次用荊芥湯洗以荊芥煎湯入瓦器時洗之潤腸丸用大黃煨淨乳香當歸各等分蜜丸每服二三十丸白湯下以防肛門急燥欲大便出無澀痛而

巴又龍石散用龍骨煅出火毒軟石膏煅出火
毒白芷黃丹作末摻瘡口又導赤散用生地黃
木通黃芩等分煎以防小便赤澀又雙金散用
黃連鬱金等分爲末用蜜水調敷痔頭有小痛
再敷之若得腦子末傅尤佳又痔頭收斂即可
服十宣散以生氣血又國老湯生甘草治痔本
藥也煎水熏洗生肌解石毒瘡極痒亦主之共
九方
周先生枯痔法明礬赤石脂五錢辰砂一錢黃丹
右爲末先用鬱金末護肛門如無鬱金用蒲黃
末入之調塗四圍好肉如不就加菉豆粉打合
却將枯藥傅上如肛門疼急濃煎甘草湯放溫
拂四圍肛門上就與寬腸藥槐花大黃枳殼木
通通瞿麥當歸各半酒半水煎　枯藥早辰
上一次日午一次洗去舊藥申時又洗去又上
一次如要急安至夜半子時又洗上一次至次
看痔頭淡淡黑色兩三日如烏梅四五日
竹篦子輕輕敲打痔頭見如石堅至七八

日便住更不須上枯藥且待自然如蘿蔔根乃
脫去也洗用甘草荊芥槐花洗去舊藥方上新
藥　凡醫痔之法且如明日要下手今日先與
此藥所以寬大腸使大便軟滑不與痔相礙且
不泄瀉痔頭未脫落者須要日日與之以大黃
生一兩煨枳殼炒當歸酒洗一兩同爲細末丸如
桐子大好酒下　治枯痔頭虛生他症凡用
枯藥或觸壞腎根或木通赤濇痛與此方大黃
木通生地各一兩滑石瞿麥各半兩同爲細末
痔
每用四錢煎服　催痔方如枯痔不脫落以此
催之好磁石一錢白殭蠶生川烏五分同爲細
末冷水調傅上立脫　凡用枯藥去盡乳頭恐
留痔硬頭損破肛門四圍成瘡用此藥龍骨一
錢石膏一錢沒藥五分膩粉五分同研十分細
凡以荊芥湯洗次摻之切忌毒物生葷　痔脫
後用甘草湯豆豉湯洗再用荊芥五倍子煎水
洗便不生膿　治痔脫後肉痒方用大粉草濃
煎湯洗　治腸方凡用枯藥脫下乳頭隨即與

此以收其腸此方補氣又收膿去血生肉令痕
壯人參當歸各一兩川芎甘草白芷防風厚朴
桔梗桂枝黃芪右細末半酒半水煎如惡酒者
酒少水多煎之夏月減桂朴加芩檗
治痔切勿用生硫毒氣入腹反至奄忽忌喫生
冷硬物冷菜之類及酒濕麪五辣辛熱大料物
及乾薑之類犯之無効
灸法大蒜十片頭垢捏成餅子先安頭垢餅於
痔頭上外安蒜片以艾灸之　唐以州王文顯

充西路安撫司判官乘騾入駱谷得痔疾因此
大作其狀如胡瓜貫於腸頭熱如溏灰火至驛
僵仆主驛吏云此病予曾患來須灸即瘥用柳
枝濃煎湯先洗痔便以艾炷其上連灸三五壯
忽覺一道熱氣入腸中因轉瀉鮮血穢物一時
出至痛楚瀉後遂失胡瓜所在登騾馳去　秘
傳痔漏隔礬灸法皂礬一斤用新瓦一片兩頭
用泥作一墻先用香油刷瓦上焙乾却以皂礬
置瓦上煅枯去砂爲末穿山甲一錢入紫罐內

煅存性爲末木鼈子亦如前法煅過取末二錢
五分乳香没藥各一錢五分另研右件和勻冷
水調量瘡大小作餅子貼瘡上用艾炷灸三四
壯灸畢就用熏洗藥先熏後洗日六度三五日
後如前法再灸以瘥爲度　熏洗方皂礬如前
製過約手規一把知母末一兩貝母末一兩葱
七莖先用水同葱煎三四沸傾入瓶內再入前
藥令患者坐瓶口上熏之待水溫傾一半洗患
處留一半俟再灸復燃熏洗以瘥爲度

七竅門上

目

目痛　目赤　目腫脹　目痒　外障
內障　瞳神散大　瞳神緊小　[illegible]　昏花
暴盲　青盲　[illegible]　其[illegible]
膚傷珠陷　神水將枯　[illegible]
雙目睛通　神珠[illegible]　[illegible]背
青黃牒出　珠中氣[illegible]　[illegible]毛
[illegible]病　風沿[illegible]　[illegible]不止
目瘡疣　漏睛　[illegible]
能近視不能遠視　能遠視[illegible]
目閉不開　目直視　目上視
目為物所傷　傷寒愈後之病
[illegible]目病　產後目病
因毒證　因他證　因風證
痘疹餘毒證　時復證

目

金壇王肯堂輯

經云瞳子黑眼法於陰白眼赤脉法於陽故陰陽合轉而精明此則眼具陰陽也　又曰五藏六府之精氣皆上注於目而爲之精精之窠爲眼骨之精爲瞳子筋之精爲黑眼血之精爲絡其窠氣之精爲白眼肌肉之精爲約束裹擷筋骨氣血之精而與脉并爲系上屬於腦後出於項中此則眼具五藏六府也後世五輪八廓之說蓋本諸此　藏府主目有二　一曰肝經云東方青色入通於肝開竅於目藏精於肝又云人卧血歸於肝肝受血而能視又云肝氣通於目肝和則目能辨五色矣　二曰心經云心合脉諸脉者皆屬於目是也至東垣又推之而及於脾如下文所云　東垣曰五藏生成篇云諸脉者皆屬於目目得血而能視針經九卷大惑論云心事煩冗飲食失節勞役過度故脾胃虚

弱心火太盛則百脉沸騰血脉逆行邪害孔竅
天明則日月不明也夫五藏六府之精氣皆禀
受於脾土而上貫於目脾者諸陰之首也目者
血氣之宗也故脾虛則五藏之精氣皆失所司
不能歸明於目矣心者君火也主人之神宜靜
而安相火代行其令相火者包絡也主百脉皆
榮於目既勞役運動勢乃妄行及因邪氣所并
而損其血脉故諸病生焉凡醫者不理脾胃及
養血安神治標不治本不明正理也　陽主散
陽虛則眼楞急而爲倒睫拳毛　陰主斂陰虛
不斂則瞳子散大而爲目昏眼花　靈樞顛狂
篇云目眥外决於面者爲銳眥在內近鼻者爲
內眥上爲外眥下爲內眥　論疾診尺篇云診
目痛赤脉從上下者太陽病從下上者陽明病
從外走內者少陽病太陽病宜溫之散之陽明
病宜下之寒之少陽病宜和之　保命集云眼
之爲病在府則爲表當除風散熱在藏則爲裏
當養血安神暴發者爲表而易療久病者爲裏
而難治除風散熱者瀉青丸主之養血安神者
定志丸主之婦人熟地黄丸主之或有肥體氣
盛風熱上行目昏澀槐子散主之此由胸中濁
氣上行也重則爲痰厥亦能損目當使胸中氣
清自無此病也又有因目疾服凉藥多則損氣
者久之眼漸昏暗令明年暗不能視物此則失
血之驗也熟乾地黄丸宜風散定志丸相須養
之或有視物不明見黑花者此之謂腎氣弱也
宜補腎水駐景丸是也或有暴失明者謂眼居
諸陽交之會也而陰反閉之此風邪內滿當有
不測之病也　子和曰聖人雖言目得血而能
視然血亦有太過不及也太過則目壅塞而發
痛不及則目耗竭而失明故年少之人多太過
年老之人多不及但年少之人則無不及年老
之人其間猶有太過者不可不察也夫目之內
眥太陽經之所起血多氣少目之銳眥少陽經
也血少氣多目之上綱太陽經也亦血多氣少
目之下綱陽明經也血氣俱多然陽明經起於

目兩旁交頞之中與太陽少陽俱會於目惟足厥陰經連於目系而已故血太過者太陽陽明之實也血不及者厥陰之虛也故出血者宜太陽陽明蓋此二經血多故也少陽一經不宜出血血少故也刺太陽陽明出血則目愈明刺少陽出血則目愈昏要知無使太過不及以養血脉而已凡血之爲物太多則濫太少則枯人熱則血行疾而多寒則血行遲而少此常理也目者肝之外候也肝主目在五行屬木雖木之爲

物太茂則蔽密太衰則枯瘁矣夫目之五輪乃五藏六府之精華宗脉之所聚其白人屬肺金肉輪屬脾土赤脉屬心火黑水神光屬腎水兼屬肝木此世俗皆知之矣及有目疾則不知病之理豈知目不因火則不病何以言之白輪變赤火乘肺也肉輪赤腫火乘脾也黑水神光被翳火乘肝與腎也赤脉貫目火自甚也能治火者一句可了故內經曰熱勝則腫凡目暴赤腫起羞明隱澀淚出不止暴寒目瞞皆太熱之所

也治火之法在藥則鹹寒吐之下之在針則神庭上星顖會前頂百會血之翳者可使立退痛者可使立已昧者可使立明腫者可使立消惟小兒不可刺顖會爲肉分淺薄恐傷其骨然小兒水在上火在下故目明老人火在上水不足故目昏內經曰血實者宜決之又經曰虛者補之實者瀉之如雀目不能夜視及內障暴怒大憂之所致也皆肝主目血少禁出血止宜補肝養腎至於暴赤腫痛皆宜以鈹針刺前五穴

出血而已次調鹽油以塗髮根甚者雖至於再至於三可也量其病勢以平爲期 按此謂目疾出血最急於初起熱痛暴發或久病鬱甚非三稜針宜泄不可然年高之人及久病虛損并氣鬱者宜從毫針補瀉之則可故知子和亦大畧言耳於少陽一經不宜出血無使太過不及以養血脉而已顯意可見

[illegible] 金之精騰結而爲氣輪木之精騰結而爲風輪火之精騰結而爲血輪土之精騰結而爲肉輪水之精騰結

而爲木輪氣輪者目之白睛是也內應於肺西
方庚辛申酉之令肺主氣故曰氣輪金爲五行
之至堅故白珠獨堅於四輪肺爲華蓋部位至
高主氣之升降少有怫鬱諸病生焉血隨氣行
氣若怫鬱則火勝而血滯火勝而血滯則病變
不測火尅於金金在木外故氣輪先赤金尅木而
後病及風輪也金色尚白故白澤者順也風輪
者白內青睛是也內應於肝東方甲乙寅卯厥
陰風木故曰風輪目竅肝肝在時爲春春生萬

物色滿宇宙惟目能鑒故屬竅於肝也此輪清
脆內包膏汁有涵養瞳神之功其色青故青瑩
者順也世人多黃濁者乃濕熱之害惟小兒之
色最正至長食味則泄其氣而色亦易矣血輪
者目兩角大小眥是也內應於心南方丙丁巳
午火心主血故曰血輪夫火在目爲神光火衰
則有昏瞑之患火炎則有焚燥之殃雖有兩心
而無正輪心君主也通於大眥故大眥赤者實
火也心包絡爲小心小心相火也代君行令通

於小眥故小眥赤者虛火也若君主拱默則相
火自然清寧矣火色赤惟紅活爲順也肉輪者
兩脾是也中央戊己辰戌丑未之土脾主肉故
曰肉輪脾有兩葉運動磨化水穀外亦兩脾動
靜相應開則萬用如陽之發生閉則萬寂如
陰靜之收斂土藏萬物而主靜故脾合則萬有
寂然而思睡此藏納歸靜之應也土爲五行之
主故四輪亦爲脾所包涵其色黃得血而潤故
黃澤爲順也華元化云目形類丸瞳神居中而

前如日月之麗東南而晚西北也內有大絡六
謂心肺脾肝腎命門各主其一中絡八謂膽胃
大小腸三焦膀胱各主其一外有旁支細絡莫
知其數皆懸貫於腦下連臟腑通暢血氣往來
以滋於目故凡病發則有形色絲絡顯見而可
驗內之何臟腑受病也外有二竅以通其氣內
有諸液出而爲淚有神膏神水神光真氣真元
真精此皆滋目之源液也神膏者目內包涵膏
液如破則黑稠水出是也此膏由膽中滲潤精

汁積而成者能涵養瞳神衰則有損神水者由三焦而發源先天真一之氣所化在目之內雖不可見然使觸物損破則見黑膏之外有似稠痰者是也在目之外則目上潤澤之水是也水衰則有火勝燥暴之患水竭則有目輪大小之疾耗澀則有昏眇之危虧者多盈者少是以世無全精之目神光者謂目自見之精華也夫神光發於心原於膽火之用事神之在人也大矣在足能行在手能握在舌能言在鼻能嗅在耳

能聽在目能視神舍心故發於心焉真血者即肝中升運滋目經絡之血也此血非比肌肉間易行之血因其脉絡深高難得故謂之真也真氣者蓋目之經絡中往來生用之氣乃先天真一氣生之[illegible]陽也大宜和暢少有鬱滯諸病生焉真精者乃先後天元氣所化精汁起於腎施於膽而後及瞳神也凡此數者一有所損目則病矣大槩目圓而長外有堅殼數重中有清脆內包黑稠神膏一函膏外則白稠神水水以滋

膏水外則皆血血以滋水膏中一點黑瑩是[illegible]膽所聚之精華唯此一點鑑照靈明空闊無窮者是目水輪內應於腎北方壬癸亥子水也[illegible]妙在三焦清升氣心神也五輪之中四輪不鑒唯瞳神乃照物者風輪則有包衛涵養之功風輪有損瞳神不久留矣或曰瞳神水也氣也血也膏也曰非也非血非氣非水非膏乃先天之氣所生後天之氣所成陰陽之妙[illegible]水火之精華血為水水為膏膏為瞳神氣為運用神則維

持論以日月理實同之而午前則小午後則大亦隨天地陰陽之運用也大抵目竅於肝主於腎用於心運於肺藏於脾有大有小有圓有長亦由稟受之異男子右目不如左目精華女子左目不如右目光[illegible]此各得其陰陽氣分之主也然聰愚後在稟[illegible]天亦能驗目而知之神哉豈非人身之至寶乎[illegible]應乎八卦脉絡經絡於腦胃直貫行通血氣往來以滋於目廓城郭各有行路往來而目廓猶城郭之意也

乾居西北絡通大腸之府藏屬肺肺與大腸相
爲陰陽上運清純下輸糟粕爲傳送之官故曰
傳道廓坎正北方絡通膀胱之府藏屬於腎腎
與膀胱相爲陰陽主水之化源以輸津液故曰
津液廓艮位東北絡通上焦之府藏配命門命
門與上焦一爲陰陽會合諸陰分輸百脉故曰
會陰廓震正東方絡通膽府藏屬於肝肝膽相
爲陰陽皆主清淨不受濁穢故曰清淨廓巽位
東南絡通中焦之府藏配肝絡肝與中焦相爲
陰陽肝絡通血以滋養中焦分氣以化生故曰
養化廓離正南方絡通小腸之府藏屬於心心
與小腸相爲藏府爲謂陽受盛之胞故曰胞陽
廓坤位西南絡通胃之府藏屬於脾脾胃相爲
藏府主納水穀以養生故曰水穀廓兌正西方
絡通下焦之府藏配腎絡腎與下焦相爲藏府
關主分精化生之源故曰關泉廓藏府相配內
經已有定法而三焦分配肝腎者此目之精法
也蓋目專竅於肝而主於腎故有二絡之[illegible]

焉左目屬陽陽道順行故廓之經位法象亦以
順行右目屬陰陰道逆行故廓之經位法象亦
以逆行察乎二目兩背之分則昭然可見陰陽
順逆之道矣

開導之說 夫目之有血爲養目之
源充和則發生長養之功全而目不病虧滯則
病生矣猶物之有水爲生物之澤時中則灌溉
滋生之得宜而物秀旱澇則物壞矣皆一氣使
之然也是故天之六氣不和則陰陽偏勝旱澇
承之水之盈虧不一物之秀槁不齊雨暘失時
而爲物害也譬之山崩水湧滂沛妄行不循河
道而流任其所之不得已而疏塞決閼以泄其
濫使無淪溺昏墊之患人之六氣不和水火乖
違亢承之血之旺衰不一氣之升降不齊營
衛失調而爲人害也蓋由陰虛火盛炎燥錯亂
不遵經絡而來鬱滯不能通暢不得已而開溜
導瘀以泄其餘使無脹漲損珠之患與戰理同
其節有六謂迎香內睥上星耳際左右太陽穴
也內睥正隊之衛卒也其功雖遲漸收而平順

兩太陽擊其左右翼也其功次之上星穴絕其
㑪道也內迎香抵賊之巢穴也成功雖速乘險
而徑耳際擊其遊騎耳道遠功卑智者不取此
實拯危之良術禦敵之要機與其閉門捕賊不
若開門逐之為良法也蓋病淺而邪不勝正者
固內治而邪自退矣倘或六陽炎熾不若開導
通之縱使其虛邪有所傷以藥內治之功而補
其所傷庶免於滯之極而有潰爛枯凸之患惜
乎開導之法俱當有為有大功於目而人不知

目 卷一 十二

有隱禍於目而人亦不知其摧鋒挫銳臨大敵
而拯禍亂此其功之大也耗液傷膏勞光華而
之滋生此其禍之隱也唯能識證之輕重目之
虛實而代之無過不及之弊庶可為醫之良者

內有內外治各不同內疾已成外
若無證之所昔外有紅絲赤脈若初發乃微
邪退後乃令點亦可消服之猶恐內病始盛
而不汗點者不明徒點無功且有激
發之病既外病已見必須內外夾功點

服並行參之何人有懸拘不同有喜服而畏點
者有喜點而畏服者不知內疾既發非服不除
外疾既成非點不退猶其流不若塞其源伐其
枝不若斷其根揚湯止沸不如釜底抽薪此謂
治本也內病既發不服而除者昔未之見也物

混鏡垢須磨刮膏之釜不經洗滌焉能清
淨此謂治標也若外障既成不點而去者吾亦
未之見也若內障不服而點者徒激其火動其
氣血反損無益服而點者亦然外障服而不點

目 卷一 十三

病初發浮嫩不定者亦退既已結成者服雖不
發不長所結不除當內外夾功方盡其妙

鉤者鉤起之謂割割去也針非砭針
之針乃針撥瞳神之針烙即熨烙之烙此四者
猶斬刈之刑剪戮兇頑之法也要在審的明而
詳審定然後加刑先滅巨魁次及從惡則情真
罪當而良善無侵濫之憂邪某無猖獗之患在
治法乃開泄鬱滯滌除瘀積之術也要在證候
明而部分當始可施治先代標病後去本病則

氣和血寧而精膏□傷損之患輪廓無傷損之
失如鈎先須識定何處皮肉筋脉浮淺而手力
亦隨病輕重行之如針先須識定內障證候可
針歲月已足氣血寧定者方與之療無差謬針
後當照證內治其本或補或瀉各隨其證之所
宜若只治其標不治其本則氣不定不久復爲
害矣割如在氣血肉三輪者可割而大背一䂓
紅肉乃血之英心之華也若誤割之則目盲因
神在而傷者死有割傷因而惹風及元虛之人
目
犯慄濕盛者潰爛爲漏蠹目枯凡障若掩及風
輪之重厚者雖可割亦宜輕輕從旁淺淺披起
及諸病如攀睛努肉雞冠蜆肉魚子石榴赤脉
虬筋肉脾粘輪等證可割餘病及在風輪之淺
者誤割之則珠破而目損烙能治殘風潰眩瘡
爛濕熱久不愈者輕則不須烙而治自愈若紅
障血分之病割去者必須用烙定否則不久復
生在氣分之白者不須用烙凡針烙皆不可犯
及烏珠不惟珠破亦且甚痛雖有惡障厚者鈎

割亦宜輕輕淺淺披去外邊其內邊障底只點
藥緩伐久自潛消若輒割風毒流毒瘀血等證
當以活法審視不可拘於一定針瞳神反背又
與內障之針不同在心融手巧輕重得宜須口
傳親見非筆下之可形容大抵鈎割針烙之治
功効最速雖有撥亂反正乃乘險救危要在心
小而膽大證的而部當必兼內治方盡其術○
目痛有二一謂目眥白眼痛一謂目珠黑眼痛
益目眥白眼疼屬陽故晝則疼甚點苦寒藥則
效經所謂白眼赤脉法於陽故也目珠黑眼疼
屬陰故夜則疼甚點苦寒則反劇經所謂瞳子
黑眼法於陰故也　要今按夏枯草治目珠
疼至夜則疼甚者神效或用苦寒藥點眼上反
疼甚者亦神效蓋目珠者連目本目本又名目
系屬厥陰之經也夜甚及用苦寒點之反甚者
夜與寒亦陰故也丹溪云夏枯草有補養厥陰
血脉之功其草三四月開花遇夏至陰生則枯
蓋稟純陽之氣也故治厥陰目疼如神者以其

治陰也予周師目珠疼及連眉稜骨痛及頭半
邊腫痛遇夜則作用黄連膏子點上則反大疼
諸藥不効灸厥陰少陽則疼隨止半月又作又
灸又止者月餘遂以夏枯草二兩香附二兩甘
草四錢同為細末每服一錢五分用茶清調服
下咽則疼減大半至四五日良愈又一男子年
六十歲亦目珠連眉稜骨痛夜甚用苦寒劑點
亦甚與前證皆同但有白翳二點在黑目及外
眥與翳藥皆不効亦以此藥間東垣選奇湯又

加四物黄連煎服并灸厥陰少陽而安　倪仲
賢論七情五賊勞役饑飽之病云陰陽應象大
論曰天有四時以生長收藏以生寒暑燥濕風
寒暑燥濕風之發耶發而皆宜時則為物俱生
寒暑燥濕風之發耶發而皆不宜時則為物俱
死故曰生於四時死於四時又曰人之五藏化
為五氣以生喜怒憂悲恐喜怒憂悲恐之發耶
發而皆中節則九竅俱生喜怒憂悲恐之發耶
發而皆不中節則九竅俱死故曰生於五藏死

於五藏目竅之一也光明視見納山川之大及
毫芒之細悉雲霄之高盡泉泌之深至於鑿無
窮為有窮而有窮又不能為窮反而聚之則乍
張乍斂乍動乍靜為一泓一點之微者豈力為
強致而能此乎是皆生生自然之道也或因七
情內傷五賊外擾饑飽不節勞役異常足陽明
胃之脉足太陰脾之脉為戊己二土生生之源
也七情五賊總傷二脉饑飽傷胃勞役傷脾戊
己既病則生生自然之體不能為生生自然之

用故致其病曰七情五賊勞役饑飽之病其病
紅赤睛珠痛痛如刺刺應太陽眼睫無力常欲
垂閉不敢久視久視則酸疼生翳皆成陷下所
陷者或圓或方或長或短或如點或如縷或如
錐或如鑿有犯此者柴胡復生湯主之黄連羊
肝丸主之睛痛甚者當歸養榮湯主之助陽活
血湯主之加減地黄丸主之決明益陰丸主之
加當歸黄連羊肝丸主之龍膽黄連膏主之巳
上數方皆群隊升發陽氣之藥其中有用黄連

黃芩之類者去五賊也搐鼻碧雲散亦可間用
最忌大黃芒硝牽牛石膏梔子之劑犯所忌則
病愈劇　又論亡血過多之病曰六節藏象論
曰肝受血而能視宣明五氣篇曰久視傷血氣
厥論曰腦移熱於腦則辛頞鼻淵傳為衄衊瞑
目繆刺論曰冬刺經脉血氣皆脫令人目不明
由此推之目為血所養明矣手少陰心生血血
榮於目足厥陰肝開竅於目肝亦主血故血亡
目病男子衄血便血婦人產後崩漏亡之過多

目痛　全書　十八

者皆能病焉其症睛珠痛珠痛不能視羞明瘾
澀眼睫無力眉骨太陽因為酸疼芎歸補血湯
主之當歸養榮湯主之除風益損湯主之滋陰
地黃丸主之諸有熱者加黃芩婦人產漏者加
阿膠脾胃不佳惡心不進食者加生薑復其血
使得其所養則愈然要忌鹹物宣明五氣篇曰
鹹走血血病無多食鹹是也　【目眼熱】多有赤
脉從上而下者太陽病也羌活為使從下
上者陽明病也升麻為使從外走內者少陽

病也柴胡為使太陽病宜溫之散之陽明病宜
下之少陽病宜和之又惡寒脉浮為在表宜選
奇湯防風飲子等散之脉實有力大腑閉為在
裏宜瀉青丸洗肝散等微利之亦有不腫不紅
但沙澀昏痛者乃氣分隱伏之火脾肺絡有濕
熱秋天多有此患故俗謂之稻芒赤亦曰白赤
眼也通用桑白皮散玄參丸瀉肺湯大黃丸洗
眼青皮湯朱砂煎　【天行赤熱】目赤痛或睥
腫頭重怕熱羞明淚涕交流等證一家之內一

目病　全書　十九

里之中往往老幼相傳者是也然有虛實輕重
不同亦因人之虛實時氣之輕重何如各隨其
所以而分經絡以發病有變為重病者有變為
輕病者有不治而愈者不可槩言此一節專為
天時流行熱邪相感染而人或素有目疾及痰
火熱病水少元虛者則爾我傳染不一其絲脉
雖多赤亂不可以為赤絲亂脉證常時如是之
比若感染輕而源清邪不勝正者則七日而自
愈蓋火數七故七日火氣盡而愈七日不愈而

有二七者乃再傳也二七不退者必其犯觸及本虛之故防他變證矣

暴風客熱證 非天行赤熱爾我感染之比又非寒熱似瘧目痛則病發病發則目痛之比乃素養不清躁急勞苦客感風熱卒然而發也雖有腫脹乃風熱夾攻火在血分之故治亦易退非若腫脹如杯等證久積退遲之比

火脹大頭證 目赤痛而頭面浮腫皮肉燥赤也狀若大頭傷寒夏月多有此患有濕熱風熱濕熱多淚而眵爛風熱多脹痛而

憎寒若失治則血滯於內雖得腫消而目必有變矣

羞明怕熱證 謂明熱之處而目痛澀畏避不能開也凡病目者十之六七皆有此患病源在於心肝脾三經總而言之不過一火燥血熱病在陽分是以見明見熱則惡類而澀痛畏避蓋己之精光弱而不能敵彼之光是以陰黑之所則清爽自然不足之證若明有不足之證若目不赤痛而畏明者乃不足之證為血不足膽汁少而絡弱不能運精華以敵陽光之虛

今人皆稱為怕日羞明者俗傳音近之誤蓋日熱二音頗近習俗呼誤久不察其理遂失其正只以怕熱羞明論之其理灼然可見夫明字所包已廣何用再申日字若以日字專主陽光言之則怕熱一證無所歸矣

睥硬睛疼證 不論有障無障但兩睥堅硬而睛疼頭或痛者尤急乃風熱在肝肝虛血少不能營運於目絡水無所滋火反乘虛而入會痰燥濕熱或頭風夾搏故血滯於睥內睥與火燥而疼輕則內生椒

瘡重則為睥腫脹如杯瘀血滯睛等證治當傳退稍較緩者用導之吉若堅硬之甚且漸漸腫起而痛及頭腦雖已退而復來其脹日高雖傳治不退不軟者此頭風欲成毒也[illegible]通肝散[illegible]

[illegible]如[illegible]證 每日痛則頭亦痛寒熱交作如瘧狀凡病發則目痛目痛則病發輕則一年數發重則一月數發蓋肝腎俱虛之故熱者內之陰虛火動邪熱也寒者榮衛虛外之腠理不實而覺其虛若作風寒瘧疾或用峻劑之

治則血愈虛而病愈深矣宜小柴胡合四物湯
主之不效則活血益氣湯
氣眼[illegible]纏怒氣則目疼宜酒調復元通氣散
痛如針刺目珠痛如針刺病在心經實火有餘之證若痛卒然一二處如針刺目雖不赤亦是心經流火別其痛在何部分以見病將犯其經矣宜服先心散次服瀉肝散及劉香丸瀉肝散〇按此證多有體勞目勞營氣不上潮於目而如針刺之痛者宜養其營若降火則殆矣
熱結膀胱證目痛則小便不通利而頭疼寒熱若方是若小便清利者非也乃熱蒸於膀胱先利清其水後治其目則愈矣蓋太陽經脉循目絡上行巔頂故頭疼火極則兼水化又血虛者表疎故發寒熱熱甚則水氣閉濕而神水被蒸之耶安得不瞑
[illegible]頭風證此證不論偏正但頭痛倏疾而來疼至極而不可忍身熱目痛便秘結者曰大雷頭風若痛從小至大大便先潤後燥小便先清後澀曰小雷頭風大者害速小者稍遲雖有大小之說而治則同一若失緩稍縱不測目必損壞輕則㬠凸重

則結毒宜早爲之救免於禍成而救之不逮世人每慮此患害速故疑於方犯惑於鬼祟邪不從而遂致禍成悔無及矣
[illegible][illegible]頭痛右不痛曰左偏風右邊頭痛左不痛曰右偏風世人往往不以爲慮久則左發損左目右發損右目有左損反攻右右損反攻左而目俱損者若外有赤痛淚熱等病則外證也有內有昏眇眩運等病則內證生矣凡頭風痛左害左痛右害右此常病易知者若難知者左攻右右攻左痛從內起止於腦則攻害也遲痛從腦起止於內則攻害也速若痛從中間發及眉梁內上星中發者兩目俱害亦各因其人之觸犯感受左右偏勝起患不同遲速輕重不等[illegible]人之[illegible]若[illegible]亦可[illegible]因其所[illegible]不知戒[illegible]以致患成[illegible]
[illegible]額板眉稜骨[illegible]陽明[illegible]元虛精弱者則[illegible]大者則有外證之病

【腦後證】腦後枕骨痛也多發於六陰用事之月發則有虛運耳鳴之患久而不治內障成矣

【太陽證】太陽內如槌似鑽一鬨而痛也若痛及目珠珠外有赤脉縱貫及瘀滯者必有外之惡證來矣若珠不赤痛只自覺視如雲遮霧障漸漸昏眇者內證成矣急早治之以免後患

【巔頂證】人靈蓋骨內痛極如槌如鑽也陽分痛尤甚陰分痛稍可夾痰濕者每痛多眩運若痛連及珠子而脹急瘀赤者外證之惡候若昏眇則內證成矣成內證者尤多於外者

【遊風證】頭風痛無常位一餉之頃遊易數遍而不能度其何所起止也若痛緩而珠赤亦而有障起者必變外障痛甚而腫脹緊急者必有瘀滯之患久而失治不赤不痛而昏眇者內證成外證者多發爲雷頭如各風目

【頭風證】人素有頭風因而目病或素目病因而頭風二邪並立搏夾而合入腦絡致傷睛眼諸絡故成此患頭痛則目病目病則頭痛輕則一年數發重則一月數發頭風目病常並行而不相悖也非若雷頭風風火搏激而瘀滯之急者又非若天行赤熱傳染之邪客感暴熱之風火寄旅無定及諸火脹頭痛之比此專爲自家本病久成者非若彼之標病暫來之悟者若赤痛脹急則有外證之候若無赤痛而只內脹及赤痛不甚無瘀滯之證而只昏眇者內證成矣

【目赤】內經目赤有三　一曰風助火鬱於上經云少陰司天之政二之氣陽氣布風乃行寒

氣時至民病目瞑目赤氣鬱於上而熱又云少陽司天之政初之氣風勝乃搖候乃大溫其病氣怫於上目赤是也　二曰火盛經曰火太過目赤膿熱瞑之綴其病目赤又云火鬱之發民病目赤心熱又曰少陽司天之政三之氣炎暑至目赤又云少陽之復目赤是也　三曰燥邪傷肝經云歲金太過燥氣流行民病目赤又云陽明司天燥氣下臨肝氣上從脇痛目赤是也倪仲賢云心火乘金水衰反制之病曰天有

六邪風寒暑濕燥火也人有七情喜怒憂思悲恐驚也七情內召六邪外從從而不休隨召見病此心火乘金水衰反制之原也世病目赤為熱人所共知者也然不審其赤分數等治各不同有白睛純赤熱氣炙人者乃淫熱反尅之病也治如淫熱反尅之病有白睛赤而胞腫外瞼虛浮者乃風熱不制之病也治如風熱不制之病有白睛淡赤而細脉深紅縱橫錯貫者乃七情五賊勞役饑飽之病也治如七情五賊勞役饑飽之病有白睛不腫不脹忽如血貫者乃血為邪勝凝而不行之病也治如血為邪勝凝而不行之病有白睛微變青色黑睛稍帶白色白黑之間赤環如帶謂之抱輪紅者此邪火乘金水衰反制之病也此病或因目病已久抑鬱不舒或因目病悮服寒涼藥過多或因目病時內多房勞皆能內傷元氣元氣一虛心火亢盛故火能尅金金乃手太陰肺白睛屬肺水乃足少陰腎腎屬水水本尅火水衰不能尅反受火

制故視物不明昏如霧露中或睛珠高低不平其色如死甚不光澤赤帶抱輪而紅也口乾舌苦眵多羞澀稍有熱者還陰救苦湯主之黃連羊肝丸主之川芎決明散主之無口乾舌苦眵多羞澀者助陽活血湯主之神驗錦鳩丸主之萬應蟬花散主之有熱無熱俱服千金磁朱丸鎮墜心火滋益腎水榮養元氣自然獲愈也噫天之六邪未必能害人也惟人以七情召而致之也七情召六邪安從反此者豈止能避而已哉猶當役之而後已也　論淫熱反尅之病曰膏粱之變滋味過也氣血俱盛稟受厚也亢陽上炎陰不濟也邪入經絡內無所禦也因生而化因化而熱熱為火火性炎上足厥陰肝為木木生火母妊子子以淫勝禍發反尅而肝開竅於目故受尅而目亦病也其病眵多眊矂緊澀赤脉貫睛臟腑秘結為重重者[illegible]清[illegible]之眵多眊矂[illegible]赤[illegible]者以大黃當歸[illegible]

芍藥清肝散主之黃連天花粉丸主之火盛服通氣利中丸目眶爛者內服上藥外以黃連爐甘石散收其爛處兼以點眼春雪膏龍腦黃連膏搐鼻碧雲散攻其淫熱此治淫熱反尅之法也非膏粱之變非氣血俱盛非亢陽上炎非邪入經絡毋用此也用此則寒涼傷胃生意不上升反為所害

論風熱不制之病曰風動物而生於熱譬以烈火焰而必吹此物類感召而不能違間者也因熱而召是為外來久熱不散感而自生是為內發內外為邪唯病則一淫熱之禍條已如前益以風邪害豈纖止風加頭痛風加鼻塞風加腫脹風加涕淚風加腦巔沉重風加眉骨痠疼有一於此羌活勝風湯主之風加癢則以杏仁龍膽草泡散洗之病者有此數證或不服藥或慢服藥必隨之而生矣另詳文附條

七情五賊勞役饑飽之病詳見

論血為邪勝凝而不行之病曰血陰物類地之水泉性本靜行其勢也行為陽是陰中之陽乃坎中有火之象陰外陽內故行也純陰故不行也不行則凝凝則經絡不通經曰足陽明胃之脈常多氣多血又曰足陽明胃之脈常生氣生血手太陽小腸之脈斜絡於目背足太陽膀胱之脈起於目內眥二經皆多血少氣血病不行血多易凝靈蘭秘典論曰脾胃者倉廩之官五味出焉五味淫則傷胃胃傷血病是為五味之邪從本生也又曰小腸者受盛之官化物出焉遇寒則阻其化又曰膀胱者州都之官津液藏焉遇風則散其藏一阻一散血亦病焉是為風寒之邪從末生也凡是邪勝血病不行不行漸滯滯則易凝凝則病始外見以其斜絡目背耶以其起於目內眥耶故病環目青黤如被物傷狀重者白睛亦黤輕者或成斑點然不痛不癢無淚眵眊羞澀之論是曰血為邪勝凝而不行之病此病初起之時大抵與傷風論相似一二日則顯此病必用宣行和散之劑消凝大丸子主之睛青者川芎行經散主之如此則凝復不滯

滯復能行不行復行邪消病除血復如故　戴
復菴云赤眼有數種氣毒赤者熱壅赤者有時
眼赤者無非血壅肝經所致蓋肝主血通竅於
眼赤眼之病大率皆由於肝宜黑神散消風散
等分白湯調食後服[illegible]用黃[illegible]切片傅其
上臨就者可用[illegible]可用[illegible]貼之
意　風熱赤甚者於黑神散消風散二藥中放
令消風頭痛用以折[illegible]臨睡時冷調洗肝散或
菊花散服仍進四物湯內用生地黃赤芍藥只
目赤　[illegible]
須半貼食後作一服却加赤茯苓半錢薛將軍
二錢[illegible]晨[illegible]鹽湯下養正丹二三十粒若
不便於過涼之劑則不必用洗肝散宜黑神散
二錢消風散一錢　尋常赤眼用黃連研末先
用大萊頭一箇切了蓋剜中心作一竅入連末
在內復以蓋遮住[illegible]定後火內煨熟取出
候冷以[illegible]中水入眼中　若赤眼久而不
愈用諸眼藥[illegible]者[illegible]起以[illegible]降氣湯下黑
錫丹[illegible]以酒調黑神散臨睡以消風散下三

黃丸此數藥不獨治久赤諸眼疾皆治之　海
藏云目赤暴作雲翳痛不可忍宜四物龍膽湯
眼赤暴發腫散熱飲子瀉青丸　肝藏實熱
眼赤疼痛竹葉[illegible]飲決明子湯麥門冬湯
瀉肝散羊肝丸　[illegible]過目赤而不痛
內服助陽和血[illegible]氣湯外用碧天丸洗之　目
赤腫足寒者必用時[illegible]洗其足并[illegible]赤脉處
斸何經灸三里臨泣[illegible]立愈　赤眼痒
痛煎枸杞汁服　治暴赤眼古銅錢刮淨薑上
目赤　[illegible]
取汁於錢[illegible]點目熱淚出隨點隨愈有瘡者不
可用或[illegible]赤皮木加鹽[illegible]著[illegible]中或本事
針頭[illegible]治陰病目赤　九節黃連秦皮麤末
加淨[illegible]熱湯洗或用艾燒煙以[illegible]之候煙上
[illegible]取下入黃連以溫水調[illegible]及前煙菜汁方皆
治陽病目赤　[illegible]為病故毒若人偏
熱[illegible]不用則[illegible]必[illegible]初起不過紅赤
次後[illegible]脹起甚則脹為形如
蝦座[illegible]血[illegible]不通在脾則腫

服如杯椒瘡之患在珠則白輪涌起凝脂翳黃
膜上衝瘕積成窗花翳白陷翳眼凝睛等惡證
出也失治者必有青黃膿出而凸之患凡見白
珠赤紫筋腫虬筋紫脈傳點不退必有瘀滯在
內可翻胞內視之若有內色帶泛浮椒瘡或粟
瘡者皆用導之之法則否不然將有變證生焉
宜服宣明丸分珠散密蒙花冬湯通血丸及歸
芍煎散等劑

[illegible] 此症白睛不見其
黑瑩但見其一點鮮紅甚則紫濁色也病至此

亦其危且急矣初起一二日尚可救遲則救亦
不愈不但不愈恐其人亦不久蓋腎之真一有
傷膽中精汁皆損故一點元陽神氣靈光見其
[illegible]由腎部十患九不治者令人但
見[illegible]便呼為血[illegible]矣

[illegible] [illegible]上下左右或見一片或一點紅血脈
[illegible]不循絡而來偶然客
[illegible]欲速[illegible]者客寄於相
[illegible]於所滯之處明之亦

好若畏開者內外夾治亦退只是稍遲獨於內
治亦退其効尤遲亦有寡欲慎火者不治自愈
若犯禁而變則瘀滯轉甚內有感激而燥者他
證生焉

[illegible] [illegible]一二三赤脈
[illegible]細多少但在白睛[illegible]上起貫到風輪
[illegible]接連[illegible]氣輪者[illegible]不易治[illegible]難退
[illegible]者稍輕薄者尤[illegible]從上下[illegible]從下
上者[illegible]過者有變證絲[illegible]及有傍絲虬亂
者有變證凡各輪外有此等脈[illegible]者雖在易退

之證亦退遲也貫雖未連而侵入風輪或一半
或三分之二之一皆不易退蓋得生氣之故也
此證專[illegible]脈已掛侵風輪之重非比赤絲亂脈
止在氣輪之輕者令人但見絲脈便呼為赤脈
貫睛非也夫絲脈在風輪氣輪上下纏綿連斷
為病各有緣[illegible]不同既不能明其證又何
[illegible]

[illegible] [illegible]氣輪有絲脈赤亂
久久[illegible]不同或因目痛火雖退
不[illegible]而赤者或因目風沙煙

瘴親火向熱鬱氣勞心恣酒嗜燥渴視勞瞻而
致有所鬱瀉而赤者有痛不痛有痠澀淚有羞
明不羞明為病不等蓋病生在氣輪白珠上有
絲脉縱横或稀密麤細不等但常常如是久而
不愈者[illegible]亦若天行客風等證之暴發赤脉貫
睛之類非此若只赤亂或昏脉澀緊不爽或
有微微淚濕者輕因而犯戒者變重若脉多赤
亂兼以枯澀而緊痛淚濕而爛腫者重驗之當
以大脉為主從何部分而來或穿連某位即別

其所患在何經絡或傳或變自病合病等證分
其生尅承制然後因其證而投其經以治之治
外者細脉易退大脉虬紫者退遲雖點細而脉
大者必須耐久去盡方已庶無再來之患不然
[illegible]其病復發若有別證火亦循此而至
[illegible]倒風輪上者有尤重而能變若因其
[illegible]餘發脉紫脹及瞬腫者用
[illegible]後脉虬紫內服外點點時細縮不
[illegible]久亦然及因而激動滯病變者未雖

不紫瞬雖不腫亦有積滯在內深處乃積滯尚
輕而在絡中幽深之所故未脹出耳揭開上瞬
深處看之其內必有不平之色在焉因其滯而
量其輕重緩緩導之不可過過則有傷真血木
虧[illegible]昏弱之患

附目赤[illegible] 乃目
之白珠紅乃血色也病在至高之氣輪本白被
鬱邪蒸[illegible]散朱中膏汁遊出在氣輪之內故
色變爲赤瞳神必有大小之患矣治者瞳神損
而爲終身病矣然當各因其病而治其本

頭風者風邪也傷寒瘧痰疾火熱邪也因毒者
毒氣所攻也餘倣此

[illegible] 風眼服用枸杞白皮雞子白皮等分
研令極細每日二次吹鼻內　肝經實熱眼赤
腫痛麥門冬湯瀉肝散菊花飲　風熱上攻目
赤腫痛分絲[illegible]消風散　白睛腫脹痛
大黃[illegible]散[illegible]服[illegible]丹皮湯玄參丸瀉肺湯
[illegible]神煎　[illegible]目赤痛瞬脹如杯覆
此是[illegible]火土之有餘益木[illegible]火生土令肝

邪實而傳脾土土受木尅而火不能生火邪反乘虛而[illegible]炎燥之病其珠必疼尤重[illegible]亦急須若暴風客熱作膿者必熱淚多而珠疼稍緩然風熱自外客感易退治亦易愈若木火內自攻擊則[illegible]退遲[illegible]則[illegible]濇閉塞血灌睛中而變證不[illegible]用開導之法輕則散治而退重則必須開導此大意也若教治不退及退而復來并開導不消消而復發痛連頭腦而腫愈高瞑愈[illegible]者此風熱欲成毒之候也

目臆　二十六

[illegible]因瘀滯已甚血脈無所從出遂致壅起氣輪狀如鰕座其則叶出脾外者病尤急非比魚胞氣分之可緩者瘀血灌睛證與此證病雖一種[illegible]則[illegible]甚而未至於極此則極矣有[illegible]邊脹[illegible]有[illegible]珠俱被脹起蓋定為珠者又有大背內[illegible]處脹出一片如皮如肉狀似袋者乃血[illegible]從[illegible]中落來故脹起了大背裏白上寛皮[illegible]爲[illegible]在[illegible]處[illegible]者爲滯爲瞎不可不[illegible]得細只用開導血漸去而皮漸縮小背脹出如袋者亦然其病大意是血氣而盛之患宜[illegible]開導爲先次有餘證從而治之在肺部[illegible]又[illegible]移傳於肝而風輪[illegible]害

[illegible]氣[illegible]分[illegible]脹不紫不赤或水紅或白色狀如[illegible]分之證金火相搏所致[illegible]導雖以[illegible]自消復若有微紅及赤脈者[illegible]於上瞼[illegible]不可過此亦是通氣之說雖不通亦可[illegible]頭痛淚熱及內燥而赤脈多者防有變證宜[illegible]之庶無後患

[illegible]有項强

目臆　二十七

頭疼面腫赤燥之患其狀目如火赤綻大脹於瞼間不能轉動若廟堂凶神之目猶鶻鳥之珠[illegible]絞[illegible]定也乃三焦關格陽邪實盛亢[illegible]風熱[illegible]諸絡澀滯目欲爆出矣大[illegible]內近[illegible]太陽兩[illegible]之所[illegible]而調治之

[illegible]初發時乃頭風[illegible]於[illegible]治雖治[illegible]行脹[illegible]痛不可[illegible]先從[illegible]

起後爛氣輪有爛沿上下臉并顴及頭上內蓋
空而死者[illegible]食少脾泄[illegible]結者死老者有能飲
食而勝調不死是人至中年患此者百無一二
可生者[illegible]脹珠凸等證治退復發再治
再發[illegible]者即成此患若已成者雖治之
脹少[illegible]出決又發發時再治至於數四終
當一發[illegible]退矣既成此證必無可全之理未
成者十分用心調攝療治得宜猶有可生凡目
病但見頭腦痛甚珠及脾脹而疼努硬緊雖數

目經　卷[illegible]　二八

剩亦不[illegible]總因時暴頓少項如故者皆此病來
此宜向內[illegible]其源而救之庶無噬臍之悔
[illegible]氣輪自平水輪自明唯風輪高泛起
[illegible]只半邊泛起者亦因半邊火來之故乃肝
[illegible]膽液滯而不道濕火鬱風輪故隨火脹
起或在下或在上或在內傍各隨其火之所來
從[illegible]脹者多非此旋臚尖起已成證而俱凸起
[illegible]風輪脹起者耳
[illegible]珠大際高而旋起[illegible]

師之形圓而尾尖視[illegible]珠亦圓[illegible]而中尖高故
目旋螺尖起因亢滯之害五氣壅實故泛起爲
珠在肝獨盛內必有瘀血目起可以平治大於
內平之法則瘀血退[illegible]氣定膏凝不復平矣病
甚者[illegible]者珠外小有[illegible]膏上騎水則沉滑
等治[illegible]起[illegible]本珠欲內之候目脹寒涼
之劑救目但失於戕伐木氣致血斷退而絡凝
氣定不復平也　[illegible]目珠脹也有內
外輕重不同名輕則自覺目內脹急不爽治亦

目經　[illegible]　二九

易退重則自覺脹痛甚甚則人視其珠亦覺漸
漸脹起者病亦發見於外已甚矣凡目珠覺脹
急而不赤者火尚微在氣分之間痛者重重則
變赤痛脹急重者有瘀塞之患疼滯甚而脹急
珠覺起者防鶻眼之禍若目不赤目覺目中或
脹或不脹時作有止不[illegible]者爲火無定位遊客
無常之故有風邪濕熱氣勝拂鬱者皆有自脹
[illegible]而有變矣
[illegible]也與[illegible]脹[illegible]因[illegible]

而慢慢脹出者不同其故不一有因真元將盡
精華衰敗致絡脈俱損痒極搔擦而出者其人
不久必死有酒醉怒甚及嘔吐極而關出者有
因患火證熱盛而關格亡陰而脹出者有因怒
甚吼喊而睛出者因胃中水液衰少精血耗損
故脈絡澀脆氣盛極火無所從出出而竅澀泄
之不及故湧脹而出亦有因打撲而出者凡出
雖離兩瞼而脈皮未斷者乘熱捺入雖入脹絡
損動終是光損若突出關在瞼中而含者易入

光不損若離瞼脈絡皮俱斷而出者雖華陀復
生不能救矣

痒若 因風而痒者驅風一字散　因火而痒
者於赤痛　求降火之劑　因血虛而痒者四
物湯　**[illegible]** 非若常時小痒之輕乃如
蟲行而痒不可忍也若病不一須驗目上有無
形證決其病之進退至如有障無障皆有痒極
之患病源非一有風邪之痒有血虛氣動之痒
有虛火入絡邪氣行動之痒有邪退火息氣血

得行脈絡通暢而痒大凡有病之目常時又有
不治而自作痒者痒一番則病重一番若醫治
後而作痒病必去速若痒極難當時時頻作目
覺低陷者命亦不久有極痒而目脫者死期至
矣痒止　多者血虛少火大抵痛屬實痒屬虛
雖有火亦是邪火乘虛而入非其本病也

赤脈 在睛外遮睛　內經診目痛赤脈從上
下者太陽病從下上者陽明病從外走內者少
陽病按此論表裏之醫明矣用以治病如鼓應

桴也　凡赤脈翳初從上而下者屬太陽以太
陽主表其病必連眉稜骨痛或腦項痛或半邊
頭腫痛是也治法宜溫之散之溫則臘茶飲川
附等分煎服立愈戴立齋常以此證用川附一
錢作一服蠟茶一錢附子半兩葱茶一大撮白
芷一錢細辛川芎防風羌活荊芥各半錢煎服
神效散同箭與林草散 [illegible]
湯見右分醫技數是也　赤脈翳初從下而
上者或從內眥出外者皆屬陽明以陽明主裏

其證多熱或便實是也治法宜下之寒之下劑局方流氣飲錢氏瀉青丸局方溫白丸加黃連黃蘗之類累用累驗寒則一味黃連羊肝丸之類是也要令善人安睡久服肥胃弁得日疾每一月或一月發時紅腫痛難如此者一年不除眼發無時常服藥有甚眼反有內障從純黑來連睥右目亦有者多從下而上謂之從外走內者少陽遏從下脉上而陽明而實謂之太陽一經有陽帝也下而有宜下之滇眼發皆從其心頭氣鬱節之鬱抑黃連如來地黃丸與連翹有熱漂三之二如至大利氣後散丸又從二九加起一人丸加苦下如果大利九二九加毎日一加睛障則及從此至夏翳如前開大痛矣

外障

從外皆入內者爲少陽以少陽主半表半裏治法宜和解之神仙退雲丸羌活退翳湯消翳散之類是也　翳膜者風熱重則有之或斑入眼此用氣盛而發在表也翳膜已生在表明矣宜發散而去之若反疎利則邪氣內搐爲翳益深邪氣未定謂之熱翳而浮邪氣已定謂之冰翳而沉邪氣牢而深者謂之陷翳當以焮發之物使其邪氣再動翳膜乃浮佐之以退翳之藥而能自去也病久者不能速效宜以歲月除之

宜服[illegible]散方東垣[illegible]有定志丸之類　瞼發[illegible]命丸[illegible]用之有人[illegible]者陰虛有熱者兼服[illegible]丸　東垣云陽不勝其陰乃陰盛陽虛則九竅不通今青白翳見於大眦乃足太陽少陰經中鬱遏足厥陰肝經氣不得上通於目故青白翳內阻也當於太陽少陰經中九原之下以益肝中陽氣[illegible]行此當先補其陽後於足太陽少陰經中瀉足厥陰肝經陰火乃次治也內經

內障

曰陰盛陽虛則當先補其陽後瀉其陰此治法是也每日清晨以腹中無宿食服補陽湯食遠服升陽泄陰丸臨臥服連柏益陰丸若天色變大寒大風并大勞役預日飲食不調精神不足或氣弱俱不得服候體氣和平天氣如常服之先補其陽使陽氣上升通於肝經之末利空竅於眼目矣　羅謙甫云人目眥暴生從下而起其色綠[illegible]不[illegible]師[illegible]翳從下而上病從陽明[illegible]色白者屬肺腎合為[illegible]

乃就畫家以墨賊粉合成色諦視之與翳同色
胎脊為病無疑矣乃瀉肺腎之邪而入陽明之
藥為之使既効而他日病復作者三其所從來
之經與翳色各異乃以意消息之曰諸脉皆屬
於目脉病則從之此必經絡不調則目病未已
也問之果然因視所不偈者治之病遂不作
翳除盡至其年月日期復發者或間一月或二
月一發皆為積治如脉滑者宜溫白丸加黃連
草龍膽如東垣五積法服之　倪仲賢論風熱

不制之病曰翳如雲霧翳如絲縷翳如秤星翳
如秤星者或一點或三四點而至數十點翳如
螺蓋者為病久不去治不如法至極而致也為
服寒涼過多脾胃受傷生意不能上升漸而致
也然必要明經絡庶能應手翳凡自內眥而出
為手太陽足太陽受邪治在小腸膀胱經加蔓
荊子蒼术羌活勝風湯主之自銳眥客主人而
入者為足少陽手少陽手太陽受邪治在膽與
三焦小腸經加龍膽草藁本少加人參羌活勝

風湯主之自目系而下者為足厥陰手少陰受
邪治在肝經心經加黃連倍加柴胡羌活勝風
湯主之自抵過而上者為手太陽受邪治在小
腸經加木通五味子羌活勝風湯主之熱甚者
兼用治淫熱之藥搐鼻碧雲散俱治已上之證
大抵如開鍋法搐之隨効然力少而銳宜不時
用之以聚其力雖然始者易而久者難漸復而
復漸復而又復可也急於復者則不治今世醫
用磨翳藥者有之用手法揭翳者有之噫翳猶

疥也奚斯愈乎非徒無益而又害之　論奇經
客邪之病曰人之有五藏者猶天地之有五嶽
也六府者猶天地之有四瀆也奇經者猶四瀆
之外別有江河也奇經客邪非十二經之治也
十二經之外別有治奇經之法也繆刺論曰邪
客於足陽蹻之脉令人目痛從內眥始啓玄子
王冰註曰以其脉起於足上行至頭而屬目內
眥故病令人目痛從內眥始也針經曰陰蹻脉
入䪼屬目內眥合於太陽陽蹻而上行故陽蹻

受邪者內眥即赤生脈如縷縷根生瘀肉瘀肉生黃赤脂脂橫侵黑睛漸蝕神水此陽蹻為病之次第也或兼銳眥而病者以其合於太陽故也銳眥者手太陽小腸之脈也銳眥之病必輕於內眥者蓋枝蔓所傳者少而正受者必多也俗呼為攀睛即其病也還陰救苦湯主之撥雲退翳丸主之梔子勝奇散主之萬應蟬花散主之磨障靈光膏主之消翳復明膏主之朴硝黃連爐甘石泡散主之病多藥不能及者宜治以

手法先用冷水洗如鍼內障眼法以左手按定勿令得動移略施小眉刀尖剔去脂肉復以冷水洗淨仍將前藥餌之此治奇經客邪之法也故并置其經絡病始　七情五賊勞役饑飽之[illegible]　內急外弛之病[illegible]

黃膜上衝　在風輪下際坎位間神膏之內有翳生而色黃如年少人指甲內際白嚴相似與凝脂翳同一氣脈但凝脂翳在輪外生點藥可去者此則在膏內熱蒸起點藥所不能除若漫及瞳神其珠必損不可誤認為涌波可緩者之[illegible]經絡阻塞極甚三焦關格火土邪之盛實者[illegible]大便秘小便澀而熱蒸從膏內作膿潰起之漏也失治者目有擬出之患[illegible]

[illegible]　因起其滯火後甚大大者病急其邪有障色赤多赤脈貫白輪而下也烏珠上半邊近白際起障一片仍有赤絲牽緝障大絲粗赤甚泪澀珠疼頭痛者病急而有變絲細少色微赤珠不疼頭不痛者緩而未變亦有珠雖

不疼頭亦不痛若無他證或只澀赤而生薄障障上仍有細絲牽絆或於障邊絲下仍起星數點此星亦是凝脂之微病也此等皆是火在內滯之患其病尚輕治亦當善蒸恐形之火潛入膏內故作是疾非比有形血熱之重也若障上有絲及星生於絲梢皆是退遲之病為接得絲脈中生氣故易生而難退雖然退遲翳薄絲細赤不甚者只用點藥逐之足矣甚者不得已而開導之大抵白珠上半邊有赤脈生起垂下到烏

珠者不論多寡但有疼痛虬赤便是凶證來了總是絲少赤微但從上而落者退亦遲治當耐久若貫過瞳神者不問麤細聯斷皆退遲此證是濕熱在腦幽隱之火深潛在絡故有此脉之赤內瘀濕熱瘀血其深處亦有積滯絲滯尚深而火尚伏故未甚耳一旦觸發則其患迸發疾亦若大內無瘀滯外無此病輕者消散重者開導此定法也內服久用服外用消金丹點之久服退熱飲消紫雪丹角丸

聚星障 此證為病最急起非一端有變者十有七八在風輪上有點初起如星色白中有㼆如針刺傷後漸長大變為黃色㼆亦漸大為窟者有初起如星色白無㼆後漸大而變色黃始變出㼆者有初起便帶鵝黃色或有㼆或無㼆後漸漸變大者或初起便成一片如障大而厚色白而嫩或色淡黃或有㼆或無㼆而變者或有障又於障內變出一塊如黃脂者或先有痕㼆後變出凝脂一片者所變不一禍則一端大法不問星障但見起時肥浮脆嫩能大而色黃者變而速長者即此證也初起時微小次後漸大甚則為窟為漏為蟹睛內潰精膏外爲枯凸或氣極有聲爆出稠水而破者此皆變證之極總緣肝膽二絡清氣受傷是以變及神膏潰壞雖遲不過旬日損及瞳神若四圍見有瘀滯者因血阻道路清汁不得升運之故若四圍不見瘀赤之甚者其內絡深處必有阻滯之故凡見此證當作急晚夜醫治若遲待長大蔽滿烏珠雖救得珠完亦帶病矣去後珠上必有白障如魚鱗外圍等狀終身不能脫若結在當中則視昏眇凡目病有此證起但是頭疼珠痛二便燥澀即是急之極甚者二便通暢猶亦稍緩有一於斯猶為可畏

久陷 肆十八

外障 四十九

凝脂翳 因火爍絡內膏液蒸傷凝脂從四圍起而漫神珠故風輪皆白或微黃視之與混障相似而嫩者大法其病白輪之際四圍生漫而來漸漸厚闊中間尚青未滿者有犯由尚見只是四圍高了中間低了此此金克木之禍也或有就於睛內下邊起一片

黃膜此二證夾攻尤急亦有上下生起名順逆障內變爲此證者此火土鬱遏之候也亦有不從沿際起只白凝脂翳色黃或不黃初小後大其細條如翳或細顆如星這邊起一箇那邊起一箇四散生將起來後纔長大牽連混合而害目此木火爲祟以上三者必有所滯治當尋其源溯其流輕則清涼之重則開導之若病漫及瞳神不甚厚重者速救亦有挽回之理但終不得如昔之好凡疾已甚雖瞳神隱隱在內亦不

能救其無疾止可救其膏凸而已

蟹睛證 謂眞睛膏損凝脂翳破壞風輪神膏綻出黑顆小則如蟹睛大則如黑豆甚則損及瞳神內視瞳神亦如杏仁棗核狀者極甚則細小無了者有極則青黃膜出者此證與黑翳如珠狀類而治大不同夫黑翳如珠源從膏內生起非若此因破而出故大不同然有虛實二證虛者軟而不疼來遲去速實者堅而多痛來速去遲其視有二其治則一雖有妙手難免瘢痕之患

斑脂翳 其色白中帶黑或帶青或焦黃或微紅或有細細赤脈絆罩有絲絆者則有病發之患以不發病者論大略多者粉青色結在風輪邊傍大則掩及瞳神掩及瞳神者目亦減光雖有神手不能除去治者但可定其不垂不發亦須內外夾治令氣血定久瘢結牢固庶不再發若治欠固或即縱犯則斑迹發出細細水泡時起時隱甚則發出大泡起而不隱又甚則於本處作痛或隨絲生障或觸睛再出矣其病

是蟹睛收回結疤於風輪之側非若瑪瑙內傷因內傷氣血結於外生之證猶有可消之理故治亦不同耳

黃油證 生於氣輪狀如脂而淡黃浮嫩乃金受土之濕熱也不腫不疼目亦不昏故人不求治無他患至老只如此略有目疾發作其證則爲他病之端矣揭開上瞼目上邊氣輪上有黃油者是濕熱從腦而下目必有病又非兩傍可緩之比或有頭風之患然此病爲患又緩治亦容易但不治者恐貽後患故宜預

自保重而夫之癘風目上有此者又重與常人
不同 [illegible] 有翳從上而下貫及瞳神
色赤或黃上尖下大薄而圓長狀如膽懸以此
得名益爲有瘀熱肝膽膏汁有損變證忽來之
候宜行醫治若眼帶細細赤脈紫脹而來者
尤兼頭疼者尤惡內必有滯瘀向四圍尋其滯
而去之免損壞之患 玉粒分經 此證或生
於脾或生於氣輪生於氣輪者金火亢承之證
燥熱爲重生於脾者濕熱爲重由土之燥滯其
形圓小而顆堅淡黃色或白肉色當辨其所生
部分而治之故曰玉粒分經初起不疼治亦易
退亦有輕而自愈者若恣酒色嗜辛熱火毒多
慾恣躁急之人及久而不治因而積久者則變
大而堅堅而疼或變大而低潰色白或淡黃
如爛瘡相似者證尚輕若復不知禁忌且犯戒
者則爛深爛深復至於不戒不治者則變爲漏
矣不可誤認爲粟瘡 銀星獨見 爲珠上有星
獨自生也若連萃而相生相聚者不是星蓋星
不能大大而變者亦不是有虛實自退不退之
證虛實者非指人之氣血而言乃指絡間之火
而言若絡間之虛火客邪因而鬱滯於風輪結
爲星者其火無源不得久滯火退氣散膏清而
星自消若火有源而來氣實壅滯於絡者則水
不清故星結不散其色白圓而顆小浮嫩者易
退易治沉澀堅滑者宜作急治之恐滯久氣定
治雖退而有迹爲冰瑕矣夫星者猶天之有星
由二氣而結其大小亦由積受盛衰之所致無
長大之理故人之患星亦由火在陰分故爲星
星亦不能大若能大者此必是各障之初起也
障猶山之霧隨天地之氣而聚散障因人之激戒
而消長即如凝脂一證初起白顆小而圓嫩儼
然一星不出一二日間漸漸長大因而觸犯遂
致損目若誤認爲星則謬於千里矣亦有凝脂
雖成因無根客火微在膏中作此一點無所觸
犯者於調養水清而退者便謂是星退醫者亦
謂之及早退遂誤認爲星終身執泥不改者誤人

多矣每見世人用愚夫蠢婦執草捻絲剔燈對
目呪咀詭厭謂之結眼間有凝脂水晶銀星虛
火聚開翳障等證偶然而退遂以為功駭羡相
傳盼醫棄藥智者尚蹈其害況愚人乎夫人之
目閉氣血不能清順是故壅滯而生病焉調養
緘護尚恐無及乃反勞掙強視搏此陽光即無
病之目精强力勞者且不能與之敵而況病目
能無損乎雖僥倖目病退者光亦渺茫難醒大凡

見珠上有星一二顆散而各自生過一二日看
之不大者方是若七日而退者火數盡之故若
連萃貫串相生及能大者皆非星也又有一等
愚人看各色障翳亦呼為星者抑又謬之甚矣

聚星障或圓或缺或厚或薄或如雲
似月或數點如星痛則見之不痛則隱聚散不
一來去無時或月數發或年數發乃腦有濕熱
之故痰火人患者多久而不治方始生定因而
觸犯者有之竊恐生成不退各隨所發形證而驗
之[illegible]

上有細顆或白色或微黃微黃者急有變[illegible]
聯綴或圓聚或散漫或一同生起或先後逐漸
一而二二而三三而四四而六七八十數餘如
此生起者初起者易治生定者退遲能大者有
變[illegible]生大而作一塊者有凝脂之變聯綴四
散傍風輪白際而起變大而接連者花翳白陷
也若兼赤脉爬絡者退遲若星翳生於絲盡頭
者亦退遲進速且有變證搜衍脉絡生氣之故
此證大抵多由痰火之患能保養者庶幾斷喪
犯戒者變證生焉[illegible]

垂簾障生於風輪
從上邊而下不論厚薄但在外色白者方是若
紅赤乃變證非本病也有初起水府不清而便
成此者有起先赤色火退後滑濇結為此者因
其自上而下如簾之垂故得此名有證數般相
似緩急不同治亦各異不可誤認混呼而誤人
一努肉初生亦在風輪上邊起但色如肉且橫
厚不同一偃月侵睛亦在上邊起是氣輪膜內
垂下白色而薄與此在外有形者不同一赤膜

下垂因瘀滯火實之急者不同此則只是白障漫漫生下來而為混障者間有紅亦是畧畧微紅而已因其觸犯搏動其火方有變證其病從上而下本當言順何以逆稱蓋指火而言火本炎上今反下垂是其逆矣

湧波翳

障從輪外自下而上故曰湧波非黃膜上衝從內向上之急甚者可比白者緩而不變亦者急而有變亦有激犯變發他證者就於此障之內變出黃膜治宜先去上衝後治此證則為無一失矣

外障　五十六

赤絲亂脈

色赤而障及絲脈赤亂縱橫上下兩邊往來若是色白而不變者乃是治後凝定非本證生來如是治亦不同若色浮嫩能大或微黃色者又不是此證乃花翳白陷也凡見風輪際處由白珠而來無數麤細不等赤脈周圍圈圓侵入黑睛黑睛上障起昏澀者即此證必有瘀滯在內蓋滯於左則從左而來滯於右則從右而來諸絡皆有所滯則四圍而來[illegible]不赤痛珠雖不脹痛亦有瘀滯於內不可輕視若傷於膏水則有翳嫩白大而變為花翳白陷若燥澀甚者則下起一片變為黃膜上衝之證若頭疼珠痛脹急者病又重而急矣

陰陽翳

珠上生二翳俱白色一中虛一中實兩翳聯串如陰陽之圖若白中畧帶焦黃色或純白而光滑沉澀者皆不能去盡若有細細赤絲絆者退尤遲大抵此證非心堅耐久不能得其効也

瑪瑙內傷證

其障薄而不厚圓斜不等其色昏白而帶焦黃或帶微

外障　五十七

微紅色但如瑪瑙之雜者是雖生在輪外實是內傷肝膽真氣清液受傷結成此翳最不能治亦或先有重病退後結成者久久耐心醫治方得減薄若要除淨須華陀更生可也

連珠外翳

與聚星似是而非蓋聚星在可治之時而色亦不同此則凝定之證形色沉滑堅澀等狀雖有妙手久治亦難免跡滯如冰瑕之患也

劍脊翳

亦名橫翳色白或如糙米色者或帶微微紅色者但狀如劍脊中間畧高兩邊薄

此積於風輪之外者即此證也厚薄不等厚者雖露上下風輪而瞳神被掩視亦不見薄者瞳神終是被掩視亦昏眊較之重者稍明耳縱色嫩根浮者亦有瘢痕若滑澀根深沉者雖有妙手堅心止可減半若微微紅絲罩絆者尤為難退易來以上不論厚薄非常之歲月必無功耳

七寶散　皂角丸　生熟地黃丸

冰瑕翳證 薄薄隱隱或片或點生於風輪之上其色光白而甚薄如冰上之瑕若在瞳神傍側者視亦不礙光華若掩及

外障　五十八

瞳神者人有其病不覺自視昏眊渺茫其狀類外圓翳但甚薄而不圓又似白障之始但經久而不長大凡風輪有痕厭者點服不久不曾補得水清膏足及凝脂聚星等證初發點服不曾去得盡絕并點片腦過多障跡反去不得盡而金氣水液凝滯者皆為此證大抵雖治不能速去纔新患者必用堅守確攻久而方退若滑澀沉深及久者雖極治亦難盡去

圓翳外障 [illegible]其色白大小不等厚薄不同薄者最多間有厚者亦非堆積之厚比薄者稍厚耳十有九掩瞳神亦名遮睛障病最難治為尤滑深沉之故有陰陽二證之別陰者明處看則不見黑暗處看則明亮而大陽者暗處看則昏明處看則明大然雖有陰陽驗病之別而治則同雖堅心久治亦難免終身之患

冰翳內障 色白如水晶清瑩見內但高厚滿珠看雖易治得效最遲瘀雖清而滑根深氣結故也乃初起膏傷時內服寒涼太過外點冰片太多致

內障　五十九

精液凝滯結為此病非比白混障之浮嫩可治也當識別之庶無外誤其名有三曰水晶曰玉翳浮滿曰水輪如冰凍之堅若傍斜細看則自透[illegible]瞳內陰處與日中看其形一同治雖略減難免終身之患

[illegible] 色雖白澀而不光亮狀帶欹斜故號魚鱗乃氣結膏凝不能除絕皆如凝脂瘡及大片病已甚不得已大用寒涼及冰片多點者往往結為此也

[illegible] 煩勞傷人[illegible]發代內外藥治皆同但勞

肉有不用割而治愈故曰小異也亦有足努肉
先起後變爲垂其狀兩頭尖薄中間高厚肉紅
色若馬蝗狀橫卧於中四匝有薄薄肉油紫赤
筋脈凹遶乃血分之病久久方成最不易治且
難去而易來風疾人每多患此治之必先用鈎
割十去五六方用殺伐之藥則有功不割則藥
力不敵病勢徒費其力然割須用烙其根處不
爾則割去暴生枉受痛楚多則有激邪之禍變
證出焉外雖劫治内須平治不然外雖平而内

必發徒勞無功此狀乃橫條非若努攀漫積之
謂也 [illegible] 多起上輪有膜如肉或如黃油
至後漸漸厚而長積赤瘀努起如肉或赤如硃
凡性燥暴悖恣嗜辛熱之人患此者多久則漫
珠積肉侵亦不見治宜殺伐久久自愈積而無
瘀其患輪及珠尚薄者皆不必用鈎割之治一
片努肉攀睛或先赤爛多年肝經爲風所衝而
成或用力作勞有傷肝氣而得或痒或痛自兩
眥頭努出心氣不寧憂慮不已遂乃攀睛或起

筋膜宜服洗刀散及二黃散定心丸 [illegible]
由眥而起貫過氣輪如皮似筋橫帶至於風輪
光亦不損甚則掩及瞳神方礙瞻視大抵十之
八九皆由大眥而起有赤白二證赤者血分白
者氣分其原在心肺二經初起如薄薄黃脂或
赤脈數條後漸漸大而厚赤者少白者多雖赤
者亦是白者所致蓋先有白而不忌火毒辛熱
故傷血而赤非血分之本病也治赤雖退其質
不退必須殺伐殺伐之治雖不見形勢之惡久

而且痛功亦遲緩不若一割即去烙之免其再
發大抵眼科鈎割一法唯此患最爲得効 [illegible]
[illegible] 二證形色相類經絡相同治亦一法故
總而言之非二病同生之謂也其狀色紫如肉
形類雞冠蜆肉者即是多生脾眥之間然後害
及氣輪而遮掩於目治者須用割治七八後用
殺伐不然雖徒費功若割亦用烙定方好其目
大眥内有紅肉一堆如雞冠蜆肉者乃心經血
部之英華若誤割者輕則目盲重則喪命愼之

抽風湯　决明散　**魚子石榴**二證經絡同治法亦同故
總而言之亦非二病同生魚子障非聚星之比
又非玉粒之比其狀生肉一片外面纍纍顆顆
叢生於目或淡紅色或淡黃色或肉色石榴狀
如榴子綻露於房其病紅肉顆或四或六或八
四角生來障滿神珠視亦不見已上二章俱是
血部瘀實之病目疾惡症治用割劆後見三光
者方可伐治二光瞑黒者内必瞳神有損不必
治也　**輪上一顆如赤豆證**氣輪有赤脉灌注

直落風輪風輪上有顆積起色紅初如赤小豆
次後積大專為内有瘀血之故急宜開導血漸
通顆亦漸消病到此十有九損若白珠上獨自
有顆鮮紅者亦是瘀滯上下無絲脉接貫者只
用點服自消若有貫接者必絡中有血灌來宜
向所來之處尋看其輕重而導之若白輪有
紅顆而脹急澀痛者有變而急痛連内而根深
接内者火瘡也又非此比若白珠雖有紅顆而
珠不疼雖疼不甚者病輕治亦易退善消可矣

[illegible]銀星證白點一顆如星光滑當
睛中蒼定顆久不大不小傍視瞳神在内只是
小些其視光華亦損乃目痛時不忌房事及服
滲泄下焦寒凉之藥過多火雖退而腎絡氣滯
膏凝結為此病雖服不退點亦不除終身之患
也　**五花障證**生於神珠之上斑斑雜雜蓋五
臟經絡間之氣俱傷結為此疾其色或白或糙
米色或肉色中帶焦黄微紅藍碧等色斑爛駁
雜不一若中有一點黒色者乃腎絡氣見雖治

不能盡去此狀與斑脂翳瑪瑙内傷形畧相似
斑脂翳乃破而結成瘢痕不能去者瑪瑙内傷
乃小而薄未掩瞳神之輕者此則高厚顯大生
在膏外可退故不同耳　**混障證**謂漫珠皆一
色之障也患之者最多有赤白二證赤者易治
於白者赤者怕赤脉外爬白者畏光滑如苔有
此二樣犂帶者必難退而易發若先因別證而
成混障則障大而原病見矣若無別證到底只
是一色者若混障因而犯禁觸發者則變證出

先治變證後治本病　一云混睛證白睛先赤而後痒痛迎風有淚閉澀難開或時無事不久亦發年深則睛變成碧色滿目如凝脂赤路如橫赤絲此乃風積熱宜服地黃散外點七寶膏

驚振外障　目被物撞觸而結爲外障也與傷在膏上急者不同初撞目時亦有珠疼澀脹之苦爲其傷輕而瘀自潛消故痛雖止而不戒禁有所觸發其火致水不清氣滯絡澀而生外障有撞雖輕反不知害有所觸犯遂爲外障者有撞重不戒反觸而變爲凶疾者凡外障結而珠疼頭痛及腫脹者皆是惡證防變急宜治之石決明散 [illegible]

黑翳如珠證　非蟹睛木疳之比木疳是大者生則瞳損不可治此則至大方損珠後損瞳神也又非蟹睛因破流出之比此肝氣有餘欲泛起之患故從風輪際處發起黑泡如珠子圓而細或一或二或三四五六多寡不一其證火實盛者痛虛緩者不痛治亦易平若長大則有裂目之患宜服瀉肝散羊角散後服補腎丸

[illegible]生於風輪者多其色藍綠青碧有虛實二證虛者大而昏花實者小而痛澀非比蟹睛因破而出乃自然生出者大小不一亦隨其變長也

內障　在睛裏昏暗與不患之眼相似唯瞳神裏有隱隱青白者無隱隱青白者亦有之　夫全書云內障先患一目次第相引兩目俱損者皆有翳在黑睛內遮瞳子而然今詳通黑睛之脉者目系也目系屬足厥陰足太陽手少陰三經蓋此三經臟府中虛則邪乘虛入經中鬱結從目系入黑睛內爲翳龍木論所謂腦脂流下作翳者即足太陽之邪也所謂肝氣衝上成翳者即足厥陰之邪也故治法以針言之則當取三經之腧穴如天柱風府太衝通里等穴是也其有手巧心審諦者能用針於黑眼裏撥其翳爲效尤捷也以藥言之則當補中疏通此三經之鬱結使邪不入目系而愈　飲食不節勞傷形體脾胃不足內障眼病宜人參補胃湯益氣聰明湯圓明內障升麻湯復明散與云右四方

治目不明皆氣虛而未脫故可與參芪中微加
連檗若氣既脫則黃檗等涼劑不可施經云陽
氣者煩勞則張精絕目盲不可以視耳閉不可
以聽之類是其證也　內障右眼小眥青白翳
大眥亦微顯白翳腦痛瞳子散大上熱惡熱大
便澀或時難小便如常遇熱煖處頭疼睛脹能
食日沒後天陰暗則昏此證可服滋陰地黃丸
翳在大眥加升麻葛根翳在小眥加柴胡羌活
　東垣云肝木旺則火之勝無所畏懼而妄行

也故脾胃先受之或病目而生內障者脾裹血
胃主血心主脈脈者血之府也或曰心主血又
曰脈主血肝之竅開於目也[illegible]是也
　倪仲賢論陰弱不能配陽之病曰五臟無偏
勝虛陽無補法六府有調候弱陰有強理心肝
脾肺腎各有所滋生一臟或有餘四臟俱不足
此五臟無偏勝也或浮或為散是曰陽無根益
之欲令實翻致不能禁此虛陽無補法也膀胱
大小腸三焦膽包絡俾之各有主平秘永不危

此六府有調候也衰弱不能濟遂使陽無禦反
而欲匹之要以方術盛此弱陰有強理也解精
微論曰心者五臟之專精目者其竅也又為肝
之竅腎主骨骨之精為神水故肝木不平內挾
心火為勢妄行火炎不制神水受傷上為內障
此五臟病也勞役過多心不行事相火代之五
臟生成論曰諸脈皆屬於目相火者心包絡也
主百脈上榮於目火盛則百脈沸騰上為內障
此虛陽病也膀胱小腸三焦膽脈俱循於目其

精氣亦皆上注而為目之精精之窠為眼四府
一衰則精氣盡敗邪火乘之上為內障此六府
病也神水黑眼皆法於陰白眼赤脈皆法於陽
陰齊陽侔故能為視陰微不立陽盛即淫陰陽
應象大論曰壯火食氣壯火散氣上為內障此
弱陰病也其病初起時視覺微昏常見空中有
黑花神水淡綠色次則視歧睹一成二神水淡
白色可為冲和養胃湯主之益氣聰明湯主之
千金磁朱丸主之石斛夜光丸主之有熱者瀉

熱貴遲濁上之久則不視瞳神水純白色永爲廢
疾也然廢疾亦有治法先令病者以冷水洗眼
如冰氣血不得流行爲度用左手大指次指按
定眼珠不令轉動次用右手持鵰鵞翎針去黑睛
如米許針之令入白睛甚厚欲入甚難必要手
準力[illegible]針入則破然後斜回針首以針刀刮之
障落則[illegible]有落而復起者起則重刮刮之有至
再三者皆爲洗不甚冷氣血不凝故也障落之
後以綿裹黑豆數粒令如杏核樣使病目垂閉

覆眼皮上用軟帛縛之睛珠不得動移爲度如
是[illegible]開視視勿勞也亦須服上藥庶
幾[illegible]法治者五六不治者亦四五五藏之
病[illegible]六腑之病翳陰之病[illegible]者皆爲陰
翳[illegible]者慎之 [illegible] 視瞳
神[illegible]家如[illegible]也然自視尚
見[illegible]中睛光[illegible]門進急宜治之免變
綠[illegible]光沒矣陰虛血少之人
及[illegible]心用意太過者每有此患

然無頭風痰氣夾攻者則無此患病至此亦危
矣不知其危而不急救者盲在旦夕耳[illegible]
[illegible]石決明丸
[illegible] 瞳神
氣色[illegible]不清其色如黃雲之籠罩瞳神似藍靛
之色[illegible]風變重之證久則變爲黃風雖
曰[illegible]由痰濕所攻火鬱憂思忿怒之
過若[illegible]攻熱蒸先散瞳神而後綠後黃前
後[illegible]頭痛者乃痰濕攻傷真氣神膏耗澀是
以色[illegible]久變則熱勝熱勝則肝木之風邪

起[illegible]大凡病到綠風危矣十有
九不能治也[illegible]此病初患則頭旋兩額角相
[illegible]入[illegible]或時紅白花起或先左而
後右或先右而後左或兩眼同發[illegible]
之病[illegible]受熱則先左肺受熱則先右肝肺同病
則齊發[illegible]服[illegible]散
[illegible]綠風[illegible]則黑花起乃腎受風
邪[illegible]腎[illegible]附子[illegible]還
睛散 [illegible] 瞳神已大而色昏濁爲黃

也病至此十無一人可救者

銀風內障　瞳神大成一片雪白如銀其病頭風痰火人偏於氣忿怒鬱不得舒而傷真氣此乃痼疾恐金丹不能爲之返光矣

絲風內障　視瞳神內隱隱然若有一絲橫經或斜經於內自視全物亦有如碎路者乃絡爲風攻鬱其真氣玄府有一絲之遏故視亦光華有損久而不治則變重爲內證之篤矣

烏風內障　色昏濁暈滯氣如暮雨中之濃煙重霧風痰人嗜欲太多敗血傷精腎絡損膽汁虧真氣耗而神光墜矣

偃月內障　瞳神內上半邊有隱隱白氣一灣如新月覆垂向下也乃內障欲成之候成則爲如銀[illegible]滿人及腦有風寒不足陰氣怫鬱者與仰月侵睛在輪膜中來綴者不同

仰月內障　瞳神下半邊有白氣隱隱一灣如新月仰而從下生上也久而變滿爲如銀內障乃下不足不失培養命及有餘故精液衰而元氣[illegible]而爲病也

如銀內障　瞳神中白色如銀也輕則一點白亮如星似片重則瞳神皆雪白而圓亮圓亮者一名圓翳內障有仰月偃月之變[illegible]有一點從中起[illegible]漸之久不見者乃[illegible]滯傷乎太和清純之元氣故陽光精液[illegible]而不得發見亦有濕冷在腦[illegible]元精損鬱閉其光非銀風內障已散大而不可復收之比年未過六十及過六十而血氣未衰者撥治之猶有復明之理

如金內障　瞳神不大不小只是黃而明瑩乃是元氣傷滯所成因而痰濕陰火攻激故色變易[illegible]人不可撥者

綠風內障　瞳神[illegible]與久之專精濕視乃見其深處隱隱[illegible]昏眼病其始[illegible]深綠而變[illegible]痰火濕熱害及於清純太和之元[illegible]久而不治及有觸犯者爲如金青盲等證[illegible]及日映紅光[illegible]有瞳神有綠色而彼自[illegible]不[illegible]看乃紅光爍於瞳神照映黑紅相射而光映爲[illegible]之故非綠色自生之謂及春夏[illegible]

神亦覺色微微綠瑩者乃肝膽清純之正氣而視亦不昏不可誤認爲此但覺昏眇而瞳神綠色明處暗處有之皆一般氣濁不清者是此證也

[illegible]謂人自見目外有如蠅蛇旗旆蛱蝶絲環等狀之物色或青黑粉白微黃者在眼外空中飛揚撩亂仰視則上俯視則下也乃玄府有傷絡間精液耗澀鬱滯清純之氣而爲內障之證其原皆屬膽腎黑者膽腎自病白者因痰火傷肺金之清純不足黃者脾胃清純之氣有傷其絡益瞳神乃先天元陽之所主禀聚五臟之精華因其內損而見其狀虛弱不足人及經產去血太多而悲哭太過深思積忿者每有此病小兒癖證熱證瘧疾傷寒日久及目病久閉蒸傷精液清純之氣亦有此患幼而無知至長始曉氣絡已定治亦不愈今人但見此證謂曰鬼神見像反泥於禳禱而不求內治他日病愈盛而狀愈多害成而不可救矣

[illegible]目前生一點開目中見之差小陰處見之則大或明或暗視物不明醫者不曉以冷藥治之轉見黑花此因肝腎俱虛而得也宜服皂角丸合生熟地黃丸及補肺散補腎丸鎮肝丸虎精丸聚寶丸化毒丸青金丹捲雲膏

[illegible]如水裹蟹睛傍觀目透於瞳神內陰處及日中看之其形一同疼而淚出此因膽氣盛遂使攻於肝而得之宜服七寶丸皂角丸合生熟地黃丸通肝散羚羊肝丸瀉肝丸分珠散

[illegible]有如水銀珠子但微含黃色不疼不痛無淚遮滿瞳神宜服皂角丸生熟地黃丸還睛丸[illegible]通肝

[illegible]微如赤色或聚或散或傍微光瞳神上如凝脂色時復澀痛而無淚出宜服皂角丸生熟地黃丸

[illegible]形如蟹睛黑或瞼下起粟子而爛日夜痛楚瞳中或淚常下熱淚宜服皂角丸生熟地黃丸入來[illegible]

[illegible]上如米光白色環遶瞳神初生目小背頭至[illegible]不痒不痛無血色相潮宜服皂角丸

合生熟地黃丸（皆脚湯　細辛散　川芎散　七寶散　白蒺藜）

沉翳內障證　白藏在黑水下向日細視方見其白或兩眼相傳疼痛則早輕夜重間或出淚宜服皂角丸及生熟地黃丸（靈寶丹　羊肝丸　撥雲丹　[illegible]散　[illegible]散）

右白圓翳以下七證雖有治法終難奏功唯金針撥之為善

偃月侵睛證　風輪上半邊氣輪交際從白膜內隱隱白片薄薄蓋向下來其色粉青乃非內非外從膜中而來者初不以為意久之始下風輪而損光或沿徧風輪周

匝而為棗花為害最遲人每忽之常中其患乃腦有風濕久滯鬱中微火攻擊腦油滴下親火嗜燥好酒暴怒激走其鬱者為變亦急凡髮經水不待乾而濕蒸及痰火人好煤膩濕熱物者皆有此患（[illegible]）

[illegible]證　其薄而白起於風輪周匝從白膜之內四圍環布而來也凡性躁暴及患痰火竭視勞瞻耽酒嗜辣傷水濕熱之人多罹此患久則始有目急乾澀昏花不爽之病犯而不戒甚則有瞳神細小內障等變或

因人觸激火入血分淚而赤痛者亦在變證之例雖有棗花鋸齒之說實無正形又有二十四枚四十枚之數有無一二不必拘拘泥於此說凡見白[illegible]從白膜四圍圈圓而來即是此證若白而嫩在風輪外四圍生起珠赤痛者是花翳白陷不可誤認為此一云此症周圍如鋸齒四五枚相合赤色刺痛如針視物如煙晝輕夜重則痛淚迎風有淚昏暗不見宜皂角丸生熟地黃丸（[illegible]湯　[illegible]散）

白翳黃心證　四邊皆

白中心一點黃大小背頭微赤時下澀淚團圓在黑珠上乃肝肺相傳停留風熱宜服[illegible]散及皂角丸合生熟地黃丸

黑花翳證　其狀青色大小皆[illegible]澀痛頻頻下淚口苦不喜飲食蓋膽受風寒宜涼膽丸還精丸四物湯[illegible]寶丸青金散[illegible]生熟地黃丸

[illegible]證　其人[illegible]人結白顏色相間却無淚[illegible]目中如坐暗室常自憂歎[illegible]丸合生熟地黃丸　龍木論

內障根源歌不疼不痛漸昏濛薄霧輕煙漸漸濃或見花飛蠅亂出或如絲絮在虛空此般狀樣因何得肝藏停留熱與風大叫大啼驚與恐腦脂流入黑睛中初時一眼先昏暗次第相牽與一同苦口何須陳逆耳只緣肝氣不相通此時服藥宜銷定將息多乖即沒功日久既應全黑暗時名內障障雙瞳名字隨形分十六龍師聖者會推窮靈藥雖投難得效金針一撥日當空強修將息依前說莫遣依前病復蹤

針內障眼法歌內障由來十六般學醫人子審須看分明一一知形狀下針方可得安然若將針法同圓翳[illegible]損[illegible]光取瘥難冷熱光明虛與實調和四體待令安不然氣悶違將息嘔逆勞神翳却翻咳嗽[illegible]頭皆不得多驚先服鎮心丸若求[illegible]用意臨時體候看老翳細針初復嫩[illegible]不可一般般病虛新產懷娠月下手纔知將息難不雨不風兼皓月清齋三日在針前安心定意行醫道念佛親姻莫雜喧患者向明盤膝坐提撕腰帶得心安針者但行賢聖路[illegible]隱之情實若緣有血莫驚須住手裹封如舊[illegible]開看忽然驚[illegible]下服藥三何見朗然七日解封雖見日花生[illegible]莫他言還睛丸散堅心服百日[illegible]

針內障後法歌內障金針針了時醫師尤要深知綿包黑豆如毬子眼上安排日繫之[illegible]須安穩仰臥三朝莫厭遲封後忽然[illegible]有痛腦風牽動莫他疑或針或絡依[illegible]仍將火熨之[illegible]吐白[illegible]

咽汁吐來[illegible]從伊起則恐因遭努損睛然稀有此須[illegible]溫食[illegible]鬧事不宜大小便時須緩緩無令自起與扶持高聲叫喚[illegible]後驚動睛輪見雪飛如此志心三十日漸行出入恐難知狂心莫憶陰陽事夫婦分牀百日間[illegible]月不須臨水面針痕濕著痛微微五[illegible]周年[illegible]服藥中除病本來　右龍木論

[illegible]人法[illegible]按其法初患眼內障之時其[illegible]不疼不癢頭不旋不痛而翳狀已結

成者宜金針撥去其翳如撥雲見日而光明也 [illegible]

今具其畧於後　開內障圖

圓翳 [illegible]　澀翳 [illegible]

浮翳 [illegible]　横翳 [illegible]

[illegible]宜針[illegible]向後[illegible]其眼痛澀頭旋額痛 [illegible]

翳狀[illegible]冰翳 [illegible]有頭旋額痛者宜針輕撥之

初患[illegible]瞳[illegible]先患一眼向後翳如水凍[illegible]宜於所[illegible]經

[illegible]針[illegible]其[illegible]不宜[illegible]撥

宜針撥[illegible]

偃月翳 [illegible]旋額痛[illegible]一

一曰次第[illegible]　棗花翳 [illegible]

旋[illegible]眼[illegible]如[illegible]

黒水凝翳 [illegible]

針[illegible]撥之

其[illegible]散翳 [illegible]

驚振翳 [illegible]入眼

[illegible]雖不痛不

癢其翳黄色紅色者不宜針撥撥翳狀破散者不

宜針撥中心濃重者不宜針撥撥之不動者曰

死翳忌撥獨白翳黄心宜先服藥後針之若無

翳者名曰風赤不宜針　白翳黄心 翳四邊白中心黄者

[illegible]用金針[illegible]　烏風 [illegible]

肝風 [illegible]

五風綠 [illegible]

風 [illegible]　[illegible]風 [illegible]

[illegible]風綾 [illegible]

[illegible]東垣云凡心包絡之脉出於心中

代心君行事也與少陽爲表裏瞳子散大者少

陰心之脉挾目系厥陰肝之脉連目系心主火

肝主木此木火之勢盛也其味則宜苦宜酸宜

涼大忌辛辣熱物是瀉木火之邪也飲食中常

知此理可也以諸辛主散熱則助火故不可食

諸酸主收心氣瀉木火也諸苦瀉火熱則益水

也尤忌食冷水大寒之物此物能損胃氣胃氣

不行則元氣不生元氣不生緣胃氣下陷胸中

三焦之火及心火乘於肺上入胸灼髓火主散溢瞳子之散大者以此大熱之物直助火邪尤爲不可食也藥中去茺蔚子以味辛及主益肝是助火也故去之加黄芩半兩黄連三錢黄連瀉中焦之火黄芩瀉上焦肺火以酒洗之乃寒因熱用也亦不可用青葙子爲助陽火也更加五味子三錢以收瞳神之散大也且火之與氣勢不兩立故經曰壯火食氣氣食少火少火生氣壯火散氣諸酸物能助元氣孫眞人曰五月

常服五味子助五藏氣以補西方肺金又經云以酸補之以辛瀉之則辛瀉氣明矣或曰藥中有黄連其味亦辛甘而不去何也此一味辛甘者以其和血之聖藥也況有甘味又欲以爲鄉導爲諸藥之使故不去也熟地黄丸　瞳神散大凡風輪反爲窄窄一周甚則一周如線者乃邪熱鬱蒸風濕攻擊以致神膏游走散壞若初起即收可復緩則氣定膏散不復收斂未起內障顏色而止是散大者直收瞳神瞳神收而光

自生矣散大而有內障起者於收瞳神藥內漸加攻內障藥治之多用攻內障發藥攻動真氣瞳神難收病既急者以收瞳神爲先瞳神但得收復目即有生意有何內障或藥或針庶無失收瞳神之悔若只攻內障不收瞳神瞳神愈散而內障不退緩而疑不決治者二證皆氣定而不復治終身疾矣大抵瞳神散大十有七八皆因頭風痛攻之害雖有傷寒瘧疾痰濕氣怒憂思經産敗血等久鬱熱邪火證而蒸傷膽中所包精汁虧耗不能滋養目中神膏故精液散走

而光華失皆水中隱伏之火發夫水不足不能制火火愈勝陰精愈虧故清純太和之氣皆乖亂况頭風而精液隨之走散矣凡頭風攻散者又當收如他證若傷寒瘧疾痰火等熱證炎上火熱邪蒸散瞳神內障來直而收亦易斂若風攻則內膏頓然直難收斂而光亦損耳保命

[illegible]

倪仲賢論強陽摶實陰之病曰強

者盛而有力也實者堅而內充也故有力者強而欲搏內充者實而自收是以陰陽無兩強亦無兩實惟強與實以偏則病內搏於身上見於虛竅也足少陰腎爲水腎之精上爲神水手厥陰心包絡爲相火火強搏水水實而自收其病神水緊小漸小而又小積漸至如菜子許又有神水外圍相類蟲蝕者然皆能睹而不昏但微覺眊矂羞澀耳是皆陽氣強盛而搏陰陰氣堅實而有禦雖受所搏終止於邊鄙皮膚也內無

所傷動治法當抑陽緩陰則愈以其強耶故可抑以其實耶惟可緩而弗宜助助之則反勝抑陽酒連散主之大抵強者則不易入故以酒爲之導引欲其氣味投合入則可展其長此反治也還陰救苦湯主之然相火藥也亦宜用搐鼻碧雲散　秘要云瞳子漸漸細小如簪脚甚則小如針視尚有光早治可以挽住復故則難退者因恣色之故雖病目亦不忌淫欲及勞傷血氣思索心意所致亦經俱傷元氣衰弱不能升

運精汁以滋於膽膽中三合之精有虧則所輸亦乏故膽中之精亦日漸耗損甚則陷沒俱無而終身疾矣亦有頭風熱證攻走蒸乾精液而細小者皆宜乘初早救以免瞳神之悔也

瞳神欹側　此症謂瞳神歪斜不正或如杏仁棗核三角半月也乃腎膽神膏損耗瞳神將盡矣若風輪破一邊而流凝收瞳神欹側者膏外必有瘢痕在風輪之際中而瞳神不得復圓外亦結有瘢痕終身不脫若輪外別無形證而瞳神欹

側者必因內傷腎水肝血膽汁之化源故膏液日耗而瞳神欲沒甚爲可畏宜急治之雖難復圓亦可挽住而免陰盡無光之患

目昏　運氣目昏有四　一曰風熱經云少陰司天之政風熱參布雲物沸騰太陰橫流寒乃時至往復之作民病聾瞑此風熱參布目昏也　二曰熱經云少陰在泉熱淫所勝病目瞑治以鹹寒此熱勝目昏也　三曰風經云歲水不及濕乃大行復則大風暴發目視䀮䀮此風

勝目昏也　四曰燥經云陽明司天燥淫所勝
目昧眥傷治以苦熱是也　經云肝虚則目䀮
䀮無所見耳無所聞善恐如人將捕之狀
海藏云目瞑肝氣不治也鎮肝明目羊肝丸補
肝散養肝丸　簡學士云素問曰久視傷血血
主肝故勤書則傷肝主目昏肝傷則自生風熱
氣上騰致目昏亦不可專服補藥但服益血鎮
肝明目藥自愈　經云膽移熱於腦則辛頞鼻
淵傳爲衄衊瞑目千金方用牛膽浸槐子陰乾

百日食後每日吞一枚可以治之　經云腎足
少陰之脉是動則病坐而欲起目䀮䀮如無所
見又云少陰所謂起則目䀮䀮無所見者陰内
奪故目䀮䀮無所見也此蓋房勞目昏也左腎
陰虛益本滋腎丸六味地黄丸右腎陽虛補腎
丸八味地黄丸　劉河間云目眛不明熱也然
玄府者無物不有人之藏府皮毛肌肉筋膜骨
髓爪牙至於世之萬物盡皆有之乃氣出入升
降之道路門戸也人之眼耳鼻舌身意神識能

爲用者皆升降出入之通利也有所閉塞者不
能爲用也若目無所見耳無所聞鼻不聞臭舌
不知味筋痿骨痺爪退齒腐毛髮墮落皮膚不
仁腸胃不能滲泄者悉由熱氣怫鬱玄府閉密
而致氣液血脉榮衛精神不能升降出入故也
各隨鬱結微甚而爲病之重輕故知熱鬱於目
則無所見也故目微昏者至近則轉難辨物由
目之玄府閉小如隔簾視物之象也或視如蠅
翼者玄府有所閉合者也或目昏而見黑花者

由熱氣甚而發之於目亢則害承乃制而反出
其泣液氣液眯之以其至近故雖微而亦見如
黑花也　要全書曰誠哉河間斯言也目盲耳
聾鼻不聞臭舌不知味手足不能運用者皆由
其玄府閉塞而神氣出入升降之道路不通利
故也先賢治目昏花如羊肝丸用羊肝引黃連等
藥入肝解肝中諸鬱蓋肝主目肝中鬱解則目
之玄府通利而明矣故黃連之類解鬱熱也椒
目之類解濕鬱也茺蔚之類解氣鬱也芎歸之

類解血鬱也木賊之類解積鬱也羌活之類解經鬱也磁石之類解頭目鬱墜邪氣使下降也蔓荊下氣通中理亦同也凡此諸劑皆治氣血鬱結目昏之法而河間之言信不誣矣至於東垣又以目昏用參芪補血氣亦能明者又必有說也蓋目主氣血盛則玄府得利出入升降而明虛則玄府無以出入升降而昏此則必用參芪四物等劑助氣血運行而明也　倪仲賢論氣為怒傷散而不聚之病曰氣陽物類天之雲霧性本動聚其體也聚為陰是陽中之陰乃離中有水之象陽外陰內故聚也純陽故不聚也不聚則散散則經絡不收經曰足陽明胃之脉常多氣多血又曰足陽明胃之脉常生氣生血七情內傷脾胃先病怒七情之一也胃病脾病氣亦病焉陰陽應象大論曰足厥陰肝主目在志為怒怒甚傷肝傷脾胃則氣不聚傷肝則神水散何則神水亦氣聚也其病無腫痛痒羞明眼澀之證初但昏如霧露中行漸空中

有黑花又漸睹物成二體久則光不收遂為廢疾蓋其神水漸散而又散終而盡散故也初漸之次宜以千金磁硃丸主之鎮墜藥也石斛夜光丸主之羨補藥也益陰腎氣丸主之壯水藥也有熱者滋陰地黃丸主之此病最難治餌服上藥必要積以歲月必要無饑飽勞役必要驅七情五賊必要德性純粹庶幾易効不然必無效病終不復治久病光不收者亦不復治一證因為暴怒神水隨散光遂不收都無初漸之次此一得永不復治之證也又一證為物所擊神水散如暴怒之證亦不復治俗名為青盲者是也世病者多不為審察曰目昏無傷始不經意及成世醫亦不識直曰熱致竟以涼藥投殊不知涼藥又傷胃況涼為秋為金肝為春為木又傷肝矣往往致廢而後已病者不悟藥之過猶委之曰命也醫者亦不自悟而曰病拙悲夫
[illegible]目內外別無證候但自視昏眇蒙昧不清也有神勞有血少有元氣弱有元精

虧而昏眇者致害不一若人年五十以外而昏者雖治不復光明蓋時猶月之過望天真日衰自然日漸光謝不知一元還返之道雖有妙藥不能挽回故曰不復愈矣此專言平人視昏非因目病昏眇之比各有其因又當分別凡目病外障而昏者由障遮之故欲成內障而昏者細視瞳內亦有氣色若有障治愈後昏眇者因障遮久滯澀其氣故光隱耗當培其本而光自發有目病漸發漸生痛損經絡血液澀少故光華

虧耗而昏有因目病治失其中寒熱過傷及開導針烙炮炙失當而失中傷其血氣耗其光華而昏者已上皆宜培養根本乘其初時而治之久則氣脉定雖治不愈若目在痛時而昏者此因氣塞火壅絡不和暢而光澀礙之煙不得透火反不明如目暴痛愈後尚昏者血未充足氣未和暢也宜謹慎保養以免後患若目病愈久而昏眇不醒者必因六欲七情五味四氣瞻視哭泣等故有傷目中氣血精液脉絡也早宜調治久則雖治亦不愈矣若人年未五十目又無痛赤內障之病及斵喪精元之過而視昏眇無精彩者其人不壽凡人年在富盛而多喪真損元竭視苦思勞形縱味久患頭風素多哭泣婦女經產損血皆目內外別無證候只是昏眊月復月而年復年非青盲則內障來矣

[illegible]風輪黃亮如金色而視亦昏眇為濕熱[illegible]重而濁氣熏蒸清陽之氣升入輪中故輪亦色易好酒嗜食濕熱燥膩之人每有此疾與視瞻

昏眇證本病不同

[illegible]目自覺乾澀不爽利而視物昏花也乃勞瞻竭視過慮多思耽酒恣燥之人不忌房事致傷神水目上必有證如細細赤脉及不潤澤等病在爲合眼養光良久則得潤澤而潤開則明爽可見水少之故若不戒謹保養甚則有傷神水而枯澀之變生矣治當滋陰養水略帶抑火以培其本本正則清純之氣和而化生之水潤若誤認火實用尅泄之治者則有緊縮細小之患

【證】內外别無證候但其人動作少過起坐少頻或久坐或久立久眠久視便覺頭眩目花昏暈也乃元氣虧弱陰精虧損水少液傷脉絡衰疲之咎怯弱證陰虚水少痰火人每多患此

【螢星】

【[illegible]】目見目前有無數細細紅星如螢火飛伏撩亂甚則如燈光掃星之狀其人必耽酒嗜燥勞心竭腎痰火上升目絡澀滯精汁為六賊之邪火熏蒸所損故陽光散亂而飛伏水不勝火之患久而不治內障成矣非若起坐生花之與有火人昏花中亦帶螢星之輕者此言其時時屡見螢星之重者耳　養肝丸　羚羊角活湯　菊睛丸　明目生熟地黃丸　石決明丸　加減駐景丸　補腎磁石丸　千金神麴丸　三仁五子丸　補肝丸　補腎丸　羚羊角飲　[illegible]丸　熟乾地黃丸　摩頂膏　決明丸　白龍粉　[illegible]散　服椒方　芎藭散

【[illegible]】平日素無他病外不傷輪廓內不損瞳神倏然盲而不見也病致有三曰陽寡曰陰孤

曰神離乃否塞關格之病病於陽傷者緣忿怒暴悖恣酒嗜辣好燥膩及久患熱病痰火人得之則煩躁秘渴病於陰傷者多色慾悲傷思竭哭泣太頻之故[illegible]中風中寒之起傷於神者因思慮太過用心罔極憂傷至甚驚恐無措者得之則其人如癡騃病發之狀屢有因頭風痰火元虛水少之人眩運發而醒則不見能保養者亦有不治自愈病復不能保養乃成痼疾其[illegible]速而異人以為魘魅方犯鬼神為祟之類況於根源殊不知急治可復緩則氣定而無用矣　丹溪治一老人病目暴不見物他無所苦起坐飲食如故此大虛證也急煎人參膏二斤服二日目方見一醫與青礞石藥朱曰今夜死矣不惜此病得之氣大虛不救其虛而反用礞石不出此夜必死果至夜半死　一男子[illegible]平生好飲熱酒忽目盲脉濇此[illegible]熱酒所傷胃氣污濁之血死在其中而然也遂以蘇木作湯調人參膏飲之服二日鼻內兩

手掌皆紫黑曰此病退矣滯血行矣以四物加蘇木紅花桃仁陳皮煎調人參末服數日而愈

一男子五十五歲九月間早起忽開眼無光視物不見急就睡片時却能見人物竟不能辨其何人何物飲食減平時之半神思極倦脉之緩大四至之上重按則散而無力朱作受濕治詢之果因卧濕地半箇月得此證遂以白术為君黄芪茯苓陳皮為臣附子為佐十餘貼而安

右三方治目昏盲皆為氣脫而用參术追回

者也經云上焦開發宣五穀味熏膚充身澤毛若霧露之溉是謂氣脫者目不明即其證也

青盲　目內外並無障翳氣色等病只自不見者是乃玄府幽邃之源鬱遏不得發此靈明耳其因有二一曰神失二曰膽涸須訊其為病之始若傷於七情則傷於神若傷於精血則損於膽皆不易治而失神者尤難有能保真致虛抱元守一者屢有不治而愈若年高及疲病或心腎不滿足者雖治不愈世人但見目盲便呼為青盲者謬甚也夫青盲者瞳神不大不小無缺無損仔細視之瞳神內並無些少別樣氣色儼然與好人一般只是自看不見方為此證若有何氣色即是內障非青盲也

雀目　俗稱也亦曰雞盲本科曰高風內障至曉不明至晚復明也蓋元陽不足之病或曰既陽不足午後屬陰何未申尚見子後屬陽何丑寅未明曰午後雖屬陰日陽而時陰陽分之陰且太陽明麗於天目得其類故明至酉日沒陰

極而瞑子後雖屬陽夜陰而時陽陰分之陽天地晦黑理之當瞑雖有月燈而不見者月陰也燈亦陰也陰不能助內之陽病輕者視亦稍見病重者則全不見至寅時陽盛日道氣升而稍明卯時日出如故若人調養得宜神氣融和精血充足陽光復盛不治自愈若不能愛養反致喪真則變為青盲內障甚則有陰陽乖亂否塞關格為中滿而死者食以牛豬之肝治以補氣之藥無不愈今見其元氣弱而陽不足也　倪仲

賢論陽衰不能抗陰之病或問曰人有晝視通明夜視罔見雖有火光月色終不能覩物者何也答曰此陽衰不能抗陰之病諺所謂雀盲者也黃帝生氣通天論曰自古通天者生之本本於陰陽天地之間六合之内其氣九州九竅五藏十二節皆通乎天氣又曰陰陽者一日而主外平旦人氣生日中而陽氣隆日西而陽氣已虚氣門乃閉又曰陽不勝其陰則五藏氣爭九竅不通是也問曰陽果何物耶答曰凡人之氣

應之四時者春夏爲陽也應之一日者平旦至昏爲陽也應之五藏六府者六府爲陽也問曰陽何爲而不能抗陰也答曰人之有生以脾胃中州爲土也靈蘭秘典曰脾胃者倉廩之官在五行爲土土生萬物故爲陽氣之原其性好生惡殺遇春夏乃生長遇秋冬則收藏或有憂思恐怒勞役饑飽之類過而不節皆能傷動脾胃脾胃受傷則陽氣下陷陽氣下陷則於四時一日五藏六府之中陽氣皆衰陽氣既衰則於四

時一日五藏六府之中陰氣獨盛陰氣既盛故陽不能抗也問曰何故夜視罔見答曰目爲肝肝爲足厥陰也神水爲腎腎爲足少陰也肝爲木腎爲水水生木蓋亦相生而成也況怒傷肝恐傷腎肝腎受傷亦不能生也晝爲陽天之陽也晝爲陽人亦應之也雖受憂思恐怒勞役饑飽之傷而陽氣下陷遇天之陽盛陰衰之時我之陽氣雖衰不得不應之而升也故猶能晝視通明夜爲陰天之陰也夜爲陰人亦應之也既

受憂思恐怒勞役饑飽之傷而陽氣下陷遇天陰盛陽衰之時我之陽氣既衰不得不應之而伏也故夜視罔所見也問曰何以爲治答曰鎮陰升陽之藥決明夜靈散主之　三因蛤粉丸

　[illegible]地膚子五錢決明子一升二味爲末以米飲汁和丸食後服二十丸至三十丸日日服至瘥止　蒼朮四兩米泔水浸一宿切作片焙乾爲末每服三錢豬肝二兩批開摻藥在內用麻線纏定粟米一合水一碗砂鍋內煮熟熏

服候溫臨臥服大效　又方蒼朮二兩擣羅為
末每服一錢不拘時候

[illegible]　此證乃熱傷真水以致神膏缺損若四圍亦甚痛極者由絡間瘀滯火爍了神膏為若凝脂翳碎壞神膏而缺者是熱蝕了神膏為病尤急若四圍不甚赤痛不是凝脂所損者為害稍緩此乃色慾煩躁恣辛嗜熱之故大略是蒸鬱損了肝膽絡分之病其狀風輪有證或痕或縱長短大小不一或擴小如針刺傷者或擴

大如簪腳刺傷者或痕如指甲刻傷者或風輪周圍有痕長甚者凡有此等皆係內有鬱滯熱蒸之因燥壞了神膏之故急須早治勿使深陷為窟而蟹睛突出若至深大縱蟹睛未出而翳漫亦有白障如冰瑕翳等病結為乃藥氣填補其內故有此瘢若久服久點方得水清膏復若治不得急則白障終身難免淺小者方得如故深大者亦不微微之迹蓋神膏乃先天二五精氣之凝自然至清至粹者今以後天藥物之氣味而補其缺損乃於濁中熏陶其含蓄之清也非鐵鑿之精斷以歲月鮮能復其初焉

膏傷珠陷　謂目珠子覺低陷而不鮮綻也非若青黃牒出諸漏等病因損破膏流水耗而擫低之比蓋內有所虧目失其養源枯絡傷血液耗澀精膏損涸之故所致不一有恣色而竭腎水者有嗜辛燥而傷津液者有因風痰濕熱久鬱而蒸損精膏者有不當出血而悞傷經絡及出血太過以致膏液不得滋潤涵養者有哭損

液汁而致者有因竅因漏泄其絡中真氣及元氣弱不能升載精汁運用者大抵係元氣弱而膏液不足也凡人目無故而自低陷者死期至矣若目至於外有惡證內損精膏者不治

神水將枯　視珠外神水乾澀而不瑩潤最不好識雖形於言不能妙其狀乃火鬱蒸膏澤故精液不清而珠不瑩潤汁將內竭雖有淫淚盈珠亦不潤澤視病氣色乾澀如蜒蝣唾涎之光凡見此證必有危急病來治之緩失則神膏乾

澀神膏乾澀則瞳神危矣大神水為目之機要其病幽微人不知之致變出危證而救之已遲其狀難當[illegible]心志巧服力精雖師指不得盡其妙若[illegible]瞽如鴉游而目疾神水將枯者[illegible]以外人糞如羊矢而目病神水將枯者[illegible]膀胱澀神水將枯者蓋下水熱蒸不清[illegible]不清澄其源而流自清矣

一六瞳神乾缺　[illegible]

[illegible]　目病六氣不和或有風邪所擊腦

轆轤轉關　[illegible]

筋如搜神珠不待人轉而自蓊然察上蓊然察下下之不能上上之不能下或左或右倏易無時蓋氣搏激不定筋脈振惕緩急無常被其牽搜而為害輕則氣定脈偏而珠歪如神珠將反之狀甚則翻轉而為瞳神反背矣　天門冬飲子　瀉肝散　聚寶丹　雄猪散　牛蒡子丸　還睛丸　[illegible]

雙目睛通　亦曰睊目甲乙經云睊目者水溝注之　此證謂幼時所患目珠偏斜視亦不正至長亦不能愈者患非一端有因脆嫩之時目病風熱攻損腦筋急縮者有因驚風天弔帶轉筋絡失於散治風熱遂致凝滯經絡而定者有因小兒眠之牖下亮處側視久之遂致筋脈滯定而偏者凡有此病急宜乘病嫩血氣未定治之若至長筋絡血氣已定不復愈矣此專言幼患至長不可醫者非神珠將反急病之比

神珠將反　謂目珠不正人雖要轉而目不能轉乃風熱攻腦筋絡被其牽縮緊急弔偏珠子是以不能運轉甚則其中自閉刮聒有聲時響

[illegible]散　[illegible]

血分有滯者目亦赤痛失治者有反背之患與雙目睛通初起狀相似而不同

瞳神反背　因六氣偏勝風熱搏急其珠斜翻側轉白向外而黑向內也藥不能療止用撥治須久久精熟能識其向入何背或帶上帶下之分然後撥之回療在反掌否則患者徒受痛楚醫者枉費心機今人但見目有內障或目損風來[illegible]者皆呼為瞳神反背謬[illegible]珠向內豈有珠正向

外內可謂之反背者哉

[illegible] 風輪破碎內中膏汁叠出也不治者甚則膏盡珠癟有內自破膜出而火氣得以舒泄內外不治致氣定而脹出不收者有瞖以寒涼逐退內火外災平治清定為凸起者乃不治之病初起由熱燥攻擊及撞損真膏等害血氣發滯元極攻碎神光中珠之中膏汁俱已潰爛而出縱有妙手不復可救但可免其癟凸而已珠上膏水功維結為翳狀如白混障者俗人呼為白果與華元化復生何能為也

[illegible] 視瞳神深處有氣一道隱隱袅袅而動狀若明鏡遠照一縷清煙也恐頭風痰火病者久火勝搏激動其絡中真一之氣游散飄耗者必宜治之動而定後光冥者內證成矣

[illegible] 眼睫毛倒捲入眼中央是也久則赤爛毛刺於內神水不清以致障結且多礙澀淚出之苦人有拔去剪去者有醫以夾板腐去上睥者得效雖速殊不知內病不除未幾復倒睫譬之草木貧壤枯瘦則枝葉萎垂即朝摘黃葉暮去枯枝徒傷其本徒速其槁不若培益糞壤滋調水土本得培養則向之黃者翠而垂者聳矣夾之一治乃弱法耳其經久脾壞而寬甚者藥攻甚遲不得已而夾去之內當服藥以治其本不然未幾而復寬睫矣拔剪之法未聞其妙屢有內多濕熱外傷風邪致爛弦極醜一毛俱無如風痰者有毛半斷者有夾而復睫云是尚寬復夾至於二四日亦急縮細小徒損無益終

黃之悟懸之謂也

倪仲賢論內急外弛之病

曰陰陽以和為本過與不及病皆生焉急者緊縮不解也弛者寬縱不收也緊縮屬陽寬縱屬陰不解不收皆為病也手太陰肺為辛為金也主一身皮毛而目之上下睫之外者亦其屬也手少陰心為丁手太陽小腸為丙丙丁為火故為表裏故分上下而目之上下睫之內者亦其屬也足厥陰肝為乙乙為木其脈循上睫之內火其子也故與心合心肝小腸三經受邪則陽

火內盛故上下瞼之內緊縮而不解也肺金為
火尅受尅者必衰衰則陰氣外行故目之上下
瞼之外者寬縱而不收也上下瞼既內急外弛
故瞼毛皆倒而刺裏睛既受刺則深赤生翳此
翳者睛受損也故目所病者皆具如羞明沙澀
畏風怕日沁爛或痛或痒生眵流淚之證俱見
有用攀夾施於上瞼之外者欲弛者急急者弛
而瞼毛無倒刺之患者非其治也此徒能解厄
於目前而終復其病也何則為不審過與不及

也為不能除其原病也治法當攀出內瞼向外
速以三稜針亂刺出血以左手大指甲迎其針
鋒後以黃芪防風飲子主之無比蔓荊子湯主
之決明益陰丸主之菊花決明散主之搐鼻碧
雲散亦宜兼用如是則緊縮自弛寬縱漸急或
過不及皆復為和藥夾之治慎勿施也徒為苦
耳智者審之　瀉肝散洗刀散石膏羌活散五
[illegible]光丸[illegible]角丸五蛻散[illegible]散　以無名異
末後入捲紙中作撚子點着至藥末處吹殺以煙

熏之自起　蟹沙一兩號丹五錢慢火熬成膏
入輕粉五分熬黑色乘時湯泡洗　摘去拳毛
用虱子血點入眼內數次即愈

[illegible]　謂眼楞緊急縮小乃倒睫拳毛之
漸也　若不曾治而目縮小者乃膏血精液
澀耗筋脈緊急之故若治而急小者治之之故
患者因[illegible]夾[illegible]其上睥失於內治愈後
復倒[illegible]而脈不舒睥[illegible]而血
不足目故急小何不[illegible]導而以數開導久不

能滋其內以致血液耗而急小者凡因治而致
者若不乘時滋養則終定氣滯雖治不復愈矣
神效黃芪湯　有翳撥雲湯　小角偏緊連
翹飲子　東垣云陽虛則眼楞緊急陰虛則
瞳子散大故東垣治眼楞緊急用參芪補氣為
君佐以辛味疏散之而忌芍藥五味子之類酸
收也治瞳子散大用地黃補血為君佐以酸
味以收之而忌茺蔚子青葙子之類是也

[illegible]　目內睥之內[illegible]相粘不開[illegible]

於轉運有熱燥血湧者目必赤痛有熱退血散失於治療者其狀雖粘必白珠亦痛止須用劆割之治若赤痛時生粘者必有瘀滯宜漸導漸劆如別病雖退而粘生不斷亦須劆割漸開仍防熱血復粘生合須用藥時分之微[illegible]

[illegible]

膠粘證　由脾膩沫粘合難開夜卧尤甚輕則如膠粘劇重則結硬必得潤而後可開也其病重在肺濕熱之故夫肺主氣氣化水為淚液為[illegible]而出邪熱蒸之渾濁不清出而為脾土

燥濕所滯遂阻膩凝結而不流燥甚則結硬而痛故當以清涼滋潤為主雖有障在珠亦是水不清內滯之故非障之徵久而不治則有瘀爛之變內則有椒瘡粟瘡眉明瘀滯等證生矣

睥翻粘瞼證　乃脾翻轉貼在外瞼之上如舌舐唇之狀乃氣滯血湧於內皮急系吊於外故不能復轉有自病爭翻而轉者有因翻睥看病為風邪搏滯不得復返而轉大抵多風濕之滯所致致風疾人患者多治亦難愈非風者易治宜用劆割開導之法

[illegible]　謂目睥不待人之開合而自牽拽振跳也乃氣分之病屬肝脾二經絡牽振之患人皆呼為風然不知血虛而氣不順非純風也若有濕熱及頭風者屬方是風邪之故久而不治為牽吊敗壞之病

[illegible]　謂睥內之肉紫於浮泛如臭血壞泛之狀其[illegible]起甚則細細如泡無數相連成片在睥絡血滯久不忌火毒燥膩致積而

不散其[illegible]而瘀泛脾內肉壞或碎脾出血[illegible]風傷其血血滯澀而睥肉不得潤[illegible]乃久積之病也非比暴疾治以活血為主[illegible]以劆治輕者止用殺伐之治足矣

[illegible]　謂目脾浮腫如毬狀也目尚無別病久[illegible]亦絲亂脉之患火重甚皮或紅目不痛濕痰與火夾搏者則有淚有眥爛之候乃火在氣分之病[illegible]不可誤認為血如杯覆血分之[illegible]以[illegible]熱伐之[illegible]復如故可

見其血不足而虛火壅於氣也

風沿爛眼 丹溪云風沿眼系上膈有積熱自飲食中挾怒氣而成頑痰痞塞濁氣不降清氣不上升由是火益熾而水益降積而久也眼沿因膿漬而腫於中生細小蟲絲遂年久不愈而多痒者是也用紫金膏以銀釵脚揩去油膩點之試問若果痒者又當去蟲以絕根本蓋紫金膏只是去濕與去風涼血而已若前所謂飲食挾怒成痰又須更與防風通聖散去硝黃為細末以酒拌勻曬乾依法服之禁諸厚味及大料物方盡諸法之要

風弦赤爛證 乃目胞沿赤爛者脾也若血虛液少不能滋養脾肉以致濕熱滯於胞絡常時赤爛如是者非若迎風因邪乘虛而襲久而不治則拳毛倒入損甚則赤爛濕而拳毛皆喪若先有障而後赤爛者乃經絡壅滯血不清而爛治其障通其脉絡而自愈有因毛倒而拔剪損動精液引入風邪以致壞爛各因其源而療之一法劫治以小烙鐵

捲紙蘸桐油燒紅烙之爛濕而痒者頗獲其効若失於內治終難除根

迎風赤爛證 謂目不論何風見之則赤爛無風則否與風弦赤爛入脾絡之深者不同夫風為木木强土弱弱則易侵因邪引邪內外夾攻土受木尅是以有風則病無風則愈赤爛者木土之正病耳赤者木中火證爛者土之濕證若痰若濕盛者爛勝赤若火若燥盛者赤勝爛心承肺承者珠亦痛赤為此專言見風赤爛之患與後章迎東迎西迎風冷熱淚等證入肉之深者又不同

眥赤爛證 謂赤爛只眥有之目無別病也若目有別病而赤爛者乃因別火致傷其眥又非此比赤勝爛者火多乃勞心憂鬱忿悖無形之火所傷爛勝赤者濕多乃恣燥嗜酒哭泣過多冒火衝煙風熱風寒有形所傷病屬心絡甚則火盛水不清而生瘡於眥邊也要分大小二眥相火君火虛實之治　洗刀散菊花通聖散內服　黃連散洗　爐甘石散點　一方用淡香油浸月餘重湯

濾過點　紫金膏用水飛過號丹蜜多水少文武火熬以器盛之點　治眼赤瞎以青泥蛆淘淨曬乾末之仰卧合目用藥一錢放眼上須臾藥行待少時去藥赤瞎自無　東垣云目瞳赤爛眩久俗呼赤瞎是也常以三稜針刺目外以洩濕熱立愈　治風弦爛眼祕穴　大骨空在手大指第二節尖灸九壯以口吹火滅　小骨空在手小指二節尖灸七壯亦吹火滅

靈樞黃帝曰人之哀而泣涕者何氣使然岐伯曰心者五藏六府之主也目者宗脉之所聚也上液之道也口鼻者氣之門戶也故悲哀愁憂則心動心動則五藏六府皆搖搖則宗脉感宗脉感則液道開液道開故涕泣出焉液者所以灌精濡空竅者也故上液之道開則泣涕不止則液竭液竭則精不灌精不灌則目無所見矣故命曰奪精補天柱經俠頸　又云五藏六府心爲之主耳爲之聽目爲之視肺爲之相肝爲之將脾爲之衛腎爲之主外故五藏六府之津液盡上滲於目心悲氣并則心系急心系急則肺擧肺擧則液上溢夫心系與肺不能常擧乍上乍下故欬而泣出矣　素問解精微論曰厥則目無所見夫人厥則陽氣并於上陰氣并於下陽并於上則火獨光也陰并於下則足寒足寒則脹也夫一水不勝五火故目眥盲是以氣衝風泣下而不止夫風之中目也陽氣內守於精是火氣燔目故見風則泣下也有以比之夫火疾風生乃能雨此之類也　肝

爲淚　運氣淚出皆從風熱經曰厥陰司天之政三之氣天政布風乃時擧民病泣出是也張子和曰凡風衝淚出俗言作冷淚者非也風衝於內火發於外風熱相搏由是淚出內外皆治可愈治外以貝母一枚白膩者加胡椒七粒不犯銅鐵研細點之治內以當歸飲子服之　經云厥氣上走則目[illegible]循脉而上至目內眥則[illegible]而泣出乃中風冷淚出也河間當歸湯主之　東垣云水附木勢上爲眼澀爲淚爲

冷淚此皆由肺金之虛而肝木寡於畏也【迎風赤爛】謂目見東南二風則澀痛淚出西北風則否與迎風赤爛迎風淚出本同而本與各證不論何風便發此二證則有東西之別以見生尅虛實之爲病迎風之淚又專言其淚不帶別病而本無他證者又非迎東迎西有別病之比故治亦不同迎東與迎西又不同迎東乃肝之自病氣盛於血發春夏者多非若迎西因虛受尅而病發也【迎西淚】謂目見西北二風則澀痛淚出見東南風則否乃肝虛受尅之病秋冬月發者多治當補肝之不足抑肺之有餘【迎風冷淚】不論何時何風見則冷淚交流若赤爛障證者非也乃水木二家血液不足陰邪之患與熱淚帶火者不同久而失治則有內障視渺等證發生焉與無時冷淚又不同此爲發虛因邪引邪之患無時冷淚則內虛膽腎自傷之患也【迎風熱淚】不論何時何風見之則流熱淚[illegible]及分風氣者非也乃肝膽腎水木

之精液不足故因虛竅不密而風邪引出其淚水中有隱伏之火發故淚流而熱久而不治反有內把者則變爲內障如螢星滿目等證也【無時冷淚】[illegible]不[illegible]無別病只是時常流出冷淚其因[illegible]迎風冷淚因虛引邪病尚[illegible]精血衰弱澀腎水不足[illegible]久而失治則有內障青盲視瞻[illegible]之患精血衰敗之人性陰毒及悲傷哭泣久鬱者又如產後悲泣太過者每多此疾且爲甚又緩人不爲慮往往罹其害而禍成也悔[illegible]矣【無時熱淚】謂目無別病止是熱淚不時常流也若有別病而熱淚流出者乃火激動其水非此病之比○此肝膽腎水耗而陰精[illegible]及勞心竭思過慮深思動其火而傷其[illegible]此以[illegible]不足人哭泣太傷者每每[illegible]久[illegible]火治[illegible]者變爲內障因其爲患微緩[illegible]者多[illegible]　肝虛逐時補肝丸　枸杞酒
[illegible]　[illegible]洗肝[illegible]子角散　肝熱決明

子方涼膽丸　風熱羌活散青葙子丸　風冷羌活散　風濕菊花散蟬蛻餅子川芎丸　外點真珠散乳汁煎　食鹽如小荳大内目中習習去鹽以冷水洗目瘥　開元銅錢一百文背上有月者更妙甘草去皮三錢青鹽一兩半於白磁器内用無根水一大碗浸七日每若一盞洗無分後洗到十日約添甘草青鹽每日洗三次忌食五辛驢馬雞魚葷酒治冷淚久而眼昏

烏雞膽汁臨卧點眼中治迎風冷淚不止

烏賊魚骨研極細末點目中治無時熱淚　目中溜火惡日與火隱澀小角紧久視昏花迎風有淚連翹飲子主之

氣壅如痰瞼内如痰白沫稠膩甚多拭之即有者是痰火上壅脾肺濕熱所致故好酒嗜燥悖鬱者每患此疾若覺瞼睥及有絲脈虬赤者必滯入血分防瘀血灌睛等變生矣

[illegible]　内經運氣目眥瘍有二一曰熱經云少陰司天之政三之氣大火行寒氣時至民病目赤眥瘍治以寒劑是也二曰燥經云歲金太過民病目赤腫眥瘍又云陽明司天燥淫所勝民病目眯眥瘍治以溫劑是也

[illegible]　輕重不等痛癢不同重則有堆積高厚紫血臙爛而腥臭者乃氣血不和火實之邪血分之熱尤重如瘀滯之證富潤水濁每每流於睥眥成瘡血散血瘀自亦勤勞濕熱人每患睥眥成瘡無別痛腫澀者亦輕而無妨若火盛瘡生堆重帶腫痛者又當急治恐濁氣沿於目内而病及於珠若先目病後生瘡必是熱沿他經凡見瘡生當驗部分以別内之何源而來因其輕重治之

[illegible]　生於睥内纍纍如瘀紅而堅者是也有目淚澀閉不便多淚而痛令人皆呼為粟瘡又有粟瘡亦生在睥但色黃軟而易散此則[illegible]而難散者[illegible]以[illegible]心等物出血取效幼難[illegible]不如目以血為榮血損而光華有衰弱[illegible]則此須善治其重至於纍纍連片疙瘩[illegible]不及血瘀滯者不得已而[illegible]中

病即止不可太過過則血損恐傷其水失養神膏大柴用平熨之法退而復來者乃內有瘀滯方可量病漸導若初治便用開導者得效最速切莫過治

粟瘡證 生於兩睥細顆黃而軟者是今人稱椒瘡為粟瘡非也椒瘡紅而堅有則礙睛沙澀不便未至於急粟瘡見若目痛頭疼者內必有變證大意是濕熱鬱於土分為重椒瘡以風熱為重二證雖皆屬於血分一易散一不易散故治亦不同有素好濕熱燥膩者亦有

粟瘡若睛翳赤而痛不甚者雖有必退與重者不同又不可誤認為玉粒玉粒乃淡黃色堅而消遲為變亦遲者

睥生痰核證 乃睥外皮肉有贅如豆堅而不疼火重於痰者皮或色紅乃痰因火滯而結此生於上睥者多屢有不治自愈有恣嗜辛辣熱毒酒色斲喪之人久而變為癧漏重疾者治亦不同若初起劫治則頃刻平復矣 [illegible]

火疳證 生於睥眥氣輪在氣輪為害尤急蓋火之實邪在於金部火尅金鬼賊之邪故害最急初起如椒瘡榴子一顆小而圓或帶橫長而圓如小赤豆次後漸大痛者多不痛者少不可誤認為輪上一顆如赤豆之證因瘀積在外易消者此則從內而生也

土疳證 謂睥上生毒俗呼為偷針眼是也有一日生又一日者有一日生一日者有邪微不出膿血而愈者有犯觸辛熱燥膩風沙煙火為漏為吊敗者有竅未實因風乘虛而入頭腦俱腫目亦赤痛者其病不一當隨宜治之　巢氏曰凡眼內

眥頭忽結成皰三五日間便生膿汁世呼為偷針此由熱氣客在眥間熱搏於津液所成但其勢輕者小小結聚汁潰熱歇乃瘥按世傳眼眥間生小皰視其背上即有細紅點如瘡以針刺破眼時即瘥故名偷針實解太陽經結熱也人每試之有驗然巢氏但具所因而不更分經絡其論名實所過者多矣 [illegible]

金疳證 初起與玉粒相似至大方變出禍患生於睥

內必礙珠澀痛以生障翳生於氣輪者則有珠
痛淚流之苦子後午前陽分氣升之時尤重午
後入陰分則病畧清寧久而失治遂成反觸者
有變漏之患　忽然一珠生於睥眥氣
輪之間者多若在風輪目必破損有虛實大小
二證實者小而痛甚虛者大而痛緩狀如黑豈
亦有橫長而圓者與木疳相似但部分稍異色
亦不同黑者屬水青綠藍碧者屬木久而失治
必變為漏頭風人每有此患風屬木肝部何以
病反屬水蓋風行水動理之自然頭風病目每
傷瞳神瞳神之精膏被風攻鬱久則火勝其
清液為火擊散走隨其所傷之絡結滯為疳也
疳因火滯火兼水化化因邪勝不為之清潤而
反為之濕熱濕熱相搏而為漏矣故水疳屬腎
與膽也　倪仲賢論血氣不分混而遂結之病
曰輕清圓健者為天故首象天重濁方厚者為
地故足象地飄騰往來者為雲故氣象雲過流
循環者為水故血象水天降地升雲騰水流各
宜其性故萬物生而無窮陽平陰秘氣行血隨
各得其調故百骸理而有餘反此則天地不降
升雲水不騰流各不宜其性矣反此則陰陽不
平秘氣血不行隨各不得其調矣故曰人身者
小天地也難經云血為榮氣為衛榮行脈中氣
行脈外此血氣分而不混行而不阻也明矣故
如雲騰水流之不相雜也大抵血氣如此不欲
相混混則為阻阻則成結結則無所去還故隱
起於皮肉之中也為是病者各隨經絡而見疣
病自上眼睥而起者乃手少陰心經足厥陰肝
脈血氣混結而成也初起時如豆許血氣衰
者遂止不復長亦有久止而復長者盛者則漸
長長而不已如杯如盞如碗如斗皆自豆許致
也凡治在初須擇人神不犯之日大要令病者
食飽不饑先汲冷井水洗眼如冰勿使氣血得
行然後以左手持銅筯按眼睥上右手翻眼皮
令瘤翻向外已突然以左手大指按之勿令
動搖復以右手持小眉刀尖畧破病處更以

兩手大指甲捻之令出則所出者如荳許小黄脂也恐出而根不能斷宜更以眉刀尖斷之以井水再洗洗後則無恙要在手疾為巧事畢須投以防風散結湯數服即愈此病非手法則不能去有則為血氣初混時藥自可及病者遇不如其為血氣混也此結則藥不能及矣故必用手法去去畢則又以升發之藥散之藥子皆至庶幾了事

[illegible]背頭結聚生瘡流出膿汁或如涎水粘

睛上下不痛仍無翳膜此因心氣不寧并風熱停留在瞼中宜服五花丸白薇丸 歌曰原因風熱瞼中停凝結如膿似淚傾驅毒除風無別病黄連膏子點雙睛合用糖煎散三和散密蒙花散 倪仲賢論熱積必潰之病曰積者重疊不解之貌熱為陽陽平為常陽淫為邪常邪則行行則病易見易見則易治也則前篇淫熱之病也深邪則不行不行則伏因伏而又伏日漸月聚勢不得不為積也積已久久積必潰潰之病見病見則難治難治者非不治也為邪積久比潰已深何則潰猶敗也知敗者庶可以救其病隱濇不自在稍覺眊矂視物微昏內眥穴開竅如針目按之則沁沁膿出有兩目俱病者有一目獨病者目屬肝內眥屬膀胱此盖一經積邪之所致也故曰熱積必潰之病又曰漏睛眼者是也竹葉瀉經湯主之大便不鞕者減大黄為[illegible]解毒丸主之不然乎悞病久終為痼害

[illegible]大眥之間生一漏時流血水其

色紫暈腫而疼病在心部火之實毒治法宜補北方瀉南方

[illegible]小眥間生一漏時流血色鮮紅病由心包絡而來相火横行之候失治則神膏損而明喪矣當於北方中補而抑之

[illegible]不論何部生漏但從黄昏至天曉則痛脹流水作青黑色或腥臭不可間日間則稍可非若他漏之長流乃幽陰中有伏隱之火隨氣升降故遇陰分即病重治當溫而清之

[illegible]不論何部分生漏但日間脹痛流水

其色黃赤遇夜則甚可非若陰漏長流也治當補正氣清金火

正漏症 有瘡生於風輪或正中或略偏病至此目亦危矣若初發破者則流出如痰白膏猶爲可救至於日久而深則流出青黑膏汁損及瞳神而有金井如痲難挽先天二五元精衰耗必矣病爲肝腎二部目竅於肝主於腎故曰正漏耳

偏漏症 漏生在氣輪金堅而位傍爲害稍遲故目偏漏其流如稠濁白水重則流膿久而失治水泄膏枯目亦損矣

外漏症 生於兩瞼之外或流膿或流稠臭水脹痛則流出不脹則略止其害目遲於各漏久而失治則睥壞氣泄膏水枯損目亦壞矣

竅漏症 今目傍竅中流出薄稠水如膿腥臭拭之即有久而目亦模糊也人皆燥熱濕痰火盛熱者有之內病久而不治亦有觸傷神水枯澀神膏不言其氣壅如痰相似按之則出此重如痰乃在小水不清陰內欲出不得出者此則從小眥蒸而出其症最不能若治亦深

能遠視不能近視 東垣云能遠視不能近視者陽氣有餘陰氣不足也乃血虛氣盛血虛氣盛者皆火有餘元氣不足火者元氣穀氣真氣之賊也元氣之來也徐而和細細如線邪氣之來也緊而強如巨川之水不可遏也　海藏云目能遠視責其有火不能近視責其無水法當補腎地黃丸主之　秘要云陰精不足陽光有餘病於水者故光華發見散亂而不能收斂近視治之在心腎心腎平則水火調而陰陽和順

陰陽和順則收斂發用各得其宜夫血之所化爲水在身爲津液在目爲膏汁若貪淫恣慾饑飽失節形脉甚勞過於悲泣皆斲耗陰精陰精虧則陽火盛火性炎而發見陰精不能制伏挽回故越於外而遠照不能治之而反觸激者有內障之患

能近視不能遠視 東垣云能近視不能遠視者陽氣不足陰氣有餘乃氣虛而血盛也血盛者陰火有餘也氣虛者元氣虛弱也此老人桑

楡之象也　海藏云目能近視責其有水不能遠視責其無火法宜補心胡方定志丸主之
秘要云此證非謂稟受生成近覷之病乃平昔無病素能遠視而忽然不能者也蓋陽不足陰有餘病於火者故光華不能發越於外而偎斂近視耳治之在膽腎膽腎足則神膏厚神膏厚則經絡潤澤經絡潤澤則神氣和暢而陽光盛矣夫氣之所用謂之火在身爲運用在目爲神光若耽酒嗜燥頭風痰火忿怒暴悖者必傷神

損氣耗神氣弱必發用衰發用衰則經絡澀滯經絡澀滯則陰陽偏勝而光華不能發達矣

靈樞大惑論帝曰予嘗上清冷之臺中堦而顧匍匐而前則惑予私異之竊內怪之獨瞑獨視安心定氣久而不解獨博獨眩披髮長跪俛而視之後久之不已也卒然自上何氣使然岐伯曰五藏六府之精氣皆注於目而爲之精精之窠爲眼骨之精爲瞳子筋之精爲黑眼血之精爲絡其窠氣之精爲白眼肌肉之精爲約束裹擷筋骨血氣之精而與脉并爲系上屬於腦後出於項中故邪中於項因逢其身之虛其入深則隨眼系以入於腦入於腦則腦轉腦轉則引目系急目系急則目眩以轉矣邪中其精其精所中不相比也則精散精散則視岐故見兩物　又云目者五藏六府之精也榮衛魂魄之所常營也神氣之所生也故神勞則魂魄散志意亂是故瞳子黑睛法於陰白眼赤脉法於陽也故陰陽合轉而睛明也目者心之使

也心者神之舍也故神精亂而不轉卒然見非常處精神魂魄散不相得故曰惑也帝曰予疑其然予每之東苑未曾不惑去之則復予唯獨爲東苑勞神乎何其異也岐伯曰不然也心有所喜神有所惡卒然相感則精氣亂視誤故惑神移乃復是故間者爲迷甚者爲惑　素問云夫精明者所以視萬物別白黑審長短以長爲短以白爲黑如是則精衰矣[illegible]
[illegible]

擊甚則如火焰霞明時發時止與視瞻有色之定者不同乃陰精虧損清氣怫鬱玄府太傷孤陽飛越神光欲散內障之重者非若螢星痰火之輕也

[illegible]大人體天地之陰陽晝明夜晦理之常也今晦冥之中倏忽見物是背於陰陽矣乃水火不交精華關格乖亂不和陽光飛越之害不能培養陰精以留制陽光而自以為精華之盛至於光墜而盲始悔之不亦晚乎

[illegible]謂物本正而目見為邪也乃陰陽偏勝神光欲散之候陽勝陰者因恣辛嗜酒怒悖頭風痰火氣傷之病陰勝陽者因色慾哭泣飲味經產血傷之病此內之玄府鬱滯有偏而氣重於半邊故發見之火亦偏而不正耳[illegible]其本而伐其標久而失治內障成焉

[illegible]謂物本定而目見為動也乃氣分[illegible]之害水不能救之故上旋眩運振掉不定光華欲墜久則地石亦覺振動而不定內障成矣[illegible]嗜燥頭風痰火人陰虛血少者[illegible]有此患

雲麓漫抄云淮南陳吉老儒醫也有富翁子忽病視正物皆以為斜几案書席之類排設整齊必更移令斜自以為正以至書寫尺牘莫不皆然父母甚憂之更歷數醫皆不諳其疾或以吉老告遂以子往求治既診脈後令其父先歸留其子設樂開宴酬勸無算至醉乃罷扶病者坐轎中使人舁之高下其手常令傾倒展轉久之方令登榻而卧達旦酒醒遣之歸家前日斜倒之物皆理正之父母躍然而喜且詢治之之方吉老云令嗣無他疾醉中嘗閃倒肝之一葉搭於肺上不能下故視正物為斜令復飲之醉則肺脹展轉之間肝亦垂下矣藥安能治之哉富翁厚為之酬

[illegible]謂目視物皆振動而倒植也譬之環舞後定視則物皆移動而倒植蓋血氣不正陰陽反復真元有傷陰精衰弱陽邪上干虛眩而運轉有一年數發有一月數發者若發一醒倒而視真不醒者神光墜矣須因其所發時令及別其因虛因風因痰因

火而治之若以風眩不足爲虛反斵喪而激觸者內障之患終莫能逃　九靈山房集云元末四明有吕復別號滄洲翁深於醫道臨川道士蕭雲泉眼中視物皆倒植請治於復復問其因蕭曰某嘗大醉盡吐所飲酒熟睡至天明遂得此病復切其脉左關浮促卽告之曰嘗傷酒大吐時上焦反覆致倒其膽腑故視物皆倒植此不內外因而致內傷者也法當復吐以正其膽遂以藜蘆瓜蒂爲麤末用水煎之使平旦頓服以吐爲度吐畢視物如常

【視一爲二症】謂一物而目視爲二卽內經所謂視歧也乃精華衰亂偏隨敗壞病在膂腑腎膽眞一之精不足而陽光失其主倚故視一爲二若目赤痛者乃火壅於絡陰精不得升運以滋神光故反爲陽邪錯亂神光而歧其視證治諸目痛時見一燈火爲二二燈也　許學士云荀牧仲嘗謂予曰有人視一物爲兩醫作肝氣盛故見一爲二服瀉肝藥皆不驗此何疾也予曰孫眞人曰燈經云目之系上屬於腦後出於項中　云云　則視岐故見兩物也令服驅風入腦藥得愈

【視瞻有色症】非若熒星雲霧二證之細點長條也乃目凡視物有大片甚則通行當因其色而別其證以治之若見青綠藍碧之色乃肝腎不足之病由陰虛血少精液衰耗膽汁不足氣弱而散故視亦見其色怯弱證人眼前每見青綠色益見其陰虛血少之故也若見黃赤者乃火土絡有傷也痰火濕熱人每有此患夫陰虛水少則賊火得以燥爍而淸純太和之氣爲之乖戾不和故神光之滋運之化源而視亦因其本而見其色也因而不能滋養反有觸犯者內障生焉若見白色者病由金分元氣有傷及有痰沫阻滯道路者皆有此患若視有大黑片者腎之元氣大傷膽乏所養不久盲矣

【視赤如白症】謂視物却非本色也因物着形之病與視瞻有色空中氣色不同或觀太陽若冰輪或覩燈火反粉色或視粉縞如紅如碧或看黃紙似綠似藍等類

此內絡氣鬱玄府不和之故當因其色而別之以知何臟府乘侮之為病而施治

[illegible]謂視日與燈燭皆生紅暈也甚則通紅而人物在燈光之下亦大矣皆是實火陽邪發越於上之害諸絡必有滯澀輕者暈小而淡重者暈大而濃治雖外證已退目視尚有暈者陽邪未平陰精未盛猶宜滋養化源而抑制其火耳

道山清話云張子顏少卿晚年常目光閃閃然中有白衣人如佛相者子顏信之彌謹乃不食肉不飲酒然體瘠而多病矣一日從汪壽卿求脉壽卿一見大驚不復言但投以大丸數十小丸千餘粒祝曰十日中服之當盡却以示報既如期視所見白衣人衣變黃而光無所見矣乃欲得肉食又思飲酒又明日俱無所見覺氣體異他日矣乃詣壽卿以告壽卿曰吾固知矣公脾俞受病為肺所乘心脾之母也公既多疑心氣不固自然有所覩吾以大丸實其脾小丸補其心肺為脾之子既不能勝其母其病自消也

北夢瑣言曰有少年苦眩運眼花常見一鏡子趙卿診之曰來晨以魚鱠奉候及期延於內從容久饑候客退方得攀接俄而檯上施一甌芥醋更無他味少年饑甚聞芥醋香徑啜之逡巡再啜遂覺胸中豁然眼花不見卿曰郎君吃魚鱠太多芥醋不快又有魚鱗在胸中所以眼花故權[illegible][illegible]愈其疾也

視直如曲

夢溪筆談云有一人家妾視直物如曲弓弦界尺之類視之皆如鉤醫僧奉真親見之

目閉不開

足太陽之筋為目上綱足陽明之筋為目下綱熱則筋縱目不開

[illegible]

視物而目睛不轉動者是也若目睛動者目睛(?)也傷寒直視者邪氣壅盛冒其正氣使神氣不榮臟府之氣不上榮於目則目為之直視傷寒至於直視為邪氣已極證候已逆多難治經曰衄家不可發汗發汗則額上陷脉緊急直視不能眴不能眠以肝受血而能視亡血家則肝氣已虛目氣已弱又發汗亡陽則陰陽

俱虛所致此雖錯逆其未甚也譫妄言反目直視又為腎絕直視搖頭又為心絕皆藏府氣脫絕也直視譫語喘滿者死下利者亦死又劇者發狂則不識人循衣摸牀惕而不安微喘直視脈弦濇者生死皆邪氣盛而正氣脫也　素問曰少陽終者其百節縱目睘絕系王註曰睘謂直視如驚貌　目系絕故目不動而直視

【目戴】經云瞳子高者太陽不足戴眼者太陽已絕　太陽之脉其終也戴眼反折瘈瘲

針灸法見中風

【[illegible]】倪仲賢論曰志於固者則八風無以窺其隙本於密者則五藏何以受其邪故生之者天也召之者人也雖生弗召莫能害也為害不已召之甚也生氣通天論曰風者百病之始也清靜則肉腠閉拒雖有大風苛毒弗之能害陰陽應象論曰邪風之至疾如風雨故善治者治皮毛夫肉腠同皮毛皆所以為衛者安從來也今為風所傷則皮毛肉腠之間為隙必甚所傷之隙豈無七情內移而為衛氣衰憊之原二者俱召風安得不從故傷於目之上下左右者則目之上下左右俱病當總作除風益損湯主之傷於眉骨者病自目系而下以其手少陰有隙也加黃連除風益損湯主之傷於額者病自抵過而上傷於耳中者病自銳眥而入以其手太陽有隙也加柴胡除風益損湯主之傷於額交巔耳上角及腦者病自內眥而出以其足太陽有隙也加蒼朮除風益損湯主之傷

耳後耳角耳前者病自客主人斜下傷於頰者病自銳眥而入以其手少陽有隙也加枳殼除風益損湯主之傷於頭角耳前後及目銳眥後者病自銳眥而入以其足少陽有隙也加龍膽草除風益損湯主之傷於額角及巔者病自目系而下以其足厥陰有隙也加五味子除風益損湯主之諸有熱者更當加黃芩兼服加減地黃丸傷甚者須從權倍加大黃瀉其敗血六節藏象論曰肝受血而能視此益滋血養血復血

之藥也此治其本也又有為物撞震神水遂散
更不復治故并識之於此 被物撞破症 [illegible]
振胞瘀痛症 因病目再被撞打變成內障日夜疼
痛淹淹障子赤膜遶目不能視三光亦如久病
內障宜補肝丸補腎丸石決明丸及皂角丸合
生熟地黃丸 物損真睛症 謂被物觸打徑在
風輪之急者物大則狀大物小則狀小有黃白
二色黃者害速白者稍遲若尖細之物觸傷淺
小者可治可消若麤厲之物傷大而深及缺損

神膏者雖愈亦有瘢痕若觸及破膏者必有膏
汁或青黑色或白色如痰者流出為害尤急縱
然急治瞳神雖在亦難免欹側之患縱其而瞳
神已大者不治物有尖小而傷深膏破者亦有
細細黑顆如蟹睛出愈後有瘢且如竹木刺金
石屑苗葉尖針尖觸在風輪淺而結顆黃者狀
如粟瘡急而有變白者狀如銀星為害稍緩每
見耘苗人竹木匠往往誤觸竹絲木屑苗葉在
風輪而病者若飛揚之物重大而打破風輪者

必致青黃牒出輕而膏破者膏汁流出黑顆為
蟹睛又輕而傷淺者黑膏未出有白膏流出狀
如稠痰凝在風輪欲流不流嫩白如凝脂者此
是傷破瞳神外邊上層氣分之精膏也不可誤
認為外障有礙昏者瞳神有大小欹側之患久
而失治目必枯凸大凡此病不論大小黃白但
有淚流赤脹等證者急而有變珠疼頭痛者尤
急素有痰火風濕斲喪之人病已內積未至於
發今因外傷而激動其邪乘此為害痛甚便澀

者最凶又如木竹芒刺誤觸斷在風輪膏內者
必晝夜疼痛難當急宜取出物若麤大入深者
於此擬處必有膏出為蟹睛治亦有瘢取遲膏
水潰結障生者物去而治障障自退障若大而
厚者僅退亦有迹失取而攻損瞳神者不治若
刺傷膚在風輪皮內取遲者必有瘀血灌脹取
出物有先後之後為輕證大抵此證物尖細者
傷亦小易退而今好麤大者傷亦大難退而有
跡小者能大大者損目風輪最急氣輪次之其

小物所觸淺細者年少精強及善於護養[illegible]純緩之人亦有不治而愈者必其內外別無他證也

振胞瘀痛 謂偶被物撞打而血停滯於瞼睥之間以致脹痛也緩而失治則脹入珠內瘀血灌睛[illegible]有損壞之患狀亦與脹如杯覆同外治開導敷治亦同內治不同若脹如杯覆因火從內起而後壅滯此因外觸凝滯脈道阻塞[illegible]及神珠或素有痰火風邪因而激動乘虛[illegible]又當驗其形證絲絡各隨其經而治之

目爲物所傷[illegible]

百廿四

驚振外障 乃被物撞打而目珠痛痛後[illegible]後如故但過後漸覺昏冥也蓋打動珠中真氣絡澀滯而鬱遏精華不得上運損及瞳神而爲內障之急若初覺昏暗速治之以免內障結成之患若疾已成瞳神無大小欹側者猶可[illegible]治內宜調暢氣血無使凝滯[illegible]

[illegible] 而風颺游絲偶然撞入目中而作痛若野蠶蜘蛛木蟲之絲患尚遲若遇金蠶老鸛等絲其目不出三日迸裂令人但患者風燥熱天行亦熱痛如針刺一應火實之證須乎爲天絲眼不知飛絲入目乃人自知者但迴避不及不意中被其入也入目之時亦自知之倏然而痛淚湧難開[illegible]可以之混治他證乎　治飛絲入目方[illegible]入眼中　柘樹漿點了綿裹筯頭蘸水於眼上繳拭涎毒　火麻子一合杵碎井水一碗浸攪却將舌浸水中涎沫自出神効　一方用茄子葉碎杵如麻子法尤妙　飛絲入眼眯[illegible]如眯痛澀不開鼻流清涕用京墨濃磨以新筆塗入目中閉目少時以手張開其絲自成一塊看在眼白上却用綿輕輕惹下則愈如未盡再塗

目爲物所傷[illegible]

百廿五

物損真睛 謂偶然被物落在目中而痛也凡人被物入目不可乘躁便擦須按住性待淚來滿而擦則物潤而易出如物性重及有芒刺不能出者急令人取出不可揉擦擦則物愈深入而難取若入深須翻上胞取之不取則轉運阻礙氣滯血凝而病變若剌金石棱角之物失取致久及擦重者則壞損輪膏如

痕類凝脂等病輕則血瘀水滯為[illegible]重則[illegible]產
有終不得出而結於瞼內者必須翻而[illegible]
其證而治之此與眯目飛揚不同飛揚細沙撥
眯已成證者此則未成證若已成證則大同小
異終彼輕而此重也

眯目飛塵 因出行間風吹沙土入目頻多揩拭以致氣血凝滯而為病也初起澀淚赤脈次後淚出急澀漸漸重結為障翳然有輕重赤白亦因人之感受血氣部分或時令之寒熱不同耳或變或不變亦隨人之感耳所以當辨形證別經絡而施治 治眯目鹽與豉置水中浸之視水其渣立出 物落眼中用新筆蘸繳出又方濃研好墨點眼立出 治稻麥芒入眼取蠐螬以新布覆目上待蠐螬從布上摩之其芒出著布上

傷寒愈後之病 倪仲賢曰傷寒病愈後或有目復大病者以其清陽之氣不升而餘邪上走空竅也其病隱澀赤脹生翳羞明頭腦骨痛宜作[illegible]之劑[illegible]之數服斯愈傷寒論曰冬時嚴寒萬類深藏君子固密不傷於寒觸冒之者乃名傷寒其傷於四時之氣者皆能為病又生氣通天論曰四時之氣更傷五藏五藏六府一病則濁陰之氣不得下清陽之氣不得上今傷寒時[illegible]雖愈濁陰清陽之氣猶未來復濁陰清陽之氣未復故餘邪尚熾不休走上而為目之害也是以一日而愈者餘邪在太陽二日而愈者餘邪在陽明三日而愈者餘邪在少陽四日而愈者餘邪在太陰五日而愈者餘邪在少

陰六日而愈者餘邪在厥陰七日而復是皆清陽不能出上竅而復受其害也當為助清陽上出則愈人參補陽湯主之羌活勝風湯主之加減地黃丸主之搐鼻碧雲散亦宜用也忌大黃芒硝苦寒通利之劑犯之不可復治

[illegible] 其病多有餘要分血分氣分氣分則有如旋螺泛起[illegible]等證血分則有如瘀血凝脂[illegible]其否隔陰陽澀滯與常人不同為[illegible]每多危急人不如意屢見臨重而措手

不及者內伐又恐傷胎泄氣不伐又源不澄病不去將奈何吁能知其胎繫固否善施內護外切之治則百發百中矣

產後目病 產則百脉皆動氣血俱傷太虛不足邪易以乘肝部發生之氣甚弱血少而膽失滋養精汁不盛則目中精膏氣液皆失化源所以目病者亦多然輕重內外不同有勞瞻竭視悲傷哭泣而為無時冷熱淚內障昏眇等證有竅不密引入風邪為濕爛頭風者有因虛沐髮濕

氣歸腦而為內障諸病者有因虛勞役恣辛嗜熱及患熱病而傷目血為外障者皆內不足所致善知愛護者疾微而不變不知保養反縱斲喪則變重不一大抵產後病宜早治莫待其久久則氣血定而病深治亦不易其外證易知者人皆知害而早治其內證害緩者人多忽之比其成也為無及之悔者多矣參有目病條下血過多之病

因風證 謂患風病人目疾也風在五行為木在臟為肝在竅為目木乎一氣久風則熱勝熱勝則血弱風久必鬱鬱則火生火性炎上故患風人未有目不病者然各因其故而發有目淺而鬱未深為偏喎歪斜者有入脾而脾反濕勝而亦爛者有血虛筋弱而振搐者有不禁反傷精神及恣燥嗜熱助邪亂清和融純之氣氣鬱而為內障者有風盛血滯結為外障如努肉等證者亦以服餌香燥之藥耽酒縱辛欲愈病而火愈熾病變證變重者治各因其證而伐其本內外常切不同大抵風病目者當去風為先

不然目病雖退而復來雖治至再至三風不住目病終無不發之理

因毒證 謂人生瘡瘍腫毒累及目病也夫六陽火燥有餘水不能制致妄亂無拘氣滯血壅而始發瘡瘍腫毒火性炎上目竅高火所從泄謂光清明之竅府臟清淨融和之府瘡毒雖病潮亂之時邪氣侵擾清和因毒勢衰而目之虛實必從臟腑之精汁不光化源弱而目終不滋故邪得乘虛入目而為害若病目正

在病毒之時治毒愈而目亦愈若毒愈而目不愈者乃邪入至高之深處難以自退當濬其流澄其源內而解散其有稽滯之處

因虛證　謂因虛弱而得者及目也所致不同有陰病而陰自傷有陽病而陽自損有寒病熱藥太過傷其神氣有熱病寒藥大過耗其精血補者瀉之瀉則損其元瀉者補之補則助其邪針砭之泄散損其氣炮炙之激動火邪實實虛虛損不足益有餘之故不同亦各因人觸犯感之

藏府經絡衰旺隨其所因而入為病內外輕重不等當驗其標而治其本譬如傷寒陽證熱鬱蒸損瞳神內證也熱盛血滯赤痛淚澀者外證也陰證脫陽目盲內證也服餌附陽燥熱之劑多而火燥赤澀者外證也痰嗽之熱損瞳神內證也火滯於血而赤澀外證也瀉痢後昏眇為穀氣之乏竭而絕之氣傷不能發生長養津液耗而膏汁不得滋潤內證也山嵐瘴氣目昏者邪氣蒙蔽正氣外證也蠱脹中滿赤痛者陰虛難制陽邪內證也氣證多怫鬱痿證多昏花皆內證也痰證之膩沫火證之赤澀皆外證也餘倣此　夢靈丸明目生熟地黃丸合皂角丸羌蔚子丸

痘疹餘毒證　痘疹為毒最重為自禀受以來蘊積最深久之故古稱曰百歲瘡謂人生百歲之中必不能免一發則諸經百脈清純太和之氣皆為其擾亂一番正氣大虛而邪得以乘之各因所犯而為疾況目又清純之最者通於

肝膽肝膽為清淨之府邪正不並立今受濁邪熏灼則目有失發生長養之源而病亦易侵昔由人不能救而且害之之故也或於病中食物太過懷藏太暖誤投熱藥多食甘酸而致病者或於病後因虛未復恣食辛辣燥膩竭視勞瞻好啼多哭衝冒風沙煙障而致病者有為昏蒙流淚之內證者有為赤爛星障之外證者有餘邪蘊積蒸燒肝膽腫花翳蟹睛等證之重而目損者有餘邪偶流為赤絲亦眼微星薄翳等

證之輕而病自消者輕重淺深亦各隨人之所受所患不一當驗其證而審其經以治之不可執一反有激變之禍蓋痘疹之後人同所造比之常人不同若有所悮貽害終身行斯道者宜加謹焉大抵治之早則易退而無變延則雖無變恐血氣凝定卽易治之證亦退遲矣今人但見痘後目疾便謂不治不知但瞳神不損者縱久遠亦有可治之理惟久而血定精凝瞳翳沉滑澀損者則不治耳　倪仲賢云痘疹餘毒所害者與風熱不制之病稍同而異總以羚羊角散主之便不鞕者減硝黄未滿二十一日而病作者消毒化癍湯主之　海藏云東垣先生治癍後風熱毒翳膜氣暈遮睛以瀉青丸子瀉之大効初覺易治　餘詳見痘疹門

時復證　謂目病不治忍待自愈或治失其宜有犯禁戒傷其脉絡遂致深入又不治之致搏夾不得發散之故或年之月月之日如花如潮至期而發至期而愈久而不治及因激發遂成大害未發者問其所發之時令以別病本在何經位已發者當驗其形證絲脉以別其何部分然後治之

證治準繩第八冊目錄

七竅門下

耳 耳聾 耳鳴 耳腫痛 耳痒 停耳 耳內瘡 凍耳成瘡 蟲入耳

鼻 鼻塞 鼻鼽 鼻淵 息肉 鼻瘡 鼻痔蝕 鼻乾無涕 鼻赤 鼻紫黑

口 口甘 口酸 口苦 口辛 口鹹 口淡 口糜 口瘡 口臭

齒 牙痛 齲蛀 牙齗宣露 牙齒動搖 牙齒不生

唇

舌 舌腫痛

面 面腫 面寒 面熱 面青 面塵 面赤 面黃 面白 面黑 面上瘡 瘡瘢 粉刺 黑䵟 面聚皮痛 酒皶

頰頤

咽喉 喉痺 咽嗌痛 乳蛾 生瘡 如有物噎塞 諸物梗喉

四肢

筋 轉筋

骨

肉

皮膚 痛 索澤

髭髮 黃白 落不生

腋 氣

蠱毒 蟲

耳

金壇王肯堂輯

[illegible]屬足少陰腎經 [illegible]者[illegible]舍 [illegible]於[illegible]在 [illegible]為 [illegible]前 [illegible]內 [illegible]高耳後 [illegible]耳[illegible]不[illegible]者 又屬手少陰心經 [illegible]於心開竅 [illegible]之人[illegible]於耳中 又屬手太陰肺經 [illegible]者[illegible]為金 [illegible]是耳中有肺水[illegible]士 [illegible]

[illegible]於[illegible]太陰肺絡會於 又屬足 [illegible]不能[illegible]而耳聾 [illegible] 又 厥陰肝經 [illegible]耳[illegible] 屬手足少陽三焦膽手太陽小腸經之會 [illegible] 又屬手足陽明大腸[illegible]經 [illegible] 又屬足太陽膀胱經 [illegible]

[illegible]又屬手足少陰心腎太陰肺脾足陽明胃經之絡[illegible]之別病**耳前**屬手足少陽三焦膽足陽明胃經之會[illegible]手少陽脈氣之所行也**耳後**屬手足少陽三焦膽經之會李東垣曰少陽者[illegible]出於耳當後也(一)按此語戶證上文**耳下曲頰**屬足少陽膽陽明大腸經之會又屬手太陽小腸經[illegible]**曲頰前**屬足少陽膽陽明大腸經之會**前寸許**屬手陽明大腸經**曲頰後**屬足少陽膽經[illegible]在耳下曲頰之後

保命集云夫耳者以竅言之水也以聲言之金也以經言之手足少陽俱會其中也有從內不能聽者主也有從外不能入者經也有若蟬鳴者有若鐘聲者有若火熇熇然者各隨經見之其間虛實不可不察也假令耳聾者何謂治肺肺主聲鼻塞者肺也何謂治心心主臭如推此法皆從受氣於始腎受氣於巳心受氣於亥肝受氣於申脾受氣於寅脾受氣於四季此治法皆生長之道也　趙以德曰耳者

腎之竅足少陰經之所主然心亦寄竅於耳在身十二經脈中除足太陽手厥陰外其餘十經脈絡皆入耳中蓋腎治內之陰心治外之陽合天地之道精氣無處而不交通故清淨精明之氣上走空竅耳受之而聽斯聰矣因此耳屬二臟之竅也於是諸經會其陰陽五行精明者皆上入之所以宮商角徵羽之五音從斯辨矣經曰清陽為天積陰為地清陽出上竅是也苟二氣不調則交通不表故陽氣者閉塞地氣者冒明而陽氣之閉塞者或因煩勞陰虛氣浮或因衛氣不下循脈積聚於上或得於邪風與陽並盛或因熱淫之勝或因三焦之火獨光而耳中渾渾焞焞或因鬱滯積熱所致或因大怒氣上而不下大如是者皆由心氣虛實不調虛則不能治其陽下與陰交實則特陽強而與陰絕經曰至陰虛天氣絕是也而地氣之冒明者或憂愁不解陰氣閉塞不與陽通或內外淫佚驕矜其氣不得升降則耳中亦渾渾焞焞或腎精脫

腎竅之精脫二者尺脈絕則死或耳中因二氣不和結乾耵聹塞之夫如是皆由腎氣不和虛則陰氣微不能上交於陽而陽是暴實則陰氣逆不納其陽也靈樞曰腎氣通於耳腎和則能聞五音五藏不和則七竅不通故凡一經一絡有虛實之氣入於耳中者皆足以亂二藏主竅之精明至於聾聵此言暴病者也若夫久聾者於腎亦有虛實之異左腎為陰主精右腎為陽主氣精不足氣有餘則聾為虛其人瘦而色黑筋骨健壯此精氣俱有餘固藏閉塞是聾為實乃高壽之兆也二者皆稟賦使然不須治之又有年衰者經曰不知調陰陽七損八益之道早衰之節也其年五十體重耳目不聰明矣此亦無治也唯暴聾之病與陰陽隔絕之未甚經脈欲行而未通衝擊其中鼓動聽戶隨其氣之微甚而作嘈嘈風雨諸聲者則可隨其邪以為治補不足瀉有餘務使陰陽和平自然清淨之氣上走耳中而聽斯聰矣曰若子所云水火

何關此竅何原病式之非溫補答曰心在竅為舌以舌非孔竅因寄竅於耳則是腎為耳竅之主心為耳竅之客以五藏開竅於面部分陰精陽氣言之在腎肝居陰故耳目二竅陰精主之在心肺脾居陽故口舌鼻三竅陽氣主之所以陰精主者貴清涼而惡煩熱陽氣主者貴溫暖而惡寒涼潔古老人皆有是論信耳目之不可以溫補也　仁齋直指云腎通乎耳所主者精精氣調和腎氣充足則耳聞而聰若勞傷氣血風邪襲虛使精脫腎憊則耳轉而聾又有氣厥而聾者有挾風而聾者有勞傷而聾者蓋十二經脈上絡於耳其陰陽諸經適有交并則臟氣逆而為厥厥氣搏入於耳是為厥聾必有時乎眩暈之證耳者宗脈之所附脈虛而風邪乘之風入於耳之脈使經氣否而不宣是為風聾必有時乎頭痛之證勞役傷於血氣淫欲耗其精元瘦悴力疲昏昏憒憒是為勞聾有能將適得所血氣和平則其聾暫輕其或日就勞傷風邪

停滯則爲久聾之證矣外此又有耳觸風邪與氣相擊其聲嘈嘈眼或見火謂之虛鳴熱氣乘虛隨脉入耳聚熱不散膿汁出焉謂之膿耳人耳間有津液輕則不能爲害若風熱搏之津液結鞕成核塞耳亦令暴聾謂之耵耳前是數者腎脉可推風則浮而盛熱則洪而實虛則濇而濡風爲之疎散熱爲之清利虛爲之調養邪氣並退然後以通耳調氣安腎之劑主之　風虛耳聾排風湯桂星散羊腎羹魚腦膏磁石丸蕙

茹散　風熱耳聾犀角飲子芍藥散犀角散茯神散　耳聾皆屬於熱少陽厥陰熱多宜開痰散風熱通聖散滾痰丸之類　耳因鬱聾以通聖散內加大黃酒煨再用酒炒三次後入諸藥通用酒炒　厥聾和劑流氣飲加石菖蒲每服三錢以生薑葱白同煎食後服沉香降氣湯或蘇子降氣湯不換金正氣散指迷七氣湯輕者吞來復丹重者吞養正丹凡治耳聾皆當調氣

氣逆耳聾有三肝與手太陽少陽也經云肝氣逆則頭痛耳聾不聽頰腫又云太陽所謂浮爲聾者皆在氣也羅謙甫云手太陽氣厥而耳聾者其候聾而耳內氣滿也手少陽氣厥而耳聾者其候耳內渾渾焞焞此皆氣逆而聾也治法宜四物湯吞龍薈丸降火及復元通氣散調氣是也　耳聾有濕痰者檳榔神芎丸下之

耳聾而頰黑者爲精脫腎虛羅謙甫云經曰精脫者則耳聾夫腎爲足少陰之經乃藏精而氣通於耳耳者宗脉之所聚也若精氣調和則腎

氣強盛耳聞五音若勞傷氣血兼受風邪損於腎藏而精脫者則耳聾也然五藏六府十二經脉有絡於耳者其陰陽經氣有相併時併則藏氣逆名之曰厥厥氣相搏入於耳之脉則令聾其腎病精脫耳聾者其候頰顴色黑手少陽之脉動則氣厥逆而耳聾者其候耳內渾渾焞焞也手太陽厥而耳聾者其候聾而耳內氣滿也宜以燒腎散主之　燒腎散益腎散補腎丸蓯蓉丸肉蓯蓉丸桑螵蛸湯腎虛有寒者宜之

本事地黃湯腎虛有熱者宜之　耳聾少氣嗌乾者爲肺虛東垣曰藏氣法時論云肺虛則少氣不能報息耳聾嗌乾註云肺之絡會於耳中故聾此說非也蓋氣虛必寒盛則氣血俱濇滯而不行也耳者宗氣也肺氣不行故聾也宜生脉散嚥下蠟彈丸　耳聾多恐者爲肝虛經云肝虛則目䀮䀮無所見耳無所聞善恐治法用四物湯加防風羌活柴胡菖蒲茯神等分煎湯服二十餘貼却用薑蝎散開之本草云肝虛則

生薑補之是也　勞聾宜益氣聰明湯　頭目不清清神散　氣閉不通通氣散秘傳降氣湯加菖蒲　外治通神散通耳法追風散草麻丸雞黃散透耳筒鯽魚膽膏蝸牛膏鼠膽丸雞卵方炙方驢脂方鵲附方龜尿方乾地龍方魚腦膏　[illegible] 草麻子丸天雄雞子方通氣散水銀方大蒜方勝金透關散　[illegible] 蒲黃膏龍腦膏川椒巴荳菖蒲松脂以麻蠟爲筒子內耳中一日一易或用雄黃一錢巴荳肉一箇研細葱涎

和作錠子紙捲塞耳中或用[illegible]汁滴耳中[illegible]云夫卒耳聾[illegible]風邪所乘搏於經絡隨其血脉上入耳[illegible]邪氣相搏故令卒聾也[illegible]云[illegible]不通[illegible]人云少陽之[illegible]也宜於通[illegible]治法[illegible]有四　一曰[illegible]邪傷腎[illegible][illegible]太陰在泉濕淫所勝民病耳聾渾渾[illegible]治以苦熱是也　二曰燥邪傷肝聾[illegible]云

歲金太過燥氣流行肝木受邪民病耳聾無所聞是也　三曰火邪傷肺聾經云歲火太過炎暑流行肺金受邪民病耳聾是也　四曰風火炎擾於上聾經云少陽司天之政風熱參布雲物沸騰民病聾瞑三之氣炎暑至民病熱中聾瞑治以寒劑是也　[illegible] 經云耳者宗脉之所聚也故胃中空則宗脉虛虛則下溜脉有所竭故耳鳴補客主人手大指爪甲上與肉交者也又云上氣不足耳爲之苦鳴補足外踝下留之

又云腦為髓之海其輸上在百會下在風府髓
海不足則腦轉耳鳴審守其輸調其虛實又云
液脫者腦髓消脛痠耳數鳴凡此皆耳鳴之屬
虛者也　經云太陽所謂耳鳴者陽氣萬物盛
上而躍故耳鳴也又云厥陰司天風行太虛雲
物搖動目轉耳鳴三之氣天政布氣乃時舉民
病耳鳴又云厥陰之脉耳鳴頭眩又云少陽所
至為耳鳴治以涼寒凡此皆耳鳴之屬實者也
王汝言云耳或鳴甚如蟬或左或右或時閉

塞世人多作腎虛治不效殊不知此是痰火上
升鬱於耳中而為鳴鬱甚則壅閉矣若遇此證
但審其平昔飲酒厚味上焦素有痰火只作清
痰降火治之大抵此證多先有痰火在上又感
惱怒而得怒則氣上少陽之火客於耳也若腎
虛而鳴者其鳴不甚其人多欲當見勞怯等證
丹溪云耳鳴因酒遏者用大劑通聖散加枳
殼柴胡大黃甘草南星桔梗青皮荊芥如不愈
用四物湯　薛新甫云若血虛有火用四物加

山梔柴胡若中氣虛弱用補中益氣湯若血氣
俱虛用八珍湯加柴胡若怒便聾而或鳴者屬
肝膽經氣實用小柴胡加芎歸山梔虛用八珍
湯加山梔若午前甚者陽氣實熱也小柴胡湯加
黃連山梔陽氣虛用補中益氣湯加柴胡山梔
午後甚者陰血虛也四物加白朮茯苓若腎虛
火動或痰盛作渴者必用地黃丸　胃中空宗
脉虛上氣不足皆參芪為君柴升佐之　耳中
閧閧然是無陰也又液脫者腦髓消脛痠耳數

鳴宜地黃丸　腎虛耳中潮聲蟬聲無休止時
妨害聽聞者當降氣補腎正元飲咽黑錫丹間
進安腎丸有熱者龍齒散　腎藏風耳鳴夜間
睡着如打戰鼓更四肢抽掣痛耳內覺有風吹
奇痒宜黃芪丸　腎者宗脉所聚耳為之竅血
氣不足宗脉乃虛風邪乘虛隨脉入耳氣與之
搏故為耳鳴先用生料五苓散加製枳殼橘紅
紫蘇生薑同煎吞青木香丸散邪疏風下氣續
以芎歸飲和養之　耳中耵聹耳鳴耳聾內有

污血宜柴胡聰耳湯　餘法與耳鳴相參用之
外治麝香散吳茱萸散及烏頭燒灰菖蒲等
分末之綿包塞耳或用生地黃截塞耳數易之
以瘥爲度　**耳腫痛**屬少陽相火經云少陽之
勝耳痛治以辛寒是也　生耳者先耳前飲子解
熱飲子　耳內痛生瘡用黍粘子湯　耳濕腫
痛用涼膈散加酒炒大黃黃芩酒浸防風荆芥
羌活服之更以腦多麝香少濕加枯礬吹入耳
中　丹鉛續錄云王萬里時患耳痛魏文靖公
勸以服青鹽鹿茸煎雄附爲劑且言此藥非爲
君虛損服之曷不覩易之坎爲耳痛坎水藏在
腎開竅於耳而水在志爲恐恐則傷腎故爲耳
痛氣陽運動常顯血陰流行常幽血在形如水
在天地間故坎爲血卦是經中已著病證矣竟
餌之而良愈　外治白龍散杏仁膏菖蒲挺子
或用穿山甲二片土狗子二箇炙在穿山甲內
同炒焦黑色爲度入麝香少許同研細吹一字
於耳內□□或用蓖麻仁如棗核大獨蒜汁□

耳內□□　或用鬱金研細末每以淨水□一
字傾入耳內急傾出或用油調桃肉爲末□□
汁和丸如桐子大綿裹安耳中或用食鹽炒
熱用棗麵蒸熱青花布包定枕之　**耳痒**沈存
中云予嘗河北察訪使時病赤目四十餘日黑
睛傍黯赤成瘡晝夜痛楚百療不瘥郎官丘革
相見問予病目如此曾耳中痒否若耳中痒卽
是腎家風有四生散療腎風每作二三服卽瘥
閭里號爲聖散子予傳其方合服之午時一服
臨臥一服目反大痛至二鼓時乃能眠及覺目
赤稍散不復痛矣更進三四服遂平安如常是
歲孫和甫學士帥鎮陽聞予說大喜曰吾知所
以自治目矣向久病目嘗見呂吉甫參政云頃
目病久不瘥因服透冰丹乃瘥如其言修合透
冰丹一劑試服了二三十服目遂愈乃知透冰
丹亦療腎風耳　聖惠云有人身痒一日一作
可畏者搔劇出血稍瘥此乃腎臟虛致浮痒上
攻未易以常法治也宜服透冰丹勿飲酒□濕

麪蔬菜雞猪之屬能益一月爲佳不能戒無效

停耳 羅謙甫云耳者宗脉之所聚腎氣之所通足少陰之經也若勞傷氣血熱氣乘虛入於其經邪隨血氣至耳熱氣聚則生膿汁故謂之停耳也内服柴胡聰耳湯通氣散蔓荊子散外用紅綿散松花散白蓮散麝香散杏仁膏礬石散葱涎膏菖蒲散竹蛀散蝎倍散立效散香附散二黄散二聖散　如壯盛之人積熱上攻耳中出膿水不瘥用無憂散送雄黄丸爲三四五

行瘥

耳内瘡 羅謙甫云耳内生瘡者爲足少陰是腎之經也其氣通於耳其經虛風熱乘之隨脉入於耳與氣相搏故令耳門生瘡也宜曾青散主之黄連散亦可　内服黍粘子湯　薛新甫云耳瘡屬手少陽三焦經或足厥陰肝經血虛風熱或肝經燥火風熱或腎經風火等證若發熱焮痛屬少陽厥陰風熱用柴胡梔子散若内熱痒痛屬前二經血虛用當歸川芎散若寒熱作痛屬肝經風熱用小柴胡湯加山梔川芎若内熱口乾屬腎經虛火用加味地黄丸如不應用加減八味丸餘當隨證治之　凍耳成瘡方柏葉三兩微炙爲末杏仁四十九枚湯浸去皮研成膏亂髮雞子大食鹽乳香各半兩細研黄蠟一兩半清油一斤右先煎油令沸下亂髮以消盡爲度次下諸藥煎令焦黄濾去滓更以綿重濾過再以慢火煎之後下乳香黄蠟等攪令稠稀得所於磁器盛每用鵝翎旋取塗之　又方柏白皮榆白皮桑白皮杏仁湯浸去皮各

二兩甘草一兩羊腦髓半斤右剉以手撚研煎令黄濾去滓於磁器盛每用鵝翎蘸藥塗之

蟲入耳 薛新甫云先君嘗睡間有蟲入耳中[illegible]將生薑擦猫鼻其尿自出取尿滴耳[illegible]出而愈又有一人張錦衣[illegible]不[illegible]作痛痛而欲死痛止[illegible]非瘡也[illegible]入耳令[illegible]取猫尿滴耳果出一[illegible]不復痛或用麻油滴之則蟲死難出或用[illegible]擦之則蟲亦出

但俱不及猫尿之速也 治百蟲入耳 藍汁
葱汁 韭汁 萵苣汁 雞冠血 酸醋
香油 稻稈灰汁 俱灌入耳中 桃葉挼細
塞耳 白膠香燒煙熏入耳 猪肉少許炙香
置耳孔邊 麻油作煎餅側卧以耳枕之 以
火照之 以刀兩口於耳上相擊作聲 水銀
一大豆傾入耳中欹耳孔向下於耳上擊銅器
物數聲 白礬雄黃等分爲細末香油調成膏
每用皂角子大塞耳 川椒爲末一錢醋半盞

浸良久少少滴耳中 用口氣盡力吸出最妙
蚰蜒入耳 立驗散 硇砂膽礬等分研細鵝
翎管吹一字入耳中蟲化爲水 雞一隻去毛
足以油煎令黃筯穿作孔枕之 緑礬爲末水
調灌耳 雄黃爲末醋調灌耳 蝸牛一箇槌
碎置耳邊 牛乳一盞少少灌入耳內若入腹
者飲一二升當化爲黃水 驢乳三合灌耳中
其蟲從左耳入右耳出 蜈蚣入耳 用煎雞卵
之或用炙猪肉掩兩耳 韭汁或薑汁灌耳中

蜈蚣及蟻入耳用猪脂一指大炙令香安耳
邊即出又用生薑汁灌耳中即出 大蒜汁亦
可 蟻入耳 搗韭汁灌 大蒜汁亦可 鯪鯉
甲燒灰爲末水調濾過滴入耳中 [illegible]
汁灌入耳即出或以稻管極氣吸之出或以
銅器於耳邊 蚤虱入耳 最害人速用皂角子
蟲研爛生鱔血調灌入耳中 蜚蠊入耳 猪脂
蒲爲末炒乘熱以綿裹着耳邊 蚯蚓入耳 以鹽
荷汁點之効 治耳中有物不可出以麻繩剪

令頭散傅好膠着耳中使其物粘之徐徐引出
蟲用弓弦 ... 妙

【頞中】頞亦作齃[illegible] **屬足陽明胃經督脈之會** [illegible]

屬手太陰肺經 [illegible] 東垣曰[illegible]肺[illegible]鼻中[illegible]不聞[illegible]氣通於天也 **又屬手少陰心經**

【鼻】東垣曰：鼻本主肺而反能聞香臭者，鼻中有心，庚金生於巳也。素問曰：五氣入鼻，藏於心肺，心肺有病而鼻為之不利也。 **又屬手足陽明大腸胃經督脈之交會** [illegible] **其在小兒面部謂之明堂** [illegible]論也 **屬足太陰**

脾經[illegible] 足陽明大腸胃經[illegible]督脈之會 餘處無志[illegible]

[illegible]者其人必為淋也，鼻尖微白者亡血也[illegible]熱也，黃者小便難也

皆屬肺經。云肺氣通於鼻，肺和則鼻能知香臭矣。又云五氣入鼻，藏於心肺，心肺有病而鼻為之不利也。又云西方白色，入通於肺，開竅於鼻，藏精於肺。又云肺主臭，在藏為肺，在竅為鼻是也。

【鼻塞】東垣曰：金匱真言論云西方白色，入通於肺，開竅於鼻，藏精於肺。夫十二經脈三百六十五絡，其氣血皆上走於面而走空竅，其精陽氣上走於目而為睛，其別氣走於耳而為聽，其宗氣出於鼻而為臭。難經云：肺氣通於鼻，肺和則能知香臭矣。夫陽氣宗氣者，皆胃中生發之氣也，其名雖異，其理則一。若因饑飽勞役損脾胃，生發之氣既弱，其營運之氣不能上升，邪塞孔竅，故鼻不利而不聞香臭也，宜養胃實營氣

質管氣陽氣宗氣上升鼻管則通矣又一說難
經云心主五臭肺主諸氣鼻者肺竅反聞香臭
者何也蓋以竅言之肺也以用言之心也因衛
氣失守寒邪客於頭面鼻亦受之不能爲用是
不聞香臭矣故經曰心肺有病鼻爲之不利潔
古曰視聽明而清涼香臭辨而溫暖者是也治
法宜先散寒邪後補衛氣使心肺之氣得交通
則鼻利而聞香臭矣麗澤通氣湯主之　眼多
傷涙溫肺湯　咳嗽上喘禦寒湯　日中溜火

氣寒血熱涙多臍下冷陰汗足痿弱溫衛湯
耳鳴口不知穀味氣不快四肢困倦行步不正
髮脫落食不下膝冷陰汗帶下喉中介介不得
卧口舌嗌乾太息頭不可回顧項筋緊急介强
肩頭旋眼黑頭痛呵欠嚏噴溫衛補血湯　人
參湯　辛夷散　增損通聖散　辛夷湯　醍
醐散　通關散　防風湯　排風散　蓽澄茄
丸　皆治鼻塞之劑宜審表裏寒熱而用之
小薊一把水二升煮一升去渣溫服　外治通

草散菖蒲散瓜蒂散搐鼻[illegible]汁[illegible]
分作三段早用葱白午用葱管中截晚用葱管
末梢一截塞入鼻中令透氣爲效　王汝言曰
鼻塞不聞香臭或但遇寒月多塞或略感風寒
便塞不時舉發者世俗皆以爲肺寒而用解表
通利辛溫之藥不効殊不知此是肺經素有火
邪火鬱甚則喜得熱而惡見寒故遇寒便塞遇
感便發也治法清肺降火爲主而佐以通氣之
劑若如常鼻塞不聞香臭者再審其平素只作

肺熱治之清金瀉火清痰或丸藥噙化或末藥
輕調緩服久服無不効矣此予所親見而屢驗
者但平素原無鼻塞舊證一時偶感風寒而致
窒塞聲重或流清涕者自作風寒治　薛新甫云
前證若因饑飽勞役所傷脾胃發生之氣不能
上升邪害空竅故不利而不聞香臭者宜養脾
胃使陽氣上行則鼻通矣補中益氣湯之類是
也　孫氏姑鼻不聞香臭有年矣後因他疾友
人繆仲淳爲處方每服用桑白皮至七八錢服

久而鼻塞忽通　鼻塞久而成齆蓋由肺氣注於鼻上榮頭面若上焦壅滯風寒客於頭腦則氣不通冷氣停滯搏於津液膿涕結聚則鼻不聞香臭遂成齆也內服芎藭散山茱萸丸外用赤龍散通頂散雄黃散黃白散通草散

【鼻鼽】謂鼻出清涕也　內經運氣鼻鼽有二一曰火攻肺虛鼻鼽經云少陰司天熱氣下臨肺氣上從鼽衄鼻窒又云少陰司天熱淫所勝民病鼽衄嚏嘔又云少陽司天火淫所勝甚

則鼽衄又云少陽之復煩躁鼽嚏又云少陰司天客勝則鼽嚏又云歲金不及炎火乃行民病鼽嚏又云金不及曰從革從革之紀其病嚏咳鼽衄治以諸寒是也　二曰金助肺實鼻鼽經云陽明所至為鼽嚏治以溫劑是也　徐一奎曰大腸肺之府也胃五藏之所受氣者也經曰九竅不利腸胃之所生也鼻主無形者經曰清氣通於天又曰鼻主天氣故腸胃無痰火積熱則平常上升之氣皆清氣也縱火熱主令之歲何嘗病耶若腸胃素有痰火積熱則其平常上升之氣皆氣而為濁耳金職司降喜清而惡濁今受濁氣熏蒸凝聚既久壅遏鬱結而為涕至於痔贅瘜肉之類皆由積久燥火內鬱而然外木降道宋氣血升降被其妨礙澆漬積厚積熱上而成息也即非火熱主令之歲亦有不病皆乎治者無拘於運氣之說可也　細辛散本事通草丸三因辛夷散千金細辛膏川椒散若桂膏皆溫熱之劑須是腦冷者乃可用　白

芷丸有外感者可服　丹溪云肥人鼻流清涕乃飲食痰積也蒼朮片芩南星川芎白芷辛夷甘草或末或丸皆可白湯下

【鼻淵】謂鼻出濁涕也　經云膽移熱於腦則辛頞鼻淵鼻淵者濁涕下不止也傳為衄衊瞑目[illegible]故得之氣厥也王太僕注云腦液下滲則為濁涕涕下不止如彼水泉故曰鼻淵也頞謂鼻頞也足太陽脈起於目內眥上額交巔上入絡腦足陽明脈起於鼻交頞中旁約

太陽之脉今膀熱則足太陽逆與陽明之脉俱盛薄於頞中故鼻頞酸痛也熱盛則陽絡溢陽絡溢則衄出汗血也血出甚陽明太陽脉衰不能榮養於目故目瞑厥者氣逆也皆由氣逆而得之宜服防風湯　運氣鼻淵皆屬熱經云少陰之復甚則入肺咳而鼻淵治以苦寒是也　仲景云肺中寒者吐濁涕　原病式曰夫五行之理微則當其本化甚則兼其鬼賊故經曰亢則害承乃制也易曰燥萬物者莫熯乎火以火

煉金熱極而反化為水故其熱極則反汗出也由是肝熱甚則出泣心熱甚則出汗脾熱甚則出涎肺熱甚則出涕腎熱甚則出唾經曰鼻熱甚出濁涕又曰膽移熱於腦則辛頞鼻淵故凡痰涎涕唾稠濁者火熱盛極消爍致之也或言鼽為肺寒者誤也但見鼽涕鼻窒遇寒則甚遂以為然豈知寒傷皮毛則腠理緻密熱氣怫鬱而病愈甚也　三因蒼耳散嚴氏辛夷散皆表劑也　丹溪治鼻淵藥南星半夏蒼朮白芷神

麯酒芩辛夷荊芥　婁全善治一中年男子右鼻管流濁涕有穢氣脉弦小右寸滑左寸濇先灸上星三里合谷次以酒芩二兩蒼朮半夏各一兩辛夷細辛川芎白芷石膏人參葛根各半兩分七貼服之全愈此乃濕熱痰積之證也丙一　全云嘗以防風通聖散除硝黃其滑石石膏減半倍加辛夷花先服三五貼再用此為丸每服七十丸早晚白湯吞服半斤則瘳矣　抑金散　戴復菴云有不因傷冷而涕多涕或黃

或白或時帶血如腦髓狀此由腎虛所生不可過用涼劑宜補腦散仍以黑錫丹紫靈丹靈砂丹　亦有痰氣者宜南星飲　頭風鼻涕下如白帶宜辛夷丸　久患鼻膿極臭者以冷水調白鹿霜末服　治腦漏驗方人參白朮川芎當歸各一錢黃芪防風各七分陳皮八分白芷木通各五分辛夷四分細辛升麻炙甘草各三分水煎食後半飽服　又方川芎二錢防風一錢二分白芷荊芥穗黃芩石膏各一錢細辛升麻

木通各七分藁本桔梗各五分甘草三分末之
每七錢加煅過黃魚腦中骨二錢茶清調下虛
人加人參麥門冬　鼻中時時流臭黃水甚者
腦亦時痛俗名控腦砂有蟲食腦中用絲瓜藤
近根三五尺許燒存性爲細末酒調服即愈
又方沉香少許宿香去白二錢雄黃皂角各少
許白牛毛橙葉焙乾各二錢右爲細末吹入鼻
中倘有少血出不妨血出加炒山梔子　灸法
顖會在鼻心直上入髮際二寸再容豆是穴灸

七壯又灸通天在顖會上一寸兩傍各一寸灸
七壯左臭灸左右臭灸右俱臭俱灸曾用此法
灸數人皆於鼻中去臭積一塊如朽骨臭不可
言去此全愈

鼻瘜肉　韓氏醫通云貴人鼻中肉贅臭不可
近痛不可搖束手待斃予但以白礬末加硇砂
少許吹其上頃之化水而消與勝濕湯加瀉白
散二貼愈此厚味擁濕熱蒸於肺門如雨霽之
地突生芝菌也　肺虛而寒鼻生瘜肉不聞香

臭羊肺散　胃中有食積熱痰流注宜星半苓
术酒芩連神麴辛夷細辛白芷甘草消痰積之
藥內服外用蝴蝶礬二錢細辛一錢白芷五分
爲末綿裹納鼻中頻換　辛夷膏輕黃散菌白
散二丁散瓜丁散地龍散皆外治之藥

[illegible]　內服烏犀丸　甘露飲　黃連阿膠丸
外治地黃煎　辛夷膏　杏仁研乳汁傅
烏牛耳垢傅　黃蘗苦參檳榔爲末猪脂調傅
青黛槐花杏仁研傅

[illegible]　椿根湯　烏香散　藍靛傅令徧日
十度夜四度立瘥

[illegible]　犀角散　桑根白皮散　吹鼻散
[illegible]氣道壅塞故痛內服人參順氣散外傅
白芷散　風冷傷於肺藏上攻於鼻則令鼻痛
[illegible]散　肺受風面色枯白頰時赤皮膚乾燥
鼻塞乾痛此爲虛風白鮮皮湯　鼻塞眼昏疼
痛腦悶[illegible]湯　辛食物從鼻中縮入腦中介
介痛不出以牛脂或羊脂如指頭大內鼻中以

鼻吸取脂入須臾脂消則物逐脂俱出也
【鼻赤】一名酒皶鼻乃血熱入肺也肺氣通於
鼻為清氣出入之道路多飲酒人邪熱熏蒸肺
葉伏留不散故見於鼻或肺素有風熱雖不飲
酒其鼻亦赤謂之酒皶鼻俗名也宜一味折二
消食後冷飲或以枇杷葉拭去毛不須塗炙剉
細煎濃湯候冷調消風散食後臨臥進亦可服
升麻防風散凉膈丸　秘方用枇杷葉去毛大山
梔苦參蒼朮米泔浸各等分為末每服一錢半酒

調白滚湯嚥下晚服之去右邊赤早服之去左
邊赤其效如神　外用硫黃入大菜頭内煨爛
塗之或以生白礬研末每洗面時置掌中酒調
搽鼻疱數日即愈或以白鹽常搽或以牛馬耳
垢水調傅或以半夏末水調傅或以山梔仁米
花杏仁研傅或以杏仁一味研汁塗或用硫
黃四兩白果燒灰百部各三分輕粉五分白
礬五分各為末用燒酒一碗入酒壺將前藥裝
內封固懸空鍋內熱湯浸壺柄火頓一二時取

出放冷日用燒酒搽夜用沉底者搽
【鼻齄】　丹溪云諸陽聚於頭則鼻為陽中之
陽鼻居面中央而陽明起於頞中一身之血運
到面鼻陽部皆為至清至精之氣矣酒性善行
而喜升大熱而有峻急之毒多酒之人酒氣熏
蒸面鼻血得酒為極熱熱血得冷為陰氣所搏
汚濁凝結滯而不行宜其先為紫而後為黑色
也須用融化滯血使得流通滋生新血可以還
化病乃可愈予嘗以酒製四物湯加酒炒片芩

陳皮生甘草酒紅花生薑煎調下五靈脂末飲
之氣弱形肥者加酒黃芪無有不應以酒醫為引使

口者脾之所主胃大腸脉之所挾經云中央黃色入通於脾開竅於口藏精於脾又云脾主口在藏為脾在竅為口又云脾氣通於口脾和則口能知五味矣此脾之主於口也又經云胃足陽明之脉挾口下交承漿又云大腸手陽明之脉挾口交人中此胃大腸之脉挾於口也　脾熱則口甘肝熱則口酸心熱則口苦肺熱則口辛腎熱則口鹹胃熱則口淡

【口甘】生地黃芩黃連及三黃丸

【口苦】柴胡黃芩黃連苦參龍膽草及小柴胡湯加麥門冬酸棗仁地骨皮

治法　內經曰有病口苦名曰膽癉乃肝主謀慮膽主決斷盛汁七合是清淨之府取決於膽或不決為之恚怒則氣上逆膽汁上溢故口苦或熱甚使然也龍膽瀉肝湯主之【】黃連龍膽瀉肝神麴蘿蔔子【】黃芩梔子瀉肺芍藥麥門冬【】白朮人參生茯苓瀉心【】知母烏賊魚骨胃【】黃芩瀉火柴胡生防風薄荷風藥甘草茯苓行【】內經云膀胱移熱於小腸膈腸不便上為口糜東垣云好飲酒人多有此疾易老用五苓散導赤散相合服之神効　經云少陰之復火氣內發上為口糜治以苦寒用黃連散必効散皆苦寒之劑以辛溫佐之　口糜野薔薇根煎湯漱之良

【口瘡】有二一曰熱經云少陽司天火氣下臨肺氣上從口瘡是也二曰寒經云歲金不及炎火乃行復則寒雨暴至陰厥且格陽反上行病口瘡是也　或問口瘡如何得之曰經云膀胱移熱於小腸膈腸不便上為口糜益小腸者心之府也此舉由邪熱之端耳心屬君火是五藏六府之火主故諸經之熱皆應於心心脉布舌上若心火炎上熏蒸於口則為口舌生瘡脾脉布舌下若脾熱生痰熱涎相搏從相火上炎亦生瘡者尤多二者之病諸寒涼劑皆可治但有涎者兼取其涎然則有用理中湯加附子以治者又何如曰夫火有虛實因諸經元有熱而動者

謂之實無熱而動者謂之虛火則正治火涼之劑是也虛則從治如此用溫熱是也理中湯者脾胃虛穀少則所勝腎水氣之逆而承之反爲寒中脾胃衰虛之火被迫炎上作爲口瘡故用參朮甘草補其土薑附散其寒則火得所助接引其退舍矣至聖濟總錄有潤元散治冷上攻口瘡者用巴戟白芷高良薑木豬腰煨服又有用丁香胡椒松脂細辛木蘇木湯調塗瘡上及不任食者用當歸附子白蜜含嚥者有用生附

塗腳心者有用吳茱萸末醋熬膏入生地龍末塗兩足心者若此之類皆是治龍火拔寒水上迫心肺之陽不得下降故用溫熱之劑或散於上或散於下或從陰隨陽所依利者也　胃中有熱脈洪大宜服涼膈散甘桔湯加芩連補丸金花丸瀉以黃連升麻湯傳以綠袍散蠶蛾散丹溪用西瓜漿水徐徐飲之如無以皮燒灰噙之外用細辛黃蘗末摻取涎　嗣氏方以好墨研螻蛄極細傳之立效按此治膀胱移熱於小腸者之正劑也蓋螻蛄專走小腸膀胱而通利膈腸者因力峻氣猛陰虛氣上致瘡者戒勿用唯體實有熱在上焦者宜之　張子和治一男子病口瘡數年上至口中至咽嗌下至胃脘皆痛不敢食熱物一湧一泄一汗十去其九次服黃連解毒湯十餘日皆釋以上實熱　服涼藥不愈者此酒色過度勞役不睡舌上光滑而無皮或因憂思損傷中氣虛火泛上無制用理中湯甚者加附子或官桂噙之　薛新甫云口瘡上

發實熱中焦虛寒下焦陰火各經傳變所致當分別治之如發熱作渴飲冷實熱也輕則用補中益氣湯重則用六君子湯飲食少思大便不實中氣虛也用人參理中湯手足逆冷肚腹作痛中氣虛寒也用附子理中湯晡熱內熱不時而熱血虛也用八物加丹皮五味麥門冬發熱作渴唾痰小便頻數腎水虧也用加減八味丸食少便滑面黃肢冷火衰土虛也用八味丸日晡發熱或從腹上□虛也用四物參朮五味麥

門不應用加減八味丸若熱來復上者見火後此
夜見伏不時而動或無定處或從脚起乃無
根之火也亦用前丸及十全大補加麥門五味
更以附子末唾津調搽湧泉穴若概用寒涼損
傷生氣爲害匪輕以上火　治少陰口瘡半夏
散聲絕不出者是寒遏絕陽氣不伸半夏製一
兩桂爲頭各壹字同煎一盞分二服　治太陰
口瘡甘礬散以甘草貳寸白礬栗子大含化嚥
津　治赤口瘡乳香散以乳香没藥各壹錢白

礬半錢銅綠少許研爲末掺之　治白口瘡没
藥散以乳香没藥雄黃各壹錢輕粉半錢巴豆
霜少許爲末掺之　口瘡久不愈以五倍末搽
之或煎湯漱或煎湯泡白礬或膽礬漱吞嚥能
收斂　戴復菴云下虚上盛致口舌生瘡若用
鎮墜之藥以降氣湯或嚥水下養正丹或黑錫
丹仍於臨卧熱湯洗足炒揀淨吳茱萸小撮拭
足了便乘炒熱置足心用絹片紮之男左女右
常熟席文靖公年踰七十未斷房室目

服溫補之藥無算兼以人參煮粥蓯蓉作羹致
滋胃熱滿口糜爛牙齒動搖口氣臭穢殆不可
近屢進寒涼清胃之藥不効有欲用薑桂反佐
者請決於予予曰用之必大劑上用加減甘露
飲入劑而平　香薷煮濃汁含之　嚼雞舌香
卽沉香花如無沉香可代　口中如膠而臭知
母地骨皮桑白皮山梔麥門冬甘草鹽湯嚥早
起汲井中第一汲水卽黃華水含之吐棄厠下
卽瘥　心氣不足口臭益智仁加甘草少許爲

末乾嚥或湯點　張子和治一男子二十餘歲
病口中氣出臭如登厠夫肺金本主腥金爲火
所乘火主臭應便如是也久則成腐腐者腎也
此亢極則反兼水化也病在上宜湧之以茶調
散湧而去其七分夜以舟車丸濬川散下五七
行比旦而臭斷舟車丸濬川散不宜輕用　羅謙甫治梁濟民
膏粱多飲因勞心過度肺金有傷以致氣出腥
臭涕唾稠粘咽嗌不利口苦乾燥以加減瀉白
散主之難經云心主五臭入肺爲腥臭此其一

也因洪飲大熱之氣所傷從心火刑於肺金以桑白皮地骨皮苦微寒降肺中伏火而補氣爲君以黄芩知母苦寒治氣腥臭清利肺氣爲臣肺欲收急食酸以收之五味子酸溫以收肺氣麥門冬苦寒治涕唾稠粘口苦乾燥爲佐桔梗苦辛治痰逆利咽膈爲使也

齒

圖統屬足少陰腎經素問曰丈夫五八腎氣衰髮墮齒槁[illegible]生齒槁少陰終[illegible]名曰黑齒長而垢○齒分上下斷[illegible]

屬足陽明胃經[illegible]

屬手陽明大腸經[illegible]

齒[illegible]

男子八歲腎氣實而齒生更三八眞牙生五八則齒槁八八而齒去矣女子亦然以七爲數蓋腎主骨齒乃骨之餘髓之所養也故隨天癸之盛衰也足陽明之支者入於上齒手陽明之支者入於下齒若腎衰不足陽明脉虛則齒之諸病生矣何以言之陽明金也齒屬腎水也陽明之支入齒間此乃母氣榮衛其子也故陽明實則齒[illegible]虛則齒浮動所以齒痛者乃陽明經[illegible]

入聚而為液為涎與齒間之氣血相搏擊而為
也若熱涎壅盛則腫而痛也熱不盛則齒浮微
腫而根浮也有蟲牙痛者由濕熱生蟲蝕其根
而作痛也有齒間血出者由陽明之支有風熱
之邪入齒齗搏於血故血出也有齒䘌者亦以
陽明入風熱之邪搏齒齗氣血腐化為膿出臭
汁謂之齒䘌亦曰風䘌有齒䘌者是蟲蝕齒至
齗膿爛汁臭也有齒挺者由氣熱傳入脉至齒
齗間液沫為膿氣血竭肉齗消故齒根露而挺

出也有齒動搖者陽明脉虛氣血不榮故齒動
搖也有齒歷蠹者由骨髓氣血不能榮盛故令
牙齒黯黑謂之歷齒其齒黃黑者亦然以此而
言豈非諸齒病皆因陽明之所致哉　東垣云
夫齒者腎之標口者脾之竅諸經多有會於口
者其牙齒是手足陽明之所過上齗隸於坤土
乃足陽明胃脉之所貫絡也止而不動下齗嚼
動而不休手陽明大腸脉之所貫絡也手陽明
惡寒飲而喜熱足陽明喜寒飲而惡熱故其病

不一牙者腎之標亦喜寒寒者堅牢為病不同
熱甚則齒動齦斷袒脫作痛不已故所治疎有不
同也有惡熱而作痛者有惡寒而作痛者有惡
寒又惡熱而作痛者有惡寒飲少熱飲多而作
痛者有惡熱飲少寒飲多而作痛者有牙齒動
搖而作痛者有齒袒而作痛者有齒齦為疳所
蝕缺少血出而作痛者有齒齦腫起而作痛者
有脾胃中有風邪但覺風而作痛者有牙上多
為蟲所蝕其齒缺少而色變為蟲牙痛者有胃

中氣少不能於寒袒露其齒作痛者有牙齒疼
痛而臭穢之氣不可近者痛既不一豈可一藥
而盡之哉　劉宗厚云頭面外冒風寒或口吸
寒冷致牙疼者皆外因也實熱陰虛火動骨蒸
所致氣鬱血熱蟲蛀皆內因也硬物所支打擊
等致皆不內外因也　薛新甫云濕熱甚而痛
者承氣湯下之輕者清胃散調之大腸熱而齦
腫痛者清胃散治之重則調胃湯清之六鬱而
痛者越鞠丸解之中氣虛而痛者補中益氣

補之思慮傷脾而痛者歸脾湯調之腎經虛熱而痛者六味丸補之腎經虛寒而痛者還少丹補之重則八味丸主之其屬風熱者獨活散不愈茵蔯散風寒入腦者羌活附子湯病證多端當臨證制宜　牙痛有風毒熱壅齲蛀腎虛未辨何證俱用消風散揩抹諸證皆宜香附炒黑三分炒鹽一分研勻揩用如常　風寒濕犯腦痛項筋急牙齒搖肉齦袒脫疼痛宜羌活散冬月時風寒濕頭疼項筋急牙齒動搖疼痛宜

麻黃散　大寒犯腦連頭痛齒亦痛宜細辛散白芷散蝎梢散　牙齒寒痛用牢牙地黃散擦或露蜂房川椒炒上四等分為麤末煎漱或荔枝殼或核燒灰存性擦痛處　牙痛用清涼藥便痛甚者從治之用蓽撥川椒薄荷荊芥細辛樟腦青鹽為末擦牙上　得熱而痛得涼則止者以辛涼藥治之東垣治劉經歷內子年三十餘病齒痛不可忍須騎馬外行口吸涼風則痛止至家則痛復作此濕熱之邪也足陽明貫於上

齒手陽明貫於下齒陽明多血多氣又加以膏粱之味助其濕熱故為此痛因立一方不須騎馬出外當令風寒之氣常生於齒間以黃連胡桐律之苦寒新薄荷葉荊芥穗之辛涼四味相合而作風寒之氣治其濕熱更以升麻之苦平引入陽明經為使牙齒骨之餘以羊脛骨灰補之為佐麝香少許入內為引用名曰馘鬼散為細末擦之神効又以調胃承氣湯去芒硝加黃連以治其本服之下三五行其病良愈不復作

風毒牙痛內服獨活散外用皂角寸節實之以鹽火煨熟湯泡通口漱吐下涎沫　風毒及熱壅上攻牙齦痛或齒縫有紅肉努出宜消風散食後臨卧入茶點仍入荊芥防風白芷蜂房之屬煎冷頻頻漱口　若熱壅甚牙齦連頰痛不可忍宜金沸草散去麻黃加薄荷如其嚴二因方云一婦人牙痛治療不効口頰皆腫以金沸草散大劑煎湯熏漱而愈　陽明熱牙疼大黃炒焦黑存性香附亦燒為末入青鹽少許擦

無時、因服補胃熱藥致上下牙疼痛不可忍
牽引頭腦滿面發熱大痛陽明之別絡入
寒惡熱乃手陽明經中熱盛而作其齒
熱清胃湯主之　倉公治齊中大夫病齲齒灸
左手陽明脉苦參湯日漱三升五六日愈　寒
熱皆痛當歸龍膽散益智木律散　寒多熱少
者微惡熱飲大惡寒飲宜草荳蔻散　熱多寒
少者微惡寒飲大惡熱飲宜麝香散立効散一
上片牙疼升麻散　下片牙疼白芷散　平昔

多食肉人口臭牙齒動搖欲落或血出不止乃
肉傷濕熱膏粱之疾也宜神功丸牢牙散調胃
承氣去消加黃連湯　腎虛牙浮而痛甚則憎
寒壯熱全具如欲脫之狀宜安腎丸八味丸還
少丹間進黑錫丹　病齒非腫非疼虛不能嚼
食用局方烏禾散蘢煎食後一服次以地骨皮
煎湯漱之候空心以羊腰子一對切片勿令斷
以葱絲椒末青鹽茯苓末刺木回元散貳錢拌
勻摻於腰子內以荳蔻葉或荷葉包裹煨令熟

食之服經兩日頓覺快利飲食如故　擦藥用
牢牙散　引涎止痛方枯礬露蜂房等分為
末每服貳錢水煎乘熱漱冷即吐之或用蟾
酥銀硃摻和為丸如蘿蔔子大每用一丸擦患
處便不疼至三丸吐涎沫數日全愈　塞耳方
雄黃定痛膏透關散及巴荳一粒煨黃熱去殼
用蒜一瓣切一頭作蓋剜去中心入巴荳其中
以蓋合之用綿裹隨患左右塞耳中　常用刷
牙牢牙散白牙散麝香刷牙散羊脛骨灰散長

春散沉香散朱砂散妙應散　**齲蛀**海藏云牙
齒等齲數年不愈當作陽明蓄血治之桃仁承
氣湯為細末煉蜜丸如桐子大服之好飲過者
多得此疾屢服有効　蛀牙痛用　燭
研燈上燒過搓乳香細末丸　內
蘆薈細末於孔中勿嚥津　用不　一錠
去皮子仰於每皂子處安巴荳一粒鹽泥固濟
燒灰研細末用剜耳子抄少許填入蛀孔內
雄雀糞綿裹塞孔內日一二易　蘆薈白膠香

塞蛀孔內　松脂銳如錐者塞孔中少頃蟲出
脂上　蘆薈四分炒研細先用鹽揩淨齒傅少
許　鶴虱枝插患處　蕪荑仁安蛀齒上有縫
就以窒之　吳茱萸雄黃各等分樟腦乳香各
少許末之擦痛處　鶴虱細辛白芷乾茄等分
為末揩痛處如有蚛孔用飯丸藥末塞孔中
蟲蝕牙根肉腐用棘針燒取瀝頻傅之或煮汁
含之亦可煮郁李根白皮濃汁含　溫米醋漱
出蟲自愈　香白芷細辛煎漱　天仙子燒煙

齒　事類八　四四

用竹筒抵牙引煙熏之即蟲死不再發　用小
瓦片置油拌韭子燒煙閣在水碗上以漏斗覆
之以蛀牙受漏斗口中煙其牙內蟲如針者皆
落水碗中　蚛牙有孔疼痛不斷根者用雄黃
乳香各一錢樟腦少許末之黃蠟為丸隨孔大
小納一丸以鐵打條一尺五寸長如筯小頭大
作一勾頭如鉗尾狀火燒紅管實向牙只留勾
頭勿令熱傷唇舌須先以筯撥開口唇然後以
頭勾灶蠟藥上須燦開覺熱為度以水漱之[illegible]

動　有蛀孔已出其孔穴空虛但痛者[illegible]
香[illegible]入[illegible]擦以實之　[illegible]
根[illegible]肉甘草水煮蟆取出令[illegible]
[illegible]乳香各等分右為細末每用少許
揩牙[illegible]妙　蚯蚓矢水和為泥火燒令赤
研如粉[illegible]和傅上日三次　永嘉一方用
入蠶瓶內[illegible]火煨燒一夜候冷[illegible]
細研用如常法揩牙　生地黃一斤於[illegible]
搗碎入鹽二合和之上用白麪裹可厚半寸[illegible]

齒　事類八　四五

[illegible]煨於塘灰火中斷煙始成去焦麪入麝香壹
分同研末每用少許貼齒根上　蔓荊子生地
黃地骨皮青葙各壹兩郁李根皮貳兩每服半
兩水煎熱含冷吐　[illegible]東垣云服升
常服牢牙齒　地黃丸亦好　陰虛內熱者甘
露飲　外用五[illegible]牢牙[illegible]
黃汁製[illegible]上[illegible]散[illegible]
細[illegible]上擦之[illegible]
[illegible]用[illegible]三十枚牛擦[illegible]

出細研入麝香少許研勻先以針挑破不生處令血出却塗藥在上不可見風忌酸鹹物　雄鼠矢三七枚麝香半錢同研細揩齒　露蜂房散　川升麻散

唇

[經]屬足太陰脾經 [illegible] 又屬手少陰心經 [illegible] 又屬手太陰肺經 [illegible] 心火不降也

脣者吉凶如指[illegible]者死脣口當[illegible]師之母也[illegible]不[illegible]相當其名曰[illegible]若[illegible]紅色則[illegible]肺[illegible]熱[illegible]

[經]統屬衝任二脈 [illegible]起於胞中[illegible]背[illegible]為經絡之海[illegible]起於腹右上行會於咽喉別而絡脣口血氣盛則充膚熱肉血獨盛則滲皮膚[illegible]人數脫血不足衝任[illegible]口所以[illegible]也

[經]屬于陽明大腸經 [illegible]

[illegible]屬足陽明胃經　燥則乾熱則裂風則瞤寒則揭若脣腫起白皮皺裂如蠶繭名曰繭脣有脣腫重出如繭者有本細末大如繭如瘤者或因七情動火傷血或因心火傳授脾經或因厚

積熱傷脾大要審本證察兼證補脾氣生脾血則燥自潤火自除風自息腫自消若患者忽略治者不察妄用清熱消毒之藥或用藥線結去反爲翻花敗證矣　胃火脣腫出血水內熱口乾吐痰體瘦宜濟陰地黃丸　肝經怒火風熱傳脾脣腫裂或患繭脣宜柴胡清肝散　胃火血燥脣裂爲繭或牙齦潰爛作痛宜清胃散或加芍芎柴胡可治脾胃肝膽經熱　風熱傳脾脣口瞤皺或頭目眩或四肢浮腫如風狀宜

羌活散　風熱客於脾經脣燥裂無色宜瀉黃飲子　中氣傷損脣口生瘡惡寒發熱肢體倦怠宜補中益氣湯　思慮傷脾血耗脣皺宜歸脾湯　意思過度蘊熱於脾瀋裂無色脣燥口乾生瘡年久不愈內服五福化毒丹外用橄欖燒灰末猪脂調塗或用核中仁細研傳之又硫黃白礬灰朱砂水銀麝香黃檗爲末和水銀磁器中臘月猪脂和如泥先淨拭脣却以唾塗之又八月藍葉絞汁洗不過二日瘥又訶子肉五倍子等分爲末乾貼又黃連[illegible]分乾薑半分炮爲細末傳之又大銅錢四文石上磨以猪脂磨取汁塗又蛇蛻灰晚蠶蛾末油調敷又以甑上滴下汗傳之白荷花瓣貼之皆神效　緊脣白灰散或皂角末少許水調塗　風濕入脾脣口瞤動瘙癢頭目眩痛結核浮腫用黃芪[illegible]防風赤小豆炒甘草炙等分蘆煎聖惠獨活散加白鮮皮黃芪枳殼或升麻飲外用松脂半兩大黃白礬赤小豆胡粉各二錢半爲細末雞子清調

脾熱脣焦枯無潤澤宜生地黃煎　冬月脣折血出方桃仁搗爛猪脂調塗　脣青黑

肉之本也脣反者肉先死

舌屬手少陰心經（素問曰心在竅爲舌[illegible]經曰心氣通於舌心和則舌能知五味矣病則舌卷短顴赤其脈搏堅[illegible]）又屬足太陰脾經（[illegible]）又兼屬足陽明胃經（[illegible]胃爲水穀之海脾氣虛而不消[illegible]之由是水穀之精化爲營衛以養四肢若起居失節飲食不時則致脾胃之氣不足而營衛之養不周風邪乘虛而干之則四肢與舌俱痺[illegible]治法宜多用[illegible]藥則可安矣）又屬足少陰腎經（[illegible]）又屬足厥陰肝經（[illegible]）

舌主嘗五味以榮養於身資於脾以分布津液於五藏故心之本脈係於舌根脾之絡脈係於舌旁肝脈循陰器絡於舌本心脾[illegible]風熱

乘之則爲病　風寒濕所中則舌卷縮而不[illegible]言宜小續命湯挾熱升麻湯加桔梗漱之[illegible]之　七情所鬱則舌腫滿不得[illegible]宜本草方[illegible]舌重[illegible]蒲黃末貼手足心　心熱則裂而瘡[illegible]黃丸與蒲黃摻之[illegible]龍石散[illegible]黃丸[illegible]不調貼腳心升麻湯加桔梗玄參黃芩又白[illegible]大黃抃研擦漱又醋調五靈脂末烏賊骨[illegible]黃末塗之服散肝經實熱之藥　[illegible]熱則滑而胎脾閉則白胎如雪宜薄荷汁白蜜薑片揩之肝壅則血上湧宜蒲黃或槐花末摻之服清肝之藥　薛新甫云如口舌腫痛或狀如無皮或發熱作渴爲中氣虛熱宜清熱補氣湯　若眼如煙觸體倦少食或午後益甚爲陰血虛熱宜清熱補血湯　若咽痛舌瘡口乾足熱日晡益甚爲腎經虛火宜六味丸　若四肢逆冷惡寒飲食或痰甚眼赤爲命門火衰宜八味丸　若發熱作渴飲冷[illegible]火宜涼膈散　若發熱惡寒口渴[illegible]爲脾經虛

熱宜加味歸脾湯　若舌本作強顋頰腫痛為心脾壅熱宜玄參升麻湯　若痰盛作渴口舌腫痛為上焦有熱宜清熱化痰湯　若思慮過度口舌生瘡咽喉不利為脾經血傷火動宜加味歸脾湯　若恚怒過度寒熱口苦而舌腫痛為肝經血傷火動宜小柴胡湯加丹皮山梔血虛者用八珍加參朮柴胡山梔丹皮虛甚須加炮薑

舌腫痛　舌根腫脹為重舌舌腫而不消和者為木舌風寒傷於心脾令人憎寒壯熱齒浮舌腫痛宜金沸草散漱口吐一半嚥一半

治舌腫黃藥湯或亂髮燒灰水調下外用釜底煤研細醋調傅舌上下脫去更傅能先決去血竟傅之尤佳一方用鹽等分井花水調傅　硼砂細末切生薑蘸藥揩舌腫處即退　蓖麻取油蘸紙撚燒煙熏之愈　好膽礬研細傅之

舌上腫硬出血海螵蛸蒲黃各等分研細井花水調傅　**木舌**腫脹馬牙硝九牛黃散玄參散飛礬散廣蟲散百草霜散　**重舌**用一味真蒲黃末摻之又用皂角刺煅朴硝少許研勻先以手蘸水搽口內并舌上下將藥摻之涎出自消

又用五靈脂一兩去砂石研末　醋一大碗煎逐旋噙漱口又用皂角不蛀者四五挺去皮弦炙令乾荊芥穗少許研細末以米醋調塗腫處

又以蛇蛻燒灰研極細少許傅之　烏犀膏牛黃散　黃藥湯　亦可以鈹刀刺之出血愈

三因云凡舌腫下必有噤蟲狀如螻蛄臥蠶有頭尾其頭小白可燒鐵烙烙頭上即消不急治能殺人　東垣云廉泉一穴一名舌本在頷下結喉上治舌下腫難言舌縱涎出口禁舌根急縮下食難刺瘧論云舌下兩脈者廉泉也刺禁論云刺舌下脈太過血不止為瘖刺節真邪論云取廉泉穴血變而止以明宜出血禁用針

或問取廉泉穴二說不同一說取舌下結喉上一說取舌下兩脈何者為當答曰舌本者乃舌根帶也若取舌下兩脈是取舌柄也[illegible]也此法淺也當取頷下者為當此舌本[illegible]

之脉根於膈兌結於廉泉頷下乃足陽明之所過行也若取舌下兩脉非足陽明經也戊與癸合廉泉足少陰也治涎下解云胃中熱上溢廉泉開故涎下當出血瀉胃中熱又知非舌下兩脉也頷下結喉上者為准矣張論曰廉泉玉英者津液之道路也　張戴人治南鄰朱老翁年六十餘歲身熱數日不已舌根腫起和舌尖亦腫腫至滿口比原舌大三倍一外科以燔針刺其舌兩旁下廉泉穴病勢轉凶將至顛巇戴人曰血實者宜決之以鈹針磨令鋒極尖輕砭之日砭八九次出血約一二盞如此者三次漸覺血少痛減腫消夫舌者心之外候也心主血故血出則愈又諸痛痒瘡瘍皆屬心火燔針火炎皆失此義也　薛新甫云凡舌腫脹甚宜先刺舌尖或舌上或邊傍出血泄毒以救其急惟舌下廉泉穴此屬腎經雖宜出血亦當禁針慎之

舌強三因礬石散治風寒濕舌強不能語　牛黃散治舌腫強又用蛇蛻燒存性全蝎等分為細末傅之

舌卷經云邪客手少陽之絡令人喉痺舌卷口乾心煩臂外廉痛手不及頭刺手中指次指爪甲上去端如韭葉各一痏又云手陽明之筋其病支痛轉筋舌卷治在燔針劫刺以知為數以痛為輸又云厥陰絡者甚則舌卷卵上縮又云肝者筋之合也肝脉弗榮則筋急筋急則引舌與卵故唇青舌卷卵縮則筋先死庚篤辛死

舌燥風熱口中乾燥舌裂生瘡宜甘露飲栝蔞根散甘露丸外傅蘆薈散玄參散紫雪散升以白礬末湯化洗足　曾有舌上生瘡瘡久蝕成穴累服涼劑不効後有教服黑錫丹遂得漸愈此亦下虛故上盛也　又有舌無故常自痺者不可作風治由心血不足理中湯加當歸服之

舌出不收心經熱甚及傷寒熱毒攻心及傷寒後不能調攝往往有之宜用珍珠末冰片等分傅之即收或用巴豆一枚去油取霜用紙撚捲之內入鼻中舌自收

治一婦人產子舌出不能收令以朱砂末

其舌乃令作產子狀以二女扶之乃於壁外潛累盆盎置危處墮地作聲聲聞而舌卷矣

舌縱涎下多唾　素問口問篇黃帝曰人之涎下者何氣使然岐伯曰飲食者皆入於胃胃中有熱則蟲動蟲動則胃緩胃緩則廉泉開廉泉開故涎下補足少陰　蕭炳治口角流涎不止口目喎邪手足痿軟用神龜滋陰丸通天愈風湯清心導痰丸清心牛黃丸　婁全善治宜支炳口流涎不止喜笑舌瘖脈洪大用連芩檗梔白朮蒼朮半夏竹瀝薑汁服之五日涎止笑息（流涎者自然流出也）　仲景云大病瘥喜唾久不了了者胃上有寒當以丸藥溫之宜理中丸東垣云多唾或唾白沫者胃口上停寒也藥中加益智仁

自齧舌　靈樞經黃帝曰人之自齧舌者何氣使然岐伯曰此厥逆走上脈氣皆至也少陰氣至則齧舌少陽氣至則齧頰陽明氣至則齧脣矣視主病者則補之

面　又統屬諸陽[illegible]又屬足[illegible]又屬足太陽膀胱經[illegible]又統[illegible]屬手少陰心經[illegible]又以五色候五藏故面青屬肝[illegible]赤屬心[illegible]黃屬[illegible]白屬肺[illegible]黑屬腎[illegible]　靈樞邪氣藏府病形篇黃帝曰首面與身形也屬骨連筋同血合於氣耳天寒則裂地凌冰其卒寒或手足懈惰[illegible]

經何也岐伯答曰十二經脉三百六十五絡其
血氣皆上於面而走空竅其精陽氣上走於目
而爲睛其別氣走於耳而爲聽其宗氣上出於
鼻而爲臭其濁氣出於胃走脣舌而爲味其氣
之津液皆上熏於面而皮又厚其肉堅故天熱
甚寒不能勝之也　羅氏曰手足六陽之經皆
上至於頭而唯陽明胃脉起鼻交頞中入上齒
中俠口環脣循頰車上耳前過客主人故人之
面部陽明之所屬也其或胃中有熱則面熱升

麻湯加黃連胃中有寒則面寒升麻湯加附子
若風熱內甚而上攻令人面目浮腫或面鼻紫
色或風刺癮疹隨其證而治之　李氏云風邪
入皮膚痰飲漬府藏則面黙䵟脾應見於面肺
應皮毛二經風濕搏而爲熱鬱故面生瘡　面
腫爲風宜用羌活防風升麻白芷牛蒡子之屬
外杵杏仁如膏傅之餘見水腫門　**面熱門**
丹溪云面熱火氣因鬱熱面寒屬胃虛　東垣
云飲食不節則胃病胃病則氣短精神少而生
大熱有時而火上行獨燎其面針經云面熱者
足陽明病　欬逆[illegible]不得[illegible]熱如醉此爲
胃熱上衝熏其面[illegible]茯苓桂枝五味子甘草湯加
大黃以利之　羅謙甫治[illegible]年五十一
歲身體肥盛[illegible]頭目[illegible]面赤熱多服清上藥
不效其脉洪大有力內經云面熱者足陽明
病脉經云陽明經氣盛有餘則身已前皆熱況
其人素膏粱積熱於胃陽明多血多氣本實則
風熱上行諸陽皆會於頭目故面熱之病生矣

先以調胃承氣湯七錢加黃連三錢犀角一錢
疏下二兩行徹其本熱次以升麻加黃連湯去
經絡中風熱上行如此則標本之邪俱退矣
又治尼長老六十一歲身體瘦弱十月間病頭
面不耐寒氣弱不敢當風行諸治不效診之其
脉皆弦細而微其人年高素食茶果而已陽明
之經本虛脉經云氣不足則身以前皆寒慄又
加看誦損氣由此胃氣虛經絡之氣亦虛不能
上榮頭面故惡風寒先以附子理中丸溫其中

氣次以升麻湯加附子主之　或曰升麻[illegible]
連湯治面熱升麻加附子湯治面寒有何依據
答曰出自仲景[illegible]子註傷寒論中辨葛根湯
云尺寸脈俱長者陽明受病也當二三日發以
其脈夾鼻絡目故身熱目疼鼻乾不得臥此陽
明經受病也始於鼻交頞中從頭至足行身之
前爲表之裏陽明經標熱本實從標脈浮而長
從本脈沉而實陽明爲病主蒸蒸而熱不惡寒
身熱爲標病陽明本實者胃中燥鼻乾目疼爲

本病陽明爲肌肉之本禁不可發汗在本者不
禁下發之則變黃證太陽主表榮衛是也榮衛
之下肌肉屬陽明二陽併病葛根湯主之衛者
桂枝榮者麻黃榮衛之中桂枝麻黃湯各半主
之榮衛之下肌肉之分者葛根湯主之又名解
肌湯故陽明爲肌肉之本非專於發汗止汗之
治桂枝麻黃而方互併爲一方加葛根者使作
葛根湯故榮衛肌肉之次也桂枝芍藥生薑甘
草大棗止汗麻黃桂枝生薑甘草發汗葛根味

薄獨加一味者非發汗止汗也從葛根以解[illegible]
故名葛根湯錢仲陽制升麻湯治傷寒瘟疫風
熱[illegible]已發未發用葛根爲
君升麻爲佐[illegible]安其中氣朱奉議作活
人書將升麻湯列作陽明經解藥予診楊氏婦
陽明經標本俱實先攻其裏後瀉經絡中風熱
[illegible]用升麻湯加黃連以寒治熱也尼長老陽明
[illegible]本俱虛先實其裏次行經絡故用升麻湯
[illegible]附子以熱治寒也仲景乃群方之祖信哉

[illegible]難經云肝外證面青善潔善怒　[illegible]
氣面塵有二一曰燥金制肝經云陽明司天燥
[illegible]所勝民病嗌乾面塵又云陽明在泉燥淫所
[illegible]病嗌乾面塵又云金鬱之發嗌乾面塵宜治
以減削是也一曰火經云少陽之復厥氣上行
面如浮塵目乃瞤瘛治以寒劑是也　針灸面
塵者取肝膽二經經云肝足厥陰之脈是動病
[illegible]面塵脫色又云膽足少陽之脈是動病
[illegible]下取之也

【面赤】難經云心外證面赤口乾善笑　虛以
云面赤爲邪氣怫鬱在經宜表不宜下　仲景
云下利脉沉而遲其人面亦身有微熱下利清
穀者以鬱冒汗出而解此面赤亦表而解也
運氣面赤皆屬寒經云太陽司天寒淫所勝民
病面赤目黃治以熱劑是也　針灸面赤皆取
心主經云心主手厥陰之脉是動則病面赤目
黃視盛虛熱寒陷下取之也　治面赤用紅藍
判碎用人乳浸拌勻以日曬乾再浸拌勻如

此六七次爲妙然後爲細末臨卧清茶或湯調
下或酒有奇効　【面黃】難經云脾外證面黃善
噫善思善味　素問云陽明經終者口目動作
善驚妄言色黃　治法見黃疸門　【面白】難經
云肺外證面白善嚏悲愁不樂欲哭　血脫者
色白夭然不澤其脉空虛　肺病面白不[illegible]
爲脫氣脫血脫津脫液脫精脫神巴戟丸主之
　脉緊者寒也或面白善嚏或面色惡皆寒也
以羌活防風甘草藁本四味瀉足太陽少加附

子以通其脉面色惡悲恐者亦加桂附　太陽
終者戴眼反折瘛瘲其色白絕汗出　少陽終
者耳聾百節皆縱目睘絕系其色青白　【面黑】
難經云腎外證面黑善恐欠　羅謙甫治一婦
人年幾三十憂思不已飲食失節脾胃有傷面
色黧黑不澤環脣尤甚心懸如饑狀又不欲食
氣短而促大抵心肺在上行榮衛而光澤於外
宜養血氣腎在下養筋骨而強於內當隱而
不見脾胃在中主傳化精微以灌四旁神和而

不息其氣　傷則四藏失所憂思不已氣結而
不行飲食失節氣耗而不足使陰氣上溢於陽
中故黑色見於面又經云脾氣通於口其華在
脣今水反來侮土故黑色見於脣此陰陽相反
病之逆也上古天眞論云陽明脉衰於上面始
焦故知陽明之氣不足非助陽明生發之劑無
以復其色故以冲和順氣湯主之內經曰上氣
不足推而揚之以升麻苦平爲根日溫自地升
天通行陽明之氣爲君人之氣以天地之風名

之氣留而不行者以辛散之防風辛温白芷甘
辛温以散滯氣爲臣蒼术苦辛獨除陽明經之
寒白芍藥之温酸安太陰經之怯弱十劑云補
可去弱人參羊肉之屬人參黄芪甘草甘温補
益正氣爲臣至真要大論云辛甘發散爲陽生
薑辛熱大棗甘温和榮衛開腠理致津液以復
其陽氣故以爲使每服早飯後午飯前取陽升
之時使人之陽氣易達故也數服而愈　孫兆
治一人滿面黑色相者斷其死孫診之曰非病
也乃因登溷感非常臭氣而得去至臭無如至
香令用沉檀碎劈焚於爐中安帳内以熏之明
日面色漸變旬日如故蓋腎臭腐屬水脾臭香
屬土今夫廁臭者腐臭也故聞之則入腎而面
黑沉香者香臭也故熏之則脾土勝腎水而色
還也　浙今夫人忽日面上生黑斑數點日久
滿面俱黑徧求醫治不効忽遇一草澤醫人云
夫人中食毒治之一月平復後校其方止用生
甘草汁服之問其故云食斑鳩蓋此物常食半夏

苗中毒故以甘草解之　針灸面黑者一二七壯一
取胃經云胃足陽明之脉是動則病灑灑振寒
顔黑其二取腎經云足少陰之脉是動則病饑
不欲食面如漆柴視盛虚熱寒陷下取之也
少陰終者面黑齒長而垢腹脹閉　太陰終者
腹脹閉不得息善噫嘔逆則面赤不逆則面黑
皮毛黑　洗面藥七白散白斂白术白牽牛白
附子白芷白芍藥白殭蠶　面上細瘡常出黄
水桃花陰乾加當歸或杏花作末洗面　面上
熱毒惡瘡礬連散塗　面上五色瘡用鹽湯綿
浸搨瘡上日五六度易瘥　面上黄水瘡併目
生瘡三月三日桃花陰乾爲末食後米水下方
寸七日三良　面上豆痕或斑點[illegible]細
末夜以人乳汁調傅有効　面上粉刺[illegible]
頭塗之或搗兎絲子汁塗之或以白[illegible]
酒調塗之　千門方治黑點令人面色白[illegible]
蘿黑牽牛北細辛爲末作澡豆去[illegible]
面粟皮痛何首烏末薑汁調成膏[illegible]

火灸鞋底熱熨之　面赤酒皶生附子用根皮薄少許剉醋浸一宿取出用猪脂同煎以附子黃爲度去滓時時塗之又硫黃半兩蝸牛殼自死枯乾小者爲上木香各半兩鉛丹半兩俱爲末杏仁半兩去皮研膏入臘月猪脂調成膏夜卧時用漿水先洗面令乾以藥塗患處平明洗淨　齊以米泔水洗却上前藥　指爪破面用生薑自然汁調輕粉傅破處更無瘢瑕

頰頤

【頤】[illegible] 屬手足少陽三焦膽手太陽小腸經之會又屬手少陰心經 [illegible] 又屬足少陰腎經 [illegible] 【頰】[illegible] 屬手足少陽三焦膽手太陽小腸足陽明胃經之會 [illegible]

[illegible] 又屬足厥陰肝經 [illegible] 其在小兒面部 【左頰】屬足厥陰肝經 素問曰肝熱病者左頰先赤 【右頰】屬手太陰肺經 素問曰肺熱病者右頰先赤 【頰側】[illegible] 屬足少陽膽陽明胃經之會 【顴】顴本作頄 [illegible] 屬足陽明胃經 [illegible] 又屬足少陰腎經 [illegible] 【依顴】屬足陽明胃經 [illegible]

內經取治面頰腫痛有三法

其一取手陽明經云頗痛刺足陽明曲周動脉見血立已不已按人迎於經立已又云厥胸滿面腫脣漯漯然暴言難甚則不能言取足陽明又云厥頭痛面若腫起而煩心取之足陽明太陰爲煩心也又云頗痛刺手陽明與頗之盛脉出血是也　其二取手太陽經云手太陽之脉是動則頷腫不可以顧所生病者耳聾頰痛視盛虛熱寒陷下取之也　其三取手足太陽經云三焦手少陽之脉所生病者頰痛又云膽

足少陽之脉所生病者頷腫視盛虛熱寒陷下取之也又云肝氣逆則頭痛耳聾頰痛取血者益取足少陽之血也　丹溪治朱奶兩腮熱腫腦壅之病也用乾葛桔梗壹錢半升麻壹錢蘇葉壹錢甘草炙七分薄荷壹錢薑壹片水煎服　東垣云咽痛頷腫脉洪大面赤者羌活勝濕湯加黃芩桔梗甘草各半錢治之如耳鳴目黃頰頷腫頸肩臑肘臂外後廉痛面赤脉洪大者以羌活防風甘草藁本通其經血加黃芩黃

連消其腫以人參黃芪益其元氣而瀉其火邪

兩頤腫以細辛草烏等分爲末入蚌粉以猪脂調傅腫處或用醋調赤小豆末傅之亦妙口含白梅置腮邊良久腫退出涎患消矣消時腫必先向下　痄腮用梔葉車前草梔子仁杵碎熱傅患處或用雞子清調赤小豆末[illegible]　平江陳氏因驚悸後常用手指甲抓搯兩頰遂兩頰破損心中懊憹不安脉數而實諸藥不愈用活幼口議牛黃清心涼膈丸數服如失　三因

治失欠頰車蹉但開不能合以酒飲之令大醉睡中吹皂角末搐其鼻嚏透即自止

咽喉

【咽】在喉之前所以咽物……之後屬咽……屬手太陽小腸少陰心足太陰脾厥陰肝經之會 [illegible] 又屬足少陰腎經 [illegible] 又屬足陽明胃經 [illegible] 又屬足厥陰肝少陽膽經 [illegible]

[illegible]……陰一陽……

【喉咽】屬手少陰心足太陰脾經之會 【喉】在咽之後所以候氣 屬手太陰肺足陽明胃少陰腎厥陰肝經任脉之會 [illegible] 又屬手少陰心少陽三焦經 [illegible]

[illegible]

心 [illegible] 又屬手足……大腸胃手少陽三焦經之會 [illegible] 又屬足太陰脾經 [illegible] 【喉嚨】屬足厥陰心包經 【[illegible]】 屬足陽明胃經 [illegible]

【[illegible]】屬手陽明大腸經 [illegible] 經

云咽喉者水穀之道也喉嚨者氣之所以上下者也會厭者音聲之戶也懸雍者音聲之關也咽與喉會厭與舌此四者同在一門而其用各異喉以納氣故喉氣通於天咽以納食故咽氣通於地會厭管乎其上以司開闔掩其厭則食下不掩其喉必錯必舌抵上齶則會厭能閉其喉交……者交相爲用闕一則飲食廢而死矣又咽喉……有痺有腫二者之外又有纏喉風乳蛾生焉……何經病之與治法……

畧願聞其說曰十二經脉皆上循咽喉盡得以病之然統其所屬者乃在君相二火何則經曰喉主天氣咽主地氣又曰諸逆衝上皆屬於火是也蓋肺主氣天也脾主食地也於是喉納氣咽納食納氣者從金化納食者從土化金性燥土性濕至於病也金化變動爲燥燥則澁澁則閉塞而不仁故在喉謂之痺土化變動爲濕濕則泥泥則壅脹而不通故在咽謂之腫痺腫之病雖少異然一時火鬱於上焦致痰涎氣血聚

結於咽喉也自其咽腫形狀分之則有纏喉風乳蛾之名纏喉風者其腫透達於外且麻且痒且痛乳蛾者腫於咽兩傍名雙乳蛾一邊腫者名單乳蛾喉痺之暴發暴死者名走馬喉痺內經又有嗌塞咽喉乾者亦皆因諸經所致中間雖有經氣之寒熱不等其爲火證一也大抵治法視火微甚微則正治甚則反治撩痰出血三者隨宜而施或更於手大指少商出血行氣若腫達於外者又必外傅以藥予嘗治是證每用

鵝翎蘸米醋攪喉中摘去其痰蓋醋味酸能收其痰隨翎而出又能消積血若乳蛾甚而不散上以小刀就蛾上刺血用馬牙硝吹點咽喉以退火邪服射干青黛甘桔梔芩礬石惡實大黃之類隨其攸利爲方以散上焦之熱外所傅藥如生地龍韭根伏龍肝之類皆可用若夫生瘡或白或赤其白者多涎赤者多血大率與口瘡同例如薔薇根皮黃蘗青黛煎噙細嚥亦佳凡經云喉痺者謂喉中呼吸不通言語不出而

天氣閉塞也云咽痛云嗌痛者謂咽喉不能納唾與食而地氣閉塞也云喉痺咽嗌痛者謂咽喉俱病天地之氣並閉塞也蓋病喉痺者必兼咽嗌痛病咽嗌痛者未必兼喉痺也

喉痺作痛或有痰或無痰初起通用甘桔湯不效加荆芥一錢半直名如聖湯或如聖湯中更加連翹黍粘子各半分防風竹茹半分或甘露飲

喉痺惡寒及寸脉小弱於關尺者皆爲表證宜甘桔湯半夏桂枝甘草湯詳寒熱發散之若水漿

不得入口者用解毒雄黃丸四五粒以極酸醋磨化灌入口內吐出濃痰却服之間以生薑自然汁一蜆殼噙下之神效　婁全善云喉痺惡寒者皆是寒折熱寒閉於外熱鬱於內薑汁散其外寒則內熱得伸而愈矣切忌膽礬酸寒等劑點喉反使其陽鬱結不伸又忌硝黃等寒劑下之反使其陽下陷入裏則禍不旋踵矣韓祗和云寸脉弱小於關者宜消陰助陽東垣云兩寸脉不足乃陽氣不足故用表藥提其氣升以

助陽也或三部俱小弱亦用其法也　喉痺鄉村病皆相似者屬天行運氣之邪治必先表散之亦大忌酸藥點之寒藥下之鬱其邪於內不得出也其病有二　其一屬火經云少陽所至為喉痺又云少陽司天之政三之氣炎暑至民病喉痺治宜仲景桔梗湯或兩赤斑者屬陽毒宜陽毒諸方汗之　其二屬濕經云太陰之勝火氣內鬱喉痺又云太陰在泉濕淫所勝病嗌腫喉痺治宜活人半夏桂枝甘草湯或面青黑

者屬陰毒宜陰毒諸方汗之　婁全善云洪武戊辰春鄉村病喉痺者甚衆蓋前年終之氣及當年初之氣二火之邪也予累用甘桔湯加黃連半夏殭蠶鼠粘子根等劑發之挾虛者加參芪歸首水漿不入者先用解毒雄黃丸醋磨化之灌喉痰出更用生薑汁灌之却用上項藥無不神驗若用膽礬等酸寒點過者皆不治蓋邪鬱不出故也　三因方治卒喉痺不得語小續命湯加杏仁七箇煎甚妙活人半夏桂枝甘草

湯治暴寒中人咽痛此外感風寒作喉痺者之治法也　喉痺不惡寒者及寸脉大滑實於關尺者皆屬下證宜硝石青黛等寒藥降之或白礬等酸劑收之也韓祗和云寸脉大於關尺者宜消陽助陰東垣云兩寸脉實為陰盛陽虛下之則愈故予每用此法治急喉痺如鼓應桴或三部俱實亦可用其法也　外臺療喉痺神驗朴硝一兩細細含嚥汁立愈或含黃檗片或嚼萊菔汁或吹鹽礬或嚼李實根及馬藺匙丢

凉膈無憂散清心利膈湯碧玉散防風散追風散
皆寒降之劑也　白礬末或用烏雞子清調灌
或枯而吹之用燈盞底油脚灌下或同馬屁勃
等分為細末以鵝翎吹入喉中或用一握金燒
灰拌炒青色為度吹入患處或用牙皂和霜梅
為末噙之或用鵬砂膽礬末以筯蘸藥點患處
及開關散七寶散皆酸收之劑也　丹溪治風
熱痰喉痺先以千緡湯次以四物湯加黃蘗知
母養陰則火降矣　七情鬱結氣塞不通宜五

香散　血壅而為痺宜取紅藍花汁服之無鮮
者則濃煎絞汁亦得或用茜草壹兩煎服或用
杜牛膝搗自然汁和醋服或用馬鞭草搗自然
汁服或用射干切壹片含嚥汁皆破血之劑也
　喉閉者先取痰瓜蒂散解毒雄黃丸烏犀膏
或用鵝翎蘸桐油探吐之或用射干逆流水吐
之或用遠志去心為末每半錢水小半盞調服
[illegible]今竹管或用皂角揉水灌下或用返魂草根
搗汁洗入喉中取吐痰出更以馬牙硝

津嚥之或用土烏藥即矮樟根醋煎先噙後嚥　其
關閉者搐鼻取之備急如聖散一字散或用巴
荳油染紙作撚子點火吹滅以煙熏入鼻中即
時口鼻涎流牙關開矣　經云寒氣客於會厭
卒然如啞宜玉粉丸半夏桂枝湯每治臟寒咽閉吞
吐不利用附子去皮臍炮裂以蜜塗炙令蜜入
內含之勿嚥　急喉痺有聲如鼾有如痰在喉
響者此為肺絕之候速宜參膏救之用薑汁竹
瀝放開服如未得參膏或先煎獨參湯救之服

早者十全七八次則十全四五遲則十不全一
也　治喉痺急速不救方皂莢去皮弦子生半
兩為末以筯頭點少許在腫痛處更以醋糊調
藥末厚塗項上須臾便破血出差　針法治喉
閉刺少商出血立愈孫兆治文潞公喉腫刺之
漏出膿血升餘而愈要全善治一男子喉痺於
太溪穴刺出黑血半盞而愈由是言之喉痺以
惡血不散故也凡治此疾暴者必先發散發散
不愈次取痰取痰不愈次去污血也

嚥唾與食則痛者是也　經云形苦志苦病生於咽嗌治之以百藥又云肝者中之將也取決於膽咽爲之使　丹溪云咽痛必用荊芥陰虚火炎上者必用玄參氣虚人參加竹瀝血虚四物加竹瀝　陰氣大虚陽氣飛越痰結在上遂成咽痛脉必浮大重取必濇去死爲近宜補陰斂陽人參一味濃煎湯細細飲之（此證皆因勞[illegible]者有）（如用寒藥[illegible]下諸方無益者）咽瘡多虚火游行無制客於咽喉宜用人參蜜炙黄蘗荊芥治之　實熱咽痛三黄丸或用黄連荊芥薄荷爲末蜜薑汁調噙或山豆根噙之及用黄蘗黄連大黄水調塗足心與患處及龍腦聚聖丹祛毒牛黄丸咽喉備急丹　浮熱表散之增損如聖湯利膈湯桔梗湯　散之不已則收之或單用硼砂或和膽礬白殭蠶白梅和噙或用白藥煎去黑皮硼砂甘草生白礬等分爲細末每服壹錢食後米飲調細細嚥下　戴云熱壅咽痛或嗽中帶血者宜金沸草散佐以辰砂化痰丸　咽喉痛

用[illegible]不[illegible]枳[illegible]湯　有咽疼[illegible]反[illegible]用[illegible]汗洋見嗽門然生瘡損了[illegible]勿用[illegible]用之辣痛又能散不收　若熱壅上焦咽喉疼痛面赤[illegible]物不若常時之間雖覺口舌今無津液[illegible]人參[illegible]錢玄參七分或佐以[illegible]心[illegible]五苓散　[illegible]物[illegible]痛不宜[illegible]過澀之用[illegible]白殭蠶微炒半兩桔梗七錢半甘草炒[illegible]爲細末每用少許乾摻咽喉中若[illegible]痛左右有紅或只一[illegible]紅紫長大水米難下用此散壹錢并[illegible]壹錢和勻摻喉中嚥津如喉中生赤腫或有小白頭瘡用前散壹錢七白礬細研半錢乾摻　內經運氣咽嗌痛皆屬寒云太陽在泉寒淫所勝民病嗌痛頷腫是也三因方蜜附子治感寒咽門閉不能咽[illegible]大附子壹枚生去皮臍切作大片蜜塗炙令黄噙嚥津甘味盡更以附子片塗蜜炙用之　咽痛用諸[illegible]不效者此非咽痛乃是鼻中生一條紅[illegible]

懸一黑泡大如櫻珠垂挂到咽門而止口中飲
食不入須用深取牛膝根直而獨條者洗淨入
好醋三五滴同研細就鼻孔滴二三點入去則
丹珠破其病立安　乳蛾一名懸癰羅青散
烏龍散玄參散射干丸　[illegible]散朴硝散射干
丸硼砂散啟關散　[illegible]寶氏秘傳紅散
丸筍犀角解毒救命散[illegible]丸硼砂散　[illegible]
[illegible]經云膽病者善太息口苦嘔宿汁
嗌中介介然數唾取陽陵泉又云心咳之狀喉
咽喉　準繩八　八十
中介介如梗狀取心之俞太陵仲景云婦人咽中
如有炙臠半夏厚朴湯主之　射干散含化龍
腦丸木香散絡石湯四味湯杏仁煎丹　有人
患纏喉風食不能下大麥麪作稀糊嚥之　咽
[illegible]中瘡出及乾嘔頭痛食不下生雞子一
個開頭取白去黃着米醋拌攪湯火頓沸起擎
下沸定須頻三度就熱飲咽盡不過一二次瘥
王[illegible]法冬月於臨臥時將食生菜蔽三五片
無咽喉之疾

[illegible]三四方者藥[illegible]令半熟以線縛定
手執線頭少嚼藥自[illegible]咽下至[illegible]處便[illegible]
引哽即出矣　秘方[illegible]挂灰塵少
糖和丸噙之自下　骨哽[illegible]油馬屁勃砂
糖三味熬膏爲丸噙化　苧麻根杵爛丸如彈
子大將所哽物煎湯化下　以犬吊一足取其
涎徐徐嚥之　剪刀草如野茨菰生於籬塹間
其根白研之則如膠用順水吞下即吐出骨不
過兩三口效　研蕾草根順水下亦佳　朴硝
咽喉　準繩八　八十一
研對入雞蘇丸如彈子大含化不過三四丸一
南硼砂井花水洗滌含化最妙　貫衆濃煎
一盞半分三服連進片時一咯骨自出　魚骨
哽以皂角少許吹入鼻中得嚏哽出　細茶五
倍子等分爲末吹入咽喉立愈　食橄欖即下
或用其核爲末順流水下　魚骨在腹中刺痛
煎茱萸汁一盞飲之骨軟而出　雞骨哽用水
簾草搗汁飲之骨自消　野苧根洗淨搗爛如
泥每用龍眼大如被雞骨所傷雞羹化下魚骨

所傷魚湯化下　稻芒糠穀哽喉將鵝吊一足
取涎徐徐嚥下即消或取鳥頭草嚼亦妙　吞
釘鐵金銀銅錢等物但多食肥肉自隨大便而
下　吞錢及鐵物在喉不得下南燭根燒細末
湯調一錢下之　吞鐵或針用餳糖半斤濃煎
艾汁調和服或用磁石磨如棗核大鑽眼以線
穿令吞喉間針自引出磁石須陰陽家用驗者
張子和治一小兒誤吞錢在喉中不下以淨
白表紙卷實如筯以刀縱橫亂割其端作鬅鬙

之狀又別取一筯縛針鉤於其端令不可脫先
下咽中輕提輕抑探之覺鉤入於錢竅然後以
紙捲納之咽中與鉤尖相抵覺鉤尖入紙捲之
端不礙肌肉提之而出　吞錢燒炭末白湯調
服數匙即出　或服蜜升許　或食荸薺茨菰
其錢自化　或用艾一把水五升煎至一升頓
服即下　或用百部根四兩酒一升漬一宿溫
服一升日再　吞釵取韭白曬令萎黃煮使熟
勿切食一大束即出　吞錢釵及鐶餳糖一片

可漸食之　吞髮繞喉不出取自亂髮作灰白
湯調服一錢　陳無擇云凡治哽之法皆以類
推如鸕鷀治魚哽磁石治針哽髮灰治髮哽狸
虎治骨哽亦各從其類也

四肢

陽主四肢經云四肢者諸陽之本也又云陽受氣於四肢是也陽實則肢腫經云結陽者腫四肢是也　陽虛則肢滿經云冬氣滿在四肢是也　脾主四肢經云四肢皆稟氣於胃而不得至經必因於脾乃得稟者是也　脾病四肢不舉經云脾脈太過為病在外則令人四肢不舉者是也　脾虛則四肢不用經云脾藏肉形不足則四肢不用又云四肢懈惰此脾精之不行

是也治見痿及中風　五藏有邪留在支節經云肺心有邪其氣留於兩肘肝有邪其氣留於兩腋脾有邪其氣留於兩髀腎有邪其氣留於兩膕是也治見痛痹　運氣四肢不舉皆屬濕經云土太過曰敦阜敦阜之紀其病腹滿四肢不舉是也

筋 轉筋

靈樞經筋篇云足太陽之筋起於足小指上結於踝邪上結於膝其下循足外側結於踵上循跟結於膕其別者結於腨外上膕中內廉與膕中并上結於臀上挾脊上項其支者別入結於舌本其直者結於枕骨上頭下顏結於鼻其支者為目上網下結於頄其支者從腋後外廉結於肩髃其支者入腋下上出缺盆上結於完骨其支者出缺盆邪上出於頄其病小指支跟

腫痛膕攣脊反折項筋急肩不舉腋支缺盆中紐痛不可左右搖治在燔針劫刺以知為數以痛為輸名曰仲春痹　足少陽之筋起於小指次指上結外踝上循脛外廉結於膝外廉其支者別起外輔骨上走髀前者結於伏兔之上後者結於尻其直者上乘䏚季脇上走腋前廉繫於膺乳結於缺盆直者上出腋貫缺盆出太陽之前循耳後上額角交巔上下走頷上結於頄支者結於目眥為外維其病小指次指支轉筋

引膝外轉筋膝不可屈伸膕筋急前引髀後引
尻即上乘䏚季脇痛上引缺盆膺乳頸維筋急
從左之右右目不開上過右角並蹻脈而行左
絡於右故傷左角右足不用命曰維筋相交治
在燔針劫刺以知為數以痛為輸名曰孟春痺
也 足陽明之筋起於中三指結於跗上邪外
上加於輔骨上結於膝外廉直上結於髀樞上
循脇屬脊其直者上循骭結於膝其支者結於
外輔骨合少陽其直者上循伏兎上結於髀聚

於陰器上腹而布至缺盆而結上頸上挾口合
於頄下結於鼻上合於太陽太陽為目上網陽
明為目下網其支者從頰結於耳前其病足中
指支脛轉筋腳跳堅伏兎轉筋髀前腫㿗疝腹
筋急引缺盆及頰卒口僻急者目不合熱則筋
縱目不開頰筋有寒則急引頰移口有熱則筋
弛縱緩不勝收故僻治之以馬膏膏其急者以
白酒和桂塗其緩者以桑鈎鈎之即以生桑
灰置之坎中高下以坐等以膏熨急頰且飲美

酒噉美炙肉不飲酒者自強也為之三拊而已
治在燔針劫刺以知為數以痛為輸名曰季春
痺也 足太陰之筋起於大指之端內側上結
於內踝其直者絡於膝內輔骨上循陰股結於
髀聚於陰器上腹結於臍循腹裏結於肋散於
胸中其內者著於脊其病足大指支內踝痛轉
筋痛膝內輔骨痛陰股引髀而痛陰器紐痛下
引臍兩脇痛引膺中脊內痛治在燔針劫刺以
知為數以痛為輸命曰孟秋痺也 足少陰之

筋起於小指之下並足太陰之筋邪走內踝之
下結於踵與太陽之筋合而上結於內輔之下
並太陽之筋而上循陰股結於陰器循脊內挾
膂上至項結於枕骨與足太陽之筋合其病足
下轉筋及所過而結者皆痛及轉筋病在此者
主癇瘛及痙在外者不能俛在內者不能仰故
陽病者腰反折不能俛陰病者不能仰治在燔
針劫刺以知為數以痛為輸在內者熨引飲藥
此筋折紐紐發數甚者死不治名曰仲秋痺也

足厥陰之筋起於大指之上上結於內踝之前上循脛上結內輔之下上循陰股結於陰器絡諸筋其病足大指支內踝之前痛內輔痛陰股痛轉筋陰器不用傷於內則不起傷於寒則陰縮入傷於熱則縱挺不收治在行水清陰氣其病轉筋者治在燔針劫刺以知為數以痛為輸名曰季秋痹也　手太陽之筋起於小指之上結於腕上循臂內廉結於肘內銳骨之後彈之應小指之上入結於腋下其支者後走腋後

廉上繞肩胛循頸出走太陽之前結於耳後完骨其支者入耳中直者出耳上下結於頷上屬目外眥其病小指支肘內銳骨後廉痛循臂陰入腋下腋下痛腋後廉痛繞肩胛引頸而痛應耳中鳴痛引頷目瞑良久乃得視頸筋急則為筋瘻頸腫寒熱在頸者治在燔針劫刺之以知為數以痛為輸其為腫者復而銳之本支者上曲牙循耳前屬目外眥上頷結於角其痛當所過者支轉筋治在燔針劫刺以知為數以痛為

輸名曰仲夏痹也　手少陽之筋起於小指次指之端結於腕上循臂結於肘上繞臑外廉上肩走頸合手太陽其支者當曲頰入繫舌本其支者上曲牙循耳前屬目外眥上乘頷結於角其病當所過者即支轉筋舌卷治在燔針劫刺以知為數以痛為輸名曰季夏痹也　手陽明之筋起於大指次指之端結於腕上循臂上結於肘外上臑結於髃其支者繞肩胛挾脊直者從肩髃上頸其支者上頰結於頄直者上出手

太陽之前上左角絡頭下右頷其病當所過者支痛及轉筋肩不舉頸不可左右視治在燔針劫刺以知為數以痛為輸名曰孟夏痹也　手太陰之筋起於大指之上循指上行結於魚後行寸口外側上循臂結肘中上臑內廉入腋下出缺盆結肩前髃上結缺盆下結胸裏散貫賁合賁下抵季脇其病當所過者支轉筋痛甚成息賁脇急吐血治在燔針劫刺以知為數以痛為輸名曰仲冬痹也　手心主之筋起於中指

與太陰之筋並行結於肘内廉上臂陰結腋下下散前後挾脇其支者入腋散胸中結於賁其病當所過者支轉筋前及胸痛息賁治在燔針劫刺以知爲數以痛爲輸名曰孟冬痺也　手少陰之筋起於小指之内側結於銳骨上結肘内廉上入腋交太陰挾乳裏結於胸中循賁下繫於臍其病内急心承伏梁下爲肘網其病當所過者支轉筋筋痛治在燔針劫刺以知爲數以痛爲輸其成伏梁唾血膿者死不治經筋之

病寒則反折筋急熱則筋弛縱不收陰痿不用陽急則反折陰急則俛不伸焠刺者刺寒急也熱則筋縱不收無用燔針名曰季冬痺也　足之陽明手之太陽筋急則口目爲噼眥急不能卒視治皆如右方也　形樂志苦病生於筋治之以熨引　諸筋病皆屬於節經云諸筋者皆屬於節又云手屈而不伸者病在筋是也　肝主諸筋經云肝主筋又云在藏爲肝在體爲筋又云酸生肝肝生筋筋生心是也　筋病忌風忌食酸辛忌久行經云風傷筋燥勝風酸傷筋辛勝酸又云酸走筋筋病無多食酸又云多食辛則筋急而爪枯又云久行傷筋是也

轉筋　經云足太陽之下血氣皆少則善轉筋踵下痛　丹溪云轉筋皆屬血熱四物加黄芩紅花蒼朮南星有筋轉於足大指轉上至大腿近腰結了乃因奔走飲酒感寒而作加酒芩蒼朮紅花南星薑煎服　仲景云轉筋之爲病其臂脚直脉上下行微弦轉筋入腹者雞矢白

散主之用雞矢白一味爲散取方寸匕以水六合和温服　聖惠方治肝虚轉筋用赤蓼莖葉切作三合水一盞酒三合煎至四合去查温分二服　孫尚藥治脚轉筋疼痛攣急松節貳兩細剉如米粒乳香壹錢右件藥用銀石器内慢火炒令焦只留壹分性出火毒研細每服壹錢至貳錢熱木瓜酒調下凡是筋病皆治之　外臺治轉筋取故綿以醋浸甑中蒸及熱用綿裹病人脚令更易勿停瘥止　丹溪云轉筋編

身入脏不忍者作極鹹鹽湯於槽中暖浸之
霍亂四時氣篇轉筋於陽治其陽轉筋於陰治其陰皆焠刺之要全甞云此則經所謂以痛爲輸之法蓋用火燒燔針刼刺轉筋之時當察轉筋之痛在何處在陽刺陽在陰刺陰隨其所痛之處刺之故曰以痛爲輸也若以一針未知則再刺之以知覺應効爲度故曰以知爲數也
資太師云轉筋兩踝灸承山而可治
霍亂轉筋已見霍亂門此謂不因霍亂而筋自轉者

骨

腎主骨在體爲骨在藏爲腎又云腎之合骨也其榮髮也　又云少陰者冬脈也伏行而濡骨髓也　骨病忌食甘苦久立經云多食甘則骨痛而髮落又云苦走骨骨病無多食苦又云久立傷骨是也　骨病不屈經云手屈而不伸者病在筋伸而不屈者病在骨在骨守骨在筋守筋是也　骨度詳靈樞骨度篇骨空詳素問骨空篇

肉

脾主肉經云脾主肉在體爲肉在藏爲脾又云邪在脾胃則病肌肉痛是也　脾病在谿經云北方黑色入通於腎故病在谿谿者肉之小會也　素問氣穴論帝曰願聞谿谷之會也岐伯曰肉之大會爲谷肉之小會爲谿肉分之間谿谷之會以行榮衛以會大氣邪溢氣壅脉熱肉敗榮衛不行必將爲膿內消骨髓外破大膕留於節湊必將爲敗積寒留舍榮衛不居卷肉縮筋肋肘不得伸內爲骨痺外爲不仁命曰不足大寒留於谿谷也谿谷三百六十五穴會亦應一歲其小痺淫溢循脉往來微鍼所及與法相同　形樂志樂病生於肉治之以鍼石　濕傷肉甘傷肉經云濕傷肉風勝濕甘傷肉酸勝甘又云甘走肉肉病無多食甘又云多食酸則肉胝䐢而脣揭是也　坐樂傷肉經云久坐傷肉又云形樂志樂病生於肉治之以鍼石是也

皮膚

素問皮部篇黃帝問曰余聞皮有分部脉有經紀筋有結絡骨有度量其所生病各異別其分部左右上下陰陽所在病之始終願聞其道岐伯對曰欲知皮部以經脉爲紀者諸經皆然陽明之陽名曰害蜚上下同法視其部中有浮絡者皆陽明之絡也其色多青則痛多黑則痺黃赤則熱多白則寒五色皆見則寒熱也絡盛則入客於經陽主外陰主內少陽之陽名曰樞持上下同法視其部中有浮絡者皆少陽之絡也絡盛則入客於經故在陽者主內在陰者主出以滲於內諸經皆然太陽之陽名曰關樞上下同法視其部中有浮絡者皆太陽之絡也絡盛則入客於經少陰之陰名曰樞儒上下同法視其部中有浮絡者皆少陰之絡也絡盛則入客於經其入經也從陽部注於經其出者從陰內注於骨心主之陰名曰害肩上下同法視其部中有浮絡者皆心主之絡也絡盛則入客

於經太陰之陰名曰關蟄上下同法視其部中有浮絡者皆太陰之絡也絡盛則入客於經凡十二經絡脉者皮之部也是故百病之始生也必先於皮毛邪中之則腠理開開則入客於絡脉留而不去傳入於經留而不去傳入於府廩於腸胃邪之始入於皮也泝然起毫毛開腠理其入於絡也則絡脉盛色變其入客於經也則感虛乃陷下其留於筋骨之間寒多則筋攣骨痛熱多則筋弛骨消肉爍䐃破毛直而敗帝曰

夫子言皮之十二部其生病皆何如岐伯曰皮者脉之部也邪客於皮則腠理開開則邪入客於絡脉絡脉滿則注於經脉經脉滿則入舍於府藏也故皮者有分部不與而生大病也帝曰善　皮膚屬肺經云肺之合皮也其榮毛也又云肺主皮毛在藏為肺在體為皮毛是也　毛折爪枯為手太陰絕經云手太陰者行氣溫於皮毛者也氣不榮則皮毛焦皮毛焦則津液去皮絕者津液既去則爪枯毛折毛折者毛先死

皮膚痛　屬心實經云夏脉者心也[illegible]則病身熱膚痛為浸淫　運氣皮膚痛皆屬火邪傷肺經云少陰在泉熱淫所勝病寒熱皮膚痛又云少陰司天火淫所勝[illegible]皮膚痛又云少陰之復咳皮膚痛治以苦寒是也　針灸皮膚痛取肺經云邪在肺則病皮膚痛寒熱上氣喘汗出咳動肩背取之膺中外腧背三節五椎之傍以手疾按之快然乃刺之取之缺盆中以越之是也[illegible]

皮膚索澤　即仲景所謂皮膚甲錯蓋皮膚澀而不滑澤者是也　三陽為病發寒熱其傳為索澤王註云索盡也精血枯涸故皮膚潤澤之氣皆盡也　運氣皮膚索澤屬燥金傷肺經云陽明在泉燥淫所勝病體無膏澤治以苦寒是也　仲景云五勞虛極羸瘦腹滿不能飲食食傷憂傷飲傷房室傷饑傷勞傷經絡榮衛傷內有乾血肌膚甲錯兩目黯黑緩中補虛大黃䗪蟲

蟲丸主之　咳有微熱煩滿胸中甲錯是爲肺
癰葦莖湯主之　人有羸如枯魚之鱗者水洗
飲也　針灸皮膚索澤取足少陽經云足少陽
之脉是動則病體無膏澤視䐃虛熱寒脇下取
之也

髭髮

內經云腎者主蟄封藏之本精之處也其華在
髮　腎之合骨也其榮髮也多食甘則骨痛而
髮落（甘走肉甘勝則腎不勝故骨痛而髮落）　女子一七歲腎
氣實齒更髮長五七陽明脉衰面始焦髮始墮
丈夫八歲腎氣實髮長齒更五八腎氣衰髮墮
齒槁　巢氏病源云足少陽膽之經其榮在鬚
足少陰腎之經其華在髮衝任之脉爲十二經
之海謂之血海其別絡上脣口若血盛則榮於

頭髮故鬚髮美若血氣衰弱經脉虛竭不能榮
潤故鬚髮脫落　帝曰婦人無鬚者無氣血乎
岐伯曰衝脉任脉皆起於胞中上循胸裏爲經
絡之海其浮而外者循腹上行會於咽喉別絡
脣口今婦人之生有餘於氣不足於血以其數
脫血也（女人月月而經通故日數脫血衝任之脉不榮口脣故）
鬚不生焉又曰人有傷於陰陰氣絕而不起陰
不用然其鬚不去宦者獨去其故何也岐伯曰
宦者去其宗筋傷其衝脉血瀉不復皮膚內結

脣口不榮故鬚不生有人未嘗有所傷不脫於
血其鬚不生何也曰此天之所不足也稟衝任
不盛宗筋不成有氣無血脣口不榮故鬚不生
髭鬚黃赤者多熱多氣白者少血少氣黑色
者多血少氣美眉者太陽多血通髯極鬚者少
陰多血美鬚者陽明多血此其時然也

鬚髮黃白 張天師草還丹 七寶美髯丹 俱
用自己髮不足則父子一氣者又不足則無病
童男女髮與胎髮用皂角水洗淨無油氣爲度

入新鍋內上用小鍋蓋之鹽泥固口勿令泄氣
桑柴慢火煅三炷香冷定取出研爲細末俟用
每服貳分空心酒調下 揩齒變白髮方 酸石榴
皮一個泥裹燒令通赤候冷去泥用茄子根與
槐枝同燒令煙絕急以器蓋之候冷用槐枝馬
齒莧臍上生者好不令人見搽薄荷石膏五倍
子燒熱川升麻各等兩爲末揩牙不但變白爲
黑亦且堅牙甚妙 東垣青絲散 西嶽石碑
方 拔白生黑良日正月四日二月八日三月

十三四月十六五月二十六月二十七月二十
八八月十九九月二十五十月一日十一月十
一日十二月十日早起拔之永不白又正月五
日十三日二月八日十八日三月三日四月十
三二十五五月五日十五日六月十四二十四
七月十八二十八八月九日十日九月八日十
八日十月十三二十三十一月十日十二月十
六日已上月日並用午時前拔之凡拔時先以
木於石上磨丁香汁候拔了急手傅於毛孔中

即生黑者 李卿換白髮方云刮老生薑皮一
大升於鐺中以文武火煎之不得令過沸其鐺
唯得多油膩者尤佳更不須洗刮便以薑皮置
鐺中密封閉濟勿令通氣令一精細人守之地
色未分時便須煎之緩緩不得令火急如其人
稍疲即換人看火一伏時即成置於鉢中研極
細李方雖曰一伏時若火候勻至日西即藥成
也使時以小簪腳蘸取如麻子大先於白髮下
點藥訖然後拔之再點以手指熟撚之令入肉

第四日當有黑者生神效

【髮落極】東垣云脉弦氣弱皮毛枯槁髮脫落黃芪建中湯主之髮脫落及臍下痛四君子湯加熟地黃　丹溪治胡氏子年十七八歲髮脫不留一莖飲食起居如常脉微弦而澀輕重皆同此厚味成熱濕痰在膈間又日多吃梅酸味收濕熱之痰隨上升之氣至於頭熏蒸髮根之血漸成枯槁遂一時盡脫遂處以補血升散之藥用防風通聖散去芒硝唯大黃三度酒炒

兼以四物湯酒製合和作小劑煎以灰湯入水頻與之兩月餘後診其脉濕熱漸解停藥淡味調養又二年髮長如初而愈　甜瓜葉治人無髮搗汁塗之卽生　滋榮散　三聖膏　治髮落不生令長麻子一升熬令黑壓油以傅頭髮上　千金云麻葉桑葉二味以泔煮沐髮七次可長六尺　眉毛墮落生半夏羊矢燒焦等分爲末薑汁調塗　又用七月烏麻花陰乾爲末生烏麻油浸每夜傅之烏麻卽秋麻是也

腋

【腋】謂臂下脇上際也屬手厥陰心包絡經（[illegible]入手足厥陰合生見於[illegible]）又屬足厥陰肝經（[illegible]）【腋前】屬手太陰肺經【腋後】屬少陰心經【腋下】屬足厥陰肝經【[illegible]】屬足太陰脾之大絡（[illegible]）

【腋腫】內經針灸腋腫有二法　其一取膽經云腋足少陽之脉所生病者缺盆中腫痛腋下腫

脉是也　其二取心經云心主手厥陰脉是動則病手心熱腋腫皆視虛實寒熱附下施補瀉當灸也

【腋臭】亦曰狐臭有瘦諸藥鮮能除根止堪塞簽耳用銅青好者不拘多少米醋調成膏先用皂角煎湯洗淨腋下以輕粉換過却使上件塗之立效

中蠱毒

凡蠱毒有數種曰蛇毒蜥蜴毒蝦蟆毒蜣蜋草毒等皆是變亂元氣人有故造作之者即謂之蠱也多因飲食內行之與人禍患禍患於他則蠱主吉利所以人畜蓄之中其毒者心腹絞痛如有物嚙或吐下血皆如爛肉或好臥闇室不欲光明或心性反常乍嗔乍喜或四肢沉重百節痠疼或乍寒乍熱身體習習而痺胸中滿悶或頭目痛或吐逆不定或目面青黃甚者十指

俱黑診其脉緩大而散皆其候也然其毒有緩有急急者倉卒或數日便死緩者延引歲月遊走腸內蝕五藏盡則死　凡入蠱鄉見人家門限屋梁絕無塵埃潔淨者其家必畜蠱當用心防之如不得已喫其飲食即潛地於初下箸時收藏一片在手儘喫不妨少頃却將手藏之物埋於人行十字路下則蠱反於本家作鬧蠱主必反來求或食時讓主人先動箸或明問主人云莫有蠱麼以箸築卓而後食如是則蠱皆不能為害　南方有蠱毒之鄉於他家飲食即以犀角攪之白沫起即為有毒無沫者即無毒也

欲知蠱主姓名者以敗鼓皮燒作灰令病人飲服方寸匕須臾自呼蠱家姓名可語之令呼喚將去則愈治之亦有方　驗蠱法令病人唾於水內沉者是蠱浮者即非或令含黑豆驗之若豆脹皮脫者是蠱豆不脹皮不脫即非又初虞世方云嚼黑豆不腥嚼白礬味甜皆中毒之候也　凡初中蠱在膈上者用歸魂散吐之已

下膈者雄朱丸下之　吐利後猶覺前後心刺痛拘急咽中如茅刺者此是取利後氣之候也更不須再服吐利藥但服桔梗散自然平復

西溪叢話云泉州一僧能治金蠶蠱毒如中毒者先以白礬末令嘗不澀次食黑豆不腥乃中毒也即濃煎石榴皮汁飲之即吐出有蟲皆活無不愈者李晦之云凡中毒以白礬茶芽搗為末冷水服　廣南挑生殺人以魚肉延客對之行厭勝法魚肉能反生於人腹中而人以之

傳謂人死陰役於其家昔雷州推官符昌言人
乾道五年親勘一公事買肉置之盤中偶因治
法以驗其術有頃肉果生毛何物淫鬼乃能爾
也然解之亦甚易但覺有物在胸膈則急服升
麻以吐之覺在腹中急服鬱金以下之雷州鏤
板印行者蓋得之於囚也　夷堅志云陳可大
知肇慶府肋下忽腫起如癰狀頃之大如盤識
者云此中挑生毒也俟五更以菉豆嚼試若香
甘則是已而果然使擣川升麻取冷熟水調貳

大盞服之遂洞下瀉出生葱數莖根葉皆具腫
即消續煎平胃散調補且食白粥經旬復常
雷州康財妻為蠻巫用雞挑生值商人楊一者
善醫與藥服之食頃吐積肉一塊剖開筋膜中
有生肉雞形已具康訴於州捕巫寘獄伏辜揚
令具疾證及所用藥略云凡喫魚肉瓜果湯茶
皆可挑初中毒覺胸腹稍痛明日漸加攪刺滿
十日則內物能動騰上則胸痛沉下則腹痛積
而瘦悴其候也在上鬲則取之法用熱茶一甌

投膽礬半錢於中候礬化盡通口呷服良久以
雞翎探喉中即吐出毒物在下鬲則瀉之以米
飲下鬱金末二錢毒即瀉下乃以人參白朮各
半兩為末同無灰酒半升納瓶內慢火熬半日
許度酒熟取出溫服之日一盃五日乃止　佛
說解蠱毒神呪凡在旅中飲食先默念七遍其
毒不行呪曰　姑蘇琢　磨耶琢　吾知蠱毒
生四角　父是穹隆窮　母是耶舍女　眷屬
百千萬　吾今悉知汝　摩訶薩摩訶　凡見

飲食上有蛛絲便莫喫　又法每遇所到處念
藥王萬福七遍亦驗　灸蠱毒法當足小指尖
灸三炷即有物出酒上得者酒出肉果上得者
肉果上出飰上得者飰出餘如方
【診】脉訣云凡脉尺寸緊數形又似釵直吐轉
增此患蠱毒急須救脉逢數軟病延生　經云
脉浮濇而疾者生微細者死洪大而遽者生

蟲

蟲由濕熱鬱蒸而生觀之日中有雨則禾節生蟲其理明矣善乎張戴人推言之也曰水火屬春夏濕土屬季夏水從土化故多蟲焉人患蟲積多由饑飽調燮失宜或過餐魚鱠白酒或多食牛羊或誤啖鱉莧中脘氣虛濕熱失運故生寸白諸蟲或如蚯蚓或似龜鱉小兒最多大人間有其候心嘈腹痛嘔吐涎沫面色痿黃眼眶鼻下青黑以致飲食少進肌肉不生沉沉默默

欲眠微有寒熱如不早治相生不已古人云蟲長一尺則能害人蟲若貫串殺人甚急治法追蟲取積以剪紅丸節神丸遇仙丹　夫人腹中有尸蟲此物與人俱生而為人大害尸蟲之形狀似大馬尾或如薄筋依脾而居乃有頭尾皆長三寸又有九蟲一曰伏蟲長四分　二曰蚘蟲長一尺三曰白蟲長一寸四曰肉蟲狀如爛杏五曰肺蟲狀如蠶六曰胃蟲狀如蝦蟆七曰弱蟲狀如瓜瓣八曰赤蟲狀如生肉九曰蟯蟲至細微形如菜蟲狀伏蟲則群蟲之主也蚘蟲貫心殺人白蟲相生子孫轉多其母轉大長至四五丈亦能殺人肉蟲令人煩滿肺蟲令人咳嗽胃蟲令人嘔吐胃逆喜噦弱蟲又名膈蟲令人多唾赤蟲令人腸鳴蟯蟲居胴腸之間多則為痔劇則為癩因人瘡處以生諸癰疽癬瘻瘑疥齲蟲無所不為人亦不必盡有有亦不必盡多或偏有或偏無類婦人常多其蟲凶惡人之極患也常以白筵草沐浴佳根葉皆可用既是香

草且是尸蟲所畏也　凡欲服補藥及治諸病皆須去諸蟲并痰飲宿澼醒醒除盡方可服補藥不爾必不得藥力　凡得傷寒及天行熱病腹中有熱又人食少腸胃空虛三蟲行作求食蝕人五藏及下部若齒齗無色舌上盡白甚者脣裏有瘡四肢沉重忽忽喜眠當數看其上脣內有瘡唾血脣內如粟瘡者心內懊憹痛悶此蟲在上蝕也　九蟲皆由藏府不實脾胃皆虛雜食生冷甘肥油膩鹹藏等物節宜不時腐敗

停滯所以發動又有神志不舒精魂失守及五藏勞熱又病餘毒氣血積鬱而生或食瓜果與畜獸內藏遺留諸蟲子類而生蟲之爲候嘔惡吐涎口出清沫痛有去來乍作乍止寸白蟲色白形褊損人精氣力乏腰疼蟯蟲細如菜蟲能爲痔漏瘡癩疥癬癰疽等患寸白蟯蚘是三者皆九蟲數中之一物也外此又有兒童疳䘌昏睡煩燥鼻爛汁臭齒斷生瘡下利黑血蟲入下部爲狐下脣有瘡蟲食其藏爲惑上脣有瘡

三蟲者謂長蟲赤蟲蟯蟲也乃有九種而蟯蟲及寸白人多病之寸白從食牛肉飲白酒所成相連一尺則殺人服藥下之須結裹潰然出盡乃佳若斷者相生未已更宜速治之蟯蟲多是小兒患之大人亦有其病令人心痛清朝口吐汁煩躁則是也其餘各種種不利人人胃無不有者宜服九蟲丸以除之　蛔蚘者是九蟲之一也長一尺亦有長五六寸或因藏府虛弱而動或因食甘肥而動其發動則腹中痛發作腫聚行來上下痛有休息亦攻心痛腹中熱口中喜涎及吐清水貫傷心者則死診其脉腹中痛其脉法當沉弱弦今反洪而大則蛔蟲也　蚘蟲九蟲之數人腹中皆有之小兒失乳而哺早或食甜過多胃虛蟲動令人腹痛惡心口吐清水腹上有青筋火煨史君子與食以殼煎湯送下甚妙然世人多於臨卧服之又無日分多不驗唯是於月初四五間五更服之至日午前蟲盡下可以和胃温平藥一兩日調理之不可多

也九蟲在人腹中月上旬頭向上中旬横之下旬頭向下故中下旬用藥即不入蟲口所以不驗也牛馬之生子上旬生者行在母前中旬生者並有而行下旬生者後隨之猫之食鼠亦然上旬食上段中旬中段下旬下段自然之理物皆由之而莫知之　客座新聞云青陽夏戚宗陽家素業醫任江陰訓科有儒生之父患腹脹求其診視乃曰脉洪而大濕熱生蟲之象況飲食如常非水腫蠱脹之證以石榴皮椿樹各東

行根加檳榔三味各五錢用長流水煎空心頓服之少頃腹作大痛瀉下長蟲一丈許遂愈本事方云肺蟲如蠶能殺人居肺葉之內蝕人肺系故成瘵疾由是欬嗽咯血聲嘶藥所不到治之爲難道藏經中載諸蟲頭皆向下唯自初一至初五以前蟲頭向上故用藥多取効者此也又姚寛西溪叢話云五臟蟲皆上行唯有肺蟲下行最難治用獺爪爲末調藥於初四初六日治之此日肺蟲上行也二說小異姑兩存之

以備參考　洎宅編永州通判廳軍員毛景得奇疾每語喉中必有物作聲相應有道人教令誦本草藥名至藍而默然遂取藍捩汁而飲之少頃吐出肉塊長一寸餘人形悉具自後無聲

陳正敏遯齋閑覽載楊勔中年得異疾每發言應答腹中有小聲効之數年間其聲浸大有道人見而驚曰此應聲蟲也久不治延及妻子宜讀本草遇蟲不應者當取服之勔如言讀至雷丸蟲無聲乃頓服之遂愈正敏後至長沙遇一丐者亦有是疾環而觀之甚衆教使服雷丸丐者亦愈　丁志記齊州士曹席進孺招所親張彬秀才爲館舍彬嗜酒每夜必置數升於牀隅一夕忘設至夜半大渴求之不可得忿悶呼躁俄頃嘔吐一物於地旦起視之見牀下肉塊如肝而黃上如蜂窠猶微動取酒沃之唧唧有聲始悟平生酒病根本亟投諸火中後遂不飲

庚志記趙子山字景高寓居邵武軍天王寺苦寸白蟲爲撓醫者戒云是疾當止酒而以素

所躭嗜欲罷不能一夕醉於外舍歸已夜半口乾咽燥倉卒無湯飲適廊廡下有甕水月色下照瑩然可掬即酌而飲之其甘如飴連飲數酌乃就寢迨曉蟲出盈席覺心腹頓寬宿疾遂愈一家皆驚異驗其所由蓋寺僕日織草屨浸紅藤根水也　吳少師在關外嘗得疾數月間肌肉消瘦每日飲食下咽少時腹如萬蟲攢攻且痒且痛皆以爲勞瘵也張鋭是時在成都吳遣驛騎招致鋭到興元旣切脉戒云明日早且忍

饑勿啖一物俟銃來為之計旦而往天方剌暑白請選一健卒趨往十里外取行路黃土一銀盂而令廚人旋治麪將午乃得食纔放筯取土適至於是溫酒一升投土攪其內出藥百粒進於吳飲之覺腸胃掣痛幾不堪忍急登溷銃密使別坎一穴便掖吳以行須臾暴下如傾穢惡斗許有馬蝗千餘宛轉盤結其半已困死吳亦憊甚扶憩竹榻上移時方餐粥一器三日而平始信去年正以夏夜出師中塗躁渴命候兵持

馬盂挹澗水甫入口似有物焉未暇吐之則徑入喉矣自此遂得病銃曰蟲入人肝脾裏勢須滋生常日遇食時則聚丹田間吮咂精血飽則散處四肢苟惟知殺之而不能掃盡故無益也銃是以請公枵腹以誘之此蟲喜酒又久不得土味乘饑畢集故一藥能洗空之耳吳大喜厚賂以金帛送之歸（瀉出後宜以四物湯加黃耆煎服生血調理）蔡定夫戡之子康積苦寸白為孽醫者使之碾檳榔細末取石榴東引根煎湯調服之先炙肥豬

肉一大臠真口中嚼咀其津膏而勿食云此蟲惟月三日以前其頭向上可用藥攻打餘日即頭向下縱有藥皆無益蟲聞肉香咂啖之意故空群爭赴之覺胸中如萬箭攻攢是其候也然後飲前藥蔡悉如其戒不兩刻腹中雷鳴急登廁蟲下如傾命僕以杖挑撥皆聯綿成串幾長數丈尚蠕蠕能動舉而拋於溪流宿患頓愈